


5.1203.





## MÉMOIRES

DE

LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

S. 1203.

IMPRIMERIE DE JULES-Gme FICK, RUE DES BELLES-FILLES, 40.

# MÉMOIRES

DE

## LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE

ET

#### D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

Tome Treizième.

GENÈVE,

LIBRAIRIE DE JOEL CHERBULIEZ, AU HAUT DE LA CITÉ.

PARIS,

MÈME MAISON, 10, RUE DE LA MONNAIE.

1854

SHIHIMAIN

DIDISTRIS NO RESIDUE AL

RECOURTER BUILDING

THE PARTY NO.



Printer



# MÉMOTRES

DE LA

# SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE

### D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

TOME XIII, 1re PARTIE.


GENÈVE, JOEL CHERBULIEZ, LIBRAIRE, AU HAUT DE LA CITÉ.

PARIS,

MÊME MAISON, 6, PLACE DE L'ORATOIRE.

1852





### **MÉMOIRES**

DE

### LA SOCIETE DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

IMPRIMERIE DE JULES-Gme FICK, RUE DES BELLES-FILLES, 40.

# MÉMOIRES

Z PA DETTE

## LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE

ET

#### D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

Tome XIII. — Première Partie.

#### GENÈVE,

LIBRAIRIE DE JOEL CHERBULIEZ, AU HAUT DE LA CITÉ.

#### PARIS,

MÊME MAISON, 6, PLACE DE L'ORATOIRE.

1852



# MÉMOIRES

DE

# LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE

#### ET D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

## RÉSUMÉ

DES

## OBSERVATIONS THERMOMÉTRIQUES

ET BAROMÉTRIQUES

FAITES A GENÈVE ET AU GRAND ST.-BERNARD

PENDANT LES DIX ANNÉES 1841 - 1850

PAR

#### E. PLANTAMOUR

Professeur d'Astronomie à l'Académie de Genève.

(Lu à la Sociéte de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 20 Mars 1851.)

Dans un précédent mémoire (voyez Archives des Sciences physiques et naturelles, N° 15) j'ai rapporté les comparaisons faites à différentes époques, depuis 1841, entre le TOME XIII, 1<sup>re</sup> PARTIE.

baromètre de l'Observatoire de Genève et celui du Grand St.-Bernard, et celles que le séjour à Genève de plusieurs savants étrangers a permis de faire entre leurs baromètres et le nôtre. Je renvoie à ce mémoire pour tout ce qui concerne les instruments, leur exposition et le mode de réduction des observations: le but que je me suis proposé dans le présent résumé, est de déterminer les variations diurnes et annuelles de la température et de la pression atmosphérique pour Genève et pour le St.-Bernard, d'après les observations publiées depuis dix ans dans la Bibliothèque Universelle, puis d'étudier l'influence de ces variations sur le calcul de la différence de hauteur des deux stations au-dessus de la mer.

#### Variation diurne de la température à Genève.

Les observations du thermomètre ont été faites, pendant ces dix années, à douze époques différentes de la journée, mais les heures ne sont pas restées les mêmes pour toutes les années, ensorte qu'il a fallu recourir à l'interpolation pour compléter les observations. Lorsque, pour quelquesunes des années, la température avait été observée à une certaine heure, et que pour d'autres elle ne l'avait pas été, il fallait la calculer, pour les dernières, d'après les observations faites à des heures voisines. Pendant les dix années, de 1841 à 1850, le thermomètre a été observé à 0 h. 1, à 8 h.

<sup>1</sup> Les heures sont comptées de 0 h à 24 h, à partir du midi moyen.

et à 20 h.; pendant huit ans, de 1841 à 1848, il a été observé à 9 h., 21 h. et à 3 h.; pendant quatre années, de 1847 à 1850, à 6 h. et 18 h.; pendant deux ans, de 1849 à 1850, à 2 h., 4 h. 10 h. et 22 heures. La marche que j'ai suivie dans l'interpolation pour les heures manquantes est celle-ci : j'ai commencé par calculer pour les deux années 1849-50 les heures manquantes, savoir 9 h. 21 h. et 5 h.; puis pour les deux années 1847-48, les heures manquantes, savoir 2 h., 4 h., 10 h., 22 heures. J'ai complété ainsi, pour ces quatre années, la série des douze observations faites à 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22; enfin la comparaison de ces observations avec celles faites de 1841 à 46 à 0, 5, 8, 9, 20, 21 m'a permis de compléter les observations manquantes dans cette dernière série. Le tableau suivant renferme, pour chaque mois, d'après la moyenne des dix années, la température aux douze époques de la journée, où les observations ont été faites; dans le calcul de la moyenne annuelle, on a tenu compte du nombre de jours compris dans chaque mois.

1 A 1850.
184
DE
GENÈVE
V
OBSERVÉE.
TEMPÉRATURE (

ii ii	JANVIER.	FÉVRIER.	MARS.	AVRIL.	MAI.	JUIN,	JUILLET.	AOUT.	SEPTEMBRE	OCTOBRE.	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	ANNÉE.
0	+ 00,71	+ 30, 40	+ 70,02	+ 110,23	+ 160,24	+ 190,98	+ 210,31	+ 200, 47	+ 170,53	+ 120,05	+ 60,74	+ 20, 12	+ 110,61
c?	+ 1, 22	+ 4, 19	7,89	11,82	16,98	20,86	22, 29	91, 54	18, 53	12, 52		~	12,
က	+ 1,06	+ 4, 15	7, 79	11,87	16, 79	20,84	22, 20	21,54	18, 51	12, 47	6, 91		12, 24
7	+ 0, 76		7, 52	11. 42	16, 35	20, 56	21, 96	21, 21	18, 12	12, 08	6, 52	+ 1,92	11, 90
9	- 0, 09	+ 2,73	6, 20	10, 30	15, 19	19, 39	20, 75	19, 72	.16, 68	10, 60	5, 43	+1,15	10, 71
8	- 0, 59	+ 1, 68	4, 90	8,84	13, 20	17, 02	18, 39	17, 46	. 14, 80	9,34	4,77	+ 0, 62	9.24
Ç,	08 ,0 -	+ 1, 28	€F ' #	8, 28	12, 50	16, 18	17; 53	16, 58	14, 01	8, 93	4, 11	+ 0, 45	8, 69
10	-1,05	_	3, 80	7,65	11, .87	15, 21	16,65	15, 85	13, 41	8, 35	4, 13	+ 0, 26	8, 17
18	- I, 84	- 0, 45	1, 17	5,84	9,93	13, 92	14, 48	13, 34	10, 63	7, 16	3,08	- 0, 43	6, 44
20	-1,70	- 0,31	2, 79	7,88	12,86	16, 73	17,80	16,77	13, 51	8, 28	3, 38	- 0, 18	
21	- 1, 25	+ 0, 70	4, 15	8,90	13,84	17, 68	18, 72	17, 93	14, 92	9, 63	4, 33	+ 0, 25	9, 19
22	- 0, 63	+1,71	5, 36	9,84	14, 75	. 18, 59	19, 68	18,86	15, 93	10, 77	5, 48	+ 0, 92	10, 15

La variation diurne de la température peut être représentée par une formule qui établit une relation entre l'heure de la journée, la température, et des constantes fournies par l'observation; la formule est de la forme:

$$t = T + x \sin (\mu + a) + y \sin (2 \mu + b) + z \sin (3 \mu + c) + etc.$$

t étant la température à l'heure \mu de la journée, et T, x, a, y, b, z, c, etc. les constantes qu'il s'agit de calculer pour les différentes époques de l'année. L'on se contente souvent de calculer dans la formule les termes qui dépendent de  $\mu$  et de  $2\mu$ ; ces termes sont les plus considérables, surtout le premier, qui représente directement le réchauffement dû à l'insolation, pendant que le soleil est au-dessus de l'horizon, et le refroidissement produit par le rayonnement dans la partie opposée de la journée. Le second terme représente l'inégalité dans la période du réchauffement comparée à celle du refroidissement; tandis que l'insolation varie beaucoup d'intensité entre le lever et le coucher du soleil, et qu'elle atteint son maximum à midi, le rayonnement nocturne varie peu d'intensité et produit un refroidissement graduel jusqu'au lever du soleil, donc la période ascendante dans la marche de la température doit être plus courte que la période descendante, surtout en hiver, où l'intervalle compris entre le lever du soleil et son passage au méridien est le plus court. Lorsque la marche de la température n'est pas influencée par des circonstances étrangères, ces deux termes suffisent pour la représenter assez exactement, et la valeur numérique des termes suivants est ordinairement très-faible. Dans mes premiers calculs je n'avais considéré que ces deux termes, mais la

comparaison des températures calculées et observées m'a fait voir que ces deux termes ne suffisaient pas pour représenter exactement la marche de la température à Genève, surtout dans les mois de printemps et d'été; j'ai calculé alors le terme dépendant de 3  $\mu$ , et la valeur de l'angle, qui doit être ajouté à 3  $\mu$ , m'a indiqué la cause spéciale qui nécessitait l'introduction de ce terme. L'inégalité de réchauffement du sol et du lac produit, surtout dans les mois chauds, une brise qui abaisse la température au milieu de la journée; il en résulte un minimum relatif vers midi et un maximum relatif aux heures de la matinée et de l'après-midi où la brise s'élève et où elle tombe. Dans la nuit la brise de terre duc au rayonnement du sol, plus intense que celui de l'eau, produit encore un abaissement de la température, dont le maximum coïncide avec l'instant le plus froid.

Le calcul des constantes s'effectue de la manière la plus simple et la plus exacte, en appliquant la méthode des moindres carrés à des observations séparées par des intervalles de temps égaux. Pour ne pas renoncer aux avantages de cette méthode, je n'ai fait entrer dans le calcul que les observations des heures paires, les observations faites à des heures impaires pouvant servir à aprécier l'exactitude du résultat obtenu. J'ai suppléé à la lacune que présentaient les observations pour les époques de 12 h., 14 h. et 16 h., en procédant par voie d'approximation, c'est-à-dire, en faisant pour les températures correspondant à ces trois époques des hypothèses, que je corrigeais dans des approximations successives jusqu'à ce que j'obtinsse des résultats identiques.

J'ai trouvé ainsi les formules suivantes qui représentent numériquement la marche diurne de la température aux différentes époques de l'année:

```
Janvier t = -0^{\circ},56 + 1^{\circ},37 \sin(\mu + 41^{\circ},5) + 0^{\circ},50 \sin(2\mu + 44^{\circ},2) + 0^{\circ},12 \sin(3\mu + 32^{\circ},2)
Ferrier t = +1, 55 +2, 14 sin (\mu+36, 9) + 0, 75 sin (2 \mu+42, 4) + 0, 08 sin (3 \mu+73, 0)
     t = +4, 26+3, 44 \sin(\mu + 42, 3) + 0, 56 \sin(2\mu + 83, 0) + 0, 04 \sin(3\mu + 248, 5)
     t = +8,46+3,33 \sin (\mu + 49,5) + 0,36 \sin (2 \mu + 104,5) + 0,08 \sin (3 \mu + 255,0)
Hai
     t = +12,96+3,99 \sin{(\mu + 52,7)} + 0,37 \sin{(2 \mu + 122,8)} + 0,16 \sin{(3 \mu + 260,4)}
Join
     t = +16,64+4,42 \sin (\mu +54,1) + 0,22 \sin (2 \mu +192,2) + 0,16 \sin (3 \mu +271,8)
Jaillet t = +17, 87+4, 55 \sin(\mu+51, 1) + 0, 27 \sin(2\mu+151, 0) + 0, 21 \sin(3\mu+256, 0)
     t = +16,97+4,64 \sin (\mu +50,1) + 0,38 \sin (2 \mu +129,2) + 0,29 \sin (3 \mu +262,7)
Août
Sept.
     t = +14,32+4,10 \sin(\mu+47,1)+0,50 \sin(2\mu+93,3)+0,20 \sin(3\mu+237,3)
Oct.
      t = +9,35+2,89 \sin (\mu +51,9) + 0,52 \sin (2 \mu +70,9) + 0,04 \sin (3 \mu +156,8)
     t = +4,70+1,95\sin(\mu+47,1)+0,60\sin(2\mu+63,1)+0,11\sin(3\mu+79,5)
Nov.
Déc.
      t = +0,73+1,25\sin(\mu+46,6)+0.53\sin(2\mu+48,2)+0.10\sin(3\mu+62,1)
     t = +0,50+1,55\sin(\mu+41,6)+0,59\sin(2\mu+44,7)+0,09\sin(3\mu+51,6)
      t = +8,56+3,58\sin(\mu+48,4)+0,41\sin(2\mu+100,2)+0,09\sin(3\mu+257,7)
Été.
      t = +17.17 + 4.55 \sin(\mu + 51.7) + 0.27 \sin(2\mu + 152.2) + 0.20 \sin(3\mu + 262.2)
      t = +9,46+2,96\sin(\mu+48,6)+0,55\sin(2\mu+72,8)+0,06\sin(3\mu+195,9)
Année t = +8,97+3,16\sin(\mu+48,6)+0,37\sin(2\mu+80,9)+0,06\sin(3\mu+263,6)
```

J'ai calculé à l'aide de ces formules la température de toutes les heures de la journée, pour chaque mois, pour chaque saison et pour l'année, et j'ai formé de cette manière le tableau suivant:

													_	_			_		_			-		- 2 -	
1E	n H	44	30	16	53	T,	82	59	43	30	12	13	90	03	1.1	28		48							73
SMBI	, 53°	, 2 c	4 6	, <u>,</u>	1,	1	0,	0,	0,	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,		0,
DÉCEMBRE	+-	++	- +	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	-	1	1	1	Ī	1		+			+
	18	7 7	2 5	- 23	94	11	7	14	5	00	33	10	61	83	80	91	81	85	13	65	41	53	13	t	7.0
MBR	60,7																							}	4, 1
NOVEMBRE	+	- 1	. •		43	** 2					.,														
						~	_	)~	63	~					20	<u> </u>	20		_	-	<del> </del>	1-	7-	+	35
OCTOBRE.		. 51		11.9	. 34		0 .	, 37	00	5	, 9	, 57	· .	€	9.	. 5	9 ,	0 .	, 6	5	. 5	, 5	-T		9,3
C.LO		13	91	=	11	10	10	C	Œ	ω	1~	[-	1-	9	9	9	9	I~	[-	Œ.	Ci	7	=		
	+											_									_	_		-	
SEPTEMBEE			40																		. 69				, 32
TEN	170	200	2 2	18	1	16	15	77	11	13	13	11	11	10	10	0	10	10	12	13	14	15	16		14,
SEI	+																				_				
		08	# KC	26				5					J.					99				95	83		97
AOUT.	200	177	٠, ١, ٥	21.	20,	19,	18,	17,	16,	15,	14,	13,	13,	12.	11,	11,	12,	13,	15,	16,	17,	18,	19,		16,
-	+																		٠						
i.	30	80	200	80	49	65	63	48	45	50	53	70	88	25	01	13	79	88	14	-FG	2'6	22	67	T	87
TUILLET.	210,	172	5 % 3	22,	21,	50,	19,	18,	7	16,	5	14,	13,	13,	13,	13,	13;	14.	16,	17.	18,	19,	20.		17,
JUL	+	,, ,		. (.*		04																		-	
	01	10	2 6	70	13	28	25	16	05	0.1	05	18	49	04	96	27	04	10	33	54	99	09	37	Ť	£9
JUIN.	-			20,																6,	1	20	9,		16,
15	+	N G	1 0	C4	C.4	_	-	7	_				_		_	-	_	_		7					
		D 9	2 0	46	98	00	17	33	61	7.5	86	90	99	=	11	00	000	19	98	25	83	85	15		96
M VI.	160,5																								12,
M	+	7	1 =	-	7	_	~	_	=	_	_	_						7	-	~	_	_	_		~
		n c	<b>3</b> 3/	43	63	0	6	- - - -		00	9	9	00	0		00	0	?	0	9	00	-7	2	- -	46
11.				11, 4																					8, 4
AVRIL		7 -	= =	Ξ	1.0	10	Co	ω	OC:	Ī.	9	9	1(3)	rC3	113	4	IL)	rO	9	Į	Œ	Ca	10		ω
	+				_		_												_					+	
<sub>ນກ</sub> ີ .	_			. 13																					, 26
MARS.	1 10	- 1	- 1	. 1-	9	9	S	4	4	33	ಬಾ	23	_	_	0	0	0	-	1	C.Y	4	rO	9	H	₹,
																								_	
ER.	= 1							73													62				55
FÉVRIER				37												. 0 .					0,			-	. 1,
भं	+-	<b>†</b>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ì	1	 		ı	+	+	+		+
نے	99,	000	22	97	33	80	Ţ	65	8	97	12	88	4.4	58	70	81	83	94	87	19	23	63	0.5		99
JANVIER.	00	<u>.</u>			0		0,	0	0.	0,	1.	Ι,	Ĭ,	1,	Ξ,	7	~	1,	1	1,	<u>_</u>	0	0,		0,
JAS	+	<del> -</del> -		- +	+	.	1	-1	ı	1	-	-	-	-	1	- }	1	-1	1	}	l	1	+		1
H.	0	0	2 0	2	2	9	1-	00	6	10	II	25	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Moy.
		-			-			-		_														_	

н.	HIVER.	PRINTEMPS	ÉTÉ.	AUTOMNE.	ANNÉE.
0	+ 2°, 02	+ 11°, 54	+ 20°, 65	+ 12°, 19	+ 11°, 65
1	+ 2, 46	11, 99	21, 17	12, 59	12, 11
2	+2,60	12, 18	21, 49	12,71	12, 30
3	+ 2, 46	12.11	21, 56	12, 55	12, 22
4	+ 2, 11	11, 78	21, 32	12, 17	11, 90
5	+ 1, 65	11, 24	20, 74	11,62	11, 36
6	+ 1, 20	10, 55	19,88	10.96	10,70
7	+ 0, 81	9,79	18, 85	10, 28	9, 99
8	+0,50	9,04	17, 76	9, 63	9,30
9	+ 0, 27	8, 34	16,71	9,06	8,66
10	+ 0, 10	7, 68,	15, 72	8,58	8,09
11	- 0,05	7,03	14, 79	8, 16	7.55
12	· <b>-</b> 0, 18	6, 38	13, 92	7,78	. 7, 03
13	- 0, 31	5, 75	13, 14	7, 40	6,53
14	- 0, 45	5, 19	12, 55	7, 02	6, 11
15	- 0, 62	4,86	12, 29	6,70	5,83
16	- 0,80	4, 81	12, 47	6, 52	5, 78
17	- 0, 95	5, 10	13, 13	6, 57	6.00
18	- 1, 02	5,75	14. 19	6, 92	6, 50
19	- 0, 93	6,69	15, 50	7, 58	7, 25
20	- 0, 64	7,79	16,86	8.49	8, 17
21	- 0, 10	8.92	18.10	9, 51	9, 16
22	+ 0, 60	9.97	19, 15	10,59	10, 12
23	+ 1, 35	10,86	20,00	11, 50	10, 97
Moy.	+ 0, 50	+ 8, 56	+ 17, 17	+ 9.46	+ 8.97

Si l'on compare les chiffres de ce tableau avec les températures observées, on trouve un accord très-satisfaisant; le plus grand nombre des écarts, savoir 103 sur 144, est au-dessous d'un dixième de degré; un petit nombre, savoir 12 sur 144, dépasse deux dixièmes, et il ne s'en trouve que deux au-dessus de trois dixièmes. Ces deux écarts se rencontrent dans les mois de Juillet et d'Août, dans lesquels l'ascension du thermomètre de 6 h. à 8 h. du matin est tellement rapide, qu'elle forme une anomalie dans la marche de la température, à laquelle la formule ne peut pas s'adapter complétement.

Les formules précédentes m'ont servi aussi à calculer les températures extrêmes, les instants correspondants et l'amplitude de la variation diurne; il suffit pour cela de déterminer dans la formule de chaque mois la valeur de  $\mu$  qui rend t un maximum ou un minimum, la substitution de ces valeurs de  $\mu$  donne les températures extrêmes.

On trouve ainsi:

	MAXI de la tem		MINI de la tem		AMPLITUDE de la variation
MOIS ET SAISONS.	ÉPOQUE.	t.	ÉPOQUE.	t.	diurne.
JANVIER.  FÉVRIER  MARS  AVRIL  MAI.  JUIN.  JUILLET.  AOUT  SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE	2h 1m · 2 13 2 13 2 10 2 15 2 46 2 49 2 29 1 43 1 32 1 42	+ 1°, 22 4, 28 7, 86 11, 81 16, 88 20, 92 22, 27 21, 51 18, 46 12, 50 7, 17 2, 50	18h 0m 18 4 16 16 15 35 15 19 14 43 15 11 15 26 15 58 16 4 17 16 18 6	- 1°, 94 - 0, 65 + 0, 63 + 4, 95 + 8, 69 + 11, 94 + 13, 00 + 11, 88 + 9, 96 + 6, 58 + 2, 80 - 0, 49	3°, 16 4, 93 7, 23 6, 86 8, 19 8, 98 9, 27 9, 66 8, 50 6, 01 4, 37 2, 99
HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE ANNÉE	1 59 2 13 2 46 1 54 2 13	2, 60 12, 19 21, 58 12, 71	18 2 15 40 15 7 16 20	- 1, 02 + 4, 78 + 12, 28 + 6, 50 + 5, 77	3, 62 7, 41 9, 30 6, 21 6, 54

L'instant du maximum diurne de la température ne varie dans l'année que de 1 h. 17 m. tandis que l'instant du minimum varie de 5 h. 25 m. entre le mois de Juin et le mois de Décembre. Au mois de Juin le maximum et le minimum sont à douze heures de distance, et la période ascendante de la température est égale à la période décroissante; dans le mois de Décembre le maximum arrive 7 h. 36 m. plus tard que le minimum, la période ascendante est donc de 7 h. 36 m. seulement, tandis que la période décroissante est de 16 h. 24 m., plus du double plus longue. Quant à l'amplitude de la variation diurne, elle varie dans l'année du simple au triple; elle est de trois degrés environ dans les mois de Décembre et de Janvier, et elle s'élève jusqu'à neuf degrés et demi dans les mois de Juillet et d'Août.

#### Variation annuelle de la température à Genève.

La variation annuelle de la température est représentée par une formule qui établit une relation entre l'époque de l'année, la température moyenne pour cette époque et des constantes fournies par l'observation. Soit T la température moyenne d'un jour correspondant à une époque M de l'année, M étant compté en degrés de 0 à 360 à partir du minuit qui sépare le 31 Décembre du 1er Janvier, on a

 $T = (T) + X \sin (M + A + Y \sin (2 M + B) + Z \sin (3 M + C) + etc.$ 

(T) X, Y, Z, A, B, C, étant les constantes qu'il faut dé-

terminer à l'aide des observations, c'est-à-dire de valeurs connues de la température moyenne pour certaines époques. Pour obtenir tous les avantages qu'offre la méthode des moindres carrés appliquée à ce calcul, il faut que ces époques partagent toute l'année en intervalles égaux et il s'agit de déduire des températures moyennes données plus haut pour les différents mois, les températures moyennes de douze époques équidistantes, savoir pour  $M=15^{\circ}$ ,  $M=45^{\circ}$  et ainsi de suite jusqu'à  $M=345^{\circ}$ .

Or la température moyenne de tous les jours d'un mois ne coïncide pas avec celle du jour placé au milieu du mois, parce que la température ne croit ou ne décroit pas uniformément; il faut donc tenir compte des différences secondes d'un mois à l'autre, pour calculer la température moyenne du milieu du mois. Les températures ainsi obtenues ne coïncident pas avec celles qui correspondent aux époques  $M=15^{\circ}$  M=45 etc., parce que les mois sont d'inégale longueur; il faut par conséquent réduire la température du milieu de chaque mois à celle qui correspond aux époques  $15^{\circ}$ ,  $45^{\circ}$ , etc. Après avoir exécuté cette double réduction, j'ai trouvé:

pour $M = 15^{\circ}$	$T = -0^{\circ}, 82$
45	+ 1,58
75	+ 4, 34
105	+ 8,65
135	+ 13, 17
165	+ 16, 84
195	+ 17, 97
225	+ 17, 02
255	+ 14, 37
285	+ 9,29
315	+ 4,64
345	+ 0, 61

La méthode des moindres carrés donne pour la valeur des constantes substituées dans la formule:

```
T = +8^{\circ}.97 + 9^{\circ}.25 \sin (M + 253^{\circ}.4) + 0^{\circ}.34 \sin (2M + 300^{\circ}.2) + 0^{\circ}.12 \sin /3M + 305^{\circ}.9)
```

Si l'on remplace M dans cette formule successivement par 15°, 45° etc., on trouvera pour les valeurs calculées de T et pour les différences avec les valeurs fournies par l'observation:

pour $M=15^{\circ}$	T calculé $=$ $-$	0°, 44	diff. = + 00,38
45	+	1, 12	<b>—</b> 0, 46
75	+	4, 48	+ 0, 14
105	+	8.76	+ 0, 11
135	+	13, 18	+ 0, 01
165	+	16,64	<b>—</b> 0, 20
195	+	18, 04	+ 0, 07
225	+	17, 16	+ 0, 14
255	+	14, 14	- 0, 23
285	. +	9, 51	+ 0, 22
315	+	4, 42	- 0, 22
345	+	0,61	0,00

La formule représente ainsi d'une manière très-satisfaisante la marche annuelle de la température, les mois de Janvier et de Février présentent seuls des écarts un peu considérables, mais la température moyenne de ces mois varie tellement d'une année à l'autre (la différence peut s'élever à huit degrés), qu'une série de dix années est insuffisante pour détruire complétement l'effet des variations accidentelles.

Les valeurs de M qui rendent T un maximum ou un mi-

nimum, et qui fournissent ainsi la température moyenne du jour le plus chaud et du jour le plus froid de l'année, sont:

```
pour le minimum M=11^{\circ},1, jour correspondant 12 Janvier, T=-0^{\circ},49 pour le maximum M=198, 3 21 Juillet +18, 08
```

La période ascendante de la température dans l'année est ainsi de quatorze jours et demi plus longue que la période décroissante; l'amplitude de la variation annuelle est de 18°, 57. J'ai calculé également par la formule l'époque de l'année à laquelle la température moyenne atteignait un certain chiffre, par exemple 0°, 5°, etc.; je trouve:

```
T = 0° pour M = 29°, 2, c'est-à-dire le 31 Janvier.
                      78, 9
                                          22 Mars.
     + 10
                      113, 2
                                          26 Avril.
     + 15
                      149, 1
                                           1 Juin.
    + 15
                     248, 1
                                          10 Septembre.
     + 10
                      282, 2
                                          14 Octobre.
     + 5
                      311.4
                                         13 Novembre.
                     353, 8
                                          26 Décembre.
```

Donc la température moyenne est au-dessus de + 15" pendant 100 jours du 1er Juin au 10 Sept.

La température de Genève, en ayant égard à sa position géographique et à sa hauteur au-dessus de la mer, donne lieu, par la comparaison avec les stations voisines, aux remarques suivantes: la moyenne annuelle est d'un degré au moins trop basse; l'amplitude de la variation annuelle est de 3 à 4° trop faible; c'est enfin l'été qui présente le plus grand écart dans le sens d'un abaissement considérable de la température. Comparons en effet Turin et Bâle avec Genève; on a d'après Mahlmann:

		Turin	Bàle.	Noyenne des deux stations.
	4		47°34	46'19'
			5 15	5 18
Hauteur		279 m	253 m	266 m
(	Janvier —	00,6	- 1.0	0,8
Température	Janvier — moyenne + Juillet +	11.7	+ 9,8	+ 10,8
(	Juillet +	22, 9	+ 19,3	+ 21, 1

La latitude de Genève est de 46° 12′, la longitude 3° 49′, la position géographique coïncide donc à peu près avec la moyenne de ces deux localités; mais, comme la hauteur au dessus de la mer est de 141 mètres plus grande, il faudra retrancher huit dixièmes de degré à peu près des chiffres obtenus pour la moyenne, afin de tenir compte de la différence de hauteur. On trouve ainsi:

	GENÈV	Æ.	
Températu	re caículée.	Température observée.	Diff.
Janvier	- 1º 6	<b>→</b> 0°,7	+ 00,9
Moyenne	+ 10, 0	+ 9.0	- 1,0
Juillet	+ 20, 3	+ 17, 9	- 2, 4

Des circonstances locales modifient donc la température de Genève de telle sorte que la température de l'hiver y est adoucie de près d'un degré, celle de l'été est refroidie de près de deux degrés et demi, et la température annuelle abaissée d'un degré. Je n'hésite pas à attribuer cette anomalie dans le climat de Genève au voisinage immédiat du lac, qui est alimenté en été par la fonte des glaciers et des neiges sur les hautes montagnes. La superficie du lac est d'environ 500 kilomètres carrés, la crue du lac depuis le mois de Mai jusqu'au mois d'Août est de un mètre et demi; si l'on a égard, en outre, à la circonstance que le débit du Rhône à Genève est beaucoup plus considérable en été qu'en hiver, on voit que c'est par milliards de mètres cubes qu'il faut évaluer la quantité d'eau amenée par la fonte des neiges et des glaces.

Il manque d'observations précises sur la différence de température du Rhône à son entrée dans le lac et à sa sortie; cependant, comme la température du Rhône à son entrée dans le lac ne doit pas s'écarter beaucoup de celle de l'Arve, vu l'analogie de la provenance, on peut, d'après la température de la dernière, évaluer à 5° au moins la différence ou l'échauffement de l'eau du Rhône pendant son séjour dans le lac. Ce réchauffement de l'eau du lac se fait au détriment de la température des rives; le lac est un réservoir d'où s'écoule en été de l'air froid, témoin la brise du lac dont j'ai parlé précédemment et la direction moyenne du vent, qui, à Genève, souffle habituellement du Nord-Nord-Est en été. M. Burnier a observé aussi à Morges la brise du lac et l'abaissement de la température qui en est l'effet. A Morges la direction de cette brise est du Sud-Sud-Est; enfin, à l'autre extrémité du lac, il souffle habituellement en été un vent du Nord-Ouest qui remonte la vallée du Rhône, de Villeneuve à Martigny. En hiver la température du lac est plus élevée que celle de l'air, le voisinage du lac aura donc pour effet d'adoucir la température. Le réchauffement produit en hiver par la température plus élevée du lac ne compense pas entièrement le refroidissement produit en été, et la moyenne annuelle est abaissée.

#### Variation diurne du baromètre à Genève.

Les observations du baromètre ont été faites aux mêmes heures que celles de la température, et j'ai employé les mêmes procédés de calcul, en sorte que je me bornerai à indiquer les résultats. Ce n'est que depuis l'année 1847 que les tableaux mensuels de la Bibliothèque Universelle renferment la hauteur du baromètre pour 8 h. du soir et 8 h. du matin; pour les années précédentes les observations existaient dans les registres de l'Observatoire, mais elles n'avaient pas été réduites.

Je les ai fait réduire et je donne ci-dessous les moyennes pour chaque mois, et pour les six années.

	Dérembre,	mm 724,00 734,24 737,54 726,02 727,27 722,64	724,17 731,32 737,88 726.21 727,10 721,57
λ 1846	Novembre.	mm 727,45 723,50 726,90 725,46 725,80 725,80	m.m 727.93 723.46 726.81 725,85 726.01
1841	Cetoère.	mm 722,28 726,91 726,44 724,49 729,77 729,77	722,36 727,05 727,06 724,55 730,28 723,12
h. de	Septembre	mm 726,41 724,53 730,03 727,04 727,15 726,03	""" 727.08 724,71 730.68 727,50 727,61 726.61
મં સ 20	Août.	mm 728,82 728,44 728,44 726,58 726,58 725,34	729, 42 729, 29 728, 87 726, 87 726, 95 725, 63
8 h. c	Juillet.	mm 727,13 727,53 727,89 726,90 727,42	727 80 727,96 728,36 727,23 727,23 728,47
nève à	Juia.	mm 727,17 728,02 721,31 727,17 726,71	727,30 728,86 724,39 728,09 727,18 728,28
a Ge		mm 726.85 725,53 724,50 723,29 723.17 725.01	727,74 725,79 724,89 724,01 723,61 725,88
bservé	Avril.	mm 723,74 725,30 725,30 729,38 723,46 721,99	724, 40 724, 03 725, 21 730, 07 723, 53 722, 25
nètre o	Mars.	mm 729,74 727,36 724,49 725,27 724,96 726,27	730,11 727,98 724,70 725,44 724,65 726,74
n baron	Férrier.	723,23 731,14 717,16 721,13 723,77 723,77	723.40 731,34 717,79 721.18 723,62 729,64
Hauteur du baromètre observée à Genève à 8 h. cí à 20 h. de 1841 à 1846.	Jan ior.	725,98 725,96 727,20 728,61 725,30 725,30	726.18 726.23 727,54 728,90 726,50
Har	Année.	1842 1843 1843 1844 1845 1845	1841 1842 1843 1844 1845 1845 1845
ļ		8 heares.	20 heures.

Le tableau suivant renferme la hauteur du baromètre observée aux différentes heures, d'après la moyenne des dix années.

32   727, 17   726, 40   726, 55		727, 16 726, 46	727,06 726.41	726,74 726.00	726.32	726.81 726.29	726,24	6 726,56 725,89 725,74	725,60	3 726.33 725,61 725,52	2 796,37 725,71 725,74	0 726,80 726,18 726,29	מינו מינו מינו	II. Janvier. Février. Mars.		and the Control of th	Hanten	
123.24	700 04	723.98	723,81	723, 59	723,92	723,82	723.55	723,05	722,88	722,96	723, 14	723,59	mn	Arril.		100 2000 00	r du baror	
-								724.58   726,12		724,58 726,19	724,72 726,33	725, 20   726, 76	wm mm	Mai. Join.			Hantone du hacomètre observée à Genève de 1841 à 1850	
_	_		728,02	0 727,87	2 727,88	727,71	727,38	726,96	5 726,96	727,06	3 727, 19	3 727,56	TO M	Juillet.		3	rvée à G	
	727.85	727,88	727,87	727,67	727,76	727,63	727,41	726,86	726,80	726, 90	727,05	727,49	min	Août.			enève -	
,	727,60	727,68	727,59	727, 32	727,31	727,20	727,03	726,48	726,38	726.47	726,66	727, 18	mm	Septembre			de 184	
	725,87	725.89	725.83	725,42	725,84	725,83	725,66	725, 37	725,03	725,00	725,11	725,51	mæ	Octobre.			2	
	727,25	727, 27	727,21	726.81	727, 18	727, 17	726,97	726,71	726,40	726, 35	726,40	726,79	шш	Novembre			350.	
	728,80	728,76	728.58	728, 31	728,66	728,66	728,52	728, 29	728 09	728,06	728,11	728,44	mm	Décombre.				
	726,83	726,87	726,81	726, 55	726,71	726,64	726,45	726,06	725,88	725, 93	726, 05	726,49	m m	Aonée.				

20

En calculant par la méthode des moindres carrés les constantes, qui entrent dans la formule de la variation diurne, j'ai trouvé les valeurs suivantes; le terme qui dépend de  $3 \mu$  est insignifiant, et je l'ai négligé.

```
b = 726,68 + 0.14 \sin (\mu + 145^{\circ},7) + 0.32 \sin (2 \mu + 173^{\circ},7)
Janvier
             b = 726,03 + 0.07 \sin(\mu + 167, 5) + 0.38 \sin(2\mu + 165, 7)
Février
             b = 726, 10 + 0.22 \sin (\mu + 185, 2) + 0.40 \sin (2 \mu + 156, 0)
Mars
             b = 723,52 + 0.26 \sin (\mu + 205, 1) + 0.38 \sin (2 \mu + 148, 4)
Avril
             b = 725.18 + 0.43 \sin (\mu + 195.8) + 0.30 \sin (2 \mu + 159.7)
Mai
             b = 726,72 + 0.43 \sin (\mu + 194,7) + 0.27 \sin (2 \mu + 144,3)
Juin
             b = 727,59 + 0.43 \sin (\mu + 201.3) + 0.27 \sin (2 \mu + 143.8)
Juillet
             b = 727,45 + 0.36 \sin (\mu + 197, 6) + 0.34 \sin (2 \mu + 150.7)
Août
             b = 727,08 + 0.38 \sin (\mu + 187, 3) + 0.37 \sin (2 \mu + 154, 4)
Septembre
             b = 725,47 + 0.07 \sin (\mu + 202, 1) + 0.39 \sin (2 \mu + 167, 5)
Octobre.
             b = 726.82 + 0.10 \sin (\mu + 196), 5) + 0.39 \sin (2 \mu + 172, 5)
Novembre
             b = 728,38 + 0.04 \sin (\mu + 165, 5) + 0.31 \sin (2 \mu + 163, 9)
Décembre
            b = 727,06 + 0.08 \sin (\mu + 155, 0) + 0.34 \sin (2 \mu + 168, 1)
Hiver
Printemps
             b = 724,95 + 0.30 \sin (\mu + 195, 5) + 0.36 \sin (2\mu + 153, 0)
Été
             b = 727.26 + 0.40 \sin (\mu + 197.9) + 0.30 \sin (2 \mu + 146.8)
             b = 726,44 + 0.18 \sin (\mu + 190, 9) + 0.38 \sin (2\mu + 164, 7)
Automne
            b = 726, 43 + 0.24 \sin (\mu + 192, 8) + 0.34 \sin (2 \mu + 158, 9)
Année
```

Le calcul de la hauteur du baromètre, pour toutes les heures de la journée, effectué d'après ces formules, donne:

-	r	_	_	_		_	_		-	_	_		_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_		
Moy.	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	7	6	5	4	ಬ	2	1	0		F
726,68	726,98	727, 11	727, 15	727,08	726,95	726,77	726,59	726, 45	726,39	726,41	726,51	726,64	726,77	726,85	726,86	726,80	726,68	726,53	726, 40	726,33	726,34	726,43	726,60	726,80	mm	Janvier.
726,03	726,33	726,44	726.46	726,37	756,21	726,00	725,83	725,71	725,70	725,78	725,93	726,11	726,26	726,35	726,34	726,24	726,06	725,87	725,70	725,61	725,62	725,73	725, 92	726, 14	tura	Février.
726, 10	726, 45	726, 59	726,61	726,53	726, 37	726.18	726,01	725 92	725,91	725,99	726,13	726,27	726,38	726,40	726,33	726,16	725,95	725,74	725.58	725,51	725, 57	725 74	725 97	726 23	1000	Mars.
723,52	723,81	723, 92	723, 93	723, 85	723,71	723,56	723,44	723,40	723,44	723,55	723,70	723,83	723,90	723,88	723,76	723, 55	723, 31	723,08	722,92	722,87	722, 95	723, 12	723,36	723,60	mea	Arril.
725, 18	725, 41	725, 58	725,67	725,67	725,60	725,49	725,38	725,30	725, 28	725,30	725.35	725,40	725, 42	725,37	725, 26	725,07	724.86	724.67	724,53	724,48	724,53	724.69	724,91	725,17	me	Mar.
726,72	726,97	727, 10	727, 15	727, 13	727,06	726,97	726,90	726,86	726,87	726,90	726,95	726,98	726.96	726,88	726,72	726,52	726,32	726,14	726,04	726,03	726,13	726, 30	726.53	726,76	wat	Jaia.
727, 59	727,79	727,92	727, 98	727,97	727, 91	727, 83	727,77	727,74	727,76	727,81	727,87	727,91	727,89	727,80	727,64	727,43	727,22	727.03	726,92	726,90	726,98	727, 15	727, 37	727, 59	toes	Juillet.
727, 45	727,73	727,87	727,92	727,87	727,76	727,63	727,52	727,46	727,47	727,54	727,64	727,73	727,76	727,72	727,59	727, 39	727,16	726,94	726,80	726,76	726.84	727,01	727,26	727,51	n m	Août.
727.08	727,44	727,60	727,65	727,60	727, 47	727,30	727,16	727,06	727,05	727,10	727, 20	727,29	727,34	727, 31	727, 19	726,99	726,76	726,54	726,40	726,36	726,44	726,64	726,91	727, 19	mm	Septembre
725,47	725,73	725,86	725,88	725,80	725,64	725,45	725,27	725.16	725, 15	725.23	725, 39	725,58	725,74	725,84	725,83	725,72	725,53	725, 32	725,14	725,03	725,02	725.12	725.31	725.53	min	Octobre.
726,82	727, 05	727,20	727, 25	727, 19	727,05	726,86	726,68	726, 56	726,52	726.58	726,72	726,89	727,05	727, 15	727,15	727,05	726,88	726,67	726,48	726,36	726,35	726,43	726,61	726.83	min min	Novembre
728, 38	728,62	728,70	728,71	728,63	728, 49	728,33	728.19	728,11	728, 10	728,18	728, 31	728, 46	728,58	728,65	728,64	728,56	728,42	728,26	728, 13	728,06	728,07	728, 16	728, 31	728, 47	æ	Décembre.
727,06	727, 34	727, 45	727,47	727,40	727,25	727,07	726,90	726,79	726,76	726,82	726,95	727,10	727, 23	727, 31	727,32	727,23	727,09	726,92	726,78	726,70	726,71	726,80	726,97	727, 17	tum	liver,
724,95	725,25	725, 39	725, 42	725, 36	725,23	725,08	724,95	724,88	724,89	724,97	725,09	725,20	725,26	725,24	725,12	724,94	724,71	724,49	724,34	724,30	724,36	724, 54	724,78	725,03	mm m	Printemps
727,26	727,50	727,64	727,69	727,66	727,58	727,48	727,40	727, 36	727,37	727,42	727,49	727,54	727,54	727,47	727, 32	727,12	726, 90	726,71	726,59	726, 57	726,65	726,82	727,05	727,30	mm	Élé.
726,44	726,73	726.87	726.91	726,85	726.70	726,52	726,35	726, 25	726,23	726, 30	726.43	726,58	72670	726,76	726 71	726,57	726, 38	726, 17	726,00	725, 91	725,93	726,06	726.27	726.51	TH IT	Autenne.
726,43	726,70	726,83	726,87	726.81	726.69	726,54	726, 40	726,32	726,31	726, 37	726,48	726,60	726,68	726,69	726.62	726,46	726,27	726,07	725 92	725,86	725,91	726,05	726,26	726,49	n n	Année.

Si l'on compare la hauteur du baromètre calculée par la formule, avec la hauteur observée à la même heure, on ne trouve que des écarts très-peu considérables: sur 144 différences fournies par les douze mois pour les douze heures d'observation, 82, c'est-à-dire plus de la moitié, ne dépassent pas 0<sup>mm</sup>,03; 52 sont comprises entre 0<sup>mm</sup>,03 et 0<sup>mm</sup>,06; 10 dépassent 0<sup>mm</sup>,06 et aucune n'est supérieure à 0<sup>mm</sup>,10. Les formules donnent ainsi la hauteur du baromètre à moins de 0<sup>mm</sup>,03 près.

La formule de la variation diurne donne deux maximum et deux minimum; voici leurs valeurs, ainsi que les époques correspondantes:

MOIS ET SAISONS.	4er MINIMUM.		der Maximum.		2° MINIMUM.		2° MAXINUM	
	Époque.	b.	Époque.	b.	Époque,	b.	Époqne.	b.
JANVIER  FÉVRIER  MARS.  AVRIL  MAI  JUIN.  JUILLET  AOUT  SEPTEMBRE  OCTOBRE.  NOVEMBRE  DÉCEMBRE	h m 3 36 3 37 4 1 4 6 4 1 4 25 4 19 4 10 4 11 3 28 3 21 3 38	mm 726, 32 725, 60 725, 51 722, 87 724, 48 726, 02 726, 89 726, 76 726, 35 725, 01 726, 34 728, 05	h m 9 20 9 36 10 18 10 46 11 13 11 52 11 48 11 1 10 52 9 35 9 29 9 37	mm 726,87 726,87 726,41 723,91 725,42 726,98 727,91 727,77 727,34 725,85 727,16 728,66	h m 14 46 15 21 15 31 16 0 15 0 15 40 15 59 15 41 15 19 15 22 15 6 15 27	726,39 725,69 723,40 723,40 725,28 726,85 727,74 727,45 727,04 725,14 726,52 728,09	h m 21 7 21 22 21 21 21 24 20 29 20 50 20 44 21 4 21 3 21 15 21 2 21 28	mm 727,15 726,47 726.62 723,94 725,68 727,15 727,98 727,92 727,65 725.89 727,25 728,72
HIVER PRINTEMPS' ÉTÉ. AUTOMNE.	3 36 4 6 4 17 3 41 3 55	726.69 724,29 726,56 725,90 725,86	9 30 10 44 11 32 9 57 10 23	727,33 725,26 727,55 726,76 726,70	15 11 15 37 15 45 15 17 15 25	726,76 724,88 727,35 726,22 726,30	21 18 21 10 20 52 21 7 21 7	727,47 725,43 727,69 726,91

La variation diurne de la pression atmosphérique peut donc être partagée en deux périodes croissantes et deux périodes décroissantes, dont j'ai indiqué dans le tableau suivant l'amplitude et la durée pour tous les mois, pour les saisons et pour l'année:

Péri	odes décre	oissantes (	entre	Périodes croissantes entre								
le 2º Mar. c	et le 1 <sup>er</sup> Nia.	le fer Nax.	et le 2º Min.	lo fer Min. e	lo d <sup>er</sup> Min, et le d <sup>er</sup> Max, lo 2º Min, et le 2º M							
Ampl.	Duree	Ampl.	Durée.	Ampl.	Durée.	Ampl.	Durée.					
- 0.83	h m	— 0,48	h m 5 26	mm + 0,55	h m 5 44	+ 0,76	h m 6 21					
- 0,87	6 15	- 0,67	5 45	+ 0,76	5 59	+ 0,78	6 1					
- 1,11	6 40	- 0.51	5 13	+ 0.90	6 17	+ 0,72	5 50					
- 1,07	6 42	- 0,51	5 14	+ 1.01	6 40	+ 0.54	5 24					
- 1,20	7 32	- 0,14	3 47	+ 0.94	7 12	+ 0,40	5 29					
- 1,13	7 35	- 0,13	3 48	+ 0,96	7 27	十 0,30	5 10					
- 1.09	7 35	- 0,17	4 11	+ 1,02	7 29	+ 0,24	4 45					
- 1,16	7 6	- 0,32	4 40	+ 1,01	6 51	+ 0,47	5 23					
- 1,30	7 8	- 0,30	4 27	+ 0,99	6 41	+ 0,61	5 44					
- 0.88	6 13	- 0.,71	5 47	+ 0,84	6 7	+ 0,75	5 53					
- 0,91	6 19	- 0,64	5 37	+ 0,82	6 8	+ 0,73	5 56					
- 0,67	6 10	- 0.57	5 50	+ 0,61	5 59	+ 0,63	6 1					
- 0,78	6 18	- 0,57	5 41	+ 0,64	5 54	+ 0,71	6 7					
- 1,14	6 56	- 0,38	4 53	+ 0,97	6 38	+ 0,55	5 33					
- 1.13	7 25	- 0.20	4 13	+ 0,99	7 15	+ 0.34	5 7					
- 1,01	6 34	- 0,54	5 20	+ 0,86	6 16	+ 0,69	5 50					
- 1.01	6 48	- 0,40	5 2	+ 0,84	6 28	+ 0,57	5 42					

Dans les mois d'hiver ces quatre périodes sont presque égales, soit pour la durée, soit pour l'amplitude; dans les mois d'été, au contraire, l'une des périodes croissantes, celle

comprise entre le minimum du soir et le maximum du soir l'emporte de beaucoup sur la seconde, de même que la période décroissante, comprise entre le maximum du matin et le minimum du soir, l'emporte sur la seconde période décroissante. Ainsi, dans les mois de Juin et de Juillet, la somme des deux périodes diurnes, savoir de la période décroissante depuis le maximum du matin jusqu'au minimum du soir et de la période croissante depuis le minimum du soir jusqu'au maximum du soir dure 15 heures et le baromètre baisse de 1mm, 10 pour remonter de 1mm, tandis que la somme des deux périodes nocturnes ne dure que 9 heures et ne forme qu'une légère ondulation de 0mm, 15 à 0mm, 25 d'amplitude. La durée des deux périodes décroissantes est un peu plus courte que celle des deux périodes croissantes, en moyenne dans l'année de vingt minutes, en hiver de deux minutes seulement, en été de quarante-quatre minutes; le baromètre baisse ainsi plus rapidement qu'il ne monte. Si l'on calcule le mouvement moyen du baromètre dans l'espace d'une heure, en divisant la somme de l'amplitude des quatre périodes par 24, on trouve en moyenne dans l'année 0mm,118; ce mouvement ne varie pas beaucoup d'une saison à l'autre, on a, en effet, en hiver 0mm, 113, au printemps 0mm, 127, en été 0mm, 111, en automne 0mm, 129; il est donc un peu plus considérable au printemps et en automne qu'en hiver et en été.

#### Variation annuelle du baromètre à Genève.

La variation annuelle du baromètre est très-peu considérable à Genève; on peut, pour cette raison, prendre sans inconvénient les moyennes mensuelles comme donnant la pression pour les époques  $M=15^{\circ}, M=45^{\circ},$  etc.; la formule de la variation calculée par la méthode des moindres carrés est alors :

```
B = 726^{mm}, 43 + 0^{mm}, 96 \sin (M + 1680, 8) + 1^{mm}, 17 \sin (2 M + 630, 1)
```

Cette formule donne pour les différents mois les valeurs suivantes, à côté desquelles j'ai inscrit les différences avec les valeurs observées.

	tato		nım
Janvier	727,52	Diff.	+ 0.84
Février	726,42		+ 0,39
Mars	724,93		- 1,17
Avril	724,30		+ 0,78
Mai	725,10		- 0,08
Juin	726,64		- 0,08
Juillet	727,65		+ 0,06
Août	727,49		+ 0,04
Septembre	726,65		- 0,43
Octobre	726,22		+ 0,75
Novembre	726,70		- 0,12
Décembre	727,49		0,89

Les écarts sont assez considérables, surtout depuis le mois de Décembre jusqu'au mois d'Avril, dans cette partie de l'antone XIII, 1<sup>re</sup> PARTIE.

née, où l'on trouve pour le même mois des différences trèsgrandes d'une année à l'autre, ce qui exige une série trèslongue pour faire disparaître ces variations accidentelles. La formule indique que la pression atmosphérique atteint annuellement deux maximum et deux minimum, savoir:

un premier maximum	727 nm,	65	pour M	I == 1",5,	c'est-à-dire le	2 Janvier;
un premier minimum	721,	30	39	103, 0	>>	15 Avril;
un second maximum	727,	73	30	205, 2	3)	28 Juillet
un second minimum	726 .	22	**	284, 0	70	16 Octobre.

## Variation diurne de la température au St.-Bernard.

Les heures d'observation n'ont pas été changées au St.-Bernard, comme elles l'ont été à Genève; ce n'est que depuis le commencement de cette année (1851) que les heures paires depuis 6 h. du matin jusqu'à 10 h. du soir ont été adoptées. Pendant toute la série des dix années les observations ont été faites à 0 h., 3 h., 9 h. et 21 h.; pour les quatre dernières années on y a ajouté celles de 6 h. et de 18 heures. Le calcul des moyennes fournit les valeurs suivantes:

	Tempé	rature ob	servée au	StBern	ard de 18	341 à 18	50.
н.	JANVIER.	FÉVRIER.	MARS.	AVRIL.	MAI.	JUIN-	JUILLET.
0 3 6 9 18 21	- 8°, 50 - 9. 05 - 10, 46 - 10, 47 - 11, 29 - 10, 14	- 5°, 69 - 6, 38 - 8, 49 - 8, 92 - 9, 51 - 7, 88	- 4°, 09 - 4. 54 - 7, 11 - 8. 01 - 8, 94 - 6, 02	- 0°, 30 - 0, 55 - 3, 22 - 4, 82 - 5, 53 - 2, 32	+ 4°, 31 + 4, 18 + 1, 88 - 0, 12 - 1, 34 + 2, 58	+ 7°. 19 + 7, 28 + 5, 48 + 3, 54 + 2, 52 + 5, 48	+ 8°, 65 + 8, 75 + 6, 99 + 5, 37 + 4, 08 + 7, 03
н.	AOUT.	SEPT.	OCTOBRE	NOV.	DÉC.	ANN	ÉЕ.
0 3 6 9 18 21	+ 7°, 67 + 7, 72 + 6, 23 + 4, 93 + 3, 73 + 6, 07	+ 4°.85 + 4.76 + 3,42 + 2.70 + 1,60 + 3.33	+ 0°, 80 + 0, 66 - 0, 85 - 1, 57 - 2, 13 - 0, 73	- 3°, 03 - 3, 53 - 4, 94 - 5, 36 - 5, 79 - 4, 96	- 6°, 05 - 6 · 30 - 7 · 41 - 7 · 66 - 8 · 02 - 7 · 39	+ 0° + 0, - 1, - 2, - 3, - 1,	29 50 50 35

Pour déduire de ces observations les formules de la variation diurne au St. Bernard, j'ai également procédé par approximation, en faisant une hypothèse sur les températures de 12 h. et de 15 h. et en les corrigeant dans des approximations successives. Je n'ai pas calculé le terme dépendant de 3  $\mu$ ; les formules sont:

```
t = -10^{\circ}, 33 + 1^{\circ}, 29 \sin (\mu + 62^{\circ}, 2) + 0^{\circ}, 54 \sin (2 \mu + 91^{\circ}, 1)
Janvier
Février
            t = -8, 27 + 1, 86 \sin (\mu + 68, 3) + 0, 75 \sin (2 \mu + 80, 0)
            t = -7, 15 + 2, 65 sin (\mu + 67, 6) + 0, 77 sin (2\mu + 93, 0)
Mars
            t = -3.71 + 3.26 \sin (\mu + 67.7) + 0.57 \sin (2\mu + 96.0)
Avril
            t = + 0, 92 + 31, 52 sin (\mu + 64, 2) + 0, 57 sin (2\mu + 110, 6)
Mai
            t = + 4,44 + 2,90 \sin (\mu + 61,3) + 0,39 \sin (2\mu + 93,0)
Juin
            t = + 6,02 + 2,80 \sin (\mu + 60,0) + 0,41 \sin (2\mu + 104,0)
Juillet
            t = + 5, 40 + 2, 36 \sin (\mu + 58, 0) + 0, 40 \sin (2\mu + 108.9)
Aout
            t = + 3,00 + 1,71 \sin (\mu + 56, 2) + 0,47 \sin (2\mu + 88, 8)
Septembre
            t = -1, 14 + 1, 81 sin (\mu + 63, 7) + 0, 35 sin (2\mu + 88', 4)
Octobre.
            t = -4,94 + 1,36 \sin(\mu + 63,8) + 0,51 \sin(2\mu + 70,5)
Novembre
            t = -7, 32 + 0, 87 sin (\mu + 63, 4) + 0, 44 sin (2\mu + 62, 9)
Décembre
            t = -8,65 + 1,33 \sin (\mu + 65,1) + 0,56 \sin (2\mu + 79,2)
Hiver
            I = -3, 31 + 3, 14 sin (\mu + 66, 4) + 0, 63 sin (2\mu + 98, 6)
Printemps
            t = + 5, 30 + 2, 68 sin (\mu + 59, 6) + 0, 40 sin (2 \mu + 99, 3)
            t = -1, 03 + 1, 63 sin (\mu + 61, 0) + 0, 44 sin (2\mu + 81, 8)
Automne
            t = -1, 89 +2, 20 sin (\mu + 63, 2) +0, 50 sin (2\mu + 90.0)
Année
```

Voici maintenant la température pour toutes les heures, calculée d'après ces formules:

-		100	,	10				-	-		_		_		-			_	_	_		-	_		
Noy.	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	-1	6	O1	*	ယ	50		0	F
- 10, 33	-	-		4	•	-	-			•		~	-	-		-		10, 27	-	•	-			- 80,65	JANVIER.
- 8, 27	-	•	•	-	•	*	•	**	~	-	40	•	14	4	•	**	•	8, 32	-	•	-	-	-	- 50, 80	FÉVRIER.
- 7, 15		~		-			-	-	-	-	•		-	-	-	-	-	6, 91	-	-				- 30,93	MARS.
- 3, 71	-	-	2, 39		-	_	•	-	•		•			-		-	-	3, 01	-	~			-	- 0°,12	AVRIL.
+ 0, 92		ယ်	+ 2, 28	į.	•		-	4	- 2, 60	~	•	- 1, 72	~	•	0,	0,	<u>,                                     </u>	+ 1, 92	20	ن	<del> </del>	Harris .	p <del>A</del>	40,	MAI.
<del>-</del>	_	_	5, 27		9	•												5, 44						+ 70,37	JUIN.
+ 6, 02	8, 39	_	_	•	-	-	_	_			•			_	•	-	_	7, 02		-				+ 80,84	JUILLET.
+ 5, 40	-	•	•	•		_	•	•	*		3		•		•	•	-	6, 27			_	_	_	+7,78	AOUT.
+ 3, 00	-	3	3, 32	-	•	4			-	•	_			-	-	2, 87	_	3, 48	3,88	-				+ 40,89	SEPTEMBAS
- 1, 14	+ 0, 52	.0,	•	•		- 2. 29	-		4	***		•	- 2, 20	•	*	_	_	- 0, 69	0,	+ 0, 20	0,	0	0,	00,	OCTOBRE.
- 4, 94	_	-	4, 67	-		•			-	•		•			•	~	_	4, 82		3, 90				- 30, 24	NOVEMBRE
-7, 32	•	•	•	_		•		-		~	•	-			•	-	•	7, 32	•			_		— 6°, 15	DÉCEMBRE

н.	HIVER.	PRINTEMPS	été.	AUTOMNE.	ANNÉE.
0	- 6°, 89	+ 0°. 18	+ 80,00	+ 0°, 83	+ 0°, 57
1	6,81	+ 0, 28	8, 19	+ 0.95	+ 0,69
2	6, 96	+ 0, 03	8, 12	+ 0,87	+ 0,55
3	7.30	- 0, 49	7, 82	+ 0.60	+ 0,20
1	7,75	- 1, 18	7, 37	+ 0.20	- 0, 30
5	8, 22	- 1, 91	6,83	<b>-</b> 0.24	- 0, 86
6	8,65	<b>—</b> 2, 68	6, 25	<b>—</b> 0,67	- 1, 40
7	8, 95	- 3, 31	5, 69	- 1,01	<del></del> 1,87
8	9, 14	- 3, 89	5, 17	- 1, 32	- 2, 26
9	9, 21	- 4, 36	4,68	- 1,53	- 2, 58
10	9, 23	- 4,78	4, 22	- 1.70	- 2, 84
11	9, 25	- 5, 17	3, 79	- 1, 85	<b>—</b> 3, 09
1.2	9, 31	<b>—</b> 5, 56	3, 38	<b>—</b> 2, 02	- 3, 35
13	9,43	- 5, 92	3.02	- 2, 20	- 3, 61
1.4	9,61	- 6, 20	2.75	<b>—</b> 2, 38	- 3, 83
15	9, 80	<del>-</del> 6, 32	2,64	- 2, 53	- 3, 98
16	9, 92	<b>—</b> 6, 23	2, 71	- 2, 58	<del>-</del> 3, 98
17	9, 93	- 5, 86	3.01	- 2, 50	- 3, 79
18	9, 76	- 5, 19	3, 51	<b>—</b> 2, 25	<b>-</b> 3, 38
19	9,41	- 4. 28	4, 27	<b>—</b> 1, 83	<del>-</del> 2,77
20	8,90	3, 20	5, 14	- 1, 27	- 2,02
21	8, 30	<b>—</b> 2, 07	6.01	- 0,61	- 1, 20
22	7, 70	- 1.06	6,87	- 0, 03	- 0,44
23	7, 21	<b>—</b> 0, 27	7, 55	+ 0, 49	+ 0, 18
Noy.	- 8,65	- 3, 31	+ 5, 30	- 1. 03	-1,89

Si l'on compare la température calculée par la formule pour une certaine heure, avec la température observée à la même heure, on trouve que sur 72 différences, il s'en trouve 30 plus petites qu'un dixième de degré et 29 plus grandes que 0°,15; aucune ne dépasse trois dixièmes de degré. Les formules représentent donc les observations dans les limites de un dixième de degré à un dixième et demi.

Voici maintenant les valeurs de  $\mu$  qui rendent dans ces formules t un maximum ou un minimum, ainsi que les températures correspondantes:

MOIS ET SAISONS.	MAXI de la tem			IMUM apérature.	AMPLITUDE  de  la variation
	ÉPOQUE	t.	ÉPOQUE.	t.	diurae.
JANVIER  FÉVRIER  MARS  AVRIL  MAI  JUIN  JUILLET  AOUT  SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE  HIVER  PRINTEMPS  ÉTÉ	0h40cm 0 45 0 39 0 48 0 50 1 15 1 9 1 6 1 7 1 2 1 6 1 12 0 51 0 46 1 12	- 8°, 60 - 5, 70 - 3, 85 0, 90 + 4, 75 + 7, 59 + 9, 02 + 7, 92 + 5, 03 + 0, 91 - 6, 81 + 0, 29 + 8, 20	16h24m 16 21 15 40 14 51 14 51 14 58 15 6 15 18 16 8 15 16 16 33 17 12	- 11°, 71 - 10, 00 - 9, 68 - 6, 79 - 2, 61 + 1, 64 + 3, 22 + 2, 96 + 1, 24 - 2, 85 - 6, 18 - 8, 14 - 9, 95 - 6, 33 + 2, 63	3°, 11 4, 30 5, 83 6, 79 7, 36 5, 95 5, 80 4, 96 3, 79 3, 08 2, 12 3, 11 6, 62 5, 57
AUTOMNE	0 57	+ 0.96	15 56 15 31	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	3, 54

L'instant du maximum diurne de la température varie encore moins au St.-Bernard qu'à Genève, et il arrive toujours plus tôt, en moyenne dans l'année de 1 h. 16 m., et même de 1 h. 40 m. au mois de Juillet. L'instant du minimum diurne arrive aussi plus tôt au St.-Bernard qu'à Genève, mais la différence est moins grande, elle n'est que de 13 minutes. L'amplitude de la variation diurne est notablement plus faible, surtout en été.

## Variation annuelle de la température au St.-Bernard.

J'ai déduit, comme pour Genève, des moyennes mensuelles les températures de douze époques équidistantes  $M \equiv 15^{\rm o}$   $M = 45^{\rm o}$  etc., ce qui donne :

$M = 15^{\circ}$	T = -	_	10°, 55
45	-	_	8, 20
75	-	_	7, 14
105		_	3, 57
135		+	1,09
165	-	+	4,62
195	-	+	6, 13
225	_	+	5, 45
255	-	+	3, 03
285	-	-	1, 20
315	-	-	5, 02
345	-	-	7, 30

La méthode des nombres carrés conduit à la formule suivante pour la variation annuelle :

```
T = -1^{\circ}, 89 + 7^{\circ}, 91 \sin (M + 246.8) + 0^{\circ}, 28 \sin (2M + 67^{\circ}, 4) + 0^{\circ}, 06 \sin (3M + 282^{\circ}, 9)
```

Si l'on remplace dans cette formule, successivement, M

par 15°, 45° etc., on trouve pour les températures correspondantes et pour les différences avec les températures observées:

$M = 15^{\circ}$	$T = -9^{\circ}, 47$	diff. = + 10,08
45	- 9,07	- 0.87
75	<b>—</b> 6, 92	+ 0, 22
105	- 3.31	+ 0.23
135	+ 0, 91	- 0.18
165	+ 4, 55	- 0.07
195	+ 6, 25	+ 0.12
225	+ 5, 51	+ 0,06
255	+ 2, 80	- 0, 23
285	<b>—</b> 1. 00	+ 0, 20
315	- 4, 91	+ 0, 11
345	- 7, 99	- 0.69

Les mois de Décembre, Janvier et Février présentent seuls, vu la variabilité de la température dans cette saison, des écarts un peu considérables; pour tout le reste de l'année la formule représente très-bien la marche de la température. Il est à présumer que les écarts des mois d'hiver s'effaceront dans une plus longue série d'observations, et qu'il faut s'attendre à rencontrer dans les années à venir le mois de Janvier plus doux et les mois de Décembre et de Février plus rigoureux que dans les dix années qui viennent de s'écouler, puisque ces dernières ont présenté une anomalie en sens inverse. On peut faire la même remarque pour Genève quant à la température des mois de Janvier et de Février, les écarts ayant lieu dans le même sens qu'au St. Bernard.

Les valeurs de M qui rendent T un maximum ou un minimum dans la formule ci-dessus sont:

```
Minimum M = 25°, 0: jour correspondant 26 Janvier, T = -9^\circ, 55.
Maximum M = 201, 8  25 Juillet, +6, 28.
```

La période ascendante de la température est donc de six jours et demi plus courte que la période descendante, le minimum annuel arrive quatorze jours plus tard qu'à Genève, le maximum quatre jours seulement; l'amplitude de la variation annuelle est de 15°, 85, près de trois degrés plus faible qu'à Genève. Si l'on calcule, à l'aide de la formule, l'époque à laquelle la température atteint un certain chiffre, on trouve:

```
T = -5° M = 92°, 1, c'est-à-dire le 5 Avril.

0 128, 3 " 11 Mai.

+5 170, 8 " 23 Juin.

+5 233, 0 " 25 Août.

0 277, 3 " 9 Octobre.

-5 315, 6 " 17 Novembre.
```

```
Donc la température moyenne est au-dessus de + 5° pendant 63 jours du 23 Juin au 25 Août.

0 0 0 151 0 11 Mai au 9 Oct.

0 5 227 0 5 Avril au 17 Nov.

au-dessous de - 5 0 138 0 17 Nov. au 5 Avril.
```

J'avais trouvé précédemment (Bibl. Univ. Juin 1849), que d'après une moyenne de plusieurs années l'époque de la congélation du lac près de l'hospice tombait sur le 17 Octobre; c'est donc huit jours plus tard que l'époque à laquelle la température moyenne tombe au-dessous de 0.

### Variation diurne du baromètre au St.-Bernard.

Les observations des dix années donnent en moyenne pour la hauteur du baromètre aux heures suivantes :

Н.	JANVIER.	février.	MARS.	AVRIL.	MAI.	JUIN.	JUILLET.	
	മത	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0	559,53	559.96	560.73	560,40	564,09	567,09	568, 34	
3	559,37	559,77	560,51	560,31	564,08	567,00	568,37	
6	559.53	560.01	560,76	560,47	564, 17	567,08	568.43	
9	559,68	560,20	561,04	560,72	564,41	567,32	568,66	
18	559.34	559,70	560,34	560,02	563,62	566,68	567,94	
21	559,72	559,95	560.63	560,29	563,96	566,93	568, 20	
		!						
н.	AOUT.	SEPT.	OCTOBRE	NOV.	DÉC-	ANN	rée.	
	nım	mm	mm	mm	mm	T	300	
0	568,14	566,94	563,66	562,73	562,52	563	3,70	
3	568,11	566.81	563,52	562,55	562,37	563	3,59	
6	568 20	566,91	563,75	562,73	562,54	568	3,74	
9	568.42	567-14	563,98	562,91	562,74	560	3,96	
18	567,74	566,60	563,26	562,50	562,40	560	3,37	
21	568,03	566,92	563,61	562,86	562,65	563, 67		

J'ai déduit de ces observations les formules suivantes pour la variation diurne:

```
b = 559,48 + 0.09 \sin (\mu + 35^{\circ}, 5) + 0.21 \sin (2 \mu + 169^{\circ}, 5)
Janvier
             b = 559,92 + 0.14 \sin (\mu + 335, 2) + 0.19 \sin (2 \mu + 154, 8)
Février
             b = 560,65 + 0.22 \sin (\mu + 344.0) + 0.23 \sin (2 \mu + 151.2)
Mars
             b = 560,33 + 0.24 \sin (\mu + 352, 8) + 0.20 \sin (2 \mu + 152, 8)
Avril
             b = 564,02 + 0.29 \sin (\mu + 355, 1) + 0.19 \sin (2 \mu + 143.4)
Mai
Juin
             b = 567,00 + 0.22 \sin (\mu + 350, 5) + 0.17 \sin (2 \mu + 137, 4)
Juillet
             b = 568,29 + 0.28 \sin (\mu + 353.5) + 0.16 \sin (2 \mu + 142.5)
             b = 568.07 + 0.25 \sin (\mu + 359, 1) + 0.18 \sin (2\mu + 149, 4)
Août
Septembre
             b = 566,85 + 0.17 \sin (\mu + 6.2) + 0.20 \sin (2\mu + 154.7)
             b = 563,58 + 0.25 \sin (\mu + 357.7) + 0.23 \sin 2\mu + 160.0
Octobre
            b = 562.66 + 0.11 \sin (\mu + 23.6) + 0.22 \sin (2 \mu + 169.7)
Novembre
             b = 562,50 + 0.07 \sin (\mu + 0.0) + 0.19 \sin (2\mu + 172.3)
Décembre
            b = 560,66 + 0.10 \sin (\mu + 357, 1) + 0.19 \sin (2 \mu + 167, 2)
Hiver
            b = 561,68 + 0.25 \sin (\mu + 351, 1) + 0.20 \sin (2\mu + 149, 0)
Printemps
Été
            b = 567,79 + 0.25 \sin (\mu + 355, 4) + 0.17 \sin (2\mu + 142.9)
            b = 564.35 + 0.17 \sin (\mu + 5.3) + 0.22 \sin 2\mu + 160.9
Automne
Année
            b = 563,64 + 0.19 \sin (\mu + 356, 1) + 0.20 \sin (2\mu + 155.8)
```

Le calcul de la hauteur du baromètre pour toutes les heures de la journée, effectué d'après ces formules, donne:

-	-	-	_	_	_			_				_	_	_		_			_		_			_			
Hoy.	5	_	_	_		_		16	15	jin.	13		11		9	œ	~	_	5	4	co	۵	-	0			,=
559, 48	000,00	559,69	559,68	559.61	559, 49	559,37	559.26	559, 19	559, 19	559, 22	559,34	559, 46	559, 59	559,67	559,70	559,68	559,60	559, 51	559, 42	559,36	559, 35	559.40	559, 48	559,56	mun n		Janvier.
559,92	00,00	559,99	559.95	559,88	559,79	559,71	559,66	559,65	559,70	559,80	559,93	560,06	560,17	560 22	560 22	560,17	560,08	559,97	559.88	559,82	559,80	559,83	559,88	¥6,6cc	anna		Février.
560,65	300, 73	560,72	560,65	560,56	560,41	560.33	560,27	560 27	560.33	560 48	560,65	560,82	560.96	561.01	561,05	560,98	560,87	560 75	560.61	560, 57	560, 56	560 59	560,64	560,70	min		Mars.
560,33	000,40	560, 38	560, 31	560, 21	560,10	560,00	559,94	559,91	560,01	560, 13	560, 29	560, 45	560 59	560,67	560,70	560,66	560.58	560, 48	560,39	560.33	560,30	560,32	560.35	260 39	10101		łwil.
564,02	56 I, IO	561,01	563, 95	563,83	563,71	563,61	563,57	563, 59	563,68	563,82	563.99	561,16	564, 30	561,38	561.40	561,36	564.28	564.19	564,12	561,07	561,05	561,07	561,09	361,11	total		Mai.
567,00	567,07	567,03	566,95	560.85	566 75	566,67	506,61	566,67	566,75	566.87	567,02	567, 15	567.25	567, 30	567,30	567, 25	567,18	567, 10	567,03	507,00	567,00	567 03	567,06	567, 08	thin.		Juin.
568, 29	568,34	568, 29	568, 20	568.10	567,99	567, 92	567,88	567, 90	567,98	568, 12	568. 27	568, 42	568, 51	568 62	568,61	568,61	568,54	568.46	568, 40	568, 35	568,33	568.31	568, 35	568,36	tuta		Juillet.
568,06	568, 15	568, 11	568, 03	567, 93	567,82	567,72	567,67	567,67	567,74	567,86	568,01	568,16	568, 29	568,37	568, 40	568, 37	568, 31	568, 22	568, 15	568,10	568,09	568.10	568, 13	568, 15	nam		Aodt.
18 995	566,98	566,98	566,92	566,82	566,71	566,60	566,52	566, 49	566,53	566,63	566,77	566,91	567,03	567 11	567,13	567,09	567,02	566,92	566,85	566,80	566,80	566,83	566,89	566 95	TUTEN		Septembre
563,58	563,68	563,68	563, 62	563,51	563, 38	563,26	563,16	563, 14	563, 19	563.31	563,48	563,67	563,83	563,92	563,98	563, 95	563,86	563,75	563, 61	563, 56	563,53	563,51	563, 59	563,65	111111		Octobre.
562,66	562,84	562,86	562.81	562,76	562,65	562,52	562, 10	562, 34	562,31	562, 40	562,54	562,66	562,77	562,88	562,92	562,90	562.82	562,72	562,63	562,56	562,55	562, 58	562,63	562,74	titit		Novembre
562, 50	562,60	562,61	562,61	562,59	562, 51	562,41	562.32	562,27	562.27	562,32	562, 41	562,52	562,63	562,71	562,73	562,71	562,64	562,54	562, 45	562,39	562,36	562, 39	562, 45	562, 53	3		Décembre.
560,66	560,76	560,79	560,77	560,71	560,62	560,52	560, 44	560,40	560,41	560,48	560,58	560,71	560, 82	560.89	560,92	560,89	560,81	560,70	560,62	560,56	560,51	560,57	560,62	560,70	tum		Hiver.
561,68	561,76	561,73	561,65	561,51	561,43	561, 33	561.27	561, 28	561,36	561, 49	561,66			562 04		562, 01	561,92	561,82	561,73	561,67	561,65	561.67	561,71	561,75	teres		Printemps
567,79	567,87	567.82	567,74	567,61	567, 53	567, 45	567,40	567, 42	567,50	567,62	567,77	567,91	568,03	568.10	568, 12		568 02	567,91	567,87	567,83	567,82	567,83	567,86	567,87	cara.		Été.
564, 35	561, 19	564.50	561 45	564, 35			561,02	00	2	561,11	561 25	564,41	564, 55	¥04	67		564, 56	564, 45	564,35	561,29	561.28	564, 31	564, 37	561.44	1100		Automne.
563.64	563,73	563,72	563.67	563, 58	563, 47	563,37	563.30	563,28	563, 33	563,44	563.58	563, 73	563.86	563.91	563, 96	563.92	563.84	563.74	563 66	563, 60	563, 58	563, 61	563.65	563,70		I	Année.

Si l'on compare les chiffres de ce tableau avec ceux que l'observation a fournis, on trouve un accord presque complet, il n'y a aucun écart supérieur à 0<sup>mm</sup>,04 et l'écart moyen est de un à deux centièmes de millimètre.

Voici les valeurs des deux maximum et des deux minimum diurnes calculés par la formule ainsi que les époques correspondantes:

	Vet MI	NIMUM.	4er M7.	XIMUM.	2e MIN	MUM.	2º MA	XIMUM
MOIS ET SAISONS.	Époque.	b.	Époque.	b.	Époque.	b.	Époque.	b.
JANVIER	h m 3 19	<sub>mm</sub> 559, 35	h m 9 0	mm 559,70	h m	mm. 559 18	h m 21 42	mm 559.69
PÉVRIER	3 9 3 10	559 80 560.55	9 30 9 26	560,23 561,05	16 24 16 32	560.26	22 19 22 44	559,99
AVRIL	2 56 3 4	560,30 564,05	9 8 9 12	560,70	16 29 16 48	559,93 563,57	23 4 23 50	560,40 564,11
JUIN	3 30	566,99	9 34	564,40 567.31	16 56	566.64	23 42	567.08
AOUT	2 44 3 0	568,33	9 8 9 2	568 64 568,40	16 54 16 33	567,88	0 12 23 32	568,36 568,16
OCTOBRE	3 21 2 51	566.79 563.53	9 10 8 58	567,13 563.98	16 8 16 10	566,49 563 14	22 38 22 34	566,99 563 69
NOVEMBRE	3 12	562.54 562.36	8 54 9 1	562,92 562.73	15 28 15 28	562 33 562,26	21 50 21 32	562,86 562,65
HIVER	3 4	560.54	9 5	560.92	15 43	560,39	21 50	560,79
PRINTEMPS	3 4	561,65	9 16	562.06	16 37	561,26	23 12	561,76
ÉTÉ	3 8 3 11	567,82 564 27	9 13 9 3	568.12 564,67	16 47 15 58	567 40	23 47 22 22	567,88 564 50
ANNÉE	3 7	563,58	9 9	563.96	16 16	563 28	22 42	563,73

Tandis qu'à Genève ce sont les époques du second minimum et du second maximum qui varient le moins dans l'année, ce sont au St. Bernard les époques du premier minimum et du premier maximum. Dans cette dernière station le maximum du soir est le plus élevé et le minimum du matin le plus bas; à Genève, au contraire, le maximum du matin est le plus élevé et le minimum du soir le plus bas. Les deux périodes croissantes et décroissantes, qui constituent la variation diurne, sont, quant à la durée et à l'amplitude:

MOIS	Périodes décroissantes entre le				Périodes croissantes entre le			
ET SAISONS.	2º Max. ct	le 1er Hin.	1 <sup>er</sup> Max, et le 2 <sup>e</sup> Min.		1er Nin, et le 1er Nax.		2º Min, et le 2º Max.	
	Ampl.	Duree	Ampl.	Durée.	Ampl.	Durée.	Ampl.	Durée.
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE	- 0,34 - 0,19 - 0,19 - 0,10 - 0,06 - 0,09 - 0,03 - 0,07 - 0,20 - 0,16 - 0,32 - 0,29	1, m 5 37 4 50 4 26 3 52 3 14 3 48 2 32 3 28 4 46 4 20 5 22 5 29	- 0.52 - 0.59 - 0.79 - 0.77 - 0.83 - 0.67 - 0.76 - 0.74 - 0.64 - 0.84 - 0.59 - 0.47	h m 6 23 6 54 7 6 7 21 7 36 7 22 7 46 7 31 6 58 7 12 6 34 6 27	**************************************	5 41 6 21 6 16 6 12 6 8 6 4 6 24 6 2 5 46 6 4 5 42 6 0	+ 0,51 + 0,35 + 0.48 + 0.47 + 0.54 + 0,48 + 0.50 + 0.50 + 0.55 + 0,53 + 0.39	h m 6 19 5 55 6 12 6 35 7 2 6 46 7 18 6 59 6 30 6 24 6 22 6 4
HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE	$ \begin{array}{c c} -0.25 \\ -0.11 \\ -0.06 \\ -0.23 \end{array} $	5 14 3 52 3 21 4 49	- 0,53 - 0,80 - 0,72 - 0.69 - 0.68	6 38 7 21 7 31 6 55	+ 0,38 + 0,41 + 0.30 + 0,40 + 0,38	6 1 6 12 6 5 5 52 6 2	+ 0,40 + 0,50 + 0.48 + 0.52 + 0,45	6 7 6 35 7 0 6 24 6 26

La période décroissante entre le maximum du matin et le minimum du soir est beaucoup moins considérable que celle comprise entre le maximum du soir et le minimum du matin. surtout au printemps et en été, tandis que l'inverse a lieu à Genève. La dilatation des couches atmosphériques dans les heures chaudes de la journée élève ces couches au-dessus du niveau de la station élevée et compense à peu près l'écoulement de l'air dans les régions supérieures de l'atmosphère; la nuit, au contraire, la contraction produite par le froid fait descendre ces couches au-dessous du niveau du St. Bernard, d'où résulte la diminution considérable de pression à l'époque la plus froide de la journée. Au St.-Bernard comme à Genève, le baromètre baisse plus rapidement qu'il ne monte, la durée des deux périodes décroissantes est en somme de cinquante-six minutes plus courte que celle des deux périodes croissantes; en été la différence est même de deux heures et dix minutes, en hiver de seize minutes seulement.

La variation du baromètre dans une heure est en moyenne dans l'année de 0<sup>mm</sup>,070, en hiver et en été de 0<sup>mm</sup>,065, au printemps et en automne de 0<sup>mm</sup>,076.

Variation annuelle du baromètre au St. Bernard.

La variation annuelle du baromètre étant assez considérable au St. Bernard, il a fallu calculer d'abord, à l'aide des moyennes mensuelles, la pression atmosphérique correspondant à douze époques équidistantes,  $M=15^{\circ},\ M=45^{\circ}$  etc.

Je trouve ainsi:

	_	mm
Pour	$M = 15^{\circ}$	B = 559, 29
	45	559,92
	75	560,71
	105	560,25
	135	564, 19
	165	567,15
	195	568.37
	225	568,09
	255	566,89
	285	563.46
	315	562,63
	345	562.61

La formule calculée par la méthode des moindres carrés est:

$$B = 563^{\text{mm}}, 64 + 4^{\text{mm}}, 27 \sin (M + 234^{\circ}, 3) + 0^{\text{mm}}, 95 \sin (2M + 68^{\circ}, 5)$$

Le calcul donne pour les douze valeurs équidistantes de M, et pour la différence avec les chiffres observés:

		mm	£11133
Pour M	= 150	B = 560,57	Diff. + 1,28
	45	559,77	- 0,15
	75	559,74	- 0,97
	105	561,39	十 1,14
	135	563,98	- 0,21
	165	566, 93	- 0,22
	195	568,56	+ 0,19
	225	568,19	+ 0,10
	255	566,34	0,55
	285	563,99	+ 0,53
	315	562,59	- 0,04
	345	561,51	- 1,{10
	4 =0		

TOME XIII, 1re PARTIE.

Les écarts sont, comme on le voit, assez considérables dans les mois de Janvier, Mars, Avril et Décembre; en ajoutant un terme de plus dans la formule, celui qui dépend de 3 M, ces différences ne seraient pas sensiblement modifiées, car le coefficient de ce terme est 0<sup>mm</sup>,11. Il faut supposer plutôt que la série des dix années n'est pas assez longue pour que les variations accidentelles dans les moyennes mensuelles soient entièrement compensées; c'est ce que la suite des observations apprendra. D'après la formule, le minimum annuel de la pression atmosphérique est de 559<sup>mm</sup>,60 et il tombe sur le 4 Mars; le maximum annuel est de 568<sup>mm</sup>,66 et il tombe sur le 27 Juillet. L'amplitude de la variation annuelle est ainsi de 9<sup>mm</sup>,06; la durée de la période croissante est de 144 jours et demi et celle de la période décroissante de 220 jours et demi.

# Différences de la température et de la pression atmosphérique entre Genève et le St.-Bernard.

La marche des variations horaires et annuelles de la température et de la pression atmosphérique diffère notablement dans les deux stations; les différences de la température et de la pression atmosphérique entre Genève et le St.-Bernard, au lieu d'être constantes, présentent des variations dépendantes de l'heure de la journée et de l'époque de l'année. Pour abréger, je me bornerai à indiquer les formules qui représentent les variations diurnes et annuelles de ces différences; à l'aide de ces formules les différences pourront être calculées pour un instant quelconque de l'année.

La variation horaire dans la différence de température entre Genève et le St.-Bernard est donnée pour tous les mois de l'année par les formules suivantes :

```
Janvier t-t'=+9^{\circ}, 67+0^{\circ}, 49 \sin{(\mu+331,9)}+0^{\circ}, 42 \sin{(2\mu+332\circ,8)}+0^{\circ}, 12 \sin{(3\mu+32\circ,2)}
Février
               +9, 56+1, 11 \sin (\mu +336,5) +0, 49 \sin (3\mu +330, 8) +0, 08 \sin (3\mu +73, 0)
Mars
               +11, 41+1, 54 \sin (\mu + 334.9) + 0, 24 \sin (2\mu + 297, 1) + 0, 04 \sin (3\mu + 248, 5)
               +12, 17+1, 05 \sin (\mu + 332, 0) + 0, 22 \sin (2\mu + 261, 9) + 0, 08 \sin (3\mu + 255, 0)
Arril
Mai
               +12, 04+0, 89 \sin (\mu + 0,0) + 0, 22 \sin (2\mu + 270, 0) + 0, 16 \sin (2\mu + 260, 4)
Juin
               +12, 20+1, 59 \sin (\mu + 40,8) + 0, 48 \sin (2\mu + 246, 2) + 0, 16 \sin (3\mu + 271, 8)
Smillet
               +11, 85+1, 84 \sin (\mu + 37,5) + 0, 30 \sin (2\mu + 243 4) + 0, 21 \sin (3\mu + 256, 0)
Août
               +11, 57 +2, 33 sin (\mu + 42, 0) + 0, 14 sin (2\mu + 219, 2) + 0, 29 sin (3\mu + 262, 7)
               +11, 32 + 2, 42 sin (\mu + 40,7) + 0, 05 sin (2\mu + 139, 8) + 0, 20 sin (3\mu + 237, 3)
Septembre
fletchre
               +10, 97 + 1. 18 sin (\mu + 33,8) + 0, 21 sin (2\mu + 41, 4) + 0, 04 sin (3\mu + 156, 8)
Novembre
               + 9.64 + 0.76 \sin(\mu + 16.2) + 0.12 \sin(2\mu + 29.8) + 0.11 \sin(3\mu + 79.5)
Décembre
               + 8, 05 + 0, 48 sin (\mu + 15, 1) + 0, 16 sin (2\mu + 2, 6) + 0, 10 sin (3\mu + 62, 1)
               +10, 86 + 1, 18 sin (\mu+ 20,6) + 0, 14 sin (2\mu+294, 4) + 0, 06 sin (3\mu+263, 6)
Année
```

A 8 heures du matin, au mois de Décembre, la différence de température n'est que de 7° 49, c'est la plus petite valeur; à 4 heures du soir, au mois d'Août, la différence est de 14° 08, c'est la plus grande valeur. La différence de hauteur des deux stations étant de 2066 mètres, comme nous le verrons plus bas, le décroissement de la température avec la hauteur est en moyenne dans l'année de 190 mètres par degré; au mois de Décembre, à 8 heures du matin, 276 mètres par degré et au mois d'Août, à 4 heures du soir, 147 mètres par degré.

La variation annuelle dans la différence de température est donnée par la formule:

```
T - T' = 10^{\circ}, 86 + 1^{\circ}, 67 \sin(M + 286, 4) + 0^{\circ}, 56 \sin(2M + 276.7) + 0^{\circ}, 07 \sin(3M + 327.0)
```

La variation horaire du poids de la colonne atmosphérique comprise entre les deux stations est donnée pour tous les mois de l'année par les formules suivantes :

```
b - b' = 167,20 + 0,19 \sin (\mu + 170^{\circ},7) + 0,11 \sin (2 \mu + 182^{\circ},6)
Janvier
Fárria
                     166,11 + 0.21 \sin (\mu + 159, 3) + 0.20 \sin (2 \mu + 176, 3)
Mars
                     165,45 + 0,43 \sin (\mu + 174.7) + 0,17 \sin (2 \mu + 167.0)
Avril
                     163, 19 + 0.49 \sin (\mu + 189, 7) + 0.19 \sin (2 \mu + 144, 6)
Mai
                     161.16 + 0.71 \sin (\mu + 187.5) + 0.12 \sin 2 \mu + 185.6
                     159.72 + 0.63 \sin (\mu + 186.7) + 0.11 \sin (2 \mu + 155.4)
Jain
                     159, 30 + 0, 69 sin (\mu + 190, 4) + 0, 10 sin (2\mu + 150, 7)
Juil et
                     159,39 + 0.60 \sin (\mu + 190, 0) + 0.17 \sin (2 \mu + 152, 2)
1ont
                     160,24 + 0,55 \sin (\mu + 187, 0) + 0.17 \sin (2\mu + 154, 0)
Septembre
Octobre
                     161,89 + 0.31 \sin (\mu + 183, 0) + 0.16 \sin (2 \mu + 178), 3
                     164, 16 + 0.21 \sin (\mu + 200, 2) + 0.16 \sin (2 \mu + 175, 5)
Novembro
Décembre
                     165,88 + 0.10 \sin (\mu + 175, 0) + 0.12 \sin (2 \mu + 151, 2)
                     162,79 + 0.43 \sin (\mu + 185!, 4) + 0.14 \sin (2\mu + 163.1)
Année
```

A 8 heures et à 9 heures du matin, au mois de Janvier, le poids de la colonne atmosphérique est de 167<sup>mm</sup>,49, c'est sa plus grande valeur; à 5 heures du soir, au mois de Juillet, il n'est que de 158<sup>mm</sup>,52, c'est sa plus petite valeur.

La variation annuelle du poids de la colonne atmosphérique est donnée par la formule :

```
B - B' = 162 \text{mm}, 79 + 3 \text{mm} 97 \sin (M + 67.1) + 0 \text{mm}, 24 \sin (2 M + 41^{\circ}.3)
```

Différence de hauteur entre Genève et le St.-Bernard d'après les observations des dix années 1841-1850.

La hauteur du St.-Bernard n'a pas encore été déterminée trigonométriquement, ou par voie de nivellement; elle ne l'a été que par le moyen du baromètre. L'hypsométrie de M. Alphonse De Candolle (Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle, de Genève, Tome viii) fait connaître les mesures barométriques obtenues par différents observateurs depuis De Saussure. Le chiffre définitif adopté par M. De Candolle pour la hauteur de la cuvette du baromètre de l'hospice 1 au-dessus du niveau de la mer est 2492 ,9; il résulte de la moyenne entre les trois déterminations suivantes:

1° Les observations faites à Genève (ancien jardin botanique) et à l'hospice, pendant les quatre années 1818 à 1821, au lever du soleil et à deux heures après-midi, calculées par M. Eynard d'après la formule de Laplace, donnent en moyenne pour la différence de hauteur entre les deux stations 2097<sup>m</sup>, 0; et en ajoutant la hauteur de la station inférieure 394<sup>m</sup>, 5, hauteur du St.-Bernard 2491<sup>m</sup>, 5.

2° Les observations faites à Rolle (8°, 2 au-dessus du niveau moyen du lac) par M. Favre et à l'hospice, pendant les quatre années 1818 à 1821, à deux heures après-midi,

<sup>1</sup> La cuvette du baromètre est à une hauteur de 8 mêtres au-dessus du sol devant le couvent, point culminant du col.

calculées par M. Eynard d'après la formule de Laplace, donnent 2135<sup>m</sup>,0 pour la différence de hauteur des deux stations. M. Eynard a retranché un centième de ce résultat, parce qu'il avait trouvé que cette correction ramenait sensiblement la valeur fournie par l'heure seule de deux heures à celle qui résulte de la moyenne des observations faites au lever du soleil et à deux heures après-midi. La différence vraie est donc 2135<sup>m</sup>, 0 — 21<sup>m</sup>, 3 soit 2111<sup>m</sup>, 7; en ajoutant 382<sup>m</sup>, 9, hauteur de la station inférieure, on a pour la hauteur du St.-Bernard 2494<sup>m</sup>, 6 (sans cette correction, la hauteur serait de 2515<sup>m</sup>, 9).

5° Les observations faites à Genève (406<sup>m</sup>, 9 au-dessus du niveau de la mer) et à l'hospice par M. d'Hombres-Firmas pendant le mois d'Août 1826, à midi, calculées par la formule de Ramond, donnent 2085<sup>m</sup>, 8 pour la différence de hauteur des deux stations, et par suite 2492<sup>m</sup>, 7 pour la hauteur du St. Bernard. M. d'Hombres-Firmas avait comparé le baromètre de Genève et celui du St. Bernard à l'aide d'un baromètre portatif de Fortin, et il avait tenu compte dans son calcul d'une erreur considérable, dont le baromètre de l'hospice était entaché, et dont je parlerai plus tard.

En tête des tableaux météorologiques publiés mensuellement par la Bibliothèque Universelle, on indique la hauteur de la station au-dessus de la mer; pour le St.-Bernard, jusqu'au mois de Mars 1820, ce chiffre est de 1246 toises, d'après la détermination de De Saussure; depuis le mois d'Avril 1820, on a remplacé ce chiffre par celui de 1278 toises soit 2491 mètres, d'après un calcul basé sur les obser-

vations des années 1818 et 1819; et le chiffre de 2491 mètres a été conservé jusqu'à la fin de l'année 1850.

J'ai repris le calcul de la hauteur du St. Bernard, en partant des données que les recherches précédentes m'ont fournies. D'après les dix dernières années, la pression atmosphérique moyenne est à Genève 726mm, 43, au St. Bernard 565mm, 64; la température moyenne de l'air à Genève ± 8°, 97, au St.-Bernard — 1°,89; on peut en déduire avec un degré très-grand d'exactitude les deux éléments, sur lesquels repose la détermination barométrique de la hauteur, savoir : le poids moyen de la colonne atmosphérique comprise entre les deux stations, et la température moyenne de cette colonne. En effet les baromètres ont été comparés, et il a été tenu compte de leurs équations respectives, en sorte que l'on peut considérer leurs indications comme se rapportant à un seul et même instrument. En second lieu, vu l'ignorance où nous sommes relativement à la loi du décroissement de la température, on est obligé de le supposer uniforme et de prendre pour la température moyenne de la colonne atmosphérique la demi-somme des températures observées à chaque station; si l'on peut craindre de commettre une erreur par suite de cette supposition, en faisant usage d'une observation isolée, ou d'observations faites à certaines heures et à certaines époques de l'année seulement, il est à présumer que la supposition se rapprochera beaucoup de la vérité, lorsque les observations embrassent toutes les heures de la journée, toutes les époques de l'année et plusieurs années, et lorsqu'on a éliminé ainsi les causes périodiques ou accidentelles qui peuvent influer sur le décroissement de la température.

Je me suis servi d'abord de la formule de Laplace et des tables calculées par le Commandant Delcros d'après cette formule (Annuaire météorologique de la France). D'après les données ci-dessus on trouve 2054<sup>m</sup>,7 pour la différence de hauteur des deux stations, et en ajoutant 407<sup>m</sup>,0, hauteur de la station inférieure, 2461<sup>m</sup>,7 pour la hauteur du St.-Bernard au-dessus de la mer.

Ce chiffre diffère d'une quantité considérable, plus de 30 mètres, de celui que M. De Candolle avait adopté, et les recherches que j'ai dû faire, pour trouver les causes de cette différence, m'ont prouvé qu'elle tenait à un défaut de l'ancien baromètre de l'hospice et que les observations faites avec cet instrument n'étaient pas sûres. La première circonstance qui m'a frappé a été l'accord entre la détermination de M. d'Hombres-Firmas et les deux autres, sur lesquelles repose le chiffre de M. De Candolle; en effet M. d'Hombres-Firmas a observé à midi, au mois d'Août seulement, et dans ces circonstances il aurait dû trouver un chiffre notablement plus élevé que les deux autres, et plus élevé même que le chiffre de 2515<sup>m</sup>, 9 qui résulte de la seconde détermination, sans la correction que M. Eynard a appliquée. J'ai répété le calcul, en partant de données analogues à celles de M. d'Hombres-Firmas, c'est-à-dire en prenant d'après les dix dernières années la pression atmosphérique et la température du mois d'Août à midi; on a, à ce moment, pour la hauteur du baromètre à Genève 727mm, 49 et au St.-Bernard 568mm, 14; température à Genève + 20°, 47, au St.-Bernard + 7°, 67. Les mêmes tables donnent pour la différence de hauteur 2085", 2 et pour la hauteur du St. Bernard au-dessus de la mer 2492<sup>m</sup>, 2. Ce chiffre ne diffère que d'un demi-mètre de celui de M. d'Hombres-Firmas et confirme ainsi le résultat qu'il a obtenu, et qui se rapporte à cette heure du jour et à cette époque de l'année, mais il est de 30<sup>m</sup>, 5 plus fort que celui qui est déduit des moyennes annuelles. Il est donc à présumer que les deux déterminations indiquées plus haut sont entachées d'erreur, et que cette erreur doit être attribuée au baromètre observé à l'hospice à cette époque. Effectivement, les Mémoires insérés dans la Bibliothèque Universelle, dans lesquels ces deux déterminations sont rapportées, ne mentionnent point de corrections appliquées aux indications du baromètre du St.-Bernard ou de celui de Genève pour les ramener à la hauteur vraie, ou à une hauteur commune, et cependant le baromètre du St. Bernard donnait des indications trop basses, ainsi qu'il résulte des comparaisons faites en 1826 par M. d'Hombres-Firmas et de la note suivante insérée dans le tableau du mois de Juillet 1829:

"Une détérioration graduelle étant survenue dans le ba"romètre qui sert aux observations de l'hospice, il était
"devenu indispensable de le remplacer. Dans ce but M. le
"Professeur De la Rive a bien voulu faire don à l'établisse"ment d'un baromètre construit avec beaucoup de soin par
"M. Gourdon, et qui a été porté au St.-Bernard à l'époque
"de la session de la Société helvétique. M. Bouvard, qui était
"présent à la session, a bien voulu laisser aussi à MM. les

<sup>1</sup> C'est le même dont on se sert encore actuellement.

» Chanoines un baromètre portatif de Bunten (nº 132). Ce » baromètre était d'accord avec celui de l'Observatoire de » Paris à l'époque du départ de M. Bouvard. Ces deux ba- » romètres ont été comparés avec l'ancien baromètre du cou- » vent, avec celui qui s'observe à Genève au pont des Tran- » chées et avec celui de la Société helvétique qui s'observe » également à Genève chez M. Maurice, par l'intermédiaire » d'un baromètre portatif appartenant à M. le Professeur » De la Rive, qui est demeuré d'accord, avant comme après » le voyage, avec un baromètre à cuvette de Fortin. Voici » le résultat de ces comparaisons:

Ancien baromètre de l'Hospice	_	baromètre prof. De la Rive =	_	ligne 1,20
Baromètre pont des Tranchées	_	. »	-	0 24
<ul> <li>donné par M. Bouvard</li> </ul>	_	n	-	0 18
Nouveau baromètre de l'Hospice	_	30	+	0.20
Baromètre Société helvétique	-	>>	+	0,55

Il résulte de là que les indications de l'ancien baromètre de l'hospice étaient trop basses en 1829 d'une ligne au moins; M. d'Hombres-Firmas avait trouvé au mois d'Août 1826 que l'erreur était de — 1 lig. 5 ( — 3 mm, 39); mais au mois d'Octobre de la même année, le niveau du mercure dans la cuvette avait été élevé d'une demi-ligne et l'erreur diminuée de la même quantité. En l'absence de comparaisons antérieures, il est impossible de déterminer exactement l'erreur du baromètre de l'hospice dans les années 1818-1821, mais dans tous les cas cette erreur était considérable, d'une ligne au moins, et par suite, la hauteur du St.-Bernard calculée d'a-

près les observations faites à cette époque doit être trop forte de trente mètres environ

Si l'on adopte la formule de Laplace pour le calcul barométrique des hauteurs, il faudra prendre 2461m, 7 pour la hauteur du St.-Bernard au-dessus de la mer, au lieu de 2492m, 9, chiffre déduit par M. De Candolle dans son hypsométrie, ou de 2491<sup>11</sup>, chiffre qui avait été mis jusqu'ici en tête des tableaux de la Bibliothèque Universelle. Mais l'on arrive à un résultat un peu différent, en partant des mêmes données, et en faisant usage des nouvelles tables hypsométriques que j'ai calculées d'après la formule de Bessel avec les valeurs des constantes déterminées par M. Regnault. Ces tables nécessitent la connaissance d'une nouvelle donnée, l'humidité relative de la couche d'air comprise eutre les deux stations, mais comme le terme dû à la présence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère est très-peu considérable, il suffit de connaître approximativement l'état hygrométrique de l'air aux deux stations. Pour Genève, j'ai préféré déduire l'état hygrométrique moyen de l'air des observations faites avec le psychromètre pendant les trois dernières années seulement, plutôt que de leur adjoindre les observations anciennes faites avec l'hygromètre à cheveu; la fraction moyenne de saturation d'après les trois années 1848-50 est de 0,77. Au St.-Bernard c'est l'hygromètre à cheveu qui a été observé pendant toute la série; en réduisant les degrés de cet instrument en fraction de saturation d'après la table publiée par Kæmtz, on trouve 0,80 pour la fraction moyenne dans l'année. Les nouvelles tables donnent pour la différence de hauteur des deux stations 2066<sup>m</sup>,0, et en ajoutant 407<sup>m</sup>,0 pour la hauteur de la station inférieure, 2473<sup>m</sup>,0 pour la hauteur du St.-Bernard. La valeur du terme dû à l'humidité de l'air est de 5<sup>m</sup>,6; une erreur même considérable sur la fraction de saturation dans l'une ou dans l'autre des deux stations ne produirait ainsi qu'un effet très-minime sur la hauteur.

Le chiffre obtenu par les nouvelles tables est de 11,3 mètres plus élevé que celui qui résulte de la formule de Laplace; cette différence peut être décomposée en deux parties, dont l'une est dûe à la manière dont Laplace tient compte de l'humidité de l'air, et dont l'autre provient du coefficient qui dépend de la densité relative de l'air et du mercure. Pour tenir compte d'une manière approximative de l'humidité de l'air, Laplace prend 0,00400 pour le coefficient de dilatation de l'air, au lieu de 0,00375 selon Gay-Lussac, ou 0,003665 selon M. Regnault. Dans le cas présent, la différence entre les deux coefficients 0,00400 et 0,003665 donne 2<sup>m</sup>,4 pour le terme dû à l'humidité de l'air suivant l'hypothèse de Laplace, tandis que les nouvelles tables le donnent de 5m,6; en admettant une petite incertitude sur la fraction de saturation, il est impossible de la diminuer de façon à réduire le terme qui en dépend de 5m,6 à 2m,4; il faudrait, pour cela, supposer la fraction moyenne de saturation dans la couche intermédiaire égale à 0,30, chiffre beaucoup trop faible. Il reste 8<sup>m</sup>,1 pour la partie de la différence qui provient du coefficient dépendant de la densité relative de l'air et du mercure; coefficient que Laplace a déduit empiriquement des comparaisons obtenues par Ramond entre des hauteurs mesurées barométriquement et géodésiquement. C'est la 250e partie environ de la hauteur totale du St.-Bernard au-dessus de Genève; si ce sont les nouvelles tables qui sont en défaut, il faudrait admettre une erreur de un deux cent-cinquantième dans la densité relative de l'air et du mercure déterminée par M. Regnault, et supposer, par exemple, que le poids du litre d'air à 0° et sous une pression de 0m, 76 soit de 1gr., 298, au lieu de 1gr., 293, comme les belles expériences faites au Collége de France l'ont fait connaître. Mais il est impossible d'admettre une pareille erreur; le poids du litre d'air a été déterminé par M. Regnault avec une approximation beaucoup plus grande qu'à un deux cent-cinquantième près, de même que la densité spécifique du mercure; donc la valeur du coefficient , qui dépend de la densité relative de l'air et du mercure, peut être calculée, d'après les expériences de M. Regnault, avec une exactitude plus grande qu'à un deux centcinquantième près, et elle me paraît devoir être préférée à l'ancienne. Il résulte de cette discussion sur les deux parties de la différence entre le calcul fait par la formule de Laplace et par les nouvelles tables, que le chiffre fourni par ces dernières doit être adopté de préférence; la hauteur du St. Bernard au-dessus de la mer doit donc être fixée à 2473 mètres.

La forme de ce coefficient est  $\frac{0^m.76}{D\,\mu}$ , où D est le rapport de la densité de l'air à 0°, sous une pression de  $0^m,76$  et sous le  $45^\circ$  de latitude à celle du mercure à 0, et  $\mu$  le module des tables; d'après les expériences de M. Regnault qui donnent D =  $\frac{1}{10517,3}$ , la valeur numérique du coefficient est  $18404^m,8$ , tandis que Laplace le suppose de  $18536^m$ .

J'ai voulu comparer aussi la différence de hauteur des deux stations calculée pour certaines heures de la journée et à certaines époques de l'année, d'après les anciennes tables et d'après les nouvelles; j'ai pris pour cette comparaison toutes les heures paires des mois de Juin et de Décembre. Voici les données du calcul, fournies par la moyenne des dix années:

Н.		Baro	mètre	Tempe	érature	Fraction de saturation		
		Сепете.	StBeroard.	Genève.	StB. raard.	Genève.	StBernard.	
JUIN	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22	726,77 726,03 726,03 726,14 726,52 726,88 726,98 726,90 726,86 726,97 727,13 727,10	567,08 567,08 567,00 567,10 567,25 567,30 567,15 566,87 566,67 566,67 566,85 567,03	+ 20°.01 + 20, 83 + 20. 70 + 19, 28 + 17, 16 + 15, 01 + 13, 18 + 12, 04 + 12, 27 + 14, 10 + 16, 54 + 18. 60	+ 7", 37 + 7, 49 + 6, 70 + 5, 44 + 4, 19 + 3, 16 + 2, 29 + 1, 75 + 1, 76 + 2, 66 + 4, 33 + 6, 14	0.61 0.58 0,60 0.66 0,73 0.79 0,81 0.87 0,87 0.84 0,77 0,68	0.74 0,73 0,74 0,77 0,80 0,82 0.83 0,84 0.84 0.83 0,80	
DÉCEMBRE	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22	728.44 728,11 728,09 728,29 728.52 728.66 728,45 728.19 728,13 728.31 728.58 728,80	562, 52 562, 39 562, 39 562, 54 562, 71 562, 71 562, 52 562, 32 562, 32 562, 27 562, 40 562, 59 562, 64	+ 2°, 11 + 2, 49 + 1, 94 + 1 14 + 0', 59 + 0, 30 + 0, 13 - 0, 03 - 0, 28 - 0, 48 - 0, 15 + 0, 93	- 6°.15 - 6.08 - 6.61 - 7.32 - 7.74 - 7.79 - 7.71 - 7.82 - 8.07 - 8.10 - 7.64 - 6.81	0.83 0.81 0.83 0.87 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.89	0.84 0.83 0.83 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86	

Le tableau suivant renferme la différence de hauteur entre Genève et le St.-Bernard calculée d'après les anciennes tables et d'après les nouvelles, et les différences avec les moyennnes annuelles.

		JUIN			DÉCEMBRE			
н.	Tables Delcros. Nouv		Nouvelle	s tables.	Tables Delcros. (Formule Laplace.)		Nouvelles tables.	
	Hauteur.	Différence.	Hauteur,	Différence.	Hauteur.	Defférence.	Hauteur.	Didérence,
	m	m	m	m	m	nı	103.	m
0	2089,6	+ 34.9	2098,7	+ 32.7	2047.7	- 7,0	2060.9	- 5,1
2	2088,5	+ 33.8	2097,6	+ 31,6	2047,4	- 7.3	2060,7	- 5,3
4	2082.2	+ 27,5	2091,5	+ 25,5	2042,6	- 12,1	2055,9	- 10,1
6	2071.4	+ 16.7	2081,1	+ 15,1	2036.3	— 18 4	2050,0	- 16.0
8	2060.3	+ 5.6	2070,7	+ 4.7	2032,8	- 21,9	2046.6	- 19.4
10	2051.2	- 3,5	2061.8	- 4.2	2032.7	- 22.0	2046.7	- 19,3
12	2043.9	- 10.8	2054.7	- 11.3	2032.6	- 22.1	2046.5	- 19,5
14	2040.3	- 14 4	2051,3	- 14,7	2031 8	- 22.9	2045,6	- 20.4
16	2043.7	- 11.0	2054,9	- 11.1	2029,4	- 25,3	2043,6	- 22,4
18	2055,8	+ 1,1	2066.7	+ 07	2029,4	- 25,3	2043.6	- 22,4
20	2071.3	+ 16,6	2081,7	+ 15,7	2032,2	- 22,5	2046.5	- 19.5
22	2083,7	+ 29.0	2093,4	+ 27.4	2041.8	- 12,9	2055,7	- 10.3
lloy.	2065 2	+ 10,5	2075 3	+ 9.3	2036.5	- 18.2	2050.2	- 15.8

La différence entre la moyenne de Juin et celle de Décembre est d'après les anciennes tables de  $28^{m}$ , 7, d'après les nouvelles de  $25^{m}$ , 1; la différence entre le mois de Juin à midi et le mois de Décembre à six heures du matin est de  $60^{m}$ , 2 d'après les anciennes tables, et de  $55^{m}$ , 1 d'après les

nouvelles. Les nouvelles tables présentent ainsi des écarts un peu moins grands, mais la partie la plus considérable de ces écarts subsiste, parce qu'elle est dûe à la supposition commune aux deux formules, que la température moyenne de la couche intermédiaire entre les deux stations soit égale à la demi-somme des températures observées aux deux extrémités, tandis qu'elle s'en écarte, et souvent notablement, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. C'est de cette incertitude sur la température de la couche intermédiaire que proviennent les écarts dans les mesures barométriques, car la seconde donnée, savoir le poids de cette couche, est donné avec une grande exactitude par les observations du baromètre, et le coefficient de dilatation de l'air est également connu avec une précision très-suffisante.

La température moyenne de la couche intermédiaire entre les deux stations, à un moment donné, est égale à la demisomme des températures accusées aux deux extrémités, plus une certaine correction qui varie avec l'heure de la journée, avec l'époque de l'année et selon les circonstances accidentelles. Pendant les heures du jour, cette correction sera en moyenne négative, parce que la température accusée aux deux stations par les thermomètres sera trop élevée; la correction sera plus forte en été qu'en hiver, pour un jour calme et serein que pour un jour couvert et avec le vent. Pendant la nuit, au contraire, la correction sera en moyenne positive, et les circonstances qui favorisent le rayonnement augmentent sa valeur. La cause en est bien simple; le sol se réchausse plus que l'air par l'insolation, mais il se refroidit

aussi davantage par le rayonnement, et la température observée dans les couches superficielles de l'atmosphère est influencée par le voisinage du sol dans les deux stations, ensorte que les variations y sont beaucoup plus considérables que dans les couches distantes de quelques centaines de pieds ou de mètres.

J'ai essayé de déterminer cette correction, et de trouver à toutes les époques de l'année la température moyenne de la couche atmosphérique comprise entre Genève et le St.-Bernard; pour y parvenir, j'ai renversé le problème de la mesure barométrique des hauteurs, c'est-à-dire, supposant connue et égale à 2066 mètres la hauteur de la couche d'air, j'ai déduit de son poids la densité et par suite la température moyenne. Pour abréger les calculs j'ai supposé constant pour un même mois le terme dû à l'humidité de l'air; l'erreur qui en résulte est insignifiante, en effet, même dans les mois les plus chauds, le mois de Juin par exemple, la valeur de ce terme varie avec l'heure dans les limites de un mètre de part et autre de la valeur moyenne des vingtquatre heures. La fraction moyenne de saturation pour les différents mois de l'année a été trouvée, comme suit, pour les deux stations:

	Genère,	StBernard.
Janvier	0.87	0,83
Février	0,79	0,78
Mars	0.76	0,75
Avril	0.74	0,74
Mai	0,71	0.73

#### RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS

	Genève:	StBernard.
Juin	0.74	0,79
Juillet	0.66	0,79
Août	0,70	0.81
Septembre	0,76	0.83
Octobre	0,83	0.84
Novembre	0,81	0.83
Décembre	0,87	0,85

Le terme dû à l'humidité de l'air a été calculé, pour chaque mois, d'après ces valeurs de la fraction de saturation et d'après la température moyenne du mois aux deux stations. En ayant égard à ce terme, j'ai calculé, pour les heures paires de tous les mois de l'année, la température moyenne de la couche atmosphérique, par la condition, que d'après les observations barométriques la hauteur fût égale à 2066 mètres; j'ai trouvé ainsi:

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	æ.	
	Janvier.	Temp
	Février.	crature
-1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9	Hars.	э тоус
1, 4 +1, 6	Avril.	ane de
+ 5,000000000000000000000000000000000000	Hai.	la cou
+ 9°,2 10°, 2 10°, 3 10°, 3 10°, 3 8°, 3 8°, 3 8°, 3	Juin.	che d'a
+1006 +1005 111, 2 10, 9 111, 5 11, 3 111, 7 11, 4 111, 4 10, 9 10, 7 10, 3 10, 2 10, 0 9, 8 9, 7 9, 4 9, 3 10, 0 9, 7 10, 0 9, 7 +10,4 +10,3	Juillet.	ir com
	Août.	prise e
+ 8 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9	Septembre	itre Ge
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Octobre.	nève et
+1, 2	Novembre	Température moyenne de la couche d'air comprise entre Genève et le StBernard
1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0	Décembra	Bernar
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Année.	ď

La variation diurne est, comme on le voit, très-faible dans la couche d'air comprise entre les deux stations, beaucoup plus petite même qu'au St. Bernard; car l'amplitude de la variation diurne n'est que d'un degré et demi en moyenne dans l'année, six dixièmes de degré dans les mois froids et deux degrés et demi dans les mois chauds, tandis qu'au St. Bernard elle est de 4°, 7 en moyenne dans l'année Les heures du maximum et du minimum diurnes arrivent plus tard que dans les deux stations, le maximum à 5 h. du soir et le minimum à 7 h. du matin; au St. Bernard le maximum a lieu à 1 h. du soir et le minimum avant 4 h. du matin.

Comparons maintenant les chiffres du tableau précédent avec la demi-somme des températures observées aux deux stations; on obtiendra de cette façon la correction qu'il faut appliquer à la demi-somme des températures observées à un moment donné à Genève et au St. Bernard, pour avoir la température moyenne de la couche d'air comprise entre les deux stations. J'ai trouvé pour la correction les valeurs suivantes:

		,-
Яиү.	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	=
+ 1,2	++++++++	dan inf
+ 0.8	+++++++	Férrier.
+ 0,1		Mars.
- 0,8	1 + + + + + + 1 = 1 = 3,7 = 3,	Avcil.
- 0,9		Mai.
- 1,2		Juin.
- 1,5		Juillet.
- 0,9		Aoit.
- 0,2	1 1 + + + + + + 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Septembre
+ 0.7	1+++++++11	Octobre.
+ 1,3	++++++++11	Novembre
+ 2.1	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Décembro.
0,0	1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Année.

Il ressort de ce tableau que la correction varie moins d'un mois à l'autre, que d'une heure à l'autre dans le même mois. La correction est en général la plus faible à l'heure, où aux deux stations la température est égale à la moyenne de la journée; c'est par conséquent ce moment qu'il faut choisir de préférence pour la mesure barométrique des hauteurs. Les mois de Mars et de Septembre donnent en moyenne les plus petites valeurs de la correction; il suffirait d'avoir dans ces deux mois un petit nombre d'observations faites à intervalles égaux, pendant les vingt-quatre heures, pour obtenir trèsexactement la différence de hauteur par des mesures barométriques. Les chiffres du tableau précédent peuvent facilement être convertis en différences de hauteur entre les deux stations; un degré sur la température moyenne de la couche intermédiaire correspond environ à 7m,5 sur la différence de hauteur, et par conséquent, en multipliant par 7,5 les chiffres de ce tableau, on obtient le nombre de mètres, qu'il faut retrancher ou ajouter à la hauteur calculée d'après les observations faites aux deux stations, pour avoir la hauteur vraie.

# TABLES HYPSOMÉTRIQUES

CALCULÉES

## D'APRÈS LA FORMULE DE BESSEL

PAR

#### E. PLANTAMOUR

Professeur d'Astronomie à l'Academie de Genève.

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 6 Mars 1851.)

Dans le N° 356 des Astronomische Nachrichten Bessel a publié un mémoire sur la mesure des hauteurs par le baromètre, dans lequel il déduit une formule hypsométrique qui renferme un terme dépendant de l'humidité de l'air. Voici cette formule:

$$\log \frac{P}{P'} = \frac{\text{(g). H'} - \Pi}{\Gamma(1 + k T)} \left\{ 1 - \alpha \frac{0.002561}{\nu P P'} \cdot 10 \right\}$$

dans laquelle les différentes quantités qui y entrent ont la signification suivante: h étant la hauteur de la station inférieure, et h' la hauteur de la station supérieure au-dessus du niveau de la mer, a le rayon de la terre,  $H = \frac{ah}{a+h}$  et  $H' = \frac{ah'}{a+h'}$ ;

P est le poids de l'atmosphère à la station inférieure et P à la station supérieure, l'unité de poids étant celui qu'exerce, sous le 45° degré de latitude, une colonne de mercure de 536,905 lignes de hauteur (mesure de Paris) à la température de 0°; (g) est la pesanteur au niveau de la mer à la latitude supposée commune des deux stations, en prenant pour unité la pesanteur sous le 45<sup>me</sup> degré de latitude; donc en désignant par  $\phi$  la latitude, on a

$$(g) = 1 - 0.0026257 \cos 2$$

l est un coefficient constant qui dépend de la densité relative de l'air et du mercure;

k le coefficient de dilatation de l'air;

T la température moyenne de la couche atmosphérique comprise entre les deux stations;

a la fraction de saturation moyenne de cette couche.

Le second terme dans la parenthèse, qui est destiné à tenir compte de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, a été obtenu en admettant que la force élastique de la vapeur d'eau pour une température T était représentée, en unité de poids, par l'expression:

p = 0,0067407 
$$\times$$
 10 0,0279712 T  $-$  0,0000625826 T  $^{\circ}$ 

En multipliant le second membre par 336,905, on trouve l'expression de la force élastique de la vapeur d'eau que La-

place avait déduite des expériences de Dalton. La valeur numérique des coefficients qui entrent dans cette formule est un peu changée, si on les calcule d'après les expériences de M. Regnault; je trouve en effet:

0,0301975**T** — 0.000080170**T'** p = 0,0060527 
$$\times$$
 10

La substitution de ces valeurs dans la formule ci-dessus donne pour le facteur entre parenthèses:

$$\left\{ \begin{array}{lll} 1-& \alpha, & \frac{0,0023003}{\nu \, \mathrm{PP'}} & 10 \end{array} \right. \cdot 10^{-0,0301975} \ T = 0,000080170 \ T^{9}$$

Les tables calculées par Bessel donnent la différence de hauteur des deux stations en toises; on obtient le logarithme de cette différence par la somme de quatre logarithmes. J'ai conservé la même forme dans les nouvelles tables, seulement la différence de hauteur est donnée en mètres au lieu de l'être en toises.

Le terme dû à la dilatation de l'air est calculé dans les tables de Bessel pour deux valeurs du coefficient, savoir pour celui de Gay-Lussac 0,00375 et pour celui de Rudberg 0,003648. Je n'ai fait le calcul que pour une seule valeur du coefficient, celle de M. Regnault 0,003665.

Bessel avait adopté pour le rapport de la densité de l'air à 0°, et soumis à une pression égale à l'unité de poids, à celle du mercure à 0°, le chiffre 1 10186, s' d'après les expériences de MM. Biot et Arago. J'ai substitué à ce rapport celui qui résulte des expériences faites par M. Regnault, au Collége

de France, et publiées dans les Mémoires de l'Institut et dans les Annales de Chimie et de Physique. M. Regnault a trouvé qu'au Collége de France, sous une pression de 0<sup>m</sup>,76, un litre d'air sec à 0° pesait 1,<sup>gr</sup>·293187; la pression exercée à la latitude de Paris par une colonne de mercure de 0<sup>m</sup>,76 est plus forte que celle qu'exerce une colonne de même hauteur sous le 45° degré de latitude, dans le rapport de 1+0,0003518: 1; pour ramener le poids du litre d'air déterminé par M. Regnault à la valeur qu'il aurait, étant soumis à l'unité de pression, il faut le diviser par 1 + 0,0005518, et on trouve ainsi 1,<sup>gr</sup>·292752. Le poids du litre de mercure à 0° est de 13596 grammes, donc le rapport p de la densité de l'air et du mercure dans les conditions indiquées plus haut est:

$$D = \frac{1}{10517,3}$$

d'un 209e environ plus faible que la valeur adoptée par Bessel. Le coefficient constant, 1, a pour expression

$$L = \frac{0^{m},76}{D_{*} \mu}$$

 $\mu$  étant le module des logarithmes vulgaires; on aura donc pour sa valeur numérique

$$L = 18404^{m}, 8.$$

Bessel fait subir à la formule, pour la réduire en tables, quelques transformations, que j'ai suivies, en introduisant les changements indiqués plus haut.

Soient b et b', en fraction de mètre, les hauteurs du baromètre aux deux stations, et t, t' les températures du mercure, on a, en supposant l'échelle du baromètre en laiton:

$$\begin{split} P &= \frac{b}{0^{m},76} \cdot (g) \cdot \left( \frac{a}{a+h} \right)^{2} \frac{(1+0.00001879 \cdot t)}{(1+0.000018018 \, t)} \\ \text{et } P' &= \frac{b'}{0^{m},76} \cdot (g) \left( \frac{a}{a+h'} \right)^{2} \left( \frac{1+0.00001879 \, t'}{1+0.000018018 \, t'} \right) \end{split}$$

$$\begin{split} & \text{Donc} \left[ \log P \right] = \log b + \log \left( g \right) - \log 0^m, 76 - \frac{2 H \mu}{a} - \mu t \left\{ 0,00018018 - 0,00001879 \right\} \\ & \log P' = \log b' + \log \left( g \right) - \log 0^m, 76 - \frac{2 H' \mu}{a} - \mu t' \left\{ 0,00018018 - 0,00001879 \right\} \end{split}$$

Si on désigne par B, B' les hauteurs du baromètre réduites à 0°, et que l'on obtient en faisant :

$$\begin{split} \log B = \log b - t. \ 0,000070095; & \log B' = \log b' - t'. \ 0,000070095, \\ \log \ \frac{P}{P'} = \log B - \log \ B' + \frac{H' - H}{7329755} \end{split}$$

et avec une exactitude suffisante:

$$V^{\mathrm{PP'}} = \frac{V^{\mathrm{BB'}}}{0.76}$$

En substituant ces expressions dans la formule, elle devient:

$$\log B - \log B' = 0,0301975. T - 0,000080170 T^{2}$$

$$\frac{(g). (H' - H)}{L (1 + k T)} \left\{ 1 - \frac{L (1 + k T)}{(g). 7329755} - \frac{\alpha. 0,001748}{\text{PBB'}} \right\}$$
10

Si on remplace  $\alpha$  par la demi-somme  $\frac{\alpha + \alpha'}{2}$  de la fraction de saturation observée aux deux stations, on trouve après quelques transformations:

$$\log B - \log B' = \frac{(g) (H') - H) (397,25 - k T)}{398,25. L. (1 + k T)} \times$$

$$\left\{ 1 - \frac{(\alpha + \alpha') \cdot 0,34807}{(397,25 - k T) \ \text{$\rlap/$BB'}} \right. 10$$

Faisant pour abréger:

$$V = \cdot \frac{398 \ 25.}{397.25 - k \ T} \ L \cdot (1 + k \ T)$$
 
$$0.0301975 \cdot T - 0.000080170 \cdot T^{3}$$
 
$$W = \frac{0.34807}{397.25 - k \ T} \cdot 10$$

on aura pour le logarithme de la différence approchée de hauteur des deux stations, H' = H.

$$\log (H' - H) = \log \left\{ \log B - \log B' \right\}$$

$$+ \log V + \log \frac{1}{1 - W \frac{(\alpha + \alpha')}{V BB'}} + \log \frac{(g)}{1}$$

La première table donne les valeurs de log v et de log w, qui ne dépendent que de la température; l'argument est la somme des températures de l'air,  $\tau$  et  $\tau'$ , observées aux deux stations, en supposant que  $\tau - \tau' = 2 \, \text{T}$ . La seconde table donne le facteur dépendant de l'humidité de l'air; avec l'argument

W · 
$$\log \frac{(\alpha + \alpha)}{V_{BB'}}$$
 on obtient  $\log \frac{1}{1 - W \frac{(\alpha + \alpha')}{V_{BB'}}} = \log V$ 

La troisième table donne le facteur dépendant de la latitude ; on trouve de degré en degré pour toutes les latitudes :

$$\log G' = \log \frac{1}{(g)}$$

Le logarithme de la différence approchée de hauteur est donné ainsi par la somme de quatre logarithmes, et, par suite, la différence; pour avoir la hauteur exacte, il faut encore appliquer une petite correction donnée par la quatrième table. On a, en effet, avec toute l'exactitude nécessaire:

$$h' - h = H' - H + \frac{H'^2}{a} - \frac{H^3}{a}$$

et on trouve dans la quatrième table, pour toutes les hauteurs de 200 en 200 mètres, la quantité  $\frac{H^2}{a}$ ; on ajoutera à la hauteur approchée H'-H le chiffre correspondant à  $\frac{H'^2}{a}$ , et on retranchera celui qui correspond à  $\frac{H^2}{a}$ .

J'ajouterai quelques exemples pour montrer l'usage des tables :

#### PREMIER EXEMPLE.

Calcul de la hauteur du Saint-Bernard en prenant Genève (407<sup>m</sup>,0) pour station inférieure.

$$B = 0^{m},72643$$

$$\tau = + 8^{o}.97$$

$$\alpha = 0,77$$

$$\log B = 9.86119$$

$$\log B' = 9.75100$$

$$\log B - \log B' = 0,11019$$

$$\log \left\{ \log B - \log B' \right\} = 9.04215 \log \frac{(\alpha + \alpha')}{VBB'}$$

$$Argt + 7^{o},08 \text{ 1re table log V} = 4.27164$$

$$Argt + 7^{o},08 \text{ 1re table log V} = 0.00120$$

$$Argt + 4^{o} = 0.00004$$

$$Argt + 4^{o} = 0.000$$

#### DEUXIÈME EXEMPLE.

Calcul de la hauteur du Mont-Blanc, d'après les observations faites par MM. Bravais et Martins dans leur ascension du 29 Août 1844, en prenant le Saint-Bernard (2475<sup>m</sup>,0) pour station inférieure.

# TABLES HYPSOMÉTRIQUES.

===		Tabl	le I.	-		Table II.			Table III.				Tab	Table IV		
A	Argument : $\tau + \tau'$ (Echelle centésimale.).					At	$\operatorname{Arg}^{t}: \operatorname{log} W. \frac{(\alpha + \alpha')}{\operatorname{\operatorname{\mathcal{V}}}^{BB'}}$			Argument: Latitude géographique					Argt: haut.	
+1	log V	log W.	τ+τ'	log V	log W.	$\Lambda rg^t$	log V	Argt	log V'	o	log G'	¢	log G'	H' H	+-	
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	3 4.217: 2 4.2481 1 4.2482 1 4.2487 9 4.2503 8 4.251. 7 4.2536 4.2533 4.2553 4.2563 1 4.2573 9 4.2507 1 4.2577 9 4.2507 1 4.2573 1 4.2604 1 4.2684 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2686 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2684 2 4.2686 2 4.2686 2 4.2686 2 4.2686 2 4.2686 2 4.2707 3 4.2707 4 4.2707 5 4.2705 5 4.2705 5 4.2705 5 4.2705 5 4.2705 5 4.2707 5 4.2809 9 4.2807 6 4.2807	8	+ 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 33 + 36 + 37 + 40 + 41 + 44 + 44 + 45 + 45 + 50 + 51 + 53 + 55 + 55 + 56 + 57 + 60 + 65		7 3557 7.3697 7.3697 7.3837 7.3975 7.4114 7.4252 7.4389 7,4526 7,4798 7,4933 7.5068 7,5202 7.5336 7.5470 7.5602 7.5753 7.5867 7.5799 7.6130 7.6260 7.6309 7.6519 7.6648 7.777 7.78005 7.7787 7.7781 7.7733 7.77664 7.7733 7.77664 7.7781 7.7887 7.7811 7.7539 7.7614 7.7783 7.7887 7.7816 7.7887 7.7817 7.7818 7.7818 7.7818 7.8885 7.8107 7.8838 7.8161 7.8285 7.8107 7.8530	7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 7.72 7.73 7.74 7.75 7.76 7.77 7.78 7.79 7.80 7.81 7.82	0.00186 0.00190 0.00191 0.00191 0,00199 0.00204 0.00204 0.00213 0.00218 0.00223 0.00223 0.00229 0.00224 0.00251 0.00256 0,00266 0,00266 0,00266 0,00266 0,00268	7,90 7,91 7,92 7,93 7,95 7,96 7,97 7,98 8,01 8,02 8,03 8,01 8,05 8,07 8,08 8,01 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,21 8,24 8,28 8,29 8,24 8,28 8,29 8,30 8,31 8,31 8,32 8,33 8,34	0,00295 0.00302 0.00302 0.00309 0,00316 0,00323 0.00331 0.00338 0.00316 0.00354 0.00363 0.00371 0.00389 0,00398 0,00407 0.00417 0.00457 0.00437 0.00457 0.00457 0.00457 0.00457 0.00457 0.00457 0.00457 0.00590 0.00590 0.00593 0,00576 0.00596 0.00596 0.00604 0,00596 0.00678 0,00678 0,00678 0,00678 0,00727 0,00798 0,00710 0,00727 0,00798 0,00717 0,00798 0,00835 0,00855 0,00875 0.00896 0.00917 0,00983	45 46 47 48 49 50 51	+ 0,00114	57 58 59 60 61	- 0,00028 - 0,00031 - 0,00035 - 0,00035 - 0,00043 - 0,00046 - 0,00057 - 0,00060 - 0,00067 - 0,00070 - 0,00070 - 0,00085 - 0,00085 - 0,00087 - 0,00	7000 7200	0,01 0,01 0,03 0.06 0.10 0,16 0,23 0,31 0.40 0,51 0.63 0,76 0.90 1.06 1,23 1,41 1,61 1.82 2,04 2,27 2,51 2,77 3,04 3,32 3,32 3,93 4,25 4,58 4,93 5,28 5,65 6,04 6.43 6.84 7,76 7,70 8,14 8,60	



## DESCRIPTION

DES

# MOLLUSQUES FOSSILES

qui se trouvent dans

LES GRÈS VERTS DES ENVIRONS DE GENÈVE

PAR

F.-J. PICTET

PROFESSEUR DE ZOOLOGIE ET D'ANATOMIE COMPARÉE

WILLIAM ROUX

DOCTEUR EN MÉDECINE.

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 20 Mars 1851.)

#### TROISIÈME CLASSE.

## LAMELLIBRANCHES OU ACÉPHALES

Les lamellibranches sont clairement caractérisés par l'absence de tête, par la simplicité de leur organisation et par leur locomotion nulle ou imparfaite. Lorsque l'animal n'est pas connu, leur coquille bivalve sussit pour les distinguer facilement des gastéropodes et des céphalopodes. Leurs rapports sont plus grands avec les brachiopodes, qui ont aussi une coquille à deux valves; mais chez ces derniers, la bouche étant située au milieu du corps, sur la ligne mé-

TOME XIII, 1re PARTIE.

diane, toutes les autres parties, et spécialement chaque valve de la coquille, sont symétriques par rapport à cette ligne médiane. Dans les lamellibranches la bouche est à l'extrémité du corps, et chaque valve de la coquille présente, en conséquence, un côté anal et un côté buccal, qui ne sont pas en général identiques.

Nous adoptons pour la description des lamellibranches la méthode proposée par M. d'Orbigny, c'est-à-dire que nous plaçons le mollusque dans sa position naturelle et que nous évitons autant que possible les qualifications de haut et de bas, d'antérieur et de postérieur, de droite et de gauche. Nous désignons de préférence les différentes parties de la coquille par les expressions de région buccale, région anale, région palléale et région cardinale, qui ne peuvent entraîner aucune confusion.

Nous rappellerons brièvement que la charnière qui unit les deux valves présente ordinairement des dents; les cardinales sont vis-à-vis du sommet des valves, et les latérales en sont plus ou moins écartées. On nomme fossettes les cavités d'une valve qui reçoivent les dents de la valve opposée. Les valves sont réunies par un ligament qui est simple ou multiple, interne ou externe.

Chaque valve présente au-dessus de la charnière ou de la région cardinale le sommet ou apex, qui est la partie la première formée; si ce sommet fait saillie, il prend le nom de crochet. Au dessous de lui dans la station normale, c'est-à-dire du côté buccal, on remarque souvent au côté extérieur une impression circonscrite, qui est la lunule ou anus. Au

dessus de lui, du côté palléal, est une dépression plus allongée, souvent recouverte par le ligament, et que l'on nomme écusson, suture, vulva, et pubes ou corselet si on y comprend l'ensemble de la dépression qui l'entoure.

En dedans, on distingue les impressions musculaires, ordinairement uniques (monomyaires) sur chaque valve dans les pleuroconques, et aumoins doubles (dimyaires) dans les orthoconques, où il y en a toujours deux principales, dont l'une est anale et l'autre buccale. La ligne qui joint les deux principales impressions, et qui est l'empreinte du bord du manteau, porte le nom de ligne palléale; elle est tantôt entière, (intégropalléales), tantôt échancrée du côté anal par le sinus palléal pour le passage des tubes (sinupalléales).

Les coquilles prises dans leur ensemble peuvent être désignées sous le nom de équivalves ou d'inéquivalves, si l'on compare les deux valves; ou sous ceux d'équilatérales ou d'inéquilatérales, lorsqu'on compare le côté anal et le côté buccal.

Nous devons aussi dire quelques mots de la manière dont nous avons mesuré les coquilles.

Nous donnons, en général, la mesure de l'angle apicial, prise en faisant, autant que possible, concorder son sommet avec celui de la coquille et ses côtés avec les bords externes; mais cette mesure est très-loin d'avoir la même régularité que l'angle spiral des gastéropodes, car il y a pour la plupart des coquilles assez d'arbitraire relativement à la position de l'instrument. Dans les mollusques réguliers et orthoconques nous mesurons la longueur (Pl. 28, fig. 1 a, A, B)

dans la direction de la ligne qui joint la bouche et l'anus, c'està-dire dans le sens vertical pour l'animal placé dans sa station normale; nous prenons ainsi la plus grande distance entre l'extrémité anale et l'extrémité buccale, suivant la ligne précitée, ou parallèlement à sa direction. Pour les mollusques non réguliers et pleuroconques, nous indiquerons les cas dans lesquels le mode de station nous a forcés à adopter une autre mesure.

Nous mesurons la largeur (Pl. 28, fig. 1 a, C, D) perpendiculairement à cette direction, en prenant ainsi la ligne la plus longue parmi celles qui expriment la distance entre le bord palléal et le bord cardinal. Quelques auteurs prennent, dans certains cas, cette plus grande distance, obliquement; il nous a semblé qu'il y avait plus de régularité et moins de chances d'arbitraire à la prendre toujours perpendiculairement à la longueur.

Nous mesurons le rapport du côté anal au côté buccal en menant depuis le sommet des valves une perpendiculaire sur la longueur, de manière à couper cette ligne en deux parties qui fournissent les deux termes du rapport. Il nous a paru plus indispensable encore, dans cette mesure, d'éviter les directions obliques.

Nous mesurons enfin l'épaisseur (Pl. 28, fig. 1 b, A, B) par la plus longue ligne menée de la surface externe d'une des valves à celle de l'autre, perpendiculairement au plan qui les sépare. La plus grande épaisseur se trouve ordinairement vis-àvis des crochets.

#### PREMIER ORDRE.

## ORTHOCONQUES d'Orbigny.

Cet ordre comprend les mollusques lamellibranches dont la station normale est verticale, dont l'animal est en général symétrique à droite et à gauche du plan vertical, et dont la coquille est en conséquence composée de deux valves symétriques ou presque symétriques.

## 1er Sous-Ordre: SINUPALLEALES d'Orbigny.

Nous plaçons dans ce sous-ordre, avec M. d'Orbigny, tous les lamellibranches orthoconques chez lesquels la ligne palléale est échancrée par un sinus.

Les seules familles de ce sous-ordre que nous ayons trouvées dans nos grès verts, sont celles des Myacides, Anatinides, Mactrides, Pétricolides et Cythérides.

Les coquilles seules ne sont pas toujours suffisantes pour distinguer ces familles. Elles fournissent toutefois souvent des caractères assez précis, dont nous rappellerons seulement les principaux.

Les familles des Myacides et des Mactrides ont toutes deux des coquilles variables sous le point de vue du bâillement; celles des Mactrides sont cependant, en général, plus fermées. Le ligament de ces dernières est toujours interne et repose sur de forts cuillerons. Le ligament et la charnière des Myacides sont moins constants. Le seul caractère fixe consiste dans les siphons respiratoires de l'animal, qui sont réunis et soudés en un long tube dans les Myacides, et séparés dans les Mactrides.

La famille des Anatimos est plus clairement caractérisée par une coquille mince, fragile, plus ou moins bàillante, ayant toujours le ligament inséré sur un osselet, et presque toujours une côte interne vers le sommet des valves.

La famille des Pétricolides renferme des coquilles perforantes, irrégulières dans leur accroissement, faiblement bâillantes, à charnière faible, à ligament externe.

Les Cythérides ont une charnière solide et sont en général épaisses, régulières et bien fermées.

## 1re Famille: MYACIDES.

## (Glycimérides et Myaires Deshayes.)

CARACTÈRES. Coquille allongée, oblongue ou ovale, inéquilatérale, bâillante aux deux extrémités. Charnière variable, toujours dépourvue d'osselets accessoires; ligament tantôt externe, tantôt interne, ne portant point d'osselet. Impression palléale très-marquée, échancrée par un profond sinus anal. Deux impressions musculaires.

Animal à manteau fermé, sauf pour le passage du pied, qui est petit ou même rudimentaire. Deux siphons, ouverts seulement à l'extrémité, et réunis dans un long tube extensible.

Les limites de cette famille ont été envisagées de diverses

manières par les conchyliologistes. Cuvier, sous le nom d'Enfermés, lui donna une très-grande extension; Lamarck y plaça les Myes, les Panopées et les Anatines, auxquelles M. de Férussac ajouta les Lutraires et les Solémyes. M. d'Orbigny la compose des genres Solen, Leguminaria, Panopæa, Pholadomya, Glycimeris, Mya et Lutraria. M. Deshayes, dans son traité élémentaire de Conchyliologie, la réduit et la modifie considérablement en n'y admettant que les genres Mya, Corbula et Neæra, et en formant avec les autres genres des familles distinctes sous les noms de Solénacés et Glycimérides (Glycimères, Panopées et Pholadomyes).

N'ayant à nous occuper ici que des genres que nous avons trouvés dans les grès verts des environs de Genève, savoir les Panopées et les Pholadomyes, nous n'avons pas à discuter cette question dans son ensemble, d'autant plus que tous les auteurs sont d'accord pour placer ces deux genres dans la même famille, et que leurs rapports avec leurs congénères vivants ne rentrent pas directement dans notre sujet. La divergence entre MM. d'Orbigny et Deshayes provient principalement de la différence d'importance que ces deux savants attachent à la position du ligament. M. d'Orbigny considère le mode d'insertion de ce corps comme trop secondaire pour fournir des caractères de famille, et M. Deshayes est d'une opinion contraire.

Les Myacides vivent enfoncées profondément dans la vase; elles ne changent point de place et ne peuvent faire que des mouvements peu étendus, provenant de l'allongement du tube et de l'action très-limitée du pied.

## GENRE PANOPÆA Ménard de la Groye.

(Panopæa, Myopsis, Homomya ex parte, Pleuromya, Agass.)

Caractères. Coquille très-bâillante, oblongue ou allongée, équivalve ou subéquivalve, inéquilatérale, recouverte d'un épiderme épais; charnière formée de chaque côté d'une dent cardinale qui est reçue dans une fossette du côté opposé. Ligament situé à l'extérieur, court, saillant, inséré sur une forte callosité.

Animal très-allongé, formé d'une masse abdominale considérable. Branchies en feuillets doubles, placées de chaque côté de cette masse. Bouche munie de palpes. Le tube extensible, caractéristique de la famille, est très-grand.

Les Panopées ont paru pour la première fois dans les terrains permiens. On n'en connaît aujourd'hui qu'un petit nombre d'espèces, dont la plupart acquièrent une taille considérable et vivent sur les côtes des mers froides et tempérées, en s'enfonçant verticalement dans le sable.

Nous suivons l'exemple de MM. d'Orbigny, Forbes et Deshayes, en réunissant aux Panopées les Myopsis de M. Agassiz et une partie de ses Pleuromyes et Homomyes. Quoique le test soit plus mince dans ces genres et diffère par quelques détails de celui des Panopées proprement dites, nous considérons les caractères sur lesquels ils ont été établis comme insuffisants pour justifier une séparation générique. M. Deshayes réunit les Myopsis aux Pholadomyes, mais depuis

que M. d'Orbigny a montré que leur charnière présente des dents analogues à celles des Panopées, il devient évident que c'est à ce dernier genre qu'elles doivent être associées.

Nous avons trouvé quatre espèces de Panopées, non compris quelques échantillons trop incomplets pour pouvoir être décrits. Deux d'entre elles sont nouvelles.

	Coquille très-bâillante et inéquilatérale
1 {	Coquille très-peu bâillante, presque équilatérale P. Sabaudiana.
2	Côté buccal court, formant environ le 1/5 de la longueur totale de la coquille
	Côté buccal égal au $^1/_3$ de la longueur de la coquille
	Côté anal tronqué P. plicata.
3	Côté anal arrondi

## 169. Panopæa acutisulcata d'Orbigny.

(Pl. 28, fig. 1 a, b.)

P. testa oblonga, compressa, concentrice sulcata; latere buccali brevi, angustato, rotundato; latere anali, dilatato, elongato, sublevigato, rotundato.

Lutraria gurgitis P A1. Brongniart, 1822, dans Cuv. oss. foss., 4° édit., IV, pag, 175 et 648. Pl. Q, fig. 15, A, B, C.

Pholadomya acutisulcata, Deshayes, 1842, dans Leymerie, Mém. Soc. Géol., t. V. pl. 3, fig. 2.

Myopsis acutisulcata, Agassiz, 1842, Etudes critiques, Myes., p. 253.

Panopæa acutisulcata, d'Orbigny, 1844, Pal. fr. Terr. crét., t. 5, p. 556, pl. 557, fig. 1 — 5.

Panopæa plicata (Sow.), Bronn, 1848, Index palæontologicus, p. 906.

P. acutisulcata. d'Orb., 1850, Prod., t. 2, p. 155.

TOME XIII, 1re PARTIE.

#### DIMENSIONS.

#### ( Moules. )

Longueur	totale	e		63 millim.
Par rappor	t à la	longueur	: Largeur	0,61
_	_	_	Epaisseur	0,47
			Longueur du côté anal,	0,64
Angle apic	ial		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	138°

Coquille oblongue, à peu près égale sur sa longueur, comprimée, ornée de plis d'accroissement concentriques, profonds, inégaux, s'atténuant sur l'extrémité anale. Côté buccal rétréci et arrondi; côté anal deux fois plus long et saillant à son extrémité.

Moule marqué des mêmes plis que le test, mais atténués.

OBSERVATIONS. L'échantillon dessiné, sur lequel ont été prises les dimensions, est plus renslé que celui qui a été figuré dans la Paléontologie française.

Histoire. Cette espèce est très-probablement celle que M. Alex. Brongniart a décrite sous le nom de Lutraria gurgitis. Nous ne comprenons pas les motifs qui ont engagé M. d'Orbigny à transporter ce nom à une espèce plus courte, plus large et plus relevée sur l'extrémité anale du bord cardinal, espèce qui caractérise les terrains turoniens, tandis que celle qui a été décrite par M. Brongniart appartient au gault de la perte du Rhône. Il est vrai que la figure donnée par cet illustre géologue est trop imparfaite pour ne laisser aucun doute, et, en particulier, il n'est pas impossible qu'elle représente un échantillon de la Panopæa plicata. Cette absence de certitude nous a engagés à abandonner le nom spécifique donné par M. Brongniart, et nous avons cru devoir, afin d'éviter une confusion possible, préférer celui qui lui a été donné par M. Deshayes, et conservé par les auteurs subséquents.

M. Bronn, dans son Index palæontologicus, la réunit à la Panopæa plicata de Sowerby, dont elle diffère cependant par sa région anale tronquée et bien plus comprimée, ainsi que par son bâillement plus faible. Il est en effet possible, qu'il n'y ait là que des diffèrences individuelles ou sexuelles. Le même auteur pense comme nous que c'est cette espèce qui a été décrite par M. Brongniart, mais il lui conserve le nom de P. plicata, comme plus ancien.

LOCALITÉ. La P. acutisulcata est rare à la perte du Rhône; nous ne la

connaissons qu'à l'état de moule. Collections de M. le Dr Roux et du Musée Académique. Elle est citée par M. d'Orbigny comme ayant été trouvée à Cluses par M. Hugard.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 28, fig. 1 a, b, moule de la P. acutisulcata, échantillon appartenant à M. le D' Roux.

## 170. PANOPÆA PLICATA d'Orbigny.

(Pl. 28, fig. 2 a, b.)

P. testà oblongà, compressà, concentricè plicatà; latere buccali brevi, dilatato, rotundato; latere anali elongato, truncato.

Lutraria gurgitis?? Al. Brongniart, 1822, dans Cuvier, oss. foss., 4e édit., IV, p. 173 et 648, pl. Q, fig. 15, A, B, C.

Mya plicata, Sowerby, 1823, Min. Conch., pl. 419, fig. 3.

Panopæa gurgitis, Goldfuss, 1842, p. 274, pl. 153, fig. 7.

Panopæa plicata, D'Orbigny, 1844, Pal. franç., Terr. crét., tome 3, p. 337, pl. 357, fig. 4 et 5.

Ead. d'Orbigny, Prod., 1850, t. 2, p. 135

#### DIMENSIONS.

#### (Moules.)

Longueur totale	74 millim.
Par rapport à longueur : Largeur	0, 61
Epaisseur	0,43
— — Longueur du côté anal	
Angle apicial	141°

Espèce oblongue, égale sur sa longueur, assez épaisse, pourvue de plis concentriques d'autant plus marqués qu'ils sont plus rapprochés des crochets. Côté buccal large, arrondi; côté anal deux fois plus long, élargi et tronqué assez carrément à son extrémité, qui est fortement bâillante.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette Panopée est réunie à la précédente par M. Bronn; le trop petit nombre de nos échantillons ne nous permettant pas une étude suffisante de cette question, nous continuerons à la considérer comme une

espèce distincte, qui dissére de la P. acutisulcata par son côté buccal plus large, et par son extrémité anale plus tronquée et plus bâillante.

Observation. On ne peut pas réunir à cette espèce la Panopæa plicata de Rœmer et de quelques autres auteurs allemands, quoique ils la rapportent euxmèmes à la Mya plicata de Sowerby. Ils ont décrit sous ce nom une petite espèce à côtes concentriques, coupées par des lignes rayonnantes qui déterminent des granulations; elle appartient au terrain neocomien. (Rœmer, Verst. nord. kreideg., p. 75, pl. 9, fig. 25; Geinitz, Characteristich, p. 75, pl. 20, fig. 2.) Ce même nom a été donné plus tard à une espèce plus voisine de la vraie P. plicata, mais qui en différe par un pli fortement prononcé séparant la région anale de celle des flancs. C'est la P. plicata de Geinitz, Nachtrag, pl. 2, fig. 2, et de Reuss., Verst. Bohm. Kreid., p. 47. Enfin M. Geinitz, dans son Grundriss, p. 402, pl. 17, fig. 7. paraît décrire et figurer, sous le nom de P. plicata, une troisième espèce, qui n'a ni les lignes rayonnantes de la première, ni le pli de la seconde.

LOCALITÉ. M. Tollot en a rapporté un échantillon de la perte du Rhône; le Musée Académique en possède quelques moules.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 28, fig. 2 a, b, Panopæa plicata de la perte du Rhône, de grandeur naturelle.

## 171. PANOPÆA RHODANI Pictet et Roux.

(Pl. 28, fig. 3 a, b.)

P. testà oblongo-ovatà, inæquilaterà, concentricè plicatà; latere buccali brevissimo, lato, rotundato; latere anali angustato, elongato.

#### DIMENSIONS

(Moules.)

Longueur to	tale		,	65	millim.
Par rapport	la	longueur	Largeur		0,58
<del></del>	-	_	Epaisseur		0,47
		_	Longueur du côté anal		0,80
Angle apicia	1			125	0

Espèce oblongue, médiocrement renflée, marquée de plis concentriques, éga-

lement prononcés sur toute la largeur de la coquille. Côté buccal très-court, élargi, arrondi; côté anal bien plus long, devenant moins épais vers son extrémité, qui est tronquée d'une manière arrondie.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Elle se distingue clairement des autres espèces des grès verts, par la longueur de son côté anal, comparée à la brièveté de son côté buccal.

Localité. Le Musée Académique la possède de la perte du Rhône.

Explication des figures. Pl. 28, fig. 5, a, b, Panopæa Rhodani de grandeur naturelle.

### 172. PANOPÆA SABAUDIANA Pictet et Roux.

(Pl. 28, fig. 4 a, b, c, d.)

P. testà tenui, ovato-cuneatà, inflatà, longitudinaliter concentricè sulcatà et tenuiter striatà, subæquilaterà; latere buccali rotundato; latere anali angustato et longiori.

#### DIMENSIONS.

Lon	gueur	totale .			$34\ millim$ .
Par	rappor	tà la lo	ngueur	: Largeur	0,65
				Epaisseur	0,63
				Longueur du côté anal	0,60
Ang	le apic	ial		,,	110°
(	Dans l	es jeune	es, il est	de 120°.)	

Coquille ovale, à peu près équilatérale, très-renflée, beaucoup moins bâillante à son extremité anale que les précédentes, et presque fermée à l'extrémité buccale, ornée de plis concentriques saillants, nombreux, assez également espacés, marqués, dans les intervalles, de stries fines. Côté buccal arrondi; côté anal un peu plus long, pourvu d'une impression transverse; on en observe une semblable sur le milieu de la coquille; l'une et l'autre sont peu profondes et quelquefois à peine marquées.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce n'a point le même facies que les trois précédentes; elle en diffère par ses crochets placés presque au milieu de la coquille, et par ses extrémités beaucoup moins bâillantes. Elle se rapproche davantage des Panopæa Arduemensis et Constantii, décrites par M. d'Orbigny, tout en

s'en distinguant facilement par la profondeur de ses plis concentriques, par son extrémité anale bien plus acuminée, par ses dépressions transversales, etc. Nos moules montrent clairement l'impression des dents de la charnière, caractère important du genre auquel nous l'avons rapportée. Cette même circonstance, jointe à sa forme presque équilatérale, et à une légère inégalité des valves dans quelques échantillons, pourrait engager à l'associer aux Corbules. Pour résoudre complétement cette question, il faudrait deux éléments qui nous manquent, savoir, la position du ligament et la forme du sinus palléal, qui est beaucoup plus profond dans les Panopées. Il nous a semblé que la place de cette espèce est, provisoirement au moins, marquée dans ce dernier genre, à cause de son bâillement anal régulier, quoique faible; l'inégalité des valves (nulle ou presque nulle dans la plupart des échantillons) ne peut pas avoir une grande importance, puisqu'on la retrouve plus grande encore dans la *Panopœa inæquivalvis* de M. d'Orbigny.

LOCALITÉ. La P. Sabaudiana n'est pas très-rare au Saxonet. Nous en connaissons aussi quelques échantillons de Bossetang, d'Anzeindaz (Diablerets) et de la perte du Rhône.

Explication des figures. Pl. 28, fig. 4 a, b, un exemplaire adulte, de grandeur naturelle, choisi parmi ceux où les impressions transversales sont les plus marquées. — Fig. 4 c, d, individu plus jeune, à impressions transverses indistinctes, de grandeur naturelle.

A la suite de ces espèces nous devons mentionner un moule incomplet, faisant partie de la collection de M. le professeur Favre, et qui indique l'existence d'une espèce courte très-bâillante, à ligne palléale bien marquée. Des traces rares et incomplètes de plis d'accroissement s'observent principalement sur la région buccale. Ce moule a été trouvé au Saxonet, il appartient probablement à une espèce voisine de la Panopæa plicata Sow., mais il nous paraît plus court et moins régulièrement plissé que les moules de cette espèce.

Nous possédons encore quelques moules de la perte du Rhône, appartenant probablement à d'autres espèces, mais trop imparfaits pour être décrits et figurés.

## GENRE PHOLADOMYA Sowerby.

(Pholadomya, Goniomya, Homomya et Arcomya ex parte, Agassiz; Lysianassa, v. Munster.)

CARACTÈRES. Coquille mince, renslée, oblongue et bâillante. Charnière sans dents, pourvue sculement d'un léger épaississement cardinal. Ligament extérieur court, situé sur une nymphe peu épaisse.

Animal inconnu.

Les Pholadomyes se distinguent des Panopées par leur coquille plus mince et par leur charnière sans dents. Ces mollusques ont été principalement abondants dans les mers de la période jurassique; ils ont diminué de nombre pendant l'époque crétacée; on n'en connaît qu'un très-petit nombre d'espèces dans les terrains tertiaires et dans les mers actuelles.

Parmi les espèces décrites par les divers auteurs, nous n'en avons trouvé qu'une dans nos grès verts, et nous en ajoutons une nouvelle.

## 173. Pholadomya Favrina Agassiz.

(Pl. 29, fig. 1 a, b.)

P. testà oblongà, subarcuatà, inflatà, longitudinaliter plicis distantibus ornatà; transversim costatà, costis approximatis subundulatis; latere buccali brevi, rotundato, dilatato; latere anali elongato.

Pholadomya Favrina, Agassiz, 1842, Etudes critiques, Myes, p. 59, pl. 2', fig. 1—2. Pholadomya Fabrina? d'Orbigny, 1844, Pal. fr., Terr. crét., 3, p. 354, pl. 363, fig. 6-7 Pholadomya Fabrina? d'Orb., Prod., 1850, t. 2, p. 135.

#### DIMENSIONS

#### (Moules)

Longueur.		 	71 millim.
		Largeur	
		 Epaisseur	0,65
-	_	 Longueur du côté anal	0,75
Angle apici	al	 ,	125°

Nous ne connaissons qu'un moule de cette Pholadomye.

Espèce oblongue, renflée, arquée, très-bâillante, ornée de côtes rapprochées et un peu sinueuses, avec lesquelles se croisent des plis d'accroissement moins marqués, beaucoup moins nombreux et irrégulièrement espacés entre eux. Côté buccal court, arrondi et élargi; côté anal large et long.

Histoire. La Pholadomya Favrina a été décrite par M. Agassiz sur un échantillon très-imparfait et unique, faisant partie de la collection de M. le professeur
Favre; ses contours sont incertains et ses crochets n'ont pu être qu'incomplétement dégagés. M. le professeur Favre ayant bien voulu nous communiquer ce même individu, nous l'avons figuré de nouveau, parce que la planche de M. Agassiz représente les côtes d'une manière très-différente de la
nature. M. d'Orbigny a rapporté à la même espèce une petite Pholadomye des
terrains albiens d'Ervy (Aube) qui nous paraît beaucoup moins épaisse en avant,
et ornée de côtes plus régulières, plus droites et moins nombreuses. N'ayant
vu que la figure, nous ne pouvons pas prononcer définitivement sur la valeur de ce
rapprochement, que nous considérons comme très-douteux. Goldfuss a confondu, sous le nom de Ph. Esmarkii, quelques espèces des grès verts de Quedlimburg; l'échantillon qui est figuré pl. 157, sous le nº 10 a, a quelques rapports
avec la Ph. Favrina, mais la fig. 10 b, montre que cette coquille est peu ou point
bâillante.

LOCALITÉ. Le seul exemplaire que nous connaissions, a été trouvé à la perte du Rhône.

Explication des figures. Pl, 29, fig. 1 a, b, Pholadomya Favrina, de grandeur naturelle.

## 174. Pholadomya Genevensis Pictet et Roux.

(Pl. 29, fig. 2 a, b.)

P. testă triangulari, compressă, longitudinaliter plicată, transversim costată; costis acutis, numerosis; latere buccali brevi, oblique truncato, subexcavato, externe subcarinato; latere anali clongato.

#### DIMENSIONS.

Lor	ngueur	totale.			30 millim.
Par	rappo	rt à la lo	ngueur	: Largeur	0,85
		_		Epaisseur	
		_	_	Longueur du côté anal	0,80
Ang	gle apid	ial		* 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	90°

Coquille triangulaire, comprimée, ornée en long de plis d'accroissement rapprochés, concentriques, s'atténuant sur la région palléale, et en travers de côtes rayonnantes, divergentes, formant par leur entrecroisement avec les plis longitudinaux de légères elévations tuberculeuses. Côté buccal court, non bâillant, coupé obliquement, excavé et présentant une légère carène; il manque de côtes transverses. Côté anal allongé, dépourvu également de côtes transverses, bâillant vers son angle supérieur.

Rapports et différences. Cette espèce diffère beaucoup, par sa forme, de celles du terrain albien. Elle se rapproche des pholadomyes jurassiques et surtout de la P. clathrata Münster, du terrain kimméridgien. La région buccale est toutefois moins aplatie et moins courte dans notre espèce; les ornements sont à peu près les mêmes. La Pholadomya decussata Agass., rapportée par cet auteur et par M. Deshayes aux grès verts supérieurs, et qui appartient en réalité au terrain oxfordien inférieur (kellowien), pourrait aussi lui être comparée, mais les côtes rayonnantes sont beaucoup plus larges dans cette dernière espèce, et la région buccale est séparée du reste de la coquille par une carène bien moins prononcée.

Localités. Nous connaissons cinq exemplaires de cette charmante espèce. L'un d'entre eux a été trouvé au Saxonet et appartient à M. le professeur Favre. Deux proviennent de Bossetang et nous ont été communiqués, l'un par M. le

TOME XIII, 1re PARTIE.

prof. Lardy, l'autre par M. Rod. Blanchet. Deux autres ont été recueillis à la perte du Rhône et font partie de la collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 29, fig. 2 a, b, Pholadomya Genevensis (moule), de grandeur naturelle.

### 2me Famille: MACTRIDES.

Caractères. Coquille ovale, transverse ou subtrigone, presque toujours bâillante des deux côtés. Charnière offrant au milieu un cuilleron, ou fossette destinée à recevoir un fort ligament interne. Au côté buccal de la fossette sont des dents divergentes. Une dent latérale de chaque côté (quelquefois rudimentaire).

Animal ayant un mauteau en grande partie fermé et muni, comme celui des Myacides, de deux siphons réunis en un long tube. Pied comprimé et triangulaire, pouvant servir à la locomotion; siphons souvent un peu divergens à leur extrémité et terminés par des tentacules simples ou branchus.

Les Mactrides, qui comprennent, dans la méthode de M. Deshayes, les genres Lutraria, Mactra, Anatinella et Gnathodon, ne se distinguent des Myacides que par leur pied moins rudimentaire et par leurs tentacules plus nombreux. Les coquilles, comparées à celles des autres familles, sont caractérisées par leur fossette ligamentaire, par les dents de leur charnière et par le bâillement plus ou moins apparent de presque toutes les espèces.

Le genre *Mactra* est le seul que nous ayons trouvé dans les grès verts des environs de Genève.

#### GENRE MACTRA Linné.

Caractères. Coquille ovale, arrondie, subtrigone, comprimée, équivalve, subéquilatérale, légèrement bâillante de chaque côté, surtout à la région anale. Impression palléale très-superficielle, à sinus anal court. Impressions musculaires peu marquées, obliques et prolongées sous les dents latérales. Charnière composée d'une dent cardinale comprimée et pliée en forme de V, et de deux dents latérales comprimées et intrantes. Ligament interne reçu dans une fossette triangulaire de la charnière.

Animal ayant les lobes du manteau garnis d'une double série de tentacules simples et coniques. Ouverture des siphons ornée de tentacules simples. Pied grand et triangulaire.

Les Mactres ont paru avec les terrains jurassiques, se continuent à travers les époques crétacées et tertiaires, et habitent encore les mers actuelles, où leurs espèces sont nombreuses et vivent sur les plages sablonneuses.

Nous en décrivons une espèce qui est nouvelle.

## 175. MACTRA GAULTINA Pictet et Roux.

(Pl. 29, fig. 3 a, b.)

M. testà ovato-compressà, inæquilaterà; latere buccali rotundato; latere anali sub-carinato, obtusè truncato.

# Dimensions. (Moule.)

				35 mil	lim.
Par rappor	t à la	longueur	: Largeur.		0,75
-		_			0,53
		~	Longueur	du côté anal (	0,62
Angle apic	ial				

Espèce lisse, comprimée, ovale, plus longue que large, rétrécie à son extrémité buccale, élargie, amincie et tronquée carrément à son extrémité opposée, qui est un peu bâillante. Le côté anal porte une dépression transverse, qui s'étend depuis les crochets jusqu'à l'extrémité du même bord, et qui est séparée du reste de la valve par une élévation formant une légère carène. Le test dont nous ne ne possédons que des fragments, était peu épais et orné de sillons concentriques peu profonds, inégaux, sublamelleux, parallèles aux stries d'accroissement. Ces sillons laissent des impressions peu marquées sur le moule. Les impressions musculaires et palléales sont peu ou point visibles. Quelques moules montrent sous les crochets l'empreinte bien conservée de la dent cardinale en forme de V.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce rappelle en partie la forme de la M. matronensis d'Orbigny, de l'étage néocomien; elle en diffère, toutefois, par son côté anal proportionnellement plus long, et tronqué carrément, au lieu de l'être obliquement.

LOCALITÉ. La perte du Rhône, où elle est très-rarc. Collection du Musée Académique. M. Tollot en a rapporté un exemplaire des Fis.

Explication des figures. Pl. 29, fig. 3 a, b, Mactra gaultina de la perte du Rhône, grandeur naturelle.

## 3me Famille: ANATINIDES.

(Ostéodesmes Deshayes.)

Caractères. Coquille plus ou moins allongée, mince, inéquilatérale, souvent un peu inéquivalve, ordinairement bâillante à ses deux extrémités; charnière ayant sur chaque valve un cuilleron auquel aboutit fréquemment une côte interne; ligament interne, renforcé par un osselet.

Animal à manteau fermé, laissant en avant une petite ouverture pour le passage d'un pied étroit, quelquesois byssisère. Siphons plus ou moins allongés et réunis en tout ou en partie. Le principal caractère de cette famille consiste dans l'osselet de la charnière; les animaux qui la composent, ont d'ailleurs, de grands rapports avec les Myacides. La présence de l'osselet est ordinairement difficile à constater dans les fossiles, et l'on est souvent forcé de recourir à des caractères accessoires pour décider de leurs affinités. C'est, en particulier, ce qui nous est arrivé pour nos fossiles des grès verts.

Nous avons trouvé trois genres d'Anatinides, les Anatina, les Periploma et les Thracia.

#### GENRE ANATINA Lamarck.

(Comprenant les Ceromya et une partie des Platymya d'Agassiz.)

Caractères. Coquille oblongue ou allongée, mince, fragile, inéquivalve, fortement bâillante à la région anale, à peine à la région buccale. Impression palléale très – marquée; sinus anal arrondi, peu profond. Charnière composée de chaque côté d'un cuilleron saillant, soutenu par une lame intérieure, oblique du côté anal. Ligament interne, muni d'un osselet calcaire, transverse. Sommet des crochets fendu transversalement.

Animal muni de deux siphons très-extensibles, distincts, accolés jusqu'à leur extrémité.

Les moules des Anatines se reconnaissent principalement aux impressions que forment la fente des crochets et la côte saillante. Tantôt toutes deux sont bien visibles, comme dans l'Anatina Agassizii, tantôt la fente des crochets présente seule sa trace. Ces moules sont encore caractérisés par leur forme générale aplatie, par leur extrémité anale bâillante et par leurs ornements, composés ordinairement de côtes parallèles aux lignes d'accroissement; l'extrême minceur de la coquille fait que le moule traduit presque tous les détails du test.

Nous n'avons trouvé qu'une seule espèce de ce genre; aucune n'avait été signalée dans le gault.

### 176. Anatina Rhodani Pictet et Roux.

(Pl. 29, fig. 4 a, b.)

A. testà elongatà, compressà, subæquilaterà, transversim unisulcatà; latere buccali obliquè costato; latere anali longitudinaliter concentricè plicato.

#### DIMENSIONS.

(Moules.)

Longueur	۲		53 1	millim.
Par rappo	ort à la	longueur	: Largeur	0,52
		_	Epaisseur	0,37
	apromo		Longueur du côté anal	0,55
Angle api	cial		$153^{\circ}$	

Nous ne connaissons que le moule.

Espèce allongée, comprimée, à peu près équilatérale, la valve gauche plus renflée que la valve droite, marquée d'un sillon transverse, légèrement oblique vers la région buccale. Côté buccal arrondi, orné de côtes obliques, larges et séparées par des sillons; côté anal moins large et pourvu de côtes plus nombreuses et moins saillantes que le côté buccal. Brisure des crochets bien marquée; impression de la côte interne oblique en haut et en avant vers le bord anal.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a de grands rapports avec l'Anatina Marullensis d'Orbigny du terrain néocomien inférieur. Elle nous a paru en différer par ses valves plus équilatérales, par ses crochets moins saillants, plus larges et plus médians, et par son épaisseur proportionnellement plus grande dans le milieu de son côté anal.

LOCALITÉ. L'A. Rhodani a été trouvée pour la première fois, à la perte du Rhône, par M. Bertolus. Le Musée de Genève en possède aussi quelques échantillons.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 29, fig. 4 a, b, moule de l'Anatina Rhodani, de grandeur naturelle.

### GENRE PERIPLOMA Schumacher.

Caractères. Coquille ovale oblongue, mince, très-légèrement bâillante à l'extrémité anale, inéquivalve, inéquilatérale, le côté anal étant plus court que le côté buccal. Impression palléale échancrée par un sinus médiocre. Impressions musculaires au nombre de deux: l'anale petite et presque triangulaire, la buccale étroite et oblique. Charnière composée de chaque côté d'une dent cardinale saillante en demi cuilleron. Ligament interne, inséré à un osselet tricuspide. Une callosité de chaque côté de la charnière, s'étendant obliquement du côté anal dans l'intérieur de chaque valve, et laissant sur le moule des espèces fossiles une forte impression oblique. Sommet des valves presque toujours fendu.

L'espèce que nous décrivons ici n'est conservée qu'à l'état de moule, et nous n'avons pu y reconnaître les caractères tirés de l'osselet et des impressions palléales et musculaires; le sommet des valves ne présente non plus aucune trace de fente. Mais les autres caractères semblent suffisants pour la rapporter à ce genre. En particulier, la brièveté du côté anal, la trace des deux dents cardinales, l'impression laissée par la callosité oblique, le léger bâillement anal et le rapprochement des crochets qui montre que la coquille a été très-mince,

nous paraissent ne pas laisser de doutes sur la convenance d'associer cette espèce aux fossiles que M. d'Orbigny nomme Periploma dans sa Paléontologie française.

Il est vrai que M. Deshayes conteste cette détermination par des motifs sur lesquels notre espèce ne fournit aucune lumière nouvelle, tels que la forme probable de l'osselet, l'inégalité des valves, etc. Ne pouvant point, avec les matériaux que nous avons, décider entre ces deux autorités, il nous a paru plus prudent de réunir provisoirement notre espèce à celles de M. d'Orbigny, dont elle devra évidemment suivre le sort, restant comme elles dans le genre Periploma, si l'opinion de ce célèbre paléontologue prévaut, ou en sortant avec elles, si de nouveaux faits démontrent qu'elles n'ont pas tous les caractères des Périplomes vivants.

## 177. Periploma Sabaudiana Pictet et Roux.

(Pl. 29, fig. 5 a, b. )

P. testá ovato-oblongá, inflatá, concentrice tenuiter subplicatá, subæqualiterá, lateribus rotundatis.

#### DIMENSIONS.

Longueur			20 millim.
Par rapport à la	longueur :	Largeur	0,72
	****	Epaisseur	0,65
		Longueur du côté anal	0, 48
Angle apicial			110°

Nous ne connaissons que le moule.

Espèce ovale allongée, rentlée, ornée probablement de lignes concentriques, à en juger du moins par les impressions qui subsistent sur le moule. Le seul exemplaire dont nous ayons les deux valves réunies, ayant été un peu modifié par

la compression, on ne peut pas juger très-bien de l'inégalité de ces valves. Côté buccal large, arrondi; côté anal à peu près égal au précédent, arrondi de même. Crochets très-saillants. Un sillon oblique bien marqué sur chaque valve, du côté anal, correspondant aux callosités internes de la coquille.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue facilement de tous les Périplomes fossiles par ses valves beaucoup plus bombées, et par sa forme presque équilatérale. Son côté anal arrondi la caractérise aussi très-bien.

LOCALITÉ. La P. Sabaudiana qui paraît très-rare, a été trouvée à la montagne des Fis, au Reposoir et à Anzeindas (Diablerets). Musée Académique de Genève et Musée de Berne.

Explication des figures. Pl. 29, fig. 5 a, b, Periploma Sabaudiana, de grandeur naturelle.

### GENRE THRACIA Leach.

## ( Corimya Agassiz. )

CARACTÈRES. Coquille mince, oblongue ou arrondie, presque équilatérale, un peu inéquivalve, légèrement bâillante à ses extrémités. Charnière ayant un cuilleron interne, oblique et saillant. Ligament double : l'interne puissant, l'externe petit. Un osselet demi-annulaire, attaché par le ligament à la partie antérieure du cuilleron (il manque dans quelques espèces). Impressions musculaires superficielles; impression palléale échancrée par un sinus anal peu profond, large et triangulaire.

M. Deshayes a démontré que l'on devait rapporter à ce genre un grand nombre de coquilles fossiles, et en particulier, le genre Corimya de M. Agassiz, qui n'en diffère par aucun caractère appréciable. Les deux espèces que nous décrivons ici ne sont pas conservées de manière à laisser voir

TOME XIII, 1re PARTIE.

tous les caractères du genre; mais leur forme, la légère différence qui existe entre les deux valves, leur bâillement anal faible et la minceur de leur coquille, nous paraissent suffisants pour justifier le rapprochement que nous avons fait. La côte saillante qui borde la région anale et qui circonscrit une sorte de corselet oblique, leur donne, en outre, une analogie de facies incontestable avec les Corimya.

Nous avons eu toutesois quelque hésitation entre les genres Thracia et Lyonsia, car M. d'Orbigny rapporte à ce dernier genre la Lutraria carinifera de Sowerby, qui a des rapports certains avec nos espèces, quoiqu'elle soit plus transverse. Mais nos fossiles sont trop peu bâillants pour être associés aux Lyonsia vivants, et sont d'ailleurs tout-à-sait dépourvus de la côte interne qui est très-caractéristique de ce genre, et qui, si elle avait existé, aurait laissé une trace sur le moule. Dans les Thracies au contraire, cette côte est trèsvariable et disparaît quelquesois presque complétement, ce qui est le cas de nos espèces. M. Deshayes consirme en outre notre détermination, en associant aux Thracies la Lutraria carinifera, aussi bien que les Corimya. Il y réunirait certainement aussi nos espèces, qui sont intermédiaires entre cès deux types.

## 178. THRACIA ROTUNDA Pictet et Roux.

(Pl. 29, fig. 6 a, b.)

L. testà subrotundà, compressà, concentricè plicatà, transversim striatà; latere buccali rotundo; latere anali transversim truncato, externè carinato.

### DIMENSIONS.

(Moules)

Longueur	totale .			. 21 millim.
Par rappor	t à la lo	ngueur	: Largeur	0, 85
			Epaisseur	. 0,58
_	_	-	Longueur du côté anal	. 0,47
Angle apic	ial			. 125°

Espèce presque ronde, comprimée, ornée de lignes d'accroissements concentriques et rapprochées, et de stries rayonnantes nombreuses et très-fines. Elle est inéquivaive et inéquilatérale, la valve gauche est la plus bombée; le côté buccal est arrondi, plus court et moins large que le côté anal, qui est tronqué carrément sur sa partie bâillante et qui porte extérieurement une carène très-prononcée; entre la carène et le bord tronqué existe une dépression très-sensible. Le sillon de la côte interne n'est visible sur aucune volve.

Moule lisse, conservant l'impression des côtes concentriques, mais pas celle des stries transverses.

Localités. Nos échantillons proviennent presque tous de la perte du Rhône; un seul a été rapporté de la vallée de Sixt. Ils appartiennent à la collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 29, fig. 6 a, b, Thracia rotunda, de grandeur naturelle.

### 179. THRACIA ALPINA Pictet et Roux.

(Pl. 29, fig. 7 a, b, c.)

T. testà ovatà, compressà, subæquilaterà, concentricè tenuiter plicatà; latere buccali rotundo, latere anali rotundo et carinato.

### DIMENSIONS.

(Moules.)

Longue	eur total	e		 	 	٠.,	 	 		٠,	15 millio	n,
Par rap	port à 1	a longueur	: Largeur.	 	 			 	. (		0,7	75
		read.	Epaisseur	 	 		 ٠,	 			0,4	45
_		-	Longueur									30
Angle	apicial			 	 		 			 	1250	

Espèce à peu près équilatérale, un peu ovale, comprimée, ornée de lignes d'accroissement concentriques peu prononcées, et de stries fines, transverses et obliques. La valve gauche paraît un peu plus rensiée que la valve droite; la petitesse de l'espèce ne permet pas d'apprécier exactement la dissérence. Le côté buccal est arrondi et moins large que le côté anal, qui est tronqué et orné exterieurement d'une carène, au-dessus et en arrière de laquelle se voit une dépression; ce dernier côté bâille un peu sur sa partie tronquée.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle ne diffère que par sa forme plus ovale et en même temps plus comprimée.

Localités. La perte du Rhône et les grès verts de Bossetang; collection du Musée Académique.

Explication des figures. Pl. 29, fig. 7 a, b, Thracia alpina, de grandeur naturelle, échantillon trouvé à Sainte-Croix, plus grand que ceux de nos environs.

— Fig. 7 c, fragment de test, grossi.

## 4me FAMILLE : PÉTRICOLIDES.

## (Lithophages Lamarck.)

Caractères. Coquille transverse, inéquilatérale, souvent irrégulière et bâillante du côté anal, presque toujours perforante. Ligament externe. Charnière sans pièces accessoires.

La plupart des espèces qui appartiennent à cette famille vivent en perçant l'argile durcie, les roches et les coraux. L'animal a un pied très-petit, quelquesois byssifère, et les deux siphons postérieurs réunis dans une partie de leur longueur.

Les Pétricolides sont en général faciles à distinguer par l'irrégularité de leurs coquilles, dont les lignes d'accroissement ne sont point astreintes à cette uniformité qui caractérise la plupart des Orthoconques.

### GENRE PETRICOLA Lamarck.

CARACTÈRES. Coquille ovale ou transverse, inéquilatérale, bâillante du côté anal. Charnière étroite, présentant deux dents sur chaque valve ou sur une seule. Impressions musculaires grandes et écartées. Impression palléale très-largement ouverte, et se rapprochant par conséquent de la région apiciale.

La seule espèce de cette famille que nous ayons trouvée, nous paraît appartenir au genre Pétricole. Nous n'avons pu observer sa charnière, car nos échantillons sont à l'état de moule, mais la grandeur et la forme du sinus de l'impression palléale nous semble lui assigner une place dans ce genre, plutôt que dans celui des Venerupis.

### 180. Petricola Rhodani Pictet et Roux.

(Pl. 29, fig. 8 a, b, c.)

P. testá rotundatá, globulosá, subaequilaterá; latere buccali et latere anali rotundatis.

#### DIMENSIONS

### ( Moules.)

Longi	ueur t	otale			millim.
Par ra	pport	à la lor	gueur :	Largeur	0,87
	_	_		Epaisseur	0,77
			_	Longueur du côté anal	0,63
Angle	apici	al			$30^{\circ}$

Nous ne connaissons que le moule ; la coquille était très-mince.

Espèce très-renflée, globuleuse, à bords arrondis, équivalve, à peu près équilatérale; le côté buccal un peu plus court que le côté anal. Crochets larges et recourbés, à peine saillants; impressions musculaires et palléale très-prononcées. Observation. Cette espèce se trouve ordinairement sous la forme d'un corps en forme de massue (fig. 8 c), atténué et fracturé à son extrémité supérieure, régulièrement arrondi à l'autre; ce corps est un moule formé dans le trou que le mollusque avait percé dans la roche. Si on casse ce moule avec précaution, on trouve quelquefois à l'intérieur la coquille elle-même divisée en petits fragments méconnaissables, puis son propre moule (fig. 8 a et b). Cette espèce est le seul mollusque perforant que nous ayons rencontré dans le gault du bassin de Genève.

LOCALITÉS. Elle se trouve à la perte du Rhône où elle n'est pas commune; on la rencontre plus rarement encore dans les grès verts de la Savoie.

Explication des figures. Pl. 29 fig. 8 a, b, moule de la Petricola Rhodani, de grandeur naturelle. Fig. 8 c, moule de la cavité perforée.

## 4me FAMILLE : CYTHÉRIDES.

CARACTÈRES. Coquille régulière, inéquilatérale, équivalve, fermée, en général solide. Charnière composée d'au moins trois dents cardinales sur chaque valve et manquant toujours de dents latérales. Ligament externe.

Ces coquilles se distinguent facilement au milieu de toutes les sinupalléales par leur régularité, leur charnière forte et à dents cardinales nombreuses, leurs valves égales et bien closes.

Nous avons trouvé des représentants de deux genres, une Venus et une Thetis.

### GENRE VENUS Linné.

Caractères. Coquille ovale, arrondie ou subtrigone, parfaitement close, épaisse. Charnière à trois dents cardinales, divergentes. Impressions musculaires grandes, ovalaires. Impression palléale terminée du côté anal par une sinuosité petite, triangulaire, oblique de haut en bas et d'avant en arrière.

On voit que nous réduisons le genre Vénus aux espèces à coquille solide, à trois dents à la charnière et à sinus palléal petit et oblique.

La seule espèce que nous ayons trouvée, a tout-à-fait les caractères de ce genre.

## 181. VENUS VIBRAYEANA d'Orbigny.

(Pl. 30, fig. 1 a, b, c.)

V. testà ovatà, subinflatà, rugoso striatà; latere buccali brevi, rotundato; latere anali elongato, rotundato; lunulà cordiformi.

Venus Vibrayeana, d'Orbigny, 1844, Pal. fr, terr. crét., t. 3, p. 442, pl. 384, fig. 16-20.

Ead. d'Orbigny, Prod. 1850, t. 2, p. 136.

### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longueur	totale		A	17 millim.
Par rappo	rt à la le	ongueur	Largeur	0,86
-	******		Epaisseur	0,60
*0.000		_	Longueur du côté anal	0,70
Angle api	cial			. 119°

Coquille ovale, renssée, ornée de stries concentriques légèrement rugueuses, et de quelques sillons d'accroissement; côté buccal court, arrondi; côté anal plus long, également arrondi; lunule plus ongue que large, très-circonscrite; corselet peu profond; crochets peu saillants.

Moule lisse, montrant quelques sillons concentriques fort atténués, ainsi que les empreintes musculaires et le sinus palléal triangulaire.

Localités. Cette espèce se trouve également à la perte du Rhône et dans les Alpes de la Savoie; elle est rare et ordinairement à l'état de moule.

Explication des figures. Pl. 50, fig. 1 a, Venus Vibrayeana grossie. Fig. 1 b, c, moule de la même espèce.

### GENRE THETIS Sowerby.

CARACTÈRES. Coquille subcordiforme, mince, parfaitement close; crochets grands; charnière munie de trois dents cardinales inégales. Impression musculaire buccale très-petite; impression palléale se dilatant en une profonde sinuosité triangulaire, large à sa base, occupant la moitié de la coquille, s'avançant en pointe dans la direction des crochets jusqu'à la partie profonde de cette région.

Ce genre remarquable est principalement caractérisé par sa singulière impression palléale. Sa forme bombée et ses grands crochets lui donnent quelque analogie de facies avec les Cardium.

### 182. THETIS GENEVENSIS Pictet et Roux.

(Pl. 30, fig. 2 a, b, c.)

T. testà rotundatà, inflatà, subcordiformi, concentricè plicatà, inaequilaterà; latere buccali brevi, rotundato; latere anali elongato, rotundato.

#### DIMENSIONS.

Longueur totale		, , , ,	26 millim.
Par rapport à la lor	igueur :	Largeur	0,100
		Epaisseur	
		Longueur du côté anal	0, 57
Angle apicial			100°

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce arrondie, très-renflée, aussi large que longue, lisse ou marquée de lignes d'accroissement peu sensibles et rapprochées. Elle est inéquilatérale, le côté buccal est un peu plus court et plus large que le côté anal; tous deux sont arrondis. Pas de lunule circonscrite; crochets très-saillants, pointus, très-contournés. Impression palléale circulaire, très-rapprochée du pourtour; sinus anal triangulaire étroit,

prolongé sur les crochets; son bord inférieur forme un demi-cercle en se rapprochant de la région buccale, puis se contourne de nouveau en s'avançant vers le labre qu'il n'atteint pas. Impressions musculaires peu marquées, visibles seulement sur la région anale.

Rapports et différences. Quoique voisine de la Thetis minor Sowerby, du gault, notre espèce ne saurait lui être assimilée, car, tandis que l'espèce de Sowerby est plus longue que large et a le côté anal le plus court, la nôtre est aussi large que longue et a le côté anal le plus long; ses crochets sont plus saillants. Ces différences sont également appréciables dans les ouvrages de MM. Sowerby et d'Orbigny. Elle se rapprocherait davantage de la Thetis major Sow., de l'étage turonien, laquelle a les mêmes dimensions proportionnelles en longueur et en largeur et la même forme de sinus; mais cette dernière est plus comprimée et n'a pas d'impression palléale circulaire. Les figures de l'ouvrage de Sowerby, faites sur des exemplaires de Blackdown, représentent la Thetis major avec des formes très-différentes de celles de notre espèce. La Thetis lævigata d'Orb, de l'étage aptien est encore plus comprimée que la Thetis major et manque également d'impression palléale circulaire.

Localités. La *Thetis Genevensis* est assez répandue dans nos grès verts, mais n'est commune dans aucune localité; nous l'avons trouvée à la perte du Rhône, au Saxonet, aux Fís, au Mont Criou.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 50, fig. 2 a, b, c, Thetis Genevensis, de grandeur naturelle.

2me Sous-Ordre.

# INTÉGROPALLÉALES d'Orbigny.

Dans ces mollusques l'impression du manteau n'est point échancrée par un sinus. Les siphons sont toujours moins développés et moins extensibles que dans les sinupalléales.

Les familles que nous avons trouvées représentées dans nos Tome XIII, 1<sup>re</sup> Partie. grès verts, sont celles des Cardides, Astartides, (Astartides et Carditides d'Orbigny), Lucindes, Tricondes, Arcacides, Mytilides et Limides. Quelques-unes d'entre elles se caractérisent très-facilement par la seule inspection de la coquille; dans d'autres les différences sont moins précises et les caractères tirés de l'animal restent le seul guide certain.

Les familles le plus clairement caractérisées sont les suivantes:

Les Triconides sont faciles à distinguer par leur charnière très-solide, composée de dents cardinales striées, et par leurs impressions musculaires accessoires multiples.

Les Arcacides ont un caractère parfaitement clair dans les dents nombreuses qui garnissent la région cardinale.

Les Mytilides différent de toutes les autres par leur forme transverse et par leur crochet formant l'extrémité anale, ou du moins s'en rapprochant beaucoup.

Les Limbes ne peuvent être confondues avec aucune autre famille d'Orthoconques à cause de leur charnière semblable à celle des Peignes, de leurs oreillettes, de leur forme transverse, et surtout parce qu'elles font une exception en étant les seules coquilles orthoconques où l'impression musculaire est unique.

Pour les autres familles, les différences sont moins tranchées et surtout moins constantes.

Les Lucinides ont une charnière plus faible que les familles suivantes, composée de dents cardinales et de dents latérales variables, une coquille mince, fréquemment ponctuée ou rayée en dedans et des impressions musculaires souvent prolongées.

Les Cardides sont en général bombées et souvent presque équilatérales. Leur charnière est pourvue de dents cardinales irrégulières et de dents latérales écartées.

Les Astartides et les Carditides de M. d'Orbigny ont une coquille épaisse, ordinairement inéquilatérale, une charnière solide, des dents cardinales prononcées, tantôt des dents latérales, tantôt point, un ligament externe ou interne. M. d'Orbigny caractérise les premières par leurs impressions musculaires buccales doubles, ce qui est vrai; mais, comme nous le dirons plus bas, ce caractère se retrouve dans plusieurs Carditides et nous réunissons provisoirement ces deux familles sous le nom d'Astartides.

## 1re Famille: CARDIDES.

CARACTÈRES. Coquille régulière, équivalve, en général ventrue et peu inéquilatérale. Deux impressions musculaires variables de forme. Charnière composée de dents cardinales irrégulières et de dents latérales écartées. Ligament externe.

Les moules se distinguent par leur forme en général renflée, par leur impression palléale simple, par la grandeur de leurs crochets et par leurs empreintes musculaires buccales très-apparentes et situées près du bord.

## GENRE CARDIUM Bruguière.

Caractères. Crochets proéminents, mais non enroulés. Charnière composée de deux dents cardinales sur chaque valve, rapprochées et obliques, s'articulant en croix avec leurs correspondantes, d'une dent latérale buccale et d'une dent latérale anale. Coquille souvent marquée de côtes rayonnantes. Les dents disparaissent en partie chez quelques espèces.

Les Cardium se trouvent dans tous les terrains, augmentant de nombre en se rapprochant de l'époque actuelle. Ces mollusques habitent le sable ou la vase des parties tranquilles du littoral de la plupart de nos mers.

Nous en avons trouvé quatre espèces, dont deux ont déjà été décrites par M. d'Orbigny.

### 183. CARDIUM NECKERIANUM Pictet et Boux.

(Pl. 30, fig. 3 a, b.)

C. testà crassà, rotundato-subangulatà, concentricè regulariter sulcatà; latere anali truncato, subcomplanato, sulco angusto marginato; latere buccali rotundato.

#### DIMENSIONS.

Lor	gueur.				millim.
				Largeur	0, 105
		_	_	Epaisseur	0,80
	-	_	-	Longueur du côté anal	0,54
Ang	gle apic	ial		98	0

Coquille épaisse, un peu plus large que longue, presque équilatérale, renflée, globuleuse, à côté anal légèrement aplati et séparé des flancs par un sillon étroit. Elle est ornée sur toute sa surface de sillons concentriques très-étroits, laissant entre eux des côtes régulières aplaties. Le bord buccal est arrondi.

Nous rapportons à cette espèce des moules entièrement lisses qui montrent que la coquille a été très-épaisse, caractère que l'observation directe nous avait déjà indiqué. RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Les sillons concentriques réguliers et l'absence complète de côtes transverses distinguent facilement cette espèce de toutes les autres.

Localités. Nous n'avons trouvé ce Cardium qu'à la perte du Rhône, où il ne paraît pas fréquent. Un des exemplaires faisait partie de la collection donnée au Musée de Genève par M. le professeur Necker. Nous lui avons dédié cette espèce.

Explication des figures. Pl. 50, fig. 5 a, b, Cardium Neckerianum, de grandeur naturelle.

## 184. CARDIUM DUPINIANUM d'Orbigny.

'(Pl. 30, fig 4 a, b.)

C. testá subcompressá, inæquilaterá, sublævigatá; latere buccali brevi; latere anali elongato, convexo; labro lævigato.

Cardium Dupinianum, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., terr. crét., t. 3, p. 26, pl. 242 bis, fig. 1-3.

Id. d'Orbigny, 1850, Prod., t. 2, p. 137.

### DIMENSIONS.

Longueur	77 millim.
Par rapport à la longueur : Largeur	0,88
— — Epaisseur	0,65
Angle apicial	105°

Coquille plus longue que large, comprimée, courte du côté buccal, allongée du côté anal, anguleuse à la terminaison du même bord, lisse, sauf quelques rides d'accroissement. Labre uni. Crochets peu saillants.

Le moule est lisse.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par sa forme comprimée, par son labre lisse et par l'absence d'ornements sur le test.

LOCALITÉS. M. Roux en a trouvé un exemplaire à la perte du Rhône, muni de son test. Le Musée Académique en possède quelques moules du même gisement et un du Saxonet.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 30, fig. 4 a, b Cardium Dupinianum, de grandeur naturelle.

## 185. CARDIUM RAULINIANUM d'Orbigny.

( Pl. 31, fig. 1 a, b, c, d, e, é et f.)

C. testà transversà, inflatà, costis angustatis intermediisque spinis acutis ornatà, latere anali plano; natibus proeminentibus; labro crenulato.

Cardium Raulinianum, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., terr. crét., t. 3, p. .25, pl. 242, fig. 7 à 10.

Id. d'Orbigny, 1850, Prod., tome 2, p. 137.

### DIMENSIONS.

### ( Moules. )

Lar	geur .				19 millim.		
Par	rappo	rt à la l	argeur :	Longueur des jeunes	0, 100		
	_	_		Longueur des adultes	0,85		
				Epaisseur des jeunes	0, 80		
			_	Epaisseur des adultes	0,100		
Angle apicial (moins obtus sur le moule)							

Coquille renslée, plus large que longue, aussi épaisse que large, à côté buccat arrondi, à côté anal un peu tronqué, ornée de côtes très-sines, égales, peu élevées, séparées par des sillons dans lesquels on distingue à la loupe des pointes droites et régulières, espacées entre elles. Labre finement crenelé.

Moule lisse; impressions musculaires bien marquées, surtout les impressions anales.

OBSERVATIONS. Dans le jeune âge la coquille est aussi longue que large; elle est moins renslée et son angle apicial est plus obtus.

Rapports et différences. Nous n'avons pas hésité à rapporter cette espèce au Cardium Raulinianum de M. d'Orbigny, car les fragments de test que nous avons pu observer sont très-caractéristiques. Nos mesures différent un peu des siennes, mais nous avons reconnu sur une série d'échantillons qu'elles varient avec l'âge. Les mesures données par M. d'Orbigny sont celles d'un jeune individu, et en effet, il indique comme mesure de la largeur 8 millimètres. A l'état adulte notre espèce se rapproche des formes et des dimensions du Cardium Constantii, mais elle en diffère toujours par des côtes beaucoup plus fines et par les petites épines qui ornent leurs intervalles.

Localités. Elle n'est pas rare à la perte du Rhône. Nous en connaissons quelques échantillons provenant du Saxonet et du Reposoir. Collections de M. Roux et des Musées de Berne et de Genève.

Explication des Figures. Pl. 31, fig., 1 a, b, c, d, échantillon adulte, grossi de moitié en sus de ses dimensions. Fig. 1  $\acute{e}$ , grandeur naturelle. Fig. 1  $\acute{e}$  et  $\acute{f}$ , échantillon jeune, de grandeur naturelle.

### 186. CARDIUM ALPINUM Pictet et Roux.

(Pl. 31, fig. 2 a, b, c, d, e, é.)

C. testà transversà, inflatà, concentricè costis inæqualibus, rugosulis ornatà; internè utroque latere unicostatà; natibus proeminentibus; labro crenulato.

#### DIMENSIONS.

Largeur	millim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,88
— — Epaisseur	0,90
Angle apicial	0

Coquille plus large et presque aussi épaisse que longue, renflée, convexe sur les bords anal et buccal, à crochets saillants et contournés, ornée de petites côtes concentríques, un peu rugueuses et inégales entre elles. Labre crénelé.

Moule intérieur marqué de sillons concentriques; il porte sur le côté anal l'empreinte profonde, arquée et étroite, d'une côte interne de la coquille, ayant son origine sur les crochets et se terminant à la naissance du bord palléal, après avoir contourné l'impression musculaire à son côté interne. Cette empreinte est analogue à celle qu'on trouve sur les moules des Cucullées; le Cardium Junoniæ des mers d'Asie porte aussi une côte interne très-prononcée.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est clairement caractérisée par ses dimensions et par les ornements de sontest. Son moule se distingue de celui du C. Raulinianum par les empreintes de côtes internes sur les régions buccale et anale et par son épaisseur proportionnellement moindre.

LOCALITÉS. Le Saxonet, le Reposoir, Lessex, Bossetang, la perte du Rhône. Collections de MM. Roux, Tollot, du Musée de Berne et du Musée Académique de Genève.

Explication des figures. Pl. 31, fig. 2 a, Cardium alpinum, de grandeur double. Fig. 2 b, c, d, e, moule de la même espèce, au même grossissement. Fig.  $\acute{e}$ , grandeur naturelle.

### GENRE ISOCARDIA Lamarck.

CARACTÈRES. Crochets proéminents, divergents, le plus souvent roulés en spirale. Charnière composée de deux dents cardinales aplaties dont une s'enfonce sous le crochet, et d'une petite dent latérale du côté anal. Impressions musculaires grandes, mais superficielles. Coquille bombée et ventrue.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce de ce genre dans nos grès verts.

## 187. ISOCARDIA CRASSICORNIS d'Orbigny.

(Pl. 31, fig. 3 a, b, c, d, e, f, g, h.)

I. testá subrotundatá, inflatá, inæquilaterá, concentrice irregulariter rugoso-striatá: latere buccali brevi; latere anali truncato; umbonibus brevibus, approximatis.

(In senioribus: umbonibus crassis, irregularibus, inæqualiter proeminentibus.)

Ceromya crassicornis, Agassiz, 1842, Études critiques, Myes., p. 36, pl. 8 f, fig. 5 à 10.

Isocardia crassicornis, d'Orbigny, 1850, Prod., t. 2, p. 137, nº 249 partim.

#### DIMENSIONS.

Longueur		43 millim.	
Par rapport à la longueur :	Largeur		)
	Epaisseur		
Angle apicial			

Coquille arrondie, aussi large que longue, inéquilatérale, renflée sur sa partie médiane en suivant le diamètre de sa plus grande largeur, ornée de lignes d'accroissement peu régulières et inégales entre elles, plus large du côté anal que du

côté buccal qui est beaucoup plus court que l'autre; crochets épais devenant irréguliers avec l'âge. Dépression transverse de chaque côté des valves, plus marquée du côté buccal, figurant un méplat un peu excavé du côté anal.

Moule lisse, marqué de rides concentriques plus ou moins apparentes, reproduisant les dépressions transverses de la coquille, surtout du côté buccal où la dépression forme un véritable sillon partant du crochet et circonscrivant l'impression musculaire qui est très-marquée et bien plus apparente que l'impression anale. On voit du côté anal de faibles traces de trois ou quatre côtes transverses intérieures. Impression palléale marquée.

Observations. Cette espèce varie de forme suivant l'âge; lorsqu'elle est jeune les crochets sont médiocres, puis ils se développent, se contournent, deviennent plus forts, plus épais, plus saillants; enfin dans un âge plus avancé, le diamètre transverse dépasse le diamètre longitudinal, et les crochets se font remarquer par leur grosseur, par un aplatissement irrégulier sur leur sommet et surtout par leur développement inégal, celui de la valve droite étant ordinairement le plus proéminent. Ce changement de forme de la coquille ne paraît pas s'opérer également et en même temps sur les deux valves; nous possédons du moins quelques échantillons sur lesquels l'inégalité de développement est très-curieuse à observer. Les seules parties de cette espèce qui conservent le même aspect à tous les âges sont la charnière et les impressions musculaires; nous avons étudié plusieurs exemplaires de cette Isocarde et n'avons jamais observé la moindre variation dans ces parties essentielles de la coquille.

Cette espèce a été classée par M. Agassiz dans le genre Ceromya, mais son impression palléale entière et ses valves non bâillantes prouvent qu'elle ne peut pas être associée à ce genre.

M. d'Orbigny, dans son Prodrome, l'a rapportée au genre Isocardia; nous avons suivi son exemple, mais nous devons faire remarquer qu'elle se rapproche des Cyprines par quelques-uns de ses caractères; ainsi le facies des individus non déformés par l'âge rappelle beaucoup celui de la *Cyprina regularis* dont il sera question plus loin, quoiqu'ils soient plus tronqués et plus courts sur la région anale; l'impression musculaire buccale très-marquée est d'ailleurs un caractère appartenant plutôt aux Cyprines qu'aux Isocardes. Ce qui nous a décidé à placer cette espèce dans le genre Isocarde, c'est l'étude de la charnière, ou du moins des impressions laissées sur le moule par cette partie de la coquille. On voit en effet entre les crochets des moules une double dent ou lame saillante, oblique, hori-

zontale, correspondant très-bien aux cavités qui reçoivent les dents cardinales obliques des Isocardes, et par contre, on ne découvre aucune impression des dents cardinales directes, qui sont ordinairement si bien marquées sur les moules des Cyprines. L'irrégularité des crochets ne pouvait être d'aucun secours dans cette discussion, car nous n'en connaissons d'exemple ni dans l'un ni dans l'autre de ces genres.

M. Agassiz, sous le nom de Ceromya crassicornis, a confondu deux espèces trèsdifférentes. L'une d'elles représentée par les fig. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la planche 8 f de la monographie des Myes, est une véritable Isocarde, et c'est à elle que nous conservons le nom de crassicornis; l'autre représentée par les figures 1, 2, 5 et 4 de la même planche, est une Isoarca, comme nous le démontrerons plus loin. Nous faisons cette séparation avec d'autant plus de sécurité que M. le professeur Favre a mis à notre disposition les exemplaires originaux figurés et décrits par notre savant ami.

Localités. Nous possédons plusieurs exemplaires de cette espèce provenant du Saxonet et du Reposoir.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 34, fig. 3 a, Isocardia crassicornis non déformée. Fig. 3 b, c, moule d'un individu plus jeune, déjà inéquivalve, mais à crochets encore courts. Fig. 5 d, e, moule d'un individu adulte, inéquivalve et à crochets déformés Fig. 3 f, g, h, moule d'un individu équivalve régulier,

## 2me FAMILLE: ASTARTIDES.

## (Astartides et Carditides d'Orbigny.)

Caractères. Coquille entièrement fermée, ordinairement épaisse, inéquilatérale, équivalve. Charnière forte, munie de grosses dents cardinales. Impressions musculaires plus ou moins arrondies, la buccale étant souvent double. On en observe quelquefois une petite au fond de la valve sous le crochet.

Ces coquilles diffèrent de celles de la famille des Cardides par l'absence des dents latérales, par leur forme plus inéquilatérale, et souvent par la duplicité de l'impression musculaire buccale. Elles ont ordinairement la même forme générale que les Cythérides et ont été fréquemment confondues avec elles; mais elles s'en distinguent par leur impression palléale entière.

Quoique nous ayons en général tâché dans ce mémoire de changer le moins possible la classification admise, parce qu'il nous semble que des remaniements de ce genre doivent être réservés aux ouvrages généraux, nous n'avons pas pu conserver les deux familles indiquées par M. d'Orbigny sous le nom de Carditides et d'Astartides, ainsi que nous l'avons déjà annoncé. Ce savant paléontologiste base en effet presque entièrement leur distinction sur l'impression musculaire buccale qui est double, suivant lui, dans les Astartides, et simple dans les Carditides. Il place dans cette dernière famille les Cyprina et les Cardita. Or, la plupart de ces dernières ont une impression buccale très-évidemment double, et dès-lors il ne reste aucun motif appréciable pour les éloigner des Astartides. Nous avons donc préféré les réunir en une seule famille qui nous paraît tout-à-fait naturelle et qui comprend parmi les genres que nous avons trouvés dans nos grès verts les Opis, ASTARTE, CARDITA et CYPRINA.

### GENRE OPIS Defrance.

CARACTÈRES. Coquille très-épaisse, cordiforme. Crochets trèsgrands, droits et saillants. Charnière forte, composée sur chaque valve d'une cavité et d'une dent. Ligament extérieur.

Ces coquilles qui ne sont connues qu'à l'état fossile paraissent spéciales aux terrains jurassiques et crétacés.

Nous en avons trouvé deux espèces, dont une était déjà décrite.

## 188. Opis Hugardiana d'Orbigny.

(Pl. 32, fig. 1 a, b, c, d, e.)

O. testâ crassâ, transversim elongatâ, cuneatâ, subquadrilaterâ, longitudinaliter rugoso-striatâ; umbonibus elongatis, angustatis.

Opis Hugardiana, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., Terr. crét., t, 3, p. 52, pl. 253, fig. 6 à 8.

Ead. d'Orbigny, 1850, Prodr., t. 2, p. 136.

#### DIMENSIONS

#### (Moules.)

Largeur	,	 36 millim.
Par rapport à la largeur :	Longueur	 0, 65
	Epaisseur	 0,80
Angle apicial		 47°

Coquille transversale, cunéiforme, subquadrilatérale, à test épais, à crochets prolongés et très-recourbés, ornée en long de stries serrées et un peu rugueuses. Face anale présentant au centre une excavation cordiforme bordée par une carène élevée, et une dépression transverse s'étendant sur toute la largeur de la coquille entre la carène sus-mentionnée et l'angle externe émoussé qui circonscrit cette face. Face buccale offrant à son centre une excavation cordiforme sembla-

ble à celle de l'autre face, mais plus grande et moins déprimée, circonscrite au dehors par un angle arrondi. Face médiane pourvue d'un sillou transverse linéaire du côté de la région buccale.

Moule marqué d'impressions musculaires prononcées; une dépression transverse linéaire part de l'impression anale, et deux autres partent de l'impression buccale; toutes trois se prolongent sur les crochets. Labre crénelé.

Rapports et différences. Nous avons été embarrassés pour rapporter cette espèce à l'une de celles que M. d'Orbigny a décrites. Les formes du moule de chacune des deux valves et les détails de leurs impressions s'accordent tout-à-fait avec les planches de l'O. Hugardiana; mais M. d'Orbigny represente cette espèce comme très-courte et à crochets très-écartés. Les formes de ces mêmes moules empêchent toute comparaison avec celui de l'O. Sabaudiana figurée pl. 254, fig. 1 à 5, et par contre le test de la face buccale s'accorde assez bien avec celui qui est représenté sous le même nom, pl. 257, fig. 5 et 6, sauf que ce dernier est un peu plus large et a les crochets plus gros. Le profil, fig. 4, est le même pour la forme, mais les sillons du nôtre sont plus réguliers.

Dans cet état de choses, devions-nous considérer notre espèce comme nouvelle? Nous ne l'avons pas pensé. Nous en possédons plus de vingt échantillons qui tous s'accordent ensemble, et parmi eux, ceux qui sont incomplets se rapprochent tellement de l'Opis Hugardiana, que, malgré la confiance que nous inspirent en général les travaux de M. d'Orbigny, nous croyons qu'il a fait dessiner les figures 7 et 8 de la planche 255, en réunissant des valves isolées ou incomplètes, ou en se servant d'individus deformés. En rapprochant les crochets dans ces figures, on a une excellente représentation de l'O. Hugardiana. La fig. 6 a été dessinée sur un individu dont le bord palléal était incomplet (ce qui arrive très-fréquemment).

Quant à l'O. Sabaudiana, les formes du moule ne s'accordent en aucune manière avec notre espèce.

Localités. Cette Opis est assez commune dans les grès verts du Saxonet, du Reposoir et des Fis; les valves sont le plus souvent isolées, et les échantillons complets sont rares. Le Musée de Berne en possède une valve provenant de la perte du Rhône.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 52, fig, 1 a, Opis Hugardiana, de grandeur naturelle. — Fig. 1 b, la même vue par sa face buccale. — Fig. 1 c, moule de la même espèce vu de côté. — Fig. 1 d, le même vu par sa face buccale. — Fig. 1 e, le même vu par sa face anale.

## 189. Opis Sabaudiana d'Orbigny.

Pal. fr., 1843, Terr. crét., p. 254, fig. 1 -3, et pl. 257, fig. 4 - 6; et Prodr., 1850, t. 2, p. 136.

Cette Opis a été indiquée par M. d'Orbigny comme trouvée à Cluse; ne la connaissant pas par nous-mêmes, nous renvoyons à la Paléontologie française, pour sa description et ses figures. Nous possédons, il est vrai, quelques valves détachées qui rappellent en partie celles qui sont figurées pl. 254, fig. 1 — 5, mais leurs caractères ne nous paraissent pas suffisants pour établir avec, une espèce distincte de l'O. Hugardiana. Nous devons d'ailleurs faire remarquer que l'exemplaire figuré pl. 254, ne peut pas être le moule de celui des fig. 4 — 6 de la planche 257; le premier est plus épais que large, le second, par contre, est beaucoup plus large qu'épais.

### 190. Opis Lineata Pictet et Roux.

(Pl. 32, fig. 2 a, b.)

 $O.\ test \^a\ transvers \^a,\ transvers im lineat \^a,\ longitudinaliter\ tenuiter\ striat \^a\ ;\ umbonibus\ elonquiis.$ 

Coquille beaucoup plus large que longue, ornée en travers de lignes ou côtes déprimées, divergentes, et en long de stries fines plus rapprochées entre elles sur la région palléale que sur les crochets.

Le moule porte une dépression transverse prolongée sur toute l'étendue du bord buccal.

Le seul exemplaire que nous possédions, est trop incomplet pour nous permettre une description plus détaillée. Les ornements du test suffisent cependant pour caractériser cette espèce, qui est bien distincte des autres.

Localité. Le Saxonet; collection du Musée Académique.

Explication des figures. Pl. 52, fig. 2 a, Opis lineata, vue de côté. — Fig. 2  $b_y$  ja même vue par la face buccale.

### GENRE ASTARTE Sowerby.

## (Crassina Lamarck.)

CARACTÈRES. Coquille ovale ou oblongue, épaisse, à crochets médiocres. Charnière très-solide, munie sur la valve droite de deux fortes dents égales et divergentes, et sur la gauche de deux dents inégales. Ligament extérieur court.

Ce genre paraît se rencontrer dans la plupart des terrains, mais ses espèces ont été souvent confondues avec les Vénus, les Cythérées et les Cyprines.

### 191. ASTARTE BRUNNERI Pictet et Roux.

(Pl. 32, fig. 3, a, b, c.)

A. testà ovato-oblongà, subcompressà, inæquilaterà, costis concentricis, distantibus, rotundatis, ornatà; latere buccali brevi; latere anali elongato.

### DIMENSIONS.

Longueur	٠			80 millim.
Par rappo	ort à la le	ngueur	: Largeur	0,74
-	_		Epaisseur	0,45
			Longueur du côté anal	0,90
Angle api	cial			. 100°

Coquille ovale, oblongue, assez comprimée, très-inéquilatérale, à côté buccal très-court, large et arrondi, à côté anal long, également arrondi; elle est ornée de grosses côtes rondes, disposées concentriquement, qui augmentent de grosseur en s'éloignant des crochets. Ces côtes sont séparées par des intervalles inégaux, quelquefois plus grands qu'elles; quelques-unes sont comme bosselées et presque tuberculeuses. Les crochets sont obliques, médiocres, peu saillants.

Le moule est lisse avec les impressions musculaires et palléales très-marquées.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est très-clairement caractérisée par sa forme très-inéquilatérale et par ses grosses côtes.

LOCALITÉS. On la trouve à la perte du Rhône. Collections du Musée Académique, du Musée de Berne, de MM. Tollot, Roux, etc. Nous l'avons dédiée à M. le professeur Brunner, qui nous en a communiqué un très-bel échantillon appartenant au Musée de Berne.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 52, fig. 5 a, Astarte Brunneri, de grandeur naturélle. Fig. 5 b, c, moule de la même espèce.

## 192. ASTARTE GURGITIS Pictet et Roux.

(Pl. 33, fig. 1 a, b.)

A. testá ovato-trigoná, subcompressá, inæquilaterá, costis confertis concentricè ornatá; lateribus rotundatis, buccali brevi.

### DIMENSIONS.

Longueur				5 millim.
			Largeur	
_	-	**************************************	Epaisseur	· 0,48
minrous		_	Longueur du côté anal	0, 90
Angle apic	ial			

Coquille arrondie, triangulaire, presque aussi large que longue, peu rentlée, très-inéquilatérale, à côté buccal très-court, arrondi, ainsi que l'anal. Elle est ornée de côtes serrées, concentriques, arrondies, presque sans intervalles. La lunule est très-excavée.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère de l'A. Brunneri, par sa forme plus triangulaire et moins allongée, d'où il résulte que le bord cardinal dans la région qui porte le ligament (corselet), est très-oblique par rapport à la ligne de longueur de l'animal, tandis que dans l'A. Brunneri, il lui est presque parallele; elle en diffère aussi par ses côtes beaucoup plus nombreuses, plus serrées, plus egales, et séparées par des intervalles presque nuls.

Localités. Elle se trouve avec la précédente. Collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 54, fig. 1 a, b, Astarte gurgitis, de grandeur naturelle.

## 193. ASTARTE DUPINIANA d'Orbigny.

(Pl. 32, fig. 5 a, b, c, d.)

A. testá crassâ, rotundato-quadratá, compressiusculá, inæquilaterá, striis concentricis ornatá; latere anali lato; latere buccali brevi; labro crenulato.

Astarte Dupiniana, d'Orb., 1843, Pal. fr., Terr. crét., t. 3, p. 70, pl. 264, fig. 4 — 6.

Ead. d'Orb., Prodr., t. 2, p. 136.

### DIMENSIONS.

Longueur	26 millim.
Par rapport à la longueur : Largeur	0, 100
— — Epaisseur	0,65
Angle apicial	120°

Coquille épaisse aussi longue que large, un peu carrée, peu comprimée, ornée de stries concentriques peu marquées et de lignes d'accroissement plus visibles; elle est inéquilatérale, courte du côté buccal, allongée et obtuse du côté anal.

Moule lisse, sauf les crénelures du labre ; impressions musculaires bien visibles; le côté buccal en porte deux sur chaque valve.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. M. d'Orbigny compare cette espèce à l'Ast. numismalis du terrain néocomien; nous la comparerions plutôt à l'A. substriata du même terrain; elle diffère de toutes deux par sa forme proportionnellement plus renflée, et par la similitude de ses deux diamètres longitudinal et transversal.

Observations. Nos echantillons sont bien plus grands que celui qui a été figuré dans la Paléontologie française; c'est peut-être à cette différence de taille qu'il faut rapporter l'écart qui existe entre les dimensions données par M. d'Orbigny et celles que nous avons trouvées, qui, du reste, coîncident bien avec celles de sa figure.

LOCALITÉ. Cette espèce n'est point rare à la perte du Rhône; on trouve le test presque aussi souvent que le moule.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 52, fig. 5 a, b, Astarte Dupiniana, de grandeur naturelle. — Fig. 5 c, d, moule de la même espèce.

TOME XIII, I're PARTIE.

### 194. ASTARTE SABAUDIANA Pictet et Roux.

(Pl. 32, fig. 4 a, b,)

A. testá ovato-oblongâ, compressâ, inæquilaterâ; latere buccali brevi, rotundato; latere anali elongato, obtusè truncato; labro simplici.

#### DIMENSIONS.

#### (Moules.)

Longueur.				27 millim.
Par rappor	tà la	longueur	: Largeur	0, 86
	_		Epaisseur	0, 52
_			Longueur du côté anal	0, 65
Angle apic	ial			1170

Espèce ovale, oblongue, plus longue que large, inéquilatérale, comprimée, paraissant, autant que nous pouvons en juger sur le moule, avoir été ornée de stries concentriques; côté buccal court et arrondi; côté anal plus long, offrant un méplat bordé d'une légère carène. Impressions musculaires peu visibles sur l'échantillon que nous avons figuré, sauf la petite impression buccale.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère clairement de la précédente par sa forme oblongue et plus comprimée, ainsi que par son labre simple.

Localité. Le Saxonet; espèce rare. Collection du Musée Académique.

Explication des figures. Pl. 52, fig. 4 a, b, moule de l'Astarte Sabaudiana, de grandeur naturelle.

### GENRE CRASSATELLA Lamarck.

Caractères. Coquille épaisse. Charnière très-solide, pourvue sur la valve droite de deux dents divergentes, et sur la gauche d'une seule. Ligament interne. Impressions musculaires profondément excavées.

Ce genre, souvent remarquable par sa coquille très-épaisse, se distingue facilement du précédent par son ligament interne. Il a paru avec les terrains crétacés. On n'en connaissait aucune espèce des terrains albiens, nous en avons trouvé trois.

### 195. Crassatella Saxoneti Pictet et Roux.

(Pl 33, fig 2 a, b.)

C. testà oblongo-subquadratà, compressà, inæquilaterà; latere buccali brevi; latere anali elongato, obliquè truncato; labro crenulato.

#### DIMENSIONS.

#### (Moule.)

Longueur		19 millim.
Par rapport à longueur :	Largeur	0, 65
<del>-</del>	Epaisseur	0, 35
	Longueur du côté anal	0,68
Angle apicial		128°

Nous ne connaissons que le moule.

Espèce plus longue que large, oblongue, un peu carrée, comprimée, lisse, inéquilatérale; le côté buccal est court, tronqué, un peu plus large que le côté anal, qui est plus long et tronqué obliquement; le côté palléal est presque droit; le labre est crénelé. Impressions musculaires fortement marquées. On voit sur le dos des valves une dépression dont le bord supérieur est relevé sous forme de côte, se dirigeant obliquement en haut depuis les crochets et se terminant à la ligne palléale.

Rapports et différences. Ce moule nous paraît très-voisin de celui de la Crassatella Galliennei d'Orbigny, du terrain turonien; mais cette dernière espèce est beaucoup moins épaisse du côté anal.

Localité. Le seul exemplaire que nous ayons pu étudier, a été trouvé au Saxonet, et appartient à la collection du Musée Académique.

Explication des figures. Pl. 35, fig. 2 a, b moule de la Crassatella Saxoneti, grossi.

### 196. Crassatella Sabaudiana Pictet et Roux.

(Pl. 33. fig. 3 a, b, c.)

G. testâ crassâ, subtriangulari, compressâ, longitudinaliter sulcatâ; latere buccali triangulato, brevi, impresso; latere anali dilatato, producto, impresso; umbonibus approximatis, elongatis; labro crenulato.

#### DIMENSIONS.

( Moules. )

Longueur		. * *	28 millim.
Par rapport à la longueur	Largeur		0, 100
	Epaisseur	***** **** ***	0, 68
Angle apicial			108°

Coquille à test épais, de forme triangulaire, aussi large que longue, peu épaisse, ornée en long sur sa région médiane de rides régulièrement espacées; bord buccal offrant une face triangulaire marquée d'une impression transverse; bord anal dilaté, ayant une impression semblable à celle du bord buccal. Crochets grands et rapprochés.

Le moule ne reproduit pas les rides de la région médiane de la coquille. Empreintes musculaires grandes et bien marquées; empreinte palléale très-distincte. Labre crénelé.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par sa forme carrée et par sa longueur qui ne dépasse pas sa largeur. Le moule prouve que le test aété très-épais.

Localités. Nos exemplaires ont été rapportés du Saxonet et de Tanneverges; ils appartiennent au Musée Académique et à M. le prof. Favre.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 53, fig. 5 a, b, c, moule de la Crassatella Sabaudiana, de grandeur naturelle. — Fig. 5 c, la même vue par sa face buccale.

### 197. Crassatella Fisiana Pictet et Roux.

(Pl. 33, fig. 4, a, b, c.)

C. testà inflatà, rotundato-trigonà, subæquilaterà; lateribus rotundatis; labro crenulato.

#### DIMENSIONS.

Longueur			8 millini.
Par rapport à la le	ngueur	: Largeur	0, 98
		Epaisseur	0, 75
		Longueur du côté anal	0, 65
Angle apicial			00

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce à peu près aussi longue que large, renflée, à bords arrondis, un peu inéquilatérale, le côté buccal étant le plus court. Crochets grands, rapprochés, recourbés. Impression musculaire buccale bien marquée et accompagnée d'une dépression que borde en dehors un sillon arrondi partant du sommet des crochets. Impression musculaire buccale bordée aussi par un sillon qui devient profond en approchant de l'extrémité. Labre crénelé.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. La duplicité de l'impression musculaire buccale et les traces de l'impression palléale placent évidemment cette espèce dans la famille des Astartides. Les moules ne conservant pas de traces du ligament, il est impossible de savoir s'il était interne comme dans les Crassatelles, ou externe comme dans les Astartes. La grandeur des crochets, l'épaisseur probable du test, la profondeur des impressions musculaires, semblent prouver en faveur de l'analogie avec les premières. Cette espèce est du reste facile à distinguer par sa forme renflée et arrondie.

Localité. Elle a été trouvée à la montagne des Fis et paraît rare. Collection du Musée de Berne.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 55, fig. 4 a, b, moule de la Crassatella Fisiana, de grandeur double. — Fig. 4 c, le même vu par sa face buccale.

## GENRE CARDITA Bruguière.

## (Cardita et Venericardia Lamarck.)

Caractères. Coquille épaisse, souvent ornée de côtes rayonnantes. Charnière solide, formée de deux dents. Impressions musculaires bien marquées. Ces mollusques se trouvent fossiles dans la plupart des terrains, et vivent encore dans les mers actuelles. Ils ont été surtout abondants pendant la période tertiaire.

Nous n'avons trouvé que deux espèces de ce genre, dont une déjà connue.

## 198. CARDITA CONSTANTII d'Orbigny.

(Pl 33, fig. 5 a, b, c, d, e.)

C. testá oblongâ, inflatâ, costis numerosis, imbricatis, angustatis, radiantibus ornatâ; costis, concentricis decussatâ; inæquilaterâ; latere anali elongato, rotundato; latere buccali brevi, rotundato; lunulâ cordiformi; labro crenulato.

C. Constantii, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., Terr. crét., 3, p. 89, pl. 269, fig. 1 -- 5.
Ead. d'Orbigny, 1850, Prodr., t. 2, p. 137.

#### DIMENSIONS.

Longi	ueur				21	millim.
Par ra	apport	à la lon	gueur:	Largeur		0,80
	_		-	Epaisseur		0,70
				Longueur du côté anal, au plus		0,90
	_		_	Longueur de la lunule		0,18
Angle	e apici	al			990	

Coquille oblongue, rentlée, plus large que longue, ornée en travers de côtes rayonnantes, étroites, au nombre de cinquante environ, avec lesquelles se croisent des côtes concentriques lamelleuses. Cette coquille est inéquilatérale, le côté anal est très-long, arrondi à son extrémité et présente la même largeur que le côté buccal. Lunule cordiforme arrondie. Labre crénelé.

Moule lisse, sauf les crénelures du labre; impressions musculaires très-apparentes; impression palléale peu marquée.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est par ses ornements, très-voisine des C. tenuicosta et Dupiniana, du gault également; mais ses proportions sont différentes : elle est plus renflée que la C. tenuicosta et n'en a pas la lunule lancéolée

et étroite; elle est moins épaisse et plus longue que la *C. Dupiniana*. Les dimensions que nous avons données s'accordent mieux avec les figures de la même espèce de M. d'Orbigny qu'avec son texte.

LOCALITÉ. Elle est assez commune à la perte du Rhône; plusieurs exemplaires ont conservé leur test qui est très-épais.

Explication des figures. Pl. 33, fig. 5 a, b, Cardita Constantii, de grandeur naturelle.— Fig. 5 c, la même vue sur la face buccale.—Fig. 5 d, e, moule de la même espèce.

### 199. CARDITA ROTUNDATA Pictet et Roux.

(Pl. 33, fig. 6 a, b, c.)

C. testà ovato-transversà, subquadrilaterà, inflatissimà, costis numerosis, angustatis, radiantibus ornatà; costis concentricis decussatà; inæquilaterà, lateribus rotundatis; lunulà cordiformi.

#### DIMENSIONS.

Largeur		12 millim.
Par rapport à la largeur :	Longueur	0,95
	Epaisseur	0,93
	Longueur du côté anal	0, 85
Angle anicial		900

Coquille un peu plus large que longue, ovale, subquadrilatère, presque globuleuse, très-renflée, ornée de côtes nombreuses, rayonnantes, étroites, et de côtes concentriques qui donnent aux précédentes un aspect imbriqué aux points de croisement. Elle est inéquilatérale, le côté anal est beaucoup plus long que le côté buccal. Lunule cordiforme plus longue que large. Labre crènelé.

Moule lisse, sauf les crénelures du labre; impressions anale et buccale bien marquées; une impression transverse de chaque côté des valves; impression palléale peu distincte; crochets peu saillants.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, voisine par ses ornements des autres Cardita du gault, en diffère tout-à-fait par sa forme; elle se distingue en particulier de la *C. tenuicosta*, par sa plus grande épaisseur et de la *G. Dupiniana*, par ses côtes plus minces et plus nombreuses. Son moule a quelque ressemblance

avec celui du Cardium alpinum; mais tandis que le labre de ce dernier est régulièrement arrondi, celui de la Cardita a des contours anguleux.

Localité. La perte du Rôhne, où elle se rencontre fréquemment; elle y a conservé son test plus rarement que l'espèce précédente.

Explication des figures. Pl. 55, fig. 6 a, Cardita rotundata, de grandeur double. — Fig. 6, b, c, moule de la même espèce, au même grossissement.

### GENBE CYPRINA Lamarck.

Caractères. Coquille cordiforme, moins inéquilatérale que dans le genre précédent, ornée seulement de stries concentriques. Charnière formée de trois dents cardinales divergentes et d'une dent latérale anale. Impression musculaire anale virgulaire, la buccale réniforme.

Les Cyprines se trouvent dans les terrains crétacés et tertiaires, ainsi que dans les mers actuelles. Nous en avons recueilli trois espèces, dont une est nouvelle.

## 200. Cyprina ervyensis Leymerie.

(Pl. 34. fig. 1, a, b.)

C. testà oblongà, subcompressà, imequilaterà, substriatà; latere buccali brevi; latere anali elongato, dilatato, truncato; natibus brevibus; lunulà nullà.

Cyptina ervyensis, Leymerie, 1842, Mém. de la Soc. Géol., t. v, p. 5, pl. 4, fig. 6. C. ervyensis, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., Ter. crét, t. 3, p. 102, pl. 274.

Ead. id. 1850, Prod., t. 2, p. 137.

### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longueur				87 millim.
Par rappo	rt à la	longueur	: Largeur	0,82
			Epaisseur	0,63
_		_	Longueur du côté anal	0,70
Angle api	cial		.,,,,	105°

Coquille oblongue, peu renflée, plus longue que large, inéquilatérale, à côté buccal court, à côté anal allongé et coupé un peu carrément à son extrémité, à crochets peu saillants; elle est ornée de stries ou lignes concentriques d'accroissement. Pas de lunule.

Moule lisse, montrant, principalement près du labre, des empreintes faibles de côtes rayonnantes internes. Impression musculaire buccale saillante et séparée du reste de la valve par une dépression transverse bien marquée; impression anale ordinairement peu visible; méplat bien prononcé sur tout le côté anal; impression palléale bien marquée.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par le méplat prononcé de son côté anal.

LOCALITÉS. Elle se trouve à l'état de moule, soit au Saxonet, soit à la perte du Rhône; elle n'est pas rare dans la dernière de ces localités. Un de nos échantillons atteint 115 millimètres de longueur.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 54, fig. 1 a, b, moule de la Cyprina ervyensis, de grandeur naturelle.

### 201. CYPRINA RHODANI Pictet et Roux.

(Pl. 34, fig. 2 a, b.)

C. testà oblongà, subcompressà, inæquilaterà; latere anali brevissimo, dilatato; latere buccali elongatissimo, angustato, obliquè truncato.

#### DIMENSIONS.

### ( Moules. )

Longueur		64 millim.
Par rapport à la longueur :	Largeur	0,70
	Epaisseur	
	Longueur du côté anal	0,85
Angle apicial		96°

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce oblongue, un peu comprimée, plus longue que large, inéquilatérale, à côté anal court et élargi, à côté buccal très-allongé et rétréci, à crochets peu contournés, mais très-obliques du côté buccal. Moule lisse ; impression musculaire buccale transverse et très-saillante ; impression anale allongée et moins mar-

TOME XIII, 1re PARTIE.

quée ; un méplat sur l'extrémité de ce même côté ; impression palléale bien conservée.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue facilement de la précédente par sa forme plus allongée et surtout par la longueur de son côté anal.

Localité. M. Roux l'a découverte à la perte du Rhône; le Musée Académique en posséde un échantillon de la même localité.

Explication des figures. Pl. 34, fig.  $2\,a,\,b,$  moule de la Cyprina Rhodani, de grandeur naturelle.

## 202. CYPRINA REGULARIS d'Orbigny.

(Pl. 34, fig. 3 a, b.)

C. testá subrotundatá, inflatá, hevigata, subæquilaterá; latere anali dilatato, rotundato; latere buccali angustato, brevi; natibus rotundatis; lunulá sulcatá.

Cyprina regularis, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., terr. crét.t. 3, p. 100, pl. 272, fig. 3 — 6.
Ead. Id. Prod., 1850, t. 2, p. 137.

### DIMENSIONS.

#### (Moules.)

Longueur				30 millim.
Par rappor	rt à la	longueur	: Largeur	0,90
_	. —		Epaisseur	0,70
_	_	_	Longueur du côté anal	0,75
Angle api	rial			1000

Nous ne possédons que des moules.

Espèce arrondie, presque aussi large que longue, renflée, pas très inéquilatérale. Le côté anal est arrondi et dilaté; le côté buccal est plus court et plus étroit. Crochets gros et rapprochés.

Moule lisse. Impression musculaire buccale entourée d'une dépression, que circonscrit une légère côte partant des crochets. Impression anale peu visible.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue facilement des précédentes par le moindre développement de sa région anale.

Localités. Elle se trouve dans les grès verts de la Savoie, au Saxonet, au Reposoir, etc. Elle a été déjà indiquée comme trouvée à Cluse par M. d'Orbigny, Nous en possédons aussi quelques échantillons de la perte du Rhône. Collections du Musée Académique, du Musée de Berne, etc.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 54, fig. 5 a, b, moule de la Cyprina regularis, de grandeur naturelle.

Nous possédons encore quelques moules du Saxonet qui nous paraissent se rapporter à la *C. cordiformis*, d'Orbigny. Leur mauvais état de conservation ne nous pêrmet pas de les décrire et de les figurer.

## 4me Famille: LUCINIDES.

Caractères. Coquille équivalve, entièrement fermée, ronde ou ovale. Charnière peu développée, munie de dents cardinales médiocres ou petites, et de deux dents latérales qui manquent quelquesois.

Les coquilles de cette famille ont les dents latérales des Cardites, mais s'en distinguent par leur forme moins renflée, par leurs crochets moins saillants et par leurs dents cardinales plus petites.

GENRE CORBIS Lamarck.

( Idotea Schumacher. )

Caractères. Coquille ovale ou arrondie, à charnière composée d'une ou de deux dents cardinales et de deux dents latérales plus ou moins compliquées, dont les buccales sont plus rapprochées du sommet. Impressions musculaires assez prononcées, non allongées, l'anale simple, la buccale composée d'une partie principale et d'une petite accessoire du côté de la charnière.

Ces coquilles se distinguent facilement des Lucines par la forme de leurs impressions musculaires. Elles datent du lias et ont été peu nombreuses à toutes les époques géologiques.

## 203. Corbis Gaultina Pictet et Roux.

(Pl. 34, fig 4 a, b.)

C. testà ovato-rotundatà, subinflatà, subæquilaterà, concentricè rugoso lineatà.

#### DIMENSIONS.

Longueur				38 millim.
Par rappo	rt à la	longueur	: Largeur	0,92
_	_		Epaisseur	0,66
_	£720		Longueur du côté anal,	0,53
Angle api	cial		<	123°

Coquille ovale, presque ronde, un peu plus longue que large, à peu près équilatérale, médiocrement rensiée, ornée de lignes rugueuses concentriques et rapprochées. Côte anal un peu plus long que le côté buccal, et moins arrondi. Crochets rapprochés. Le labre ne paraît pas avoir été crénelé.

Moule lisse, orné de sillons concentriques ; impressions musculaires peu apparentes.

Localités. Le Saxonet. Collections du Musée de Berne et du Musée Académique de Genève. M. Tollot l'a trouvée à Samoëns.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 54, fig. 4 a, b, moule de la Corbis gaultina, de grandeur naturelle.

# GENRE LUCINA Bruguière.

Caractères. Coquille ronde ou ovale, à crochets petits et obliques. Charnière faible et variable. Impression musculai-

re buccale très-allongée et non divisée; impression palléale se continuant en dehors d'elle. Intérieur des valves souvent ponctué ou strié. Ligament en partie externe et en partie caché.

Les Lucines sont clairement caractérisées par l'allongement de leur impression musculaire buccale. Elles sont très-abondantes dans les mers actuelles.

## 204. Lucina gurgitis Pictet et Roux.

(Pl. 34, fig. 5 a, b.)

L. testâ ovato-rotundatâ, maximè compressâ, subæqualiterâ; lateribus rotundatis; nucleo lævigato.

### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longueur	12 millim.
Par rapport à longueur : Largeur	0, 90
— — Epaisseur	0,40
— — Longueur du côté anal	0,43
Angle apicial	126°

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce arrondie, un peu plus longue que large, très-comprimée, presque équilatérale, le côté anal un peu plus court que le côté buccal; tous deux ont leurs bords arrondis. Crochets peu saillants, presque médians.

Moule lisse; impression buccale allongée, caractéristique du genre; impression palléale et anale également bien marquées; empreinte d'une forte dent latérale en arrière de l'impression buccale.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue de toutes les Lucines du gault par sa forme plus arrondie et par ses crochets plus médians.

LOCALITÉ. La perte du Rhône, où elle est rare. Collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 54, fig. 5 a. b, moule de la L. gurgitis, grossie deux fois.

## 5me Famille: TRIGONIDES.

Caractères. Coquille épaisse, équivalve, inéquilatérale. Charnière très-forte, composée de dents cardinales oblongues, divergentes, striées. Impressions musculaires doubles de chaque côté; il y en a de plus une sous les crochets.

Cette famille à peu près éteinte aujourd'hui, renferme des coquilles remarquables par leur forme et par leurs ornements. Elles ont surtout été abondantes pendant l'époque secondaire.

## GENRE TRIGONIA Bruguière.

Caractères. Charnière composée de dents, dont deux sur la valve gauche sont sillonnées des deux côtés, et quatre sur la valve droite le sont d'un seul côté.

Ce genre se distingue des *Myophoria* de Bronn, par les stries des dents. Les Trigonies sont en outre ordinairement plus ornées du côté extérieur.

# 205. Trigonia aliformis Parkinson.

(Pl. 35, fig. 1 a b., et 2 a, b, c.)

T. testà elongatà, triangulari, costis flexuosis, crenulatis, transversim ornatà; latere buccali brevi, rotundato; latere anali elongato, lævigato, canaliculato; areà anali angustatà, costis crenulatis regulariter striatà.

T. aliformis, Parkinson, 1811, Organ. remains, t. 111, p. 176, pl. 12, fig. 9.

Ead. Sowerby, 1818, Min. conch. pl. 215.

Ead. Defrance, 1828, Dict. des Sc. nat, tom. 55 p. 297.

Ead. Desh., 1831, Coq. caract. p. 33, pl. 10, fig. 6, 7.

Lyriodon aliformis, Goldf., 1839, Petref. Germ. t. 2, p. 203, pl. 137, fig. 6.

Trigonia aliformis, Agassiz, 1840, Trigonies, p. 31, pl. 7, fig. 14-16, pl 8, fig. 12.

Trigonia aliformis, d'Orbigny, 1843, Pal. fr. Terr. Cret. t. 3, p. 143, pl. 291, fig. 1-3.

Trigonia alæformis, Reuss, 1845, Verst. Bæhm. Kreid. H, p. 5.

Fail. Cripita 1846, Crupiliis, pl. 18, fig. 15 (crupica d'appèr Caldidae)

Ead. Geinitz, 1846, Grundriss, pl. 18, fig. 15 (copiée d'après Goldfuss)
Ead. 1850, Prodr. t. 2, p. 137.

Nons pensons que l'on doit exclure de cette synonimie les citations suivantes que l'on trouve dans quelques auteurs.

Lyriodon alæformis, Bronn, Lethaea p. 700, pl. 32, fig. 15. La figure ne peut pas se rapporter à cette espèce.

Trigonia aliformis, de Buch, 1839, Petrif. recueillies en Amérique, pl. 1, fig. 10. Elle nous parait offrir des caractères tout à fait différents de ceux de l'aliformis.

#### DIMENSIONS

Longueur	80 mill.
Par rapport à la longueur : Largeur	0,65 à 0,80
— — Epaisseur	0,45 à 0,65
— — Longueur du côté anal	0,75
Angle apicial	80°

Coquille triangulaire, beaucoup plus longue que large, renîlée dans l'âge adulté, ornée en travers de côtes obliques, saillantes, crénelées, flexueuses, largement séparées par des sillons réguliers. Côté buccal court, arrondi; côté anal très-long, prolongé dans le jeune âge en un rostre obtus. Area anale ou corselet, excavé dans l'âge adulte, orné intérieurement de petites côtes transverses, rapprochées, droites et crenelées, à peu près perpendiculaires à la suture. Ce corselet est séparé de la région palléale par un rebord élevé, lisse, étroit, divisé par un sillon longitudinal.

Moule intérieur offrant quelquefois des traces des côtes dans toute leur longueur, et toujours les crénelures du bord qui correspondent à leur terminaison. Impressions buccales indistinctes.

Observation. Cette espèce varie avec l'âge d'une manière assez remarquable. Elle est d'abord peu épaisse et a un rostre assez prolongé (fig. 2); puis la largeur et l'épaisseur augmentent à proportion de la longueur, en sorte que dans l'âge adulte elle se rapproche beaucoup plus de la forme des Trigonia scabra, crenu-

lata, etc. Les côtes du corselet ne sont dans l'origine que des stries nombreuses et un peu obliques; puis elles s'éloignent, deviennent perpendiculaires à la suture, prennent des crénelures, et se reduisent à peu près au nombre des côtes principales. En même temps, le corselet se creuse et rend ainsi plus saillant l'espace lisse qui le sépare des flancs. Ce dernier forme alors un bourrelet très-prononcé.

Au reste, nos échantillons manquent tous de la dernière partie de l'extrémité anale, de sorte qu'ils laissent des doutes sur la forme de cette région aux divers âges. Mais ils sont suffisants pour montrer clairement les variations des côtes du corselet, ainsi que celles de la largeur et de l'épaisseur de la coquille.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. La *T. aliformis* se distingue facilement de ses congénères du gault, par la région lisse marquée d'un sillon longitudinal, qui sépare l'area de la region palléale et par les côtes régulières de son corselet.

LOCALITÉS. Elle n'est pas rare à la perte du Rhône; on la trouve aussi au Criou, au Saxonet et au Reposoir.

Explication des figures. Pl. 55, fig. 1 a, b T. aliformis adulte de la perte du Rhône, échantillon appartenant à M. Tollot; — fig. 2 a, b, la même jeune; — fig. 2 c, moule de la même espèce.

# 206 TRIGONIA CONSTANTII d'Orbigny.

(Pl. 35, fig. 3 a, b, c.)

T. testà oblongo-quadratà, inæquilaterà, costis transversis, acutis, crenulatis ornatà; latere buccali brevi, convexo; latere anali lato, obtusè truncato; areà anali transversim costulatà, anticè lævigatà.

T. Constantii, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., ter. crét. t. 3, p. 144, pl. 291, fig. 4 à 6.
 Ead. Id. Prod., 1850, t. 2, p. 137.

### DIMENSIONS.

Longueu	r		41 n	aillim.
Par rapp	ort à la l	ongueur	: Largeur	0,80
		_	Epaisseur	0,50
	_		Longueur du côté anal	0,83
Angle ap	icial			

Coquille oblongue, un peu carrée, plus longue que large, ornée de côtes transverses, peu arquées, aigues et légèrement crénelées. Côté buccal court, ar-

rondi; côté anal très-long, coupé presque carrément. Aréa anale pourvue vers les crochets de côtes transverses qui se changent sur la région anale en stries de plus en plus obliques.

Moule lisse, crénelé sur ses bords.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue facilement des autres, par sa forme carrée, ainsi que par sa région anale dépourvue d'ornements. Son moule est beaucoup moins arqué du côté anal que celui de la T. aliformis; il porte l'impression musculaire anale plus rapprochée du crochet, et ne présente pas de rostre.

Localités. Elle se trouve également à la perte du Rhône et au Saxonet; nous n'en connaissons qu'un petit nombre d'exemplaires.

Explication des figures. Pl. 55, fig. 5 a, b, Trigonia Constantii, de grandeur naturelle, — fig. 5 c, moule de la même espèce.

# 207. TRIGONIA ARCHIACIANA d'Orbigny.

(Pl. 35, fig. 4.)

T. testà oblongà, costis transversis, obtusè angulatis, obliquè striatis, ornatá; latere buccali brevi, rotundato; latere anali elongato, truncato; areà anali costis arcuatis, striatis, transversim ornatà.

Trig. Archiaciana, d'Orbigny, 1843. Pal. fr. Terr. crét., tome 3, p. 142, pl. 290 fig. 6-10.

Ead.

Id. Prod., 1850, t. 2, p. 137.

### DIMENSIONS.

Longueu	r,		····· 33 r	nillim.
Par rapp	ort à la l	ongueur	: Largeur	0,80
-			Epaisseur	0, 50
	_		Longueur du côté anal	0,80
Angle ap	icial		900	

Coquille oblongue, ornée de côtes obtuses, transverses, peu arquées, marquées en travers de stries obliques, régulièrement espacées. Côté buccal court, arrondi; côté anal plus allongé, obtus, anguleux. Aréa anale séparée de la ré-

TOME XIII, 1re PARTIE.

gion palléale par une ligne étroite, un peu saillante; elle est ornée de côtes obliques très-arquées, striées en travers, et en nombre plus grand que celui des côtes palléales.

La surface interne de la coquille est entièrement lisse.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par sa forme comprimée et par les stries obliques qui ornent ses côtes.

LOCALITÉS. Elle a été recueillie à la perte du Rhône par M. le professeur Favre et par M. Tollot. Le Musée de Berne la possède du Reposoir.

Explication des Figures. Pl. 55, fig. 4, Trigonia Archiaciana, de grandeur naturelle.

# 208. TRIGONIA NODOSA Sowerby.

(Pl. 35, fig. 5.)

T. testà subtrigonà, elongatà, crassà, tuberculis crassis per series arcuatas et transversas ornatà; latere buccali brevi, lato, rotundato; latere anali elongato, obtusè truncato; areà anali....

Trigonia nodosa, Sow. Min. Conc. 1826, pl. 507, fig. 1.

#### DIMENSIONS.

Lon	gueur .				99 millin	n.
Par	rappor	t à la l	ongueur	: Largeur	0, 7	1
		_	_	Epaisseur		5
		_	grates <sub>an</sub> .	Longueur du côté anal	0,9	3
1ng	le apici	al.,			. 115°	

Coquille subtrigone, médiocrement renflée, plus longue que large, inéquilatérale, à côté buccal très-court, élargi et arrondi, à côté anal très-long. Elle est ornée en travers de douze à quinze séries de tubercules assez rapprochés entre eux et devenant d'autant plus petits qu'ils approchent du côté palléal, où ils se terminent en lignes rugueuses. L'aréa anale qui est incomplétement conservée sur notre échantillon, paraît continuer la même courbure que les flancs.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. L'espèce dont elle est la plus voisine est la T. Herzogii des grès verts du cap de Bonne-Espérance, Goldf., pl. 157, fig 5. Elle

a aussi des rapports de forme avec la T. Robinaldina d'Orbigny, du néocomien inférieur, et des rapports d'ornements avec les T. dœdalca et rudis de Parkinson; mais elle est bien distincte de toutes les trois.

M. d'Orbigny rapporte la planche de Sowerby que nous avons citée à la T. rudis, du néocomien, mais elle nous paraît bien plutôt retracer les caractères de l'espèce que nous décrivons ici, qui ne peut pas se confondre avec la T. rudis. Elle en diffère en effet, par la forme plus allongée de son côté anal, par l'absence de dépression sur l'aréa anale, par le manque de séparation entre cette aréa et les flancs, et par ses tubercules plus séparés. Dans la T. rudis l'aréa anale occupe près de lamoitié de la coquille etforme un méplat très-caracteristique. M. Agassiz (Trigonies, p. 27.) avait déjà fait ressortir les différences qui existent entre la T. nodosa Sow. et celle à laquelle il a donné le nom de T. cinçta qui n'est autre que la T. rudis.

Localité. Elle a été trouvée à la perte du Rhône. Collection du Musée Académique.

Explication des figures. Pl. 55, fig. 5, Trigonia nodosa, de grandeur naturelle.

# 6me Famille: ARCACIDES.

Caractères. Charnière composée de dents nombreuses disposées sur une ligne droite, arquée ou courbée. Deux impressions musculaires, ordinairement simples et arrondies.

Cette famille est une des plus naturelles; la disposition des dents de la charnière distingue facilement les coquilles qui la composent de celles de tous les autres Acéphales marins.

## GENRE ARCA Linné.

# (Arca, Cucullæa et Byssoarca auct.)

Caractères. Dents de la charnière disposées en ligne droite. Ligament externe. Coquille allongée, ovale, inéquilatérale, souvent anguleuse; crochets écartés, non enroulés.

Nous réunissons aux Arca les Cucullées de Lamarck que ce savant naturaliste caractérisait par une lame saillante à l'intérieur des valves et par les dents de la charnière disposées à l'extrémité dans le sens longitudinal. Ces deux caractères ne sont point en effet constamment associés et présentent d'ailleurs de nombreuses formes intermédiaires.

Les Arches sont un genre très-ancien et ont été trouvées dans presque tous les terrains.

## 209. Arca gurgitis. Pictet et Roux.

(Pl. 36, fig. 2 a, b.)

A. testá elongatá, transversim striatá, longitudinaliter rugoso-lineatá, inæquilaterá; latere buccali brevissimo, angulato; latere anali elongatissimo, obtusè truncato; area ligamenti latá; umbonibus distantibus; labro lævigato.

### DIMENSIONS.

### ( Moules.)

Longueur,				42 millim.
Par rapport	à la lo	ngueur	: Largeur	0,40
_	_	_	Epaisseur	0,33
-	_		Longueur du côté anal	0,80
alminer			Longueur de la facette ligamentaire	0,55

Coquille très-allongée, étroite, ornée en travers de côtes ou destries rayonnantes avec lesquelles se croisent des rides d'accroissement. Côté buccal très-court, an-

guleux en arrière sur le prolongement de la ligne ligamentaire; côté anal allongé, tronqué d'une manière obtuse, marqué d'un sillon longitudinal peu profond. Bord palléal sinueux; aréa anale pourvue dans le sens de sa longueur de plis marqués. Crochets écartés, peu saillants. Facette ligamentaire à peu près plane, assez large; labre lisse. Moule lisse.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce ressemble surtout à l'Arca pholadiformis, d'Orbigny, du grès vert supérieur du Mans; et rappelle comme elle la forme de l'Arca Noe; mais elle en diffère par son côté anal bien plus dilaté, par son côté buccal plus tronqué et par son bord palléal sinueux.

LOCALITÉ. La perte du Rhône; collection du Musée Académique. Espèce très-rare.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 56, fig. 2 a, b. moule de l'Arca gurgitis, de grandeur naturelle.

# 210. Arca Hugardiana d'Orbigny.

(Pl. 36, fig. 1 a, b, c, d.)

Arca testà oblongà, compressà, transversim striatà, longitudinaliter plicatà; latere buccali brevi, angustato; latere anali elongato, rotundato; areà ligamenti angustà.

A. Hugardiana, D'Orb. 1844. Pal. fr. Terr. crét. t. 3. p. 216, pl. 313, fig. 4 à 6. Ead. d'Orb. Prodr. 1850. t. 2, p. 138.

### DIMENSIONS

### (Moules.)

Longueur .				٠.,	 	 	. 19 millim.
Par rapport	a la lo	ngueur	Largeur		 	 	. 0,50
_	_		Epaisseur				
	_	<u> </u>	Longueur du côté anal		 	 	0,77

Coquille allongée, oblongue, comprimée, ornée de stries fines rayonnantes entrecroisées de lignes d'accroissement inégalement espacées entre elles. Côté buccal court, arrondi, retréci; côté anal long, un peu élargi, coupé un peu obliquement en arrière; bord palléal légèrement sinueux. Crochets peu saillants, rapprochès. Facette ligamentaire étroite.

Moule lisse, montrant quelques traces des lignes d'accroissement de la co-quille.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est la plus comprimée de toutes les arches du terrain albien.

LOCALITÉS. La perte du Rhône, le Saxonet et les Fis ; espèce très-rare. Collections de M. le prof. Favre, du Musée Académique de Genève et de celui de Berne.

Explication des figures. Pl. 56, fig. 1 a, b. Arca Hugardiana, de grandeur naturelle; — fig. 1 c, d. moule de la même espèce.

## 211. ARCA FAVRINA Pictet et Roux.

(Pl. 36, fig. 4 a, b.)

A. testà oblongà, subcompressà ; latere buccali brevissimo, rotundato ; latere anali elongato, rotundato ; umbonibus approximatis ; labro lævigato.

#### DIMENSIONS.

Longueur.				26 millim.
Par rappor	t à la	longueur	: Largeur	0,58
_			Epaisseur	0,55
_		_	Longueur du côté anal	0,77
_	_	_	Longueur de la facette ligamentaire	0,70

( Moules. )

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce allongée, oblongue, peu comprimée, à côté buccal court, retréci et arrondi; à côté anal long, également arrondi, sans aucune carène. Crochets, peu saillants, très-rapprochés, ne laissant entre eux qu'un espace très-étroit mais allongé pour la facette du ligament.

Moule lisse offrant des traces de côtes concentriques ou de lignes d'accroissement rapprochées; empreintes musculaires peu marquées; pas de sillon de côte interne.

RAPPORTS ET DIFFÉRÈNCES. Cette espèce se distingue clairement des précédentes, mais elle est très-voisine de forme de l'A. Galliennei d'Orb. du terrain turonien; la ressemblance est surtout très grande lorsqu'on les compare du côté des crochets; il est à regretter qu'aucun de nos échantillons n'ait conservé son test, pour nous

permettre d'apprécier exactement les rapports de ces deux espèces que des différences notables dans les dimensions ne nous permettent pas provisoirement d'assimiler. L'absence de toute carène sur le côté anal qui est très-régulièrement arrondi, la différencie de toutes les arches du terrain albien.

Localités. La perte du Rhône et le Reposoir; collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 36, fig, 4 a, b. moule de l'Arca Favrina, de grandeur naturelle.

## 212. Arga Campichiana Pictet et Roux...

(Pl. 36, fig 3 a, b.)

A. testà oblongà, angustà, subinflatà; latere buccali brevi, posticè angulato; latere anali elongato, obliquè truncato, externè subcarinato; areà ligamenti latà.

### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longu	ieur.				34 millini.
Par ra	ppor	t à la l	longueur	: Largeur	0,52
-		_	_	Epaisseur	0,50
	_	_		Longueur du côté anal	0,72
-	_		4	Longueur de la facette ligamentaire	0,75

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce oblongue, plutôt étroite, peu comprimée. Côté buccal court, aminci et anguleux en arrière sur le prolongement de la ligne ligamentaire; côté anal allongé, obliquement tronqué, légèrement caréné du côté externe. Crochets courts et écartés; aréa ligamentaire large. Moule lisse; empreintes musculaires très-marquées.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est assez voisine de l'A. carinata; elle en diffère par sa largeur moindre, par sa région buccale étroite, par ses impressions musculaires très-marquées et surtout par la conformation de sa région anale dont la carène externe est presque nulle, et dont la surface est presque régulièrement convexe. L'A. carinata présente tout au contraire une carène saillante et tranchante et une région anale fortement excavée.

LOCALITÉS. La perte de Rhône où elle est rare. Collections de M. Tollot et du

Musée Académique. Nous l'avons dédiée à M. le Dr Campiche qui nous en a communiqué plusieurs échantillons de Ste-Croix.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 56, fig. 5 a, b. moule de l'A. Campichiana, de grandeur naturelle.

## 213. Arga BIPARTITA Pictet et Roux.

(Pl. 36, fig. 5 a, b.)

A. testâ oblongâ, subquadratâ, inflatâ, lævigatâ; in latere buccali sulco transverso bipartitâ; latere buccali brevi, angustato; latere anali elongato, dilatato; natibus brevibus, distantibus; areâ ligamenti latâ.

#### DIMENSIONS.

Longueur				14	millim.
Par rappo	rtà la	longueur	: Largeur		0,61
_	_		Epaisseur		0,60
			Longueur du côté anal		0,60
	-		Longueur de la facette ligamentaire		0,80

Coquille oblongue, de forme un peu carrée, aussi épaisse que large, renflée, lisse à l'œil nu, ornée à la loupe de stries fines rayonnantes et de lignes concentriques obtuses; partagée en deux sur sa région buccale par un sillon transversal. Côté buccal le plus court, retréci, coupé un peu carrément; côté anal allongé, élargi, coupé de même presque carrément. Crochets courts et très-peu saillants. Facette ligamentaire très-large, sillonnée sur sa longueur.

Moule lisse, reproduisant le sillon transverse de la coquille, labre finement strié.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette jolie espèce est suffisamment caractérisée par le sillon dont elle est marquée.

Localité. Le Saxonet; espèce très-rare.

Explication des figures. Pl. 56. fig. 5 a, b. moule de l'Arca bipartita, de grandeur double.

## 214. ARCA SUBNANA Pictet et Roux.

(Pl. 36, fig. 6 a, b, c, d.)

A. testà ovatà, inflatà, concentricè radiatimque striatà; latere buccali brevi, rotundato, posticè angulato; latere anali elongato, obliquè truncato, externè subcarinato; areà ligamenti sulcatà non angustatà; umbonibus non approximatis; labro in junioribus crenulato; nucleo lævigato.

#### DIMENSIONS.

Lon	gueur.				17 millim
Par	rapport	àlal	ongueur:	Largeur	0,75
		-	_	Epaisseur	0; 68
	en e	_	_	Longueur du côté anal	0, 62
			_	Longueur de la facette du ligament	0.8

Coquille ovale, renflée, ornée de stries fines concentriques, croisées par des stries rayonnantes; côté buccal le plus court, arrondi, anguleux en arrière sur la ligne ligamentaire, côté anal plus long, plus large, coupé obliquement; sa partie extérieure est carénée, mais la carène n'est pas aussi vive que dans l'A. carinata. Crochets contournés, plutôt écartés. Facette ligamentaire sillonnée de côtes divergentes.

Moule lisse, sans fente costale ni empreintes musculaires, marqué seulement de sillons concentriques rapprochés; labre finement crénelé sur les jeunes individus.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est très-voisine de l'A. nana d'Orb.; elle en diffère cependant par la longueur de sa facette ligamentaire, par son coté anal caréné, par son labre crénelé dans le jeune âge, et par les sillons concentriques qui ornent son moule.

Localité. La perte du Rhône; espèce peu commune; collections de M. Roux et du Musée Académique.

Explication des figures. Pl. 36, fig. 6 a, b. Arca subnana, de grandeur double, — fig. 6 c, Moule de la même espèce au même grossissement.

TOME XIII, 1re PARTIE.

# 215. Arca carinata Sowerby.

(Pl. 37, fig. 1, a, b, c. d.)

A. testà oblongà, inflatà, radiatim costatà, transversim rugosà, costis lateralibus inæqualibus; latere buccali brevi, posticè angulato; latere anali elongato, obliquè truncato, multicostato, externè carinato; areà ligamenti sulcatà, latà.

Arca carinata, Sowerby, 1813. Min. Conch. pl. 44, fig. 23.

Cucullæa costellata, Sowerby, 1824. Min. Conch. pl. 447, fig. 3, 4.

Cucullæa striatella, Michelin, 1838. Mém. de la Société géol. de France. Tom. III, p. 102, pl. 12, fig. 11,

Arca carinata, d'Orbigny, 1844. Pal. fr. Terr. crét. Tome 3, p. 214, pl. 313, fig. 1 — 3.

Ead., d'Orb. 1850. Prod. tome 2, p. 138.

#### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longue	ur				34	millim.
Par rap	port à	la lo	ngueur :	: Largeur		0,57
	_	-	_	Epaisseur		0,55
_		-	_	Longueur du côté anal		0,78
		-		Longueur de la facette ligamentaire		0,75

Coquille allongée, renflée, à peu près également large sur toute sa longueur, ornée de côtes rayonnantes dont quelques-unes sont plus grosses et plus saillantes que les autres vers les deux extrémités, et surtout sur l'anale; des rides d'accroissement croisent ces côtes. Côté buccal le plus court, anguleux, saillant et prolongé sur la ligne ligamentaire; côté anal long, coupé très-obliquement à son extrêmité et fortement caréné en dehors. Crochets saillants. Facette ligamentaire assez large, ornée de côtes divergentes.

Moule lisse, sans impressions musculaires.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est facilement reconnaissable à sa carène très-oblique et très-saillante.

LOCALITÉS. Elle est assez commune à la perte du Rhône et au Saxonet; on la trouve aussi au Reposoir, à Samoens, etc.

Explication des figures. Pl. 57, fig. 1 a, b. A. carinata du Saxonet, de grandeur naturelle, — fig. 1 c, d. Moule de la même espèce, individu plus grand de la perte du Rhône.

# 216. ARCA COTTALDINA d'Orbigny.

Arca Cottaldina d'Orbigny, 1844. Pal. fr. Terr. crét. T. 3, p. 217, pl. 313, fig. 7—9. Ead. d'Orbigny, Prod. 1850. Tome 2, p. 138.

Nous rapportons à cette espèce quelques moules du Saxonet; mais ils ne sont pas assez bien conservés pour que nous soyons sûrs de notre détermination et que nous jugions utile de les figurer et de les décrire.

# 217. Arca fibrosa Sowerby.

(Pl. 37, fig. 2. a, b, c, d, e, f.)

A. testâ ovată, dilatată, longitudinaliter subplicată; în junioribus striis radiantibus ornată; latere buccali brevi, angustato; latere anali elongato, dilatato, obtuse truncato; areâ ligamenti angustă, excavată, sulcată; labro lævigato; nucleo postice sulcato.

Arca fibrosa, d'Orbigny, 1844, Pal. fr. Terr. crét. t. 3, p. 212, pl. 312. Cucullæa fibrosa, Sowerby, 1818, Min. Conc. pl. 207, fig. 2.

Arca glabra, Goldfuss, Petref. Germ. p. 149, n° 32, pl. 124, fig. 1.

Arca fibrosa, d'Orbigny, Prodr. 1850, t. 2, p. 138.

#### DIMENSIONS.

Longue	ur				70 millim.
Par rap	port à	la lon	gueur	Largeur	0,70
-	_	-	_	Epaisseur	0,85
		-		Longueur du côté anal	0,70
****	-	-	<del></del>	Longueur de la facette ligamentaire	0,70

Coquille ovale ou oblongue, un peu carrée, ornée de lignes d'accroissement d'autant plus marquées que l'individu est plus âgé, et de stries rayonnantes qu'on

n'observe que sur les jeunes exemplaires. Côté buccal court, arrondi; côté anal plus long, obliquement tronqué, surtout dans la jeunesse, et séparé de la région des flancs par une carène très-arrondie. Crochets plus rapproches chez les sujets jeunes que chez les vieux. Facette ligamentaire étroite, ornée de larges sillons divergents. Valve droite, visiblement plus grande que la gauche. Nous n'avons pas pu observer la charnière. Labre lisse.

Moule lisse, marqué sur le côté anal d'une fente arquée, profonde, formée par une côte interne de la coquille; impression musculaire buccale très-distincte.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Très-voisine de la Cuculheu decussata, Sowerby, l'A. fibrosa en diffère par son labre non denté.

OBSERVATIONS. Cette espèce varie de forme; le côté anal s'allonge avec l'âge et l'angle formé par l'extrémité de la carène qui sépare ce côté des flancs devient de plus en plus aigu. C'est ce caractère qui distingue le plus facilement l'A. fibrosa de l'espèce suivante.

LOCALITÉS. Elle se trouve à la perte du Rhône; nous en avons observé aussi quelques exemplaires rapportés du Saxonet, du Reposoir et de Bossetang.

Explication des figures. Pl. 57, fig. 2 a, b. A. fibrosa adulte, de grandeur naturelle. — fig. 2 c, d, moule de la même — fig. 2, e. f., moule d'un individu plus jeune.

# 218. ARGA OBESA Pictet et Roux.

(Pl. 38, fig. 1a, b, c, et fig. 2a, b, c, d.)

A. testâ ovatâ, înflatâ, longitudinaliter subplicatá; în junioribus striis radiantibus ornatâ; latere buccali brevi, angustato; latere anali truncato; areâ ligamenti angustâ; labro lævigato; nucleo posticè sulcato.

### DIMENSIONS.

## (A l'état normal.)

Longu	ieur .				46 millim.
Par ra	ppor	tà la lo	ngueur	Largeur	0, 80
_			_	Epaisseur	0,90
-	_		_	Longueur du côté anal	0,65
_			_	Longueur de la facette ligamentaire	0,70

## (Dans les individus déformés par l'âge.)

Par rapport à la longueur: Largeur 0, 10					00
		-	Epaisseur	0,1	18
_	_		Longueur du côté anal	0,	92
	_		Longueur de la facette ligamentaire	0,	72

Coquille ovale, carrée, très-renflée, ornée de lignes d'accroissement, et comme la précédente de stries rayonnantes qu'on n'observe que sur les individus jeunes. Côté buccal, court, arrondi; coté anal plus long mais beaucoup moins oblique que dans l'A. fibrosa, séparé de la région des flancs par une carène plus arrondie et moins marquée. Crochets rapprochés, Labre lisse.

Moule lisse, marqué sur la région anale d'une impression oblique plus courte et plus rapprochée de la charnière que dans l'A. fibrosa.

Observations. Cette espèce varie aussi avec l'âge mais en sens inverse de la précédente. Tandis que l'.1. fibrosa devient de plus en plus oblique et que son angle ano-palléal s'allonge, l'A. obesa tend au contraire à se raccourcir jusqu'à devenir plus épaisse que longue. Le côté buccal y est alors presque nul et le côté anal forme presque toute la coquille, mais en restant obtus et comme aplati.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. On pourra à tous les âges distinguer l'A. obesa de l'A. fibrosa par son angle ano-palléal moins aigu et par la côte interne qui laisse son impression sur le côté anal du moule ; cette côte est au milieu de la face anale dans l'A. fibrosa, tandis qu'elle est beaucoup plus rapprochée de la charnière dans l'A. obesa. A l'âge adulte, les différences sont beaucoup plus évidentes.

Localités. Elle est très-commune à la perte du Rhône et se trouve aussi au Saxonet et au Reposoir.

Explication des figures. Pl. 59, fig. 4 a, b, moule de l'Arca obesa très-adulte et déformée par l'àge, — fig. 2 a, la même espèce dans son état normal, — fig. 2 b, c, d. moule de l'espèce normale,

### GENRE ISOARCA Münster.

Caractères. Dents de la charnière disposées comme dans les Arca. Ligament extérieur. Crochets grands, saillants, enroulés.

Ce genre a été établi par le comte de Munster pour des Arca, qui par leurs grands crochets, rappellent la forme des Isocardes.

## 219. Isoarca Agassizii Pictet et Roux.

(Pl. 38, fig., 3, a, b, c, d.)

I. testâ inflatissimâ, striis radiantibus concentricisque decussatim ornatâ; latere buccali brevi, rotundato; latere anali elongato, dilatato, obtusè truncato; umbonibus involutis, contortis, crassis; areâ ligamenti excavatâ; nucleo non sulcato.

Ceromya crassicomis, Agassiz, 1842. Etudes crit., Myes, p. 36, pl. 8 f, fig. 1-4. Isocardia crassicomis, d'Orbigny, 1850. Prodr., t. 2, p. 137. nº 249, partim.

#### DIMENSIONS.

Lon	gueur			******************************	26 millim.
Par	rappor	t'à la l	ongueur:	Largeur	97
				Epaisseur	105
	-	_	_	Longueur du côté anal	75
				Longueur de la facette ligamentaire	75

Coquille presque aussi large que longue, très-renflée, ornée de stries rayonnantes fines, croisées par des stries concentriques également fines et régulièrement distribuées. Côté buccal court, arrondi; côté anal plus long, obtusément tronqué à son extrémité. Crochets très-epais, rapprochés sur les jeunes individus, ¡ufléchis, contournés et écartés sur les adultes. Aréa ligamentaire excavée.

Moule lisse, offrant des sillons concentriques plus ou moins visibles suivant les échantillons; impressions musculaires buccales bien marquées; pas de fente costale sur le côté anal.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, bien distincte de toutes les arches a été confondue par M. Agassiz avec l'Isocardia crassicornis, ainsi que nous l'avons déjà dit en traitant de cette espèce. La confusion est en effet facile quand on ne possède que des moules incomplets; mais toutes les fois que l'on peut observer la charnière, la distinction entre ces deux espèces est parfaitement claire; de plus

les ornements du test les différencient suffisamment. M. le professeur Favre nous a communiqué l'échantillon très-imparfait qui a servi pour les figures 1-4 de la planche 8 f, de M. Agassiz. La comparaison que nous en avons faite avec les nôtres nous permet de présenter avec une complète sécurité la rectification cidessus indiquée à l'ouvrage de notre savant ami.

Localités. Cette espèce n'est pas rare à la perte du Rhône, on la rencontre aussi au Saxonet, au Reposoir, à Bossetang, etc.

Explication des figures. Pl. 38, fig. 5 a, Isoarca Agassizii de grandeur naturelle, — fig. 5 b, moule de la même espèce, vu de profil, — fig. 5 b, le même vu en dessus, — fig. 5 d, le même vu sur sa face buccale.

## GENRE PECTUNCULUS Lamarck.

Caractères. Dents de la charnière disposées en arc régulier. Ligament externe. Coquille orbiculaire, subéquilatérale; crochets petits ou médiocres.

Ces caractères distinguent très-clairement les Pétoncles des Arches, ainsi que des genres dans lesquels le ligament est interne.

Les Pétoncles ont paru avec les terrains jurassiques; ils sont très-nombreux dans les mers actuelles.

# 220. Pectunculus alternatus d'Orbigny

(Pl. 38, fig. 4 a, b.)

P. testà orbiculatà, subcompressà, subvequilaterà, transversim costatà; costis una latà, alterà angustà, alternantibus; labro crenulato; areà ligamenti angustà.

P. alternatus, d'Orbigny, 1843. Pal. fr., Terr. crét., t. 3, p. 188, pl. 306, fig. 7-11.
 Id. d'Orbigny, 1850. Prod., t. 2, p. 138.

### DIMENSIONS.

Longueur				22 millim.		
Par rappoi	t à la	longueur	: Largeur	0, 100		
_			Epaisseur	0,66		
_		_	Longueur du côté anal	0,53		
Angle apicial 125°						

Coquille épaisse, presque circulaire, aussi large que longue, peu comprimée, ornée de côtes rayonnantes régulièrement alternes, les unes larges, les autres très-étroites. Côté anal un peu plus long que le côté buccal. Labre crénelé. Facette ligamentaire étroite.

Moule lisse sauf le labre. Empreintes musculaires bien marquées.

Observations. Lorsque la coquille est imparfaitement conservée, les petites côtes sont seules visibles; les côtes larges qui remplissaient leur intervalles ont disparu.

LOCALITÉ. Nous n'avons rencontré cette espèce qu'à la perte du Rhône. Collections de M. Roux et du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 59, fig. 4 a, Pectunculus alternatus, de grandeur double, — fig. 4 b, grossissement du test.

## 221. Pectunculus Huberianus Pictet et Roux.

(Pl. 38, fig. 5 a, b.)

P. testà suborbiculatà, subcompressà, subæquilaterà, radiatim concentricèque striatà; labro crenulato; areà ligamenti angustà.

### DIMENSIONS.

Longu	leur				millim.
Par ra	ppor	t à la lo	ngueu	r: Largeur	90
	_	_	-	Epaisseur	65
-	_	_	_	Longueur du côté anal	55
Angle	anic	al		1300	

Coquille épaisse, à peu près circulaire, un peu moins large que longue, peu renflée, ornée de stries fines rayonnantes, croisées par d'autres stries concentriques, et par des lignes d'accroissement. Le côté anal est un peu plus long que le côté buccal. Labre crénelé. Facette ligamentaire étroite.

Moule lisse; son labre est crénelé.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère par ses ornements de toutes celles des terrains crétacés.

LOCALITÉ. La perte du Rhône. Collection du Musée Académique; espèce trèsrare.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 38, fig. 5 a, P. Huberianus, de grandeur double, — fig. 5 b, grossissement du test.

## GENRE NUCULA Lamarck.

Caractères. Dents de la charnière disposées sur deux lignes droites qui se réunissent en formant un angle obtus. Ligament interne, placé dans une fossette qui occupe cet angle. Coquille ovale ou allongée, plus ou moins inéquilatérale.

La disposition des dents de la charnière et la position du ligament limitent ce genre d'une manière très-claire.

Les Nucules ont paru avec les terrains siluriens, se sont continuées à travers tous les âges géologiques, et sont trèsaboudantes dans les mers actuelles où on les trouve sous toutes les latitudes.

## 222. Nucula Neckeriana Pictet et Roux.

(Pl. 39, fig. 1, a, b, c, d.)

N. testà oblongo-trigonà, compressà, æquilaterà, concentricè striatà; latere buccali incurvato, angustato; latere anali latiori; umbonibus brevibus, compressis; labro lævigato.

Tome XIII, 1re partie.

#### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longueur				18 millim.
Par rappor	t à la	longueur	: Largeur	0,62
-	-	_	Epaisseur	0,45
Delivera .	a Tubs		Longueur du côté anal	0,50
Angle apici	al			1180

Coquille allongée, épaisse, aplatie sur les côtés, équilatérale, ornée de stries concentriques, à côté buccal rétréci, un peu recourbé, à côté anal plus large. Crochets comprimés, courts, écartés. Labre lisse.

Moule lisse, impressions musculaires peu marquées.

Observations. Cette espèce a la forme extérieure de quelques-unes de celles que M. d'Orbigny rapporte au genre Leda, mais son impression palléale entière nous oblige à la placer parmi les Nucules.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Elle ressemble sous quelques rapports à la Nucula subrecurva, Phill., mais elle s'en distingue par une épaisseur un peu plus grande et surtout par l'écartement des crochets qui est très-frappant dans le moule de l'adulte. Les flancs présentent aussi toujours une dépression caractéristique, tandis que chez la N. subrecurva ils sont uniformément arrondis.

Nous aurions toutefois, peut-être, hésité à séparer ces deux espèces, si M. d'Orbigny n'avait pas placé la N. subrecurva dans le genre Leda, ce qui est probablement motivé par l'observation d'une impression palléale échancrée; or, dans la N. Neckeriana cette impression parfaitement entière prouve que la coquille est une véritable Nucule.

Localités. La N. Neckeriana n'est pas rare à la perte du Rhône. Elle a été aussi trouvée, mais moins communément, au Saxonet, au Criou et à Bossetang.

Explication des figures. Pl. 39, fig. 1 a, b, Nucula Neckeriana du Saxonet, moule d'un échantillon très-adulte, grossi;— fig. 1 c, d, moule d'un individu plus jeune de la perte du Rhône.

# 223. Nucula Vibrayeana d'Orbigny.

(Pl. 39, fig. 2 a, b.)

N. testà ovato-rotundatà, compressà, subæquilaterà, hevigatà; lateribus rotundatis; latere buccali subangustato, lunulà nullà; labro lævigato.

Nucula Vibrayeana, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., Terr. crèt., t. 3, p. 172, pl. 301, fig. 12 — 14.

Leda Vibrayeana, d'Orb. Prodr., 1850, t. 2, p. 136.

### DIMENSIONS.

Longue	ır			13 millim.
Par rapp	ort à la	longueur	Largeur	0,80
_		_	Epaisseur	0,45
_	_	-	Longueur du côté anal	0,52
Angle ap	icial			125°

Coquille ovale, comprimée, presque équilatérale, lisse; côté anal plus large que le côté buccal et un peu plus long; tous deux arrondis; lunule non distincte. Labre lisse.

Moule lisse; impressions musculaires plus ou moins marquées, impression palléale entière.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère de la précédente par sa forme plus large, par l'écartement moindre des crochets et par l'absence d'une dépression latérale.

ORSERVATIONS. Nous rapportons cette petite espèce à la N. Vibrayeana, quoique M. d'Orbigny ait classé depuis cette dernière espèce dans le genre Leda; mais nos moules prouvent l'absence de tout sinus palléal et M. d'Orbigny n'ayant figuré que le test, il est possible que ce caractère lui ait échappé et qu'il n'ait été décidé que par les formes extérieures. S'il en est autrement et si la Nucula Vibrayeana d'Orbigny est une vraie Leda, la nôtre pourra conserver ce même nom en restant dans le genre Nucula.

LOCALITÉ. La perte du Rhône où elle est rare; collections de M. Roux et du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 59, fig. 2 a, b, moule de la Nucula Vibrayeana, de grandeur double.

# 224. Nucula pectinata Sowerby.

(Pl. 39, fig. 3 a, b.)

N. testà ovato-subtrigonà, inflatà, radiatim costatà, concentricè plicatà; latere buccali brevi, angulato; latere anali elongato, angustato; lunulà cordiformi, excavatà, læviqatà; labro crenulato.

Nucula pectinata, Sowerby 1818, Min. conch. trad. franç. p. 242. pl. 192. fig. 9 et 10. (Il faut probablement exclure de la synonimie les fig. 7 et 8.)

N. pectinata, Mantell, 1822, Geol. of Sussex, pl. xix, fig. 5 à 9.

Ead. Michelin, 1839, Mém. Soc. Géol. de France, t. 3, p. 102.

Ead. d'Orbigny, 1843, Pal. fr., Ter. crét. t. 3, p. 177, pl. 303, fig. 8-14.

Ead. Id. Prod., 1850, t. 2, p. 138.

Ead.? Reuss, Bohm. Kreid. II, p. 5. pl. 34 fig. 1-5.

M. Geinitz (Character. Kreid. p. 77) rapporte à la N. pectinata sans motifs suffisants et sans que les planches citées justifient, ce nous semble, cette association, les espèces suivantes:

Nucula truncata, Nilson, Petref. suec. pl. 5, fig. 6.

Ead. Geinitz, Charact. pl. 20, fig. 25.

Nucula Blochmanni, Geinitz, id. p. 50, pl. 10, fig. 8a, b.

Nucula striatula, Roëmer, Nord. Deuts. Kreid. pl. 8. fig. 26.

### DIMENSIONS

Longueur	25 millim.				
Par rapport à longueur : Largeur	0,65				
— — Epaisseur	0,55				
Longueur du côté anal	0,80				
Angle apicial					

.

Coquille ovale, plus ou moins triangulaire, plus ou moins renflée, ornée de côtes rayonnantes et de lignes concentriques d'accroissement. Côté buccal court, anguleux, côté anal long, arrondi ou à peine anguleux. Lunule cordiforme, à peu près aussi large que haute, excavée, lisse de même que le corselet. Labre crénelé.

Moule lisse, sauf les crénelures du labre sur les rares échantillons où il est intact; impressions musculaires saillantes; empreinte palléale distincte.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est facile à distinguer des autres par ses côtes rayonnantes et par sa lunule.

LOCALITÉS. La perte du Rhône, le Saxonet, le Reposoir, le Criou, Tanneverges. Explication des figures. Pl. 59, fig. 5 a, b, moule de la Nucula pectinata, grossi.

## 225. Nucula ovata Mantell.

(Pl. 39, fig. 4 a, b.)

N. testà ovato-oblongà, compressà, inæquilaterà; latere buccali brevi, angustato, subanquiato; latere anali elongato, angustato, rotundato; lunulà nullà; labro lævigato.

Nucula ovata, Mantell, 1822, Geol. of Sussex pl. xix, fig. 26 et 27.

Nucula capsæformis? Michelin, 1839, Mém. Soc. Géol. de France, t. 3, p. 120, pl. 12, fig. 8.

Nucuta ovata, d'Orbigny, 1843, Pal. fr. Terr. crét. t. 3, p. 173, pl. 202, fig. 1—3.

Ead. Id. Prodr. 1850, p. 137.

Nucula Mantelli ? Geinitz, Charact. Kreid. p. 77. pl. 20, fig. 22. M. Geinitz la cite comme identique à la N. ovata Mantell (non Nilsson); mais la figure qu'il en donne, et qui du reste est à peu près inintelligible, semble peu justifier ce rapprochement.

### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longueur	23 n	aillim.
Par rapport à la longueur :	Largeur	0,65
	Epaisseur	0,46
	Longueur du côté anal	0,70
Angle apicial		

Nous n'avons pas trouvé de test.

Espèce ovale oblongue, un peu comprimée; à côté buccal court, un peu rétréci, anguleux; à côté anal long, plus rétréci, arrondi. Lunule non distincte. Labre lisse.

Moule présentant une impression palléale et des impressions musculaires trèsdistinctes et grandes; on remarque fréquemment sur la région anale quelques granules, disposés sur une ligne arquée, qui correspondent probablement à de petites cavités du test.

Rapports et différences. Cette nucule n'a aucun rapport avec celles que nous avons décrites jusqu'à présent; elle a des analogies de forme avec une ou deux espèces du terrain néocomien, avec lesquelles cependant elle ne saurait être confondue.

Localités. Elle n'est pas rare à la perte du Rhône, nous l'avons aussi trouvée au Saxonet et à Samoëns.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 59, fig. 4 a, b, moule de la Nucula ovata de grandeur double.

## 226. Nucula gurgitis Pictet et Roux.

(Pl. 39, fig. 5, a, b.)

N. testà ovato-oblongà, subcompressà, inæquilaterà; latere buccali brevi, angustato; latere anali elongato, angustato, rotundato; lunulà nullà; labro lævigato.

### DIMENSIONS.

### (Moule.)

Longueur totale	18 millim.
Par rapport à la longueur	: Largeur 0,62
	Epaisseur
	Longueur du côté anal 0,75
Angle apicial	

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce ovale oblongue, peu comprimée; côté buccal court, un peu anguleux;

côté anal allongé, peu rétréci, arrondi. Lunule non distincte; labre lisse. Moule lisse, montrant par l'aplatissement de l'espace compris entre l'impression palléale et le bord, que la coquille a été très-épaisse.

Observation. Cette espèce est très-voisine de la N. ovata; elle en diffère par son côté anal plus long, plus large, plus arrondi et par son épaisseur bien plus forte près de l'empreinte palléale; avec des dimensions à peu près semblables, ces deux espèces ont cependant un facies très-différent, et les moules de la N. gurgitis portent près du labre des indices de stries rayonnantes qu'on ne retrouve pas sur ceux de l'espèce précédente.

LOCALITÉ. La perte du Rhône où elle n'est pas rare ; collections de MM. Roux, Tollot et du Musée Académique.

Explication des figures. Pl. 59, fig. 5 a, b, moule de la Nucula gurgitis, grossi.

# 227. Nucula arduennensis, d'Orbigny.

(Pl. 39, fig. 6 a, b.)

N. testà ovato-trigonà, compressà; latere buccali brevi, dilatato, truncato; latere anali elongato, angustato, subangulato; labro lævigato.

Nucula arduennensis, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., Terr. crét., t. 3, p. 174, pl. 302, fig. 4-8,

Ead. d'Orbigny, Prod. 1850, t. 2, p. 137.

### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longueur	13 millim.
Par rapport à la longueur : Largeur	0,72
— — Epaisseur	0,50
— — Longueur du côté anal	0,70
Angle apicial	980

Nous ne possédons que des moules.

Espèce ovale, subtrigone, comprimée; côté buccal court, élargi, tronqué; côté anal allongé, rétréci, un peu anguleux. Labre lisse.

Moule lisse; impressions musculaires bien détachées.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. La forme triangulaire de cette Nucule la différencie parfaitement des espèces précédentes.

LOCALITÉ. La perte du Rhône ou elle est rare. Collection du Musee Academique. Explication des figures. Pl. 59, fig. 6, a, b, moule de la Nucula arduennensis, de grandeur double. L'extrémité anale est trop arrondie sur la figure 6, a.

## 228. NUCULA TIMOTHEANA Pictet et Roux.

(Pl. 39, fig. 7 a, b,)

N. testà trigonà, compressissimà, latá; lateribus subangulatis; lubro lævigato.

#### DIMENSIONS

Longueur .				millim.
Par rappor	t à la	longueur	: Largeur	0,85
	_	_	Epaisseur	0,40
			Longueur du côté anal	0,70
Angle apic	ial		98	9

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce triangulaire, très-comprimée, large; côté anal un peu plus long que le côté buccal et terminé par un angle assez prononcé. Moule lisse; labre non crénelé; empreintes musculaires bien marquées et saillantes.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. La forme très-comprimée de cette espèce et sa grande largeur la différencient de ses congénéres et en particulier de la précédente avec laquelle elle a quelques rapports au premier coup-d'œil. Nous devons faire observer à ce sujet que la figure 7 a, comparée à la figure 6 a, n'indique pas suffisamment les différences qui existent entre les deux espèces. Pour les bien saisir il faut surtout considérer la largeur et remarquer que la N. Timotheana est la seule espèce qui forme un triangle presque équilatéral.

LOCALITÉS. Elle a été recueillie au Saxonet et dans les grès de Bossetang. Collections de M. Roux et du Musée Académique. C'est une espèce rare.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 39, fig. 7 a, b, moule de la Nucula Timotheana de grandeur double.

## 229. Nucula Carthusiæ Pictet et Roux.

(Pl. 39, fig. 8 a, b.)

N. testà oblongo-trigonà, subinflatà, lateribus angulatis, angustatis; latere anali elongato; tunulà cordiformi; labro lævigato.

### DIMENSIONS.

(Moules.)

Longueur.				6 millim.
Par rappor	tà la l	ongueur	: Largeur	0, 55
		_	Epaisseur	0, 50
_			Longueur du côté anal	0, 75
Angle apic	ial			)7°

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce oblongue, triangulaire, peu comprimée, à côtés anguleux, le côté buccal court, le côté anal allongé; lunule cordiforme; labre lisse.

Moule complétement lisse; empreintes musculaires saillantes.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est voisine de forme de la N. pectinata, mais elle s'en distingue par ses extrémités très-anguleuses et par son labre non crénelé.

LOCALITÉ. Elle a été trouvée au Reposoir; collection du Musée Académique. Explication des figures. Pl. 39, fig. 8 a, b, moule de la Nucula Carthusiæ de grandeur naturelle.

Nous avons recueilli encore, soit à la perte du Rhône, soit dans les Alpes de la Savoie, quelques espèces dont nous ne possédons que des moules. Nous ne les decrivons pas, pour ne pas risquer de faire double emploi avec celles qui ne sont connues que par leur test.

Tome XIII, 1re Partie.

## 7me Famille: MYTILIDES.

Caractères. Coquille allongée ou ovale, équivalve, ordinairement fermée, à crochets terminaux ou subterminaux. Ligament très-long, marginal ou submarginal. Deux ou trois impressions musculaires.

Les coquilles de cette famille font une transition entre les Orthoconques et les Pleuroconques. Elles sont équivalves comme les premières, mais se rapprochent par leurs formes de la famille des Malléacés et en particulier des Pernes, Gervilies, Avicules, etc., dont elles se distinguent facilement par leurs impressions musculaires.

Les Mytilides qui ont paru au sein des mers les plus anciennes, ont été nombreuses pendant les époques secondaire et tertiaire, et le sont encore plus dans les mers actuelles. Leur position normale est verticale ou oblique, les crochets en bas. Elles se fixent sur les rochers au moyen de leur byssus.

## GENRE MYTILUS Linné.

Caractères. Région anale fermée ou à peine bâillante. Charnière longue, souvent dépourvue de dents. Test simple, non composé de deux couches comme dans les Pinna. Impressions musculaires au nombre de deux sur chaque valve, une grande anale et une petite buccale.

# 230. Mytilus albensis d'Orbigny.

Mytilus albensis, d'Orbigny, 1850, Prod., t. 2, p 138.

Espèce de la série des modioles de Lamarck, lisse, très-large sur la région buccale.

M. d'Orbigny la cite de Cluse; nous ne la connaissons pas.

## 231. Mytilus Orbignyanus Pictet et Roux.

(Pl. 39, fig. 9 a, b, c.)

M. testà oblongà, subarcuatà, inflatà, radiatim striatà, concentricè striatà et plicatà; latere buccali obtuso; latere anali dilatato, rotundato; labro crenulato.

Longueur (mesurée depuis les crochets à l'extrémité de la région anale) 51	millim.
Par rapport à la longueur : Largeur	0,40
Epaisseur	0.60

Coquille oblongue, arquée, renflée, ornée partout de stries fines rayonnantes continues, croisées par d'autres stries concentriques plus fines et par des plis d'accroissement nombreux. Côté buccal obtus, retréci; côté anal allongé, élargi, arrondi; la région palléale ne dépasse pas les sommets. Labre crénelé.

Moule lisse, marqué de sillons d'accroissement.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Ce Mytilus ne nous paraît pas pouvoir être confondu avec d'autres espèces des terrains crétacés, et en particulier avec le Mytilus albensis, d'Orbigny, cité ci-dessus, qui est lisse et très-large sur la région buccale.

LOCALITÉS. Le Saxonet, le Reposoir, le Criou, la perte du Rhône. Collections du Musée Académique de M. le prof. Favre et de M. Roux.

Explication des figures. Pl. 59, fig. 9 a, Mytilus Orbignyanus de grandeur naturelle; — fig. 9 b, le même vu sur la région du ligament; — fig. 9 c, le même vu sur la région palléale.

## 232. Mytilus Rhodani Pictet et Roux.

(Pl. 40, fig. 1 a, b.)

M. testâ ovato-elongatâ, compressâ; latere buccali angustato; latere anali subdilatato, rotundato; latere palleali non excavato.

#### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Longueur	35	millim .
Par rapport à la longueur : Largeur		0,52
Epaisseur		0.34

Nous ne connaissons pas la coquille.

Espèce ovale oblongue, convexe et étroite sur la région apiciale, élargie et comprimée sur les régions palléale et anale. Côté anal arrondi, un peu oblique ; côté buccal un peu retréci. Crochets légèrement dépassés par l'extrémité de la région palléale. Moule lisse, montrant quelques empreintes des plis d'accroissement de la coquille et aussi quelques indices de stries obliques.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par sa forme ovale, oblongue, comprimée, non arquée. Elle a quelques rapports avec les Myoconcha par la forme de sa charnière qui avait une dent allongée de chaque côté, et par celle de l'impression musculaire buccale qui est profonde et qui forme sur le moule une sorte de pointe conique. Mais la coquille est mince comme dans les Mytilus et, autant que nous en avons pu juger, l'impression musculaire buccale n'est point double comme dans les Myoconcha.

LOCALITÉ. La perte du Rhône; espèce rare. Collection du Musée de Berne.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 40, fig. 1 a, moule du Mytilus Rhodani, de grandeur naturelle, échantillon appartenant au Musée de Berne; — fig. 1 b, le même vu sur la région du ligament.

## 233. Mytilus gurgitis Pictet et Roux.

(Pl. 40, fig. 2 a, b.)

M. testà oblongo-elongatà, angustà, compressissimà, subarcuatà; latere buccali brevi, angustato, obtuso.

#### DIMENSIONS.

#### ( Moules. )

Longueur .				 		 	 	 ٠	ď	 ٠.	 33	millim,
Par rapport	à la lo	ngueur	: Largeur	 	٠.	 ٠.	 	 		 		0, 33
_			Epaisseur.	 		 	 			 		0, 13

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce très-allongée, très-comprimée, un peu arquée. Côté buccal court, obtus, etroit; crochets légérement dépassés par la région palléale; côté anal un peu élargi, arrondi. Région palléale très-légérement évidée au milieu. Moule lisse, montrant quelques indices de plis concentriques.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par sa forme trèsallongée, étroite et surtout très-comprimée.

LOCALITÉ. La perte du Rhône ; espèce rare. Collection du Musée Académique.

Explication des ficures. Pl. 40, fig. 2 a, moule du Mytilus gurgitis de grandeur naturelle; — fig. 2 b, le même vu sur la région du ligament.

## 254. Mytilus giffreanus Pictet et Roux.

(Pl. 40, fig. 3 a, b, c.)

M. testă ovato oblongă, inflată, gibbosă, subarcuată; latere buccali brevi, obtuso; latere anali rotundato; latere palleali excavato, externè obtuse carinato; natibus convexis.

#### DIMENSIONS.

#### (Moules.)

Longueur	24 millim.
Par rapport à la longueur : Largeur	0,40
Epaisseur	0,63

Nous ne connaissons pas le test.

Espèce ovale oblongue, très-rensiée, un peu arquée; côté buccal court, obtus; côté anal un peu oblique, arrondi, non élargi; région palléale un peu excavée, ne dépassant pas le sommet des crochets qui sont convexes, pointus et insléchis en dedans; elle est bordée par une carène obtuse. Moule lisse, montrant des indices des plis d'accroissement de la coquille.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce dissère de ses congénères du gault par sa forme courte et renslée, et par ses crochets saillants pointus et enroulés.

LOCALITÉS. Elle a été trouvée au mont Criou et au Saxonet. Collections de M. Roux et du Musée de Berne.

Explication des figures. Pl. 40, fig. 5 a, moule du Mytitus giffreanus de grandeur naturelle, de la collection de M. Roux; — fig. 3 c, le même vu sur la région du ligament; — fig. 5 b, individu plus renslé sur la région anale, de la collection du Musée de Berne.

# 235. Mytilus Mortilleti Pictet et Roux.

(Pl. 40. fig 4 a, b.)

M. testà ovato-oblongă, compressă, subarcuată, concentrice inaqualiter tenuiter striată; latere anali obtuso, compresso, rotundato; latere buccali inflato.

### DIMENSIONS.

Longueur	,	 30 millim.
Par rapport à la longueur	: Largeur	 0, 47
	Epaisseur	 0,40

Coquille ovale, oblongue, comprimée, un peu arquée, ornée de stries concentriques, fines mais profondes, inégales entre elles; côté anal obtus, oblique, arrondi; côté palléal évidé au milieu et comprimé vers son extrémité; côté buccal renflé; crochets dépassés par l'extrémité de la région palléale.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a assez de rapports de forme avec les M. Carteroni et æqualis du terrain néocomien, mais sa région anale est beaucoup plus comprimée. Il est probable aussi qu'elle se rapproche du Mytilus albensis, d'Orbigny, que nous avons cité plus haut et qui n'est connu que par une phrase très-brève et insuffisante. Nous pensons toutefois que ces deux espèces sont différentes, car le M. albensis est lisse suivant M. d'Orbigny, tandis que le M. Mortilleti est finement mais profondément strié.

Localité. Elle a été découverte dans les grès vert du grand Bornand par M. Mortillet.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 40, fig. 4 a, Mytilus Mortilleti de grandeur naturelle; — fig. 4 b, le même vu sur la région palléale.

### 8me FAMILLE : LIMIDES.

CARACTÈRES. Coquille équivalve, comprimée, auriculée, inéquilatérale, souvent bâillante. Une seule impression musculaire à chaque valve, large, ovale, située du côté anal. Ligament placé sous les crochets dans une fossette triangulaire de la facette cardinale, qui est elle-même plane, triangulaire, très-oblique. Charnière dépourvue de dents.

Les Limides autrefois associées aux Pectinides sont équivalves et l'animal est composé de parties paires. Elles doivent donc ètre réunies aux Orthoconques intégropalléales, mais elles forment un groupe bien distinct par leur impression musculaire unique. Ainsi que le fait très-bien remarquer M. d'Orbigny, elles sont aux Pectinides, ce que les Mytilus sont aux Malléacés.

Cette famille ne se compose que du genre Lima.

GENRE LIMA Bruguière.

(Lima et Plagiostoma Sowerby, Lamarck.)

Ces coquilles ont en général les mêmes ornements extérieurs que les peignes et leur ressemblent par leurs oreillettes. Elles s'en distinguent facilement par leurs valves égales, par leur coquille bien plus inéquilatérale et par la forme de leur facette cardinale.

Les Limes ont eu leur maximum de développement numérique dans les terrains jurassiques et crétacés.

## 236. LIMA ITIERIANA Pictet et Roux.

(Pl. 40, fig. 5 a, b, c, d, e,f.)

L. testà compressà, transversà, concentricè rugoso-striatà, radiatim: 20-22 costis rotundatis ornatà; sulcis intermediis interstriatis, sæpè unicostatis; latere buccali radiatim costulato, recto; latere anali convexo.

#### DIMENSIONS.

Largeur		31 millim.
Par rapport à la largeur :	Longueur	0,85
	Epaisseur	0,47
many years take	Longueur de la facette du ligament	0,30
Angle anicial, sans les oreil	lettes	90°

Coquille ovale, transverse, comprimée, pourvue d'environ vingt côtes rayonnantes, arrondies, separées par des sillons plus larges que les côtes, principalement sur la région anale. Chacun de ces sillons est orné de stries parallèles aux côtes, dont la médiane, plus apparente, figure souvent une côte très-petite; cette disposition est surtout distincte sur la région anale; des stries concentriques, fines et un peu rugueuses, croisent les côtes et les sillons. Côté buccal costulé, droit, présentant une arête saillante, légèrement excavée latéralement; bord anal convexe; région cardinale étroite, coupée obliquement.

Le moule ne présente que les grosses côtes rayonnantes.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère de la Lima parallela, d'Orbigny, par ses stries intercostales et par la situation de la petite côte qui se trouve au fond des sillons et non au sommet des grosses côtes; elle est beaucoup plus voisine de la L. cottaldina, d'Orbigny, du terrain aptien, qui présente aussi une petite côte au fond des sillons intermédiaires aux côtes principales; elle en diffère cependant par sa longueur plus grande, par ses côtes arrondies et jamais anguleuses et par quelques autres détails d'ornementation.

Observations. Il est possible que ce soit le moule de cette espèce que M. d'Orbigny a eu entre les mains, quand il a cité la L. parallela comme trouvée à Cluse; leurs moules ne peuvent guère être distingués l'un de l'autre.

LOCALITÉS. La perte du Rhône, le Reposoir, le Saxonet; espèce répandue, mais rare partout. Collections de MM. Tollot, Roux, des Musées de Berne et de Genève.

Explication des figures. Pl. 40, fig. 5 a, b, Lima Itieriana de grandeur naturelle; — fig. 5 c, moule de la même espèce; — fig. 5 d, grossissement des côtes; — fig. 5 e, coupe transversale grossie des côtes près du bord buccal; — fig. 5 f, la même coupe vers le milieu du bord anal.

#### 237. LIMA SABAUDIANA Pictet et ROUX.

(Pl. 40, fig. 6.)

L. testà ovato-transversà, compressà, radiatim multicostatà; costis tenuibus; latere buccali truncato, recto; latere anali inflato, rotundato.

Tome XIII, 1re Partie.

#### DIMENSIONS

Longueur	************************	50 millim.
Par-rapport à longueur :	Largeur	0, 87
	Epaisseur	0,25à0,30
Angle apicial, sans les oreil	lettes,	90°

Coquille ovale transverse, comprimée, ornée de côtes rayonnantes nombreuses, petites, égales entre elles; côté buccal tronqué, présentant sur la commissure des valves une arête saillante avec une dépression latérale; côté analélevé, arrondi sur son bord; nous n'avons pas pu observer la région cardinale.

Moule reproduisant les côtes du test.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette lime diffère des autres espèces du gault par ses côtes nombreuses, simples et petites.

LOCALITÉ. Le Saxonet où elle est très-rare; collections de M. Roux et du Musée Académique.

Explication des figures Pl. 40, fig. 6, moule de la Lima sabaudiana de grandeur naturelle.

#### 238. Lima alpina Pictet et Roux.

(Pl. 40, fig. 7.)

L. testá orbiculatá, compressá, radiatim 42-costatá; costis et sulcis intermediis concentricè squamosis; latere buccali truncato, excavato; latere anali dilatato, rotundato.

#### DIMENSIONS.

Longueur à peu près égale à la largeur.	
Angle apicial, sans les oreillettes	95

Coquille orbiculaire, comprimée, ornée d'environ douze côtes rayonnantes, arrondies, squammeuses de même que leurs intervalles; région buccale tronquée,

excavée ; côté analarrondi, dilaté ; région cardinale large. Sur le moule les côtes sont lisses.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par sa forme comprimée, par ses côtes espacées et par son test squammeux.

LOCALITÉ. Elle n'est pas rare au Saxonet, où on ne la trouve en général que très-mutilée; collections de M. Roux, du Musée de Berne et du Musée Académique de Genève.

Explication des figures. Pl. 40, fig. 7, Lima alpina, de grandeur naturelle.

#### 239. LIMA SAXONETI Pictet et Roux.

(Pl. 40 fig. 8.)

L. testà ovatà, transversà, subcompressà, radiatim tenuicostatà et interstriatà, concentricè sub-plicatà; latere buccali truncato, excavato, subcarinato; latere anali convexo, rotundato.

#### DIMENSIONS.

( Moules.)

Longueur	llim.
Par rapport à la longueur : Largeur	0,90
— — Longueur de la facette du ligament	0,35
Angle anicial, sans les oreillettes	

Espèce ovale transverse, médiocrement comprimée, ornée de plis concentriques rapprochés, très-peu marques et de faibles côtes rayonnantes, nombreuses, dont les sillons intermédiaires offrent chacun trois ou quatre stries ou petites côtes parallèles aux côtes principales. Région buccale tronquée, excavée, un peu carénée en dehors; bord anal arrondi.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère des précédentes par ses côtes très-peu prononcées formant de faibles stries, qui la laissent presque lisse à l'œil nu. Elle se distingue de la suivante par ces mêmes côtes et stries rayonnantes et par son angle apicial beaucoup plus aigu.

Localité. Le Saxonet; collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 40, fig. 8, Lima Saxoneti, de grandeur naturelle.

## 240. Lima albensis d'Orbigny.

( Pl. 40, fig. 9 a, b.)

L. testá ovato-trigoná, inflatá, concentricè radiatimque substriatá; latere buccali truncato, excavato, subcarinato; latere anali rotundato, semicirculari.

L. albensis, d'Orbigny, 1843, Pal. fr., Ter. crét., t. 3, p. 541, pl. 416, f. 15—16.

Ead. Id. Prod. 1850, t. 2, p. 138.

Largeur ,	17	millim.
Par rapport à la largeur : Longueur		0,95
Epaisseur		0, 60
Angle apicial	105	0

Coquille ovale, subtrigone, renflée, à peu près aussi longue que large, lisse à l'œil nu et ne montrant que quelques lignes d'accroissement, ornée à la loupe de stries concentriques, croisées par des indices de stries rayonnantes, principalement dans le voisinage de la région buccale; celle-ci est tronquée, très-excavée sur son milieu et carénée en dehors. Le bord anal est arrondi en demi-cercle.

Moule complétement lisse.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par son aspect lisse, par sa région buccale excavée et par sa longueur à peu près égale à sa largeur; elle est très-voisine de la *L. Saxoneti*, mais elle s'en distingue par un angle apicial plus ouvert et par la disposition des côtes et des stries.

LOCALITÉ Le Musée Académique la posséde de la perte du Rhône où elle est très-rare.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 40, fig. 9 a, b, moule de la Lima albensis, grossi de moitié.

## 241. Lima rhodaniana d'Orbigny.

Lima rhodaniana; d'Orbigny, 1845, Pal. fr., Terr. crét., t. 3, p. 541, pl. 416 fig. 17 — 19.

Ead. d'Orb., Prodr., 1850, p. 138.

Nous n'avons pas trouvé cette espèce que M. d'Orbigny cite de la perte du Rhône; elle ressemble aux deux précèdentes, mais elle s'en distingue par l'absence de carène sur la région buccale.






Fig. 1. Panopæa acutisulcata. Fig. 2. P. plicata. Fig. 3 P. Rhodani .

Fig. 4. P. Sabaudiana .






Fig. 1. Pholadomya Favrina. — Fig. 2. P Genevensis. — Fig. 3 Mactra gaultina. Fig. 4. Anatina Rhodani. — Fig. 5. Periploma Sabaudiana. — Fig. 6. Thracia rotunda. Fig. 7. T. alpina. — Fig. 8. Petricola Rhodani.






Fig. 1. Venus Vibrayeana. — Fig. 2. Thetis Genevensis. Fig. 3. Cardium Neckerianum. — Fig. 4. C. Dupinianum.







Fig. 1. Cardium Raulinianum Fig. 2. C. Alpinum. Fig. 3. Isocardia crassicornis.





imp con a some

Fig. 1. Opis Hugardiana. — Fig. 2. O. lineata. — Fig. 3. Astarte Brunneri. Fig. 4. A. Sabaudiana. — Fig. 5. A. Dupiniana.






Fig. 1. Astarte gurgitis. — Fig. 2 Crassatella Saxoneti. — Fig. 3. C. Sabaudiana. Fig. 4. C. Fisiana. — Fig. 5. Cardita Constantii. — Fig. 6. C. rotundata.






Fig. 1. Cyprina Ervyensis. Fig. 2. C. Rhodani. Fig. 3. C. regularis. Fig. 4. Corbis gaultina. Fig. 5. Lucina gurgitis.






Fig. 1 & 2 . Trigonia aliformis . Fig. 3 . T . Constantii . Fig. 4 . T . Archiaciana . Fig. 5 . T . nodosa .






Fig. 1. Arca Hugardiana. — Fig. 2. A. gurgitis. — Fig. 3. A. Campichiana. Fig. 4. A. Favrina. — Fig. 5. A. bipartita. — Fig. 6. A. subnana.






Fig. 1. Arca carinata. — Fig. 2. Arca fibrosa.






Fig. 1 & 2. Arca obesa. — Fig. 3 Isoarca Agassizii. — Fig. 4. Pectunculus alternatus.

Fig. 5. Pectunculus Huberianus.






Fig. 1. Nucula Neckeriana. — Fig. 2 N. Vibrayeana. — Fig. 3. N. pectinata. — Fig. 4 N. ovata. Fig. 5. N. gurgitis. — Fig. 6. N. Arduennensis — Fig. 7. N. Timotheana. Fig. 8. N. Carthusiæ. — Fig. 9. Mytilus Orbignyanus.






Fig. 1. Mytilus Rhodani. — Fig. 2. M. gurgitis. — Fig. 3. M. Giffreanus. Fig. 4. M. Mortilleti. — Fig. 5. Lima Itieriana. — Fig. 6. L. Sabaudiana. Fig. 7. L. alpina. — Fig. 8. L. Saxoneti. — Fig. 9. L. albensis.



# NOTE

RELATIVE

## AUX APPARENCES MICROSCOPIQUES

DES

#### CHEVEUX HUMAINS ET DES POILS D'ANIMAUX.

PAR

M. A. MORIN.

(Lue à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 17 Avril 1851.)

A la suite d'un meurtre commis, il y a quelques mois, sur la personne d'un garde forestier du Pays de Gex, le Juge d'Instruction fit saisir une hache chez la personne que différentes circonstances faisaient soupçonner de ce crime, et je fus chargé, avec un autre expert<sup>1</sup>, de décider si un poil blanc, de trois lignes de longueur, qui se trouvait à l'emmanchûre de l'instrument, était un cheveu d'homme ou provenait d'un animal.

Le seul travail de ce genre qui ait été publié dans les

<sup>1</sup> M. Hummel.

annales d'hygiène remonte à 1837 et est compris dans un rapport d'Olivier d'Angers relatif à un fait analogue.

Les résultats auxquels cet observateur est parvenu à l'aide du microscope sont les suivants :

1° Les cheveux ont la même grosseur de la base à la pointe et un diamètre moyen de %100 de millimètre. Ils sont tous pourvus d'un canal central formant une ligne moins colorée ou argentine et offrent une certaine transparence dans toute leur épaisseur, quelle que soit leur couleur.

2º Les poils de cheval, de bœuf ou de vache sont opaques, fusiformes, diminuent graduellement de grosseur, les diamètres étant  $\frac{8\frac{4}{100}}{100}$ , puis  $\frac{7}{1000}$ ,  $\frac{3}{100}$  et  $\frac{2^{\frac{1}{100}}}{100}$  de millimètre et se terminent en pointe émoussée. A la base se trouve une cavité conique, creusée dans le centre, renfermant le prolongement de la bulbe. Cette partie donne à la base des poils une transparence notable, contrastant avec l'opacité du reste. M. Olivier a distingué dans l'un de ces poils une ligne centrale, transparente, mais ils ne paraissent pas avoir de canal dans leur longueur. Leur couleur est d'un jaune roussâtre, d'une teinte plus ou moins foncée. Plusieurs offrent sur leur longueur des renslements latéraux. L'un d'eux était surmonté dans un point de son étendue par un filament extrêmement ténu qui s'en détachait presqu'à angle droit, de la même manière qu'un rameau se détache de la branche qui le supporte.

En examinant comparativement les poils que portait l'instrument qu'on supposait avoir servi à l'accomplissement du meurtre, Olivier reconnut que ce n'étaient pas des cheveux, mais des poils de cheval, de bœuf ou de vache. L'enquête judiciaire confirma l'exactitude de ces résultats.

Les recherches que nous avons faites nous ont conduits à une conclusion inverse de celle à laquelle Olivier était arrivé. En effet, outre le poil blanc, long de trois lignes, trouvé à l'emmanchûre de la hache, nous en recueillimes encore quelques-uns dans le trou dont nous avions retiré le manche, mais dont la longueur ne dépassait pas deux lignes. Tous ces poils étaient blancs, à l'exception d'un seul de couleur brune. Examinés au microscope ils possédaient tous la transparence générale propre aux cheveux. Comparés à ceux qui avaient été enlevés des différentes régions de la tête de la victime, ils leur ressemblaient par la transparence et la couleur. Par un hasard singulier les cheveux du prévenu avaient une teinte toute différente. Enfin des investigations minutieuses et fréquemment répétées sur les poils des divers animaux à la portée de l'homme nous firent voir qu'aucun d'eux ne possédait la transparence générale des cheveux ou que si elle s'y rencontrait elle était partielle ou accompagnée d'autres caractères distinctifs. En conséquence nous pûmes affirmer que les poils trouvés sur la hache étaient des cheveux d'homme et qu'ils avaient une grande analogie avec ceux de la victime, sans pouvoir toutefois décider qu'ils lui eussent appartenu.

Les aveux de l'assassin s'accordèrent avec ces résultats.

J'ai profité de l'excellent microscope d'Amici que l'Académie avait mis à ma disposition, et du concours d'un homme aussi versé dans la science que dans l'art du dessin, pour étendre ces observations depuis la remise du rapport à l'autorité judiciaire et pour joindre à cette note la représentation fidèle de quelques-uns des poils que j'ai eu l'occasion d'examiner. Moins préoccupé de l'anatomie de ces organes que de l'importance de leurs apparences pour la médecine légale, je ne les donne pas comme des planches destinées à enrichir l'histoire naturelle, mais comme une série de portraits qui peut servir à lever les doutes de l'expert. La description écrite m'a paru suffisante pour distinguer les autres.

Les belles recherches du Docteur Erdt sur la construction intérieure des poils, consignées dans les mémoires de l'Académie des Sciences de Bavière de 1841, montrent que ces organes sont composés d'un épithelium, de substance corticale et de matière médullaire. Celles-ci diffèrent l'une de l'autre par la couleur, l'épaisseur, la forme et la grandeur des cellules dont elles sont composées. Quelquefois la substance corticale présente l'apparence d'un tuyau dans lequel elle s'étend en cloisons de formes et d'inclinaisons très-variées, dont les intervalles sont ou vides ou occupés par la matière médullaire. Dans d'autres cas ces deux substances se pénètrent réciproquement. La matière médullaire envahit souvent la presque totalité de la tige; d'autres fois elle parait complétement supprimée. Les poils ne sont pas tous arrondis. Ils sont quelquefois com-

primés en un ou plusieurs sens. Il y en a d'ovales, de reniformes, de cannelés, de dentelés.

Aucun ordre des mammisères étudiés par M. Erdt n'a présenté de caractères saillants qui ne se retrouvassent dans aucun des autres.

Les animaux dont il a examiné les poils sont la plupart étrangers à l'Europe ou ne se trouvent que rarement à la portée de l'homme dans nos contrées. — M. Erdt n'a pas mentionné les appendices épidermiques qui se voient à la surface de la plupart des poils. La forme cylindrique des cheveux ne l'a pas frappé et il a admis d'une manière trop absolue qu'ils étaient dépourvus de substance médullaire. En outre tous les poils dont il a donné la description ont été immergés dans l'huile d'olives afin de les rendre transparents. — Il en est résulté que ces matériaux, quoique d'un grand intérêt scientifique, ont eu peu d'utilité pour l'investigation spéciale qui a motivé mes recherches.

Les cheveux et les poils dont les figures accompagnent cette note sont grossis de quatre-vingts fois leur diamètre. J'espérais trouver dans la forme des bulbes, la position des appendices corticaux, la distribution des parties lumineuses et des masses médullaires quelque loi qui pût servir de direction dans les investigations medico-légales; aussi tous ces détails ont-ils été copiés avec l'exactitude la plus scrupuleuse. Quoiqu'il soit ressorti de cet examen quelques a-

perçus intéressants, les règles générales que j'en attendais ont fait défaut, ce qui m'oblige à donner aux descriptions de ces organes une étendue dont j'espérais pouvoir me dispenser. Un fait cependant est digne d'être remarqué, c'est à peu d'exceptions près la persistance de toutes ces apparences, de tous ces caractères dans les poils des individus d'une même espèce, à quelque partie du corps qu'ils soient pris et indépendamment des variations de teinte, de grosseur ou de forme. C'est le pendant de ce qu'on observe dans le plumage et les œufs des oiseaux.

## Cheveux et poils de l'homme.

Il est évident qu'Olivier a désigné sous le nom de canal central la masse du cheveu qui est transparente et comprise entre deux lignes dont l'opacité est probablement due à la dispersion des rayons lumineux qui frappent la surface avec des angles d'incidence très-petits. Il n'a point entendu par cette expression le canal médullaire central mentionné par les anatomistes, qui manque dans la plupart des cheveux, mais qui est plus fréquent dans les poils d'animaux.

Outre les cheveux de la victime et les fragments trouvés sur la hache, j'en ai examiné de blancs, de blonds, de noirs et de nuances intermédiaires, provenant de personnes d'âges très-variés et des deux sexes.

Tous possèdent la transparence générale dans toute leur longueur, indépendamment de leur teinte particulière. Dans quelques-uns seulement on voit des masses medullaires sur la ligne centrale, mais isolées entr'elles, sans contour bien défini, de forme variable, un peu amincies aux deux extrémités et d'une couleur brune plus ou moins foncée. Il ne s'en trouve pas à l'extrémité.

Tous sont cylindriques ou à peu près. Cependant des cheveux d'un blond très-pâle, forts et épais, provenant d'un Wurtembergeois àgé de 27 ans et d'un tempérament lymphatique, ont offert des renslements le long de la tige (fig. 3).

Quelques-uns sont enveloppés à la base par une gaîne qui part de la racine, se prolonge à quelque distance audessus et se termine par un bourrelet (fig. 3 et 4).

La tige est terminée abruptement dans la plupart des cheveux parce qu'ils sont coupés. Lorsqu'ils n'ont pas encore été soumis à cette opération leur extrêmité est arrondie. Je m'en suis assuré avec des cheveux noirs pris sur un enfant 24 heures après la naissance et avec ceux d'un enfant blond un peu plus àgé (fig. 2). Ce mode de terminaison s'accorde avec la forme cylindrique remarquée dans tous ces organes. La tige porte, même dans les enfants nouveaux nés, des ramifications de forme irrégulière, souvent repliées en bas, qui ne paraissent pas être autre chose que des appendices épidermiques.

Les bulbes ou racines des cheveux d'Européens que j'ai examinés sont simples et en général pivotantes, avec de légères variations de grosseur et de forme (fig. 1).

Tous les poils des autres parties du corps humain ont

la même transparence que les cheveux. Ils sont en général pourvus de substance médullaire. Ceux de la barbe et des favoris sont plus forts, légèrement applatis de place en place, ou présentent des surfaces gauches qui contribuent à les faire friser. Ils sont plus fortement enracinés, ont des bulbes simples plus grosses que celles des cheveux et d'une section plus grande que celle des tiges.

J'ai retrouvé dans un poil follet l'invagination du bas de la tige déjà remarquée dans quelques cheveux et poils d'homme.

Enfin les cheveux d'un jeune nègre originaire d'Haïti ont présenté, outre la transparence générale des cheveux des blancs, quelques caractères particuliers, tels que des racines multiples de forme variable, surmontées d'une tige cylindrique jusqu'à une certaine hauteur passé laquelle elle devient inégale d'épaisseur, applatie, contournée irrégulièrement, fendue ou plutôt déchirée dans le sens de la longueur ce qui produit dans quelques places des crochets solides dirigés en arrière. Ces formes expliquent la facilité avec laquelle les cheveux de nègre se feutrent. Ils ne paraissaient pas avoir de masses médullaires le long de l'axe, mais ils portaient des appendices épidermiques (fig. 5).

## Poils d'animaux.

Il n'est pas question ici du duvet soyeux ou laineux qui se trouve presque toujours à la base des poils proprement dits, mais de ces organes eux-mêmes. A peu d'exceptions près les poils sont transparents vers la base et à l'extrémité.

Ils n'ont pas en général un diamètre égal dans toute leur longueur. Les uns se rétrécissent à la base, comme celui du veau; d'autres offrent le même caractère dans le milieu, comme celui du mouton, mais cette apparence tient surtout à ce que la tige est un peu applatie et se présente par la face la plus étroite. Celui du lièvre est plus épais au milieu et s'amincit aux deux bouts. Presque tous diminuent graduellement de grosseur jusqu'à l'extrémité et se terminent en pointe conique assez effilée. Ceux de l'âne, de la chèvre et du blaireau sont tronqués comme s'ils avaient été rompus sans déchirure. Il est probable cependant que ces exceptions à la forme générale ne sont qu'accidentelles et qu'elles sont dues aux habitudes de ces animaux qui les exposent à de nombreux frottements.

On observe quelquesois des renslements partiels comme ceux qui ont été remarqués dans quelques cheveux.

Lorsque la tige des poils n'est pas complétement opaque elle offre en général, comme celle des cheveux, des masses médullaires isolées entr'elles et disposées le long de l'axe de manière à simuler un canal. La couleur de cette matière est brune, plus ou moins foncée. Quelquefois elle ne forme qu'une série de petites taches. Dans les poils du lapin et du hérisson elle est répartie en plusieurs lignes parallèles non continues, comme les grains d'un chapelet.

Dans le chamois la matière toute entière est parsemée de masses médullaires.

La cavité conique, mentionnée par Olivier comme se trouvant à la base des poils et leur donnant de la transparence, n'a été aperçue dans aucun de ceux qui font le sujet de cette note.

Dans la plupart des poils on remarque sur les bords deux bandelettes ondulées ou échancrées d'où partent des stries qui se croisent en tous sens et produisent comme un réseau à la surface de la tige. Ces bandelettes parallèles sont presque toujours d'un brun très-foncé, noirâtre même. Elles sont parfois divisées longitudinalement et l'intervalle formé par cette séparation est alors ou très-transparent ou nuageux comme le centre.

Près de la racine les squamules, qui recouvrent les fibres de la tige et qui s'en détachent par le frottement, sont plus nombreuses que vers l'extrémité où clles n'apparaissent plus qu'à de grandes distances. Elles sont le plus souvent entièrement transparentes, quelquefois opaques et ombrées, de manière à représenter des formes bizarres d'une certaine élégance. Mais il n'y a rien, ni dans leur position, ni dans leur forme, qui dénote une loi générale. Elles paraissent dues à des exfoliations de l'épiderme ou de la couche corticale.

Dans aucun des poils ne s'est rencontrée cette sorte d'invagination qui a été remarquée sur des poils follets et plusieurs cheveux de l'homme.

La bulbe ou la racine des poils présente des formes différentes, quoique prise sur le même sujet, ce qui parait tenir à l'âge, à un développement plus ou moins complet,

ou à ce qu'en arrachant le poil de l'alveole une portion de la bulbe se détache et y reste fixée. Les racines sont droites ou recourbées, ou palmées comme celles de certains Orchis, ou de la forme d'une amande coupée longitudinalement.

Je ferai suivre ces observations générales par une revue rapide des particularités propres à chaque espèce de poils, en suivant l'analogie des formes et des apparences plutôt que les liaisons naturelles reposant sur la classification.

## Poil de vache pris sur la croupe (fig. 8).

Plus court que celui du veau et plus mince que celui du bœuf; totalement opaque depuis une petite distance au-dessus de la racine et portant de rares exfoliations épidermiques sous forme de petits boutons noirs. La substance médullaire est divisée irrégulièrement sans indice de canal central. Bulbe ovale, allongée et droite.

### Poil de veau.

Bulbe plus longue que dans le poil de vache. Immédiatement au-dessus la tige est transparente et laisse voir la substance médullaire. Celle-ci s'aperçoit encore dans le centre de deux renslements transparents situés au milieu de la longueur et se retrouve dans la partie supérieure du poil qui est transparente; cependant l'extrémité

effilée parait en être dépourvue. Les appendices corticaux sont nombreux et de forme variée.

## Poil de bœuf.

Bulbe en forme de massue, garnie inférieurement de plusieurs radicules très-courtes. Tige transparente dans le quart inférieur et dans le quart supérieur. Masses médullaires peu prononcées, visibles dans les parties transparentes du poil, mais ne s'étendant pas jusqu'à la pointe. Exfoliations épidermiques très-nombreuses.

## Poil de chèvre (fig. 9).

Tronqué à l'extrémité. Transparent aux deux bouts, plus opaque cependant près de la racine. Cette dernière est trèspetite, presque droite, renslée au sommet et à l'extrémité, de manière à former un léger étranglement à la partie moyenne. La tige est plus mince à la base qu'à l'extrémité supérieure, grossit insensiblement à partir de la bulbe et devient alors très-opaque. On remarque dans toute sa longueur la substance médullaire qui forme une ligne centrale plus foncée que le reste. La surface du poil porte des parties épidermiques.

## Poil d'ânesse (fig. 6).

Remarquable par une bulbe palmée de formes variées et par une opacité totale, plus prononcée que dans la plupart des poils d'autres animaux. Tige tronquée, portant peu d'appendices épidermiques.

#### Poil de cheval.

Terminé en pointe droite, garnie de petites nodosités opposées les unes aux antres, couvert de fortes exfoliations corticales. Au quart de sa longueur, à partir de la pointe, il devient complétement opaque jusqu'à une petite distance de la racine. Il redevient alors transparent et laisse voir de grosses plaques de substance médullaire. La bulbe est pivotante, mais de forme irrégulière.

## Poil de chien-loup (fig. 7).

Bulbe divisée en deux branches garnies de radicules très-petites. La tige, depuis la base jusqu'aux deux tiers de la longueur, est abondamment garnie de membranes épidermiques, sauf dans le tiers supérieur. Elle est transparente d'un bout à l'autre. Le centre est occupé par des

masses de substance médullaire de forme allongée, presque sans interruption jusqu'à l'extrémité du poil qui est conique mais se termine en pointe arrondie.

## Poil de chien de race anglaise.

A l'exception de la racine qui est très-petite et en forme d'amande, ce poil diffère peu du précédent. Il est plus mince et un peu renflé vers la base. La substance médullaire est beaucoup moins marquée et les membranes épidermiques sont rares à la surface de la tige.

## Poil de chat du pays.

Transparent aux deux extrémités, fortement garni de membranes épidermiques à la partie inférieure, terminé en général par une pointe ondulée, quelquefois droite ou tronquée. Bulbe, tantôt pivotante, tantôt en forme d'amande et transparente dans le milieu.

## Poil de chat angora blanc.

Analogue au précédent, si ce n'est que la racine est d'une forme un peu différente et que l'extrémité de la tige est droite.

#### Poil de souris.

Très-mince et très-pointu. Bulbe cylindrique ressemblant à l'épi d'un Typha. Tige garnie de nodosités opposées, ou plutôt annulaires, et presque totalement dépourvue d'appendices épidermiques.

## Poil de Blaireau (fig. 10, 11 et 12).

Le seul qui ait été trouvé dépourvu de membranes épidermiques. Il est fort, tout droit, s'amincit vers son extrémité qui est tronquée. A partir de la racine, qui est pivotante et accompagnée de longues radicules partant du collet, ce poil est transparent jusqu'au quart de sa longueur et la substance médullaire y est divisée sous forme de nuages bruns. Depuis ce premier quart on remarque au centre comme un canal tout droit, bien limité, rempli de substance médullaire et non interrompu, qui se perd en s'éfilant dans la partie supérieure de la tige. Celleci reprend alors une transparence compléte à l'exception des deux bandes latérales foncées qui la bordent d'un bout à l'autre.

## Poil de lièvre (fig. 13).

D'une structure très-remarquable. Transparent aux deux extrémités. A une petite distance de la racine, qui est pi-

votante et abondamment garnie de follicules épidermiques, on remarque des lignes longitudinales au nombre de quatre ou cinq sur la face visible, formées d'une série de petites taches ou de cellules arrondies, communiquant aussi transversalement. Cette apparence, due peut-être à une disposition particulière des masses médullaires, cesse à la moitié de la longueur. Le poil devient opaque à l'exception d'une ligne centrale très-étroite, d'une transparence éblouissante, interrompue de distance en distance. Le dernier quart est effilé et transparent. Les appendices corticaux sont peu nombreux.

#### Poil de Chamois.

Sous forme de serpent dans toute sa longueur, peu chargé d'appendices et terminé par une pointe aiguë trèstransparente. Le reste du poil offre un amas d'utricules ou de masses médullaires se touchant dans tous les sens et remplissant toute la ligne, de sorte qu'on ne remarque pas de canal médullaire central. Les poils examinés avaient été coupés au-dessus de la racine et sont représentés dépourvus de bulbe.

## Poil de mouton noir du pays.

Mince et sinueux; d'un diamètre variable; applati et portant des renslements de distance en distance, ce qui donne à la tige l'apparence d'une grande inégalité d'épaisseur et explique la facilité avec laquelle la laine se feutre. On observe le long du poil des plaques opaques. L'extrémité est transparente, non terminée en pointe, parce que l'animal avait déjà fourni des coupes. Appendices épidermiques nombreux. Ligne centrale médullaire visible dans quelques parties de la tige. Racine en forme de massue recourbée à l'extremité et trèsopaque.

## Poil de cochon (fig. 14).

Aussi transparent que celui de l'homme dans toute sa longueur, portant de nombreuses membranes épidermiques. Bulbe pivotante. Deux caractères servent à le distinguer du cheveu; la raideur de la tige et la manière dont elle est terminée. Elle se bifurque en effet et chaque branche se divise en deux autres. Les extrémités sont ordinairement terminées par un petit mouchet de substance épidermique.

## Poil de sanglier.

D'une épaisseur beaucoup plus forte, presque entièrement opaque. Tige fendue, les parties se réjoignant à l'extrémité de la séparation. Sommet divisé et rameux beaucoup plus encore que celui de cochon.

Cette ramification des poils de sanglier et de cochon ex-Tome XIII, 1<sup>re</sup> PARTIE. 25 plique très-bien pourquoi les brosses ne fonctionnent plus lorsque l'extrémité des poils est usée.

## Poil de hérisson pris sur le dos.

Ce poil dur, corné, long de 6 à 8 lignes, a été examiné dans l'idée qu'il fournirait quelques données intéressantes pour les apparences de ceux des autres animaux. Il est aminci aux deux bouts, marqué de taches noires vers son extrémité supérieure. La racine est petite. Elle se détache d'une espèce d'engaînement, comme le pied humain sortant d'un pantalon. Elle est opaque à la pointe et transparente au-dessus. On y remarque plusieurs lignes parallèles qui se prolongent jusqu'à la gaine où elles disparaissent sous la parfaite opacité de cette dernière pour reparaître bientôt sous la forme de bandelettes rangées les unes à côté des autres, à des distances à peu près égales et se prolongeant jusqu'au tiers supérieur de la tige. Ces bandelettes opaques sont garnies dans toute leur longueur et à des intervalles égaux d'alvéoles ou plutôt de plaques circulaires parfaitement transparentes; elles sont séparées les unes des autres par des raies larges également transparentes d'un bout à l'autre. Au milieu de la longueur le poil parait entr'ouvert largement et se rétrécit peu à peu vers la pointe. Les bandelettes s'amincissent et se terminent en un prolongement irrégulier qui finit par

se perdre dans la pointe du poil qui est opaque. A partir de l'endroit où les bords de la fente se rapprochent toute cette partie devient d'une transparence parfaite. On ne remarque que de rares exfoliations sur les bords du poil.

## Poil de hérisson, pris sur la poitrine.

Corné comme celui du dos. Bulbe tronquée à l'extrémité, un peu noueuse, d'une épaisseur double de celle du poil pris au-dessus du collet, à peu près cylindrique, garnie çà et là de petites radicules. La tige est ondulée jusqu'au second tiers de la longueur. La substance médullaire y est disséminée d'une manière confuse; mais à partir du second tiers tout l'intérieur du poil est composé de ces parties très-transparentes qui simulent des alvéoles, entourées de matière très-opaque, et superposées les unes aux autres jusqu'au dernier quart du poil en diminuant de grandeur à mesure qu'il s'éfile. Depuis là elles se confondent en une série de petites plaques de couleur pâle qui se terminent en un fil se perdant dans la pointe du poil. Sur toute la tige on ne rencontre que trois ou quatre exfoliations de l'épiderme.

## Poil de hérisson pris sur la moustache.

Il ne ressemble en rien à ceux des autres parties du corps. Bulbe en forme de navet, terminée par un pivot un peu recourbé garni de quelques radicules. A partir du collet jusqu'au tiers de sa longueur la tige porte des membranes très-longues en forme de branches d'arbrisseau ornées de feuilles. Elle est transparente à la base, devient plus opaque à peu de distance de la bulbe. Le centre est occupé par de la substance médullaire disposée en plaques plus ou moins écartées qui continuent jusqu'à l'extrémité en devenant insensiblement plus pâles. Deux bandelettes échancrées accompagnent parallèlement ces taches et paraissent former les limites du canal médullaire. Le dernier tiers du poil est très-transparent. On ne remarque que de rares appendices épidermiques dans le haut de la tige.

## Poil de singe vivant (fig. 15).

J'avais eu l'intention d'étendre ces recherches aux animaux exotiques, mais je me suis aperçu que les poils des peaux préparées pour les collections sont opaques tandis que ceux des mêmes animaux vivants peuvent être plus ou moins transparents. — Les poils d'un singe de petite espèce se sont trouvés dans ce cas. La tige est mince, légèrement ondulée, transparente. La racine est pivotante. La substance médullaire ne paraît pas circonscrite dans un canal ou du moins celui-ci est peu marqué. Le sommet se termine par un mouchet assez volumineux de membranes allongées.

Je ne terminerai pas sans mentionner une observation qui me parait avoir une certaine valeur pour les recherches de médecine légale. Tous ces poils ont été examinés sans contact avec l'eau. Lorsqu'on les soumet au microscope, plongés dans ce milieu, ils changent d'apparence.

Ainsi le poil de veau acquiert une certaine transparence dans toutes ses parties. La bulbe ne conserve d'opacité que dans les bords. Dans la tige on voit distinctement une espèce de canal ou de matière médullaire occupant les deux tiers de l'épaisseur du poil, interrompue de place en place ainsi que des plaques opaques plus ou moins longues et larges.

Le poil d'ânesse, d'une opacité complète lorsqu'il est sec, prend de la transparence lorsqu'on l'examine dans l'eau. La racine reste opaque tandis que les radicules deviennent transparentes. Il en est de même du poil à partir du collet. On aperçoit la matière médullaire sous forme nuageuse remplissant la tige d'un bout à l'autre, dans presque toute son épaisseur. Deux lignes très-étroites et douées d'une grande transparence font ressortir les limites de cette espèce de canal médullaire. A de grandes distances des masses de largeur et de longueur variées, parfaitement opaques, en occupent le diamètre tout entier.

Ces exemples suffisent pour montrer que la plupart des caractères qui servent à distinguer les poils à l'état sec disparaissent en présence de l'eau. Il y a bien cependant des différences notables à observer, entr'autres dans la forme du réseau qui enveloppe les tiges, mais elles sont plus difficiles à saisir et exigeraient un nouvel examen. Par une dessication lente ces poils ont repris exactement les mêmes apparences qu'ils avaient lorsqu'ils ont été examinés et décrits. Il est donc nécessaire, pour n'être pas conduit à des conclusions erronées, d'éviter la transparence momentanée que l'eau donne aux poils les plus opaques, et d'avoir soin de les ramener à leur état ordinaire en les laissant sécher.

#### CONCLUSIONS.

On ne trouve, ni dans la forme des bulbes, ni dans les ramifications épidermiques de la tige, ni dans sa grosseur, un caractère qui distingue positivement les poils de l'homme de ceux des animaux.


Quoique la transparence soit générale dans les poils humains, à quelque partie du corps qu'ils appartiennent, tandis qu'elle manque complétement dans un grand nombre d'animaux et qu'elle n'est que partielle dans quelques autres, tels que la chèvre et le blaireau, ces différences ne sont pas absolues au point d'en pouvoir tirer des conclusions rigoureuses. En effet le poil du chien-loup approche beaucoup de la transparence des poils humains et sa tige est moins conique, terminée par une pointe moins effilée que celle de la plupart des poils d'autres animaux. Le poil de cochon qui est transparent et cylindrique comme les che-

veux de l'homme, est cependant raide et a son sommet rameux, caractères qui peuvent servir à le reconnaître.

La forme assez généralement conique des poils d'animaux, de la base à la pointe, peut être employée utilement pour les distinguer des cheveux, dont la forme est cylindrique. Mais ce caractère manque dans les poils qui sont tronqués naturellement ou par accident et il ne peut avoir de valeur que dans l'examen d'organes entiers.

La difficulté est beaucoup augmentée lorsqu'on est appelé à prononcer sur des fragments de poils ou de cheveux, sans racines et dépourvus de leurs sommets, lorsqu'il faut décider, par exemple, entre des cheveux et certaines parties transparentes des poils de chèvre ou de blaireau. Il est nécessaire dans ce cas d'utiliser les moindres différences et de multiplier les comparaisons. Ces considérations feront comprendre comment j'ai été entraîné à ces études minutieuses et combien ce travail eût été facilité si j'avais eu dès l'abord à ma disposition les matériaux que j'ai recueillis.





Cheveux et poils.



# RECHERCHES

SUR LA

# CONDUCTIBILITÉ DES MINÉRAUX

# POUR L'ÉLECTRICITÉ VOLTAIQUE,

PAR

#### M. ÉLIE WARTMANN.

Professeur de Physique à l'Académie de Genève.

(Lues à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genèvo, dans la séance générale du 20 Novembre 1851.)

La conductibilité des minéraux pour l'électricité est à peine mentionnée dans nos meilleurs traités. Haüy remarque que les cristaux électrisés par frottement, et mis en contact avec un corps métallique non isolé, perdent plus ou moins vite le fluide dont ils étaient chargés '. D'après cela, il les groupe en trois classes, suivant leur plus ou moins de faculté conservatrice de l'électricité. La première classe est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité de Minéralogie, tome I, page 195; seconde édition, 1822.

TOME XIII, 1<sup>re</sup> PARTIE.

26

surtout représentée par le spath d'Islande et la topaze incolore, la deuxième par le succin, et la dernière par le cristal de roche. Plus loin, dans un tableau du règne minéral considéré sous le rapport de l'électricité produite par le frottement, il établit quatre subdivisions en combinant la transparence et la coloration des diverses espèces avec leur plus ou moins de conductibilité <sup>1</sup>.

M. Necker observe que la distinction entre les corps conducteurs et les corps isolants correspond assez exactement avec les deux grandes et principales divisions naturelles des minéraux. « En effet, dit-il, les minéraux métallophanes qui ne sont formés que de substances combustibles sans aucun principe combureur, qui sont essentiellement opaques, sont tous conducteurs de l'électricité, tandis que les minéraux lithophanes qui contiennent tous, dans leur composition, quelque principe combureur, qui n'ont point l'aspect métallique et qui sont essentiellement translucides, sont tous des corps isolants. Entre ces deux grandes divisions où se trouve comprise la portion, de beaucoup la plus considérable, des espèces et des genres inorganiques, paraît un petit groupe d'êtres participant à la fois aux qualités physiques de ces deux grandes classes; ce sont les minéraux amphiphanes qui comprennent en même temps des sulfures et des oxydes métalliques dans lesquels la translucidité et l'éclat métallique se trouvent réunis sur le même individu. Dans une telle classe, les individus dans lesquels l'éclat métallique et l'opacité do-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité de Minéralogie, tome I, page 251.

minent, sont conducteurs, ceux dans lesquels c'est au contraire l'aspect lithoïde et la translucidité, sont isolants '».

Si la conductibilité n'est pas, pour le minéralogiste, un caractère essentiel de classification, elle s'offre au physicien comme une propriété intéressante à divers égards. Les relations qui peuvent exister entre la transmission de la lumière ou de la chaleur et celle de l'électricité à travers un même cristal, dans des directions diverses, constituent un moyen précieux pour étudier sa disposition moléculaire et pour avancer la théorie des fluides impondérables. Au point de vue des applications, les usages industriels de l'électricité rendent chaque jour plus nécessaire le connaissance des différents degrés de conductibilité des substances inorganiques.

L'étude expérimentale de la conductibilité a déjà occupé plusieurs physiciens. Sir II. Davy, au commencement du siècle 2, et, plus tard, M. Faraday l'ont envisagée surtout chez les produits minéraux artificiels 3. Pelletier publia, en 1812, une thèse inaugurale sur la valeur des caractères physiques des minéraux, dans laquelle il examina le temps variable nécessaire à chacun d'eux pour décharger une bouteille de Leyde 3. Il les distingua en trois classes, les conducteurs, les demi-conducteurs qui exigent un temps appréciable pour enlever le fluide, et enfin les isolants.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Règne minéral ramené aux méthodes de l'histoire naturelle, t. 1, p. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal of the Royal Institution of Great Britain, 1802, page 53.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Experimental Researches in Electricity, quatrième série; Phil. Trans. 1835, §§ 380 et suiv.

<sup>4</sup> GILBERT'S, Annalen der Physik, tome XVI, page 198; Leipzig 1814.

En 1829, P. Erman découvrit que plusieurs minéraux vitreux, la marékanite, la perlite de Cap de Gate, la plupart des obsidiennes, diverses laves, la dichroïte et quelques autres cristaux jouissent de la propriété très-remarquable de perdre leur conductibilité par une augmentation de température ! Au-dessous de 19°C, ils conduisent l'électricité presque aussi bien qu'un métal; mais, au-dessus de cette limite, ils tendent graduellement à devenir isolants, et le sont déjà à 37°,5. Cette différence ne peut s'expliquer par l'intervention d'une couche d'humidité que la chaleur ferait disparaître. Des marékanites et des dichroïtes placées, durant plusieurs jours, dans un vase dont le fond était occupé par de l'acide sulfurique concentré, se sont montrées aussi conductrices à l'électromètre que celles qui avaient été abandonnées dans la chambre : échauffées au-dessus de l'acide, elles sont devenues, comme les autres, parfaitement isolantes.

L'année suivante, M. R.-W. Fox occupé de recherches sur les courants électriques qui existent dans les mines, fit quelques expériences sur la conductibilité d'une vingtaine de minéraux métalliques . Il constata que tous ceux qui conduisent l'électricité galvanique se comportent de même avec l'électricité ordinaire. Les sulfures de zinc et d'antimoine lui parurent plus isolants pour cette dernière que les oxydes de ces métaux. Il conclut de son travail qu'il n'existe pas de re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Denkschriften der Berliner Akademie pour 1829; — Pogg. Ann., tome XXV, page 607; 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philos. Transact. 1850, page 402.

lations constantes entre la nature chimique des espèces minérales et leurs propriétés électriques.

Deux savants hanovriens, MM. J.-F. Hausmann et F.-C. Henrici, ont ensuite communiqué à la neuvième session de la Société des Amis des Mines, séante à Gættingen en 1834, des recherches sur la conductibilité des minéraux plus complètes que les précédentes; publiés dans un recueil spécial et peu répandu , leurs résultats ne m'ont été connus qu'après l'achèvement de mes propres expériences. Ces physiciens ont employé une méthode semblable à celle de Pelletier. Ils plaçaient l'échantillon à examiner dans l'arc de décharge d'une bouteille de Leyde, électrisée chaque fois par vingt tours de roue d'une machine à cylindre de médiocre puissance. Cet échantillon était serré entre les extrémités de deux fils de laiton épais, verticaux, dont l'un communiquait directement avec l'armature extérieure de la bouteille, tandis qu'on touchait l'autre avec le bouton d'un excitateur mis en relation avec l'armature intérieure. Après chaque contact, on examinait si la décharge avait été complète ou partielle. Dans ce dernier cas, on comparait l'intensité de l'étincelle résidu avec celle de l'autre. On répétait aussi l'expérience en maintenant le circuit fermé plus ou moins longtemps; puis, après sa rupture, on recherchait si la bouteille avait conservé du fluide. Enfin, quand il s'agissait de minéraux de petites dimensions, on s'efforçait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Studien des Gættingischen Vereins bergmænnischer Freunde, tome IV, page 217; Göttingen, 1858.

d'empêcher l'étincelle de jaillir extérieurement d'un conducteur à l'autre et on multipliait les épreuves.

C'est surtout dans le cas, assez fréquent, où la longueur du cristal n'est pas grande que l'emploi de l'électricité de tension offre le plus d'incertitude. Le moyen de s'en préserver consiste à faire usage, comme M. Fox, d'un courant voltaïque dans le circuit duquel on intercale un bon galvanomètre. Telle est la méthode que j'ai choisie.

Si le minéral paraissait isolant, on augmentait l'intensité du courant jusqu'à se servir d'une pile formée de dix grands couples de Daniell. Dans le cas contraire, on employait un délicat rhéomètre construit par M. Ruhmkorff, en modérant à volonté le courant à l'aide d'un rhéostat.

La pureté des minéraux a une très-grande influence sur leur conductibilité. J'ai donc employé, toutes les fois que cela a été possible, des cristaux bien déterminés. Un grand nombre des échantillons que j'ai examinés appartiennent à notre Musée, et ont été mis obligeamment à ma disposition par M. le professeur Marignac. D'autres proviennent de ma collection particulière; je les ai désignés par l'initiale W. Quelques-uns m'ont été prêtés par notre collègue, M. Etienne Melly; je suis heureux de le remercier ici de sa complaisance. Toutes les expériences ont été faites en hiver, dans une salle dont la température variait de 14° à 17°C, limites entre lesquelles la conductibilité n'est pas sensiblement altérée. Chaque épreuve a été répétée à diverses reprises et sur plusieurs échantillons dont les surfaces avaient été préalablement nettoyées avec soin.

Le tableau qu'on trouvera plus loin renferme l'énumération de toutes les espèces que j'ai examinées, d'après l'ordre méthodique adopté par M. Dufrénoy le la permet de découvrir facilement les lacunes qui demeurent à combler. J'ai ajouté en regard, les résultats obtenus par MM. Hausmann, Henrici, Pelletier et Fox, et en note ceux de divers autres physiciens, ainsi que les observations que j'ai faites sur quelques cristaux avec l'électricité de tension.

Sur les 550 espèces indiquées au tableau, il en est 319 que j'ai soumises à des essais directs. MM. Hausmann et Henrici n'en ont étudié que 103, Pelletier que 74 (dont il ne mentionne spécialement que 44) et M. Fox que 25 (dont il ne désigne que 21). Parmi ces 519 espèces, il en est 252 d'isolantes. Le rapport des minéraux conducteurs aux non conducteurs est donc approximativement de un à quatre.

La comparaison des résultats de mes expériences avec celles de mes devanciers montre une coïncidence générale très-satisfaisante. Toutefois elle n'est pas plus complète qu'entre les observations de Pelletier et celles de MM. Hausmann et Henrici <sup>2</sup>. Les causes auxquelles on doit attribuer ces divergences sont la variété de structure résultant des différences de localité, et sans doute aussi le mode de propagation de l'électricité de courant qui n'est pas identique avec celui de l'électricité de tension.

L'influence de la variété de structure a été mise en évi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité de Minéralogie, tome II, page 24; Paris 1845.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les différences sont relatives au réalgar et au plomb carbonaté.

dence par les recherches de M. Riess sur la différence de conductibilité de l'antimoine sulfuré, suivant qu'il est natif ou qu'il a été fondu !. Ces observations ont été confirmées par les travaux de M. Faraday, et plus récemment par MM. Karsten et Munck af Rosenschold qui ont trouvé, entre autres, que les cristaux naturels de réalgar provenant de Nagy-Ag sont bons conducteurs, tandis que M. Hausmann range cette substance parmi les demi-conducteurs et Pelletier parmi les isolants. Le zinc sulfuré en morceaux ou en poudre conduit l'électricité ou est isolant, selon qu'il a été préparé par voie sèche ou par voie humide. Cela n'expliquerait-il pas la divergence de résultats de MM. Hausmann et Fox relativement à la blende? Le mercure sulfuré noir et très-pur conduit fort bien, tandis que le cinabre est un isolant complet. D'autres sulfures offrent les mêmes caractères.

La diversité de propagation de l'électricité, suivant qu'elle émane d'une machine ordinaire ou d'une pile, ressort d'une foule d'expériences. MM. Hausmann et Henrici signalent comme demi-conducteurs un grand nombre de substances, telles que les chaux carbonatée et sulfatée, qui isolent absolument le courant. Or, j'ai répété la plupart de leurs expériences et les ai trouvées correctes. Cette remarque suffit

<sup>1</sup> Pogg. Ann., tome XLIII, page 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exp. Res. quatrième série, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pogg. Ann., tome LXXI, page 241. — L'orpiment, quel que soit son état, est toujours très-isolant.

à expliquer quelques divergences qu'offrent leurs résultats comparés à ceux de M. Fox, ainsi que la coïncidence complète qui existe (sauf pour l'argent sulfuré) entre les miens et ceux du physicien anglais.

Il est deux faces du sujet dont l'étude serait très-intéressante, savoir, les rapports de conductibilité des minéraux non isolants, ramenés aux mêmes dimensions et placés dans des conditions identiques, et les variations de cette propriété dans le même cristal, suivant des directions diverses. Malheureusement des difficultés presque insurmontables s'opposent à cet examen. La manière dont les surfaces d'entrée et de sortie du courant sont touchées par les rhéophores augmente ou diminue du simple au double, ou au triple, la déviation du rhéomètre. J'ai fait de nombreuses tentatives au moyen d'une pince à mâchoires de platine, isolées l'une de l'autre et entre lesquelles on serrait le cristal avec une vis. Une fraction de tour de celle-ci déterminait des changements de conductibilité tels qu'aucune appréciation satisfaisante n'aurait pu se déduire d'épreuves successives. J'ai essayé d'humecter avec des liquides conducteurs ces surfaces de platine, et dans quelques cas les lectures ont été plus constantes. Mais, plus souvent, je n'ai réussi qu'à polariser diversement les mâchoires, ou à déterminer des phénomènes électro-chimiques qui voilaient le résultat désiré.

Ces obstacles deviennent plus nombreux encore dans l'examen des variations de la conductibilité à l'intérieur d'un même minéral. Les substances conductrices qui appartiennent à des systèmes autres que le régulier sont peu nombreu-

ses. Les cristaux qu'on en connaît sont presque toujours fort petits; leurs formes sont rarement simples; quelques-uns sont hémitropes et de texture peu homogène Il en est dont les faces naturelles sont terminées par une croûte isolante, quoique d'un beau poli. J'ai trouvé des cristaux d'oligiste parfaitement conducteurs, et d'autres, de même apparence et mêlés aux premiers, qui arrêtaient les courants les plus énergiques jusqu'à ce que le frottement prolongé d'un corps très-dur eût entamé leur superficie. De très-beaux cristaux d'étain oxydé se sont montrés conducteurs le long des arêtes rentrantes, ainsi que ça et là sur les faces; partout ailleurs ils isolaient. Enfin l'adhérence variable des surfaces de clivage modifie souvent de la manière la plus capricieuse les valeurs de la conductibilité. Aussi ne peut-on pas regarder comme incontestables les résultats de quelques essais faits par MM. Hausmann et Henrici qui ont trouvé, par exemple, que la malacolite conduit mieux dans le sens de l'axe de cristallisation, et le diallage parallèlement aux faces de clivage: Ces difficultés ont obligé MM. Wiedemann? et de Sénarmont 3 à recourir à la distribution superficielle de l'électricité de tension pour déterminer, d'une manière moins directe, les sens de plus grande et de moindre conductibilité.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ils déclarent, du reste, que leurs expériences ne leur ont donné aucun résultat décisif, et qu'il n'y a pas de relation genérale entre la direction de l'axe et celle de la décharge.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pogg. Ann., tome LXXVI, page 404.

<sup>3</sup> Ann. de Chim. et de Phys. mars 1850.

Les expériences auxquelles je me suis livré sur ce point s'effectuaient en faisant passer simultanément le courant d'une pile à travers deux galvanomètres de Ruhmkorff, mis d'accord à l'aide d'un rhéostat et qui ne pouvaient s'influencer réciproquement. Une pince, disposée dans le circuit de l'un d'eux, embrassait le cristal dans la direction de son axe. Une autre pince, isolée de la première et en relation avec le second galvanomètre, serrait le minéral dans des sens variables. Des épreuves multipliées ont montré que l'acerdèse conduit beaucoup mieux parallèlement à l'axe que dans une direction perpendiculaire <sup>1</sup>. Des feuillets de molybdène sulfuré du Vallais ont présenté le phénomène inverse, qui m'a paru aussi assez marqué chez quelques cristaux de fer arsenical.

Les conclusions de mon travail, semblables à divers égards à celles qu'ont formulées MM. Hausmann et Henrici, sont les suivantes:

1° Les minéraux conducteurs appartiennent aux cinq premiers types cristallins. On n'en trouve aucun parmi les douze espèces du système représenté par le prisme oblique non symétrique.

2º Les minéraux présentent tous les degrés intermédiaires entre la conductibilité parfaite et l'isolement complet.

<sup>1</sup> La conductibilité de l'acerdèse varie d'un échantillon à l'autre. Les longues faces des petits prismes accolés sont sans doute dans des conditions de contact moins intimes que les tranches perpendiculaires : de là, probablement, la différence de faculté conductrice dans les deux directions.

210 CONDUCTIBILITÉ DES MINÉRAUX POUR L'ÉLECTRICITÉ VOLTAIQUE.

- 3º Les métaux natifs et leurs alliages sont conducteurs.
- 4° Il existe parmi les oxydes métalliques de grandes différences de conductibilité. Ceux qui sont opaques et doués d'éclat l'emportent en général sur les autres. M. Necker a rappelé cette circonstance.
- 5° Les sulfures métalliques donnent lieu à une remarque semblable.
- 6° Les chlorures sont tantôt conducteurs (argent corné), tantôt isolants.
- 7º La même variété règne parmi les sels. La grande majorité d'entre eux est isolante.
- 8° L'état moléculaire détermine la conductibilité ou l'isolement d'une même substance. Le diamant isole, le graphyte conduit fort bien.
- 9° Chez les minéraux d'origine végétale, la conductibilité est d'autant meilleure que la carbonisation est plus parfaite 1.
- 10° Parmi les minéraux conducteurs qui ne cristallisent pas dans le système régulier, il en est qui présentent une conductibilité différente suivant la direction du courant rapportée à celle de l'axe de symétrie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Chryreusse a publié d'intéressantes observations sur la conductibilité des charbons, dans les Ann. de Chim. et de Phys., tome XXIX, page 440.

N. D'ORDRE.	NOM DU MINÉRAL.	LOCALITÉ.	COLLECTION.	WARTMANN.	HAUSMANN ET HENRICI.	PELLETIER.	FOX.
1		0.1	Mus.	non conducteur.		isolant.	
2	Diamant noir, opaque	Orient	W.		non cond.	id.	
3	Quartz	StGothard	W.	id.		ia.	-
4	Améthyste	Chamouni		id.	_	-	
	Opale	Oberstein	W.	id.	_		-
5	Saphirine	Grænland	Mus.	id.	-		-
6	Rutile	Tyrol	W.	id.	presq. isol.	_	_
7	Anatase *	StGothard	Mus.	id.	bon cond.	-	
8	Brookite	Tête noire	Mus.	id.	-	_	_
9	Soufre	Sicile	W.	id.	non cond.	isolant.	-
10	Arsenic natif	Schneeberg	Mus.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur	- 1
11	Réalgar **	Hongrie	Mus.	non conducteur.	pen cond.	isolant.	isolant.
12	Orpiment***	Moldavie	Mus.	id.	_	id.	_
13	Acide arsénieux	Hartz	W.	id.	-	isolant.	
14	Antimoine natif	Allemont	Mus.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur	-
15	id. sulfuré†	Puy de Dôme	W.	non conducteur.	cond. assez	_	isolant.
16	id. arsenical	Andréasberg	W.	bon conducteur.	-	-	_
17	Zinkénite		_	_	bon cond.	_	
18	Haidingérite	Braunsdorf	Mus.	bon conducteur.	_	_	-
19	Antimoine oxydé sulfuré	Hongrie	Mus.	non conducteur.	_	conduit peu	_
20	id. oxyde	Pzibran	Mus.	id.	-	_	_
21	Acide antimonieux hydraté	Corse	Mus.	id.	-		-
22	Tellure natif	Fatzebay	Mus.	bon conducteur.		conducteur	
23	id. auro-argentifère	Nagy-Ag	Mus.	id.	bon cond.	_	_
21	id. auro-plombifère	Fatzebay	Mus.	id.	id.	1 _	_
25	id. bismuthifère · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fatzebay, Saxe	Mus.	id.	1 _		
26	Mercure natif	Almaden	W.	id.	bon cond.	conductenr	
27	id. sulfuré cristallisé	Carniole	Melly	non conducteur.	peu cond.	peu cond.	isolant.
28	id. chloruré	Almaden	Mus.	id.	-	pea sonu.	-
29	Molybdène sulfuré (Wasserblei)	Vallais	W.	bon conducteur.	bon cond.		pen cond.
30	Chrôme oxydé	Saône et Loire	Mus.	non conducteur.	2011 00114.	peu cond.	peu conu.
31	Wolkenskite	Mt Jetimiczki	W.	id.		_	
32	Ammoniaque muriatée	Agnano	W.	id.	_		
33	Mascagnine	1 -	W.	id.	-	isolant.	-
34		Vésuve				id.	-
35	Potasse nitratée	Hongrie	W.	id.	_	id.	_
		Vésuve	W.		_	id.	-
1 36	Alun natif ††	StGothard	Melly	id.	-	id.	-
37	Alunite	Tolfa	W.	id.	_	-	_
38	Polyhalite	Vic	W.	id.	_		_
39	Sel gemme cristallisé	Wieliczka	W.	id.	-	isolant.	-
40	Soude nitratée	Atacama	W.	id.	-	id.	_
41	id. carbonatée	Vésuve	W.	id.	-	id.	_
			1	1	1	1	1

<sup>\*</sup> MM. Hausmann et Henrici signalent un échantillon isolant ; c'était un cristal bleu, transparent, du Brésil.

<sup>&</sup>quot; M. Faraday l'a trouvé isolant; Exp. Res., § 405. — M. Riess le déclare conducteur; Loc. cit.

<sup>...</sup> Id. ibid.

<sup>†</sup> MM. Hausmann et Henrici n'ont constaté aucune différence, suivant que la décharge était dirigée parallèlement ou perpendiculairement à l'axe †† Non conducteur de l'électricité de tension.

N. D'ORBRE.	NOM DU MINÉRAL.	LOCALITÉ.	COLLECTION.	WARTMANN.	HAUSMANN EX HENRICI.	PELLETIER.	FOX.
42	Soude prismatique	_	W.	non conducteur.	-		
43	Urao	Lagunilla	W.	id.			
44	Gay-Lussite	id	Mus.	id.	_	_	-
45	Soude sulfatée	Salzbourg	W.	id.	-	isolant.	-
46	Thenardite	Espartines	W.	id.		-	-
47	Glaubérite	Vic	Mus.	id.	-	isolant.	-
48	Soude boratée *	Toscane	Melly	id.		id.	-
49	Baryte carbonatée cristallisée	Anglesark	W.	id.			_
,50	Baryto-calcite	Alston Moor	W.	id.	_	-	
51	Baryte sulfatée (cristal et lame mince)	Traversella	W.	id.	assez bon c.	_	_
52	Strontiane carbonatée  id. sulfatée (Zölestin)		Mus.	id.			
53	id. sulfatée (Zölestin) Chaux carbonatée cristallisée **	Saxe duc., Sicile	W.	id.	conducteur très-peu c.		
54	Anthraconite	Norwège		id.	non cond.	isolant.	_
55 56	Arragonite cristallisée et amorphe	Auverg., St. Goth.	Mus.	id.	non conu.		
57	Dolomie cristallisée	StGothard	W.	id.		~~~	
58	Chaux fluatée	Mont Rose	W.	id.		isolant.	
59	id. sulfatée anhydre *** (Karstenit).	Bex, Dieuse	W.Mus.	id.	peu cond.	Isviant.	
60	id. sulfatée †	Montmartre	W.	id.	id.		_
61	id. phosphatée cristallisée	StGothard	Melly	id.	_	_	_
62	id. arséniatée	Andréasberg	W.	id.	_	_	_
63	Pyrochlore	Miask	Mus.	id.		_	_
64	Scheelin calcaire (Tungstein)	Zinnwald	Mus.	id.	_	très-pen c.	1
65	Chaux nitratée (sèche)	Lausanne	W.	id.	-	isolant.	- 1
66	id- muriatée (sèche)	Dieuze	w.	id.	-	id.	- 1
67	Périclase	Vésuve	Mus.	id.		_	- 1
68	Magnésie hydratée · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Shetland	Mus.	id.	_	_	- 1
69	Magnésite †† · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Kittschick, kaiserstuhl	W. Mel.	id.	<b> </b>		-
70	Boracite	Saxe · · · · · · · · ·	W.	id.	_		-
71	Magnésie phosphatée	Höllgraben	Mus.	id.	-	_	
72	id. sulfatée fibreuse	Espagne	Mus.	id.	-	_	
73	Gadolinite	Ytterby	Mus.	id.	_	peu cond.	
74	Corindons rouge et bleu	StGothard :	W.	id.	-		-
75	Diaspore	Oural	W.	id.	-	-	-
76	Gibsite	Massachusets	Mus.	id.			
77	Wavellite	Ecosse	W.	id.	_		
78	Childrenite	Cornouailles	Mus.	id.	_		
79	Turquoise	Meshed	W.	id.	_	_	- 1
80	Cryolithe	Grænland	W.	id.	_		-
81	Alunite	New-Haven	Mus.	id.	_		_ }
82	Alumite	Tolfa	Mus.	id.	_		
		·		,			

<sup>\*</sup> Est aussi isolante pour l'électricité de tension.

<sup>&</sup>quot; Isole, quelle que soit la position de l'axe.

<sup>···</sup> Suivant M. Hausmann, la faible conductibilité serait moindre dans la direction du clivage le plus net que dans le sens perpendiculaire.

<sup>🕇</sup> Même remarque que pour l'espèce précédente.

<sup>††</sup> Décharge lentement l'étincelle.

N. D'ORDRE.	NOM DU MINÉRAL.	LOCALITÉ.	COLLECTION.	WARTMANN.	HAUSMANN ET HENRICI.	PELLETIER.	FOX.
83	Monazite	Mt Ilmen	Mus.	non conducteur.	_		
84	Cérite	Suède	W.	id.	_		
85	Cerine	Suède	W.	id.	_	très-peu c.	_
86	Orthite	Fimbo	Mus.	id.			_
87	Manganèse bisulfuré (Hauérite)	Kalinka	Mus.	id.		_	_
88	id. sulfuré		_	_	_	isolant.	isolant.
89	Hausmannite	Thuringe	Mus.	non conducteur.	conducteur.	_	_
90	Braunite (Graubraunstein) *	StMarcel	Mus.	id.	id.	_	
91	Pyrolusite	Calderon	W.	bon conducteur.	id.		conducteur
92	Acerdèse	Ilfeld	Mus.	id.			[
93	Manganèse peroxydé hydraté	Klaperude	Mus.	id.	bon cond.	bon cond.	
94	Psilomélane	La Romanèche	W.	id.	id.	_	_
95	Hureaulite	Chanteloube	Mus.	non conducteur.	-	_	_
96	Hétérozite	id.	Mus.	id,	_	_	_
97	Triphylline	Rabenstein	Mus.	id.	-	_	
08	Manganèse phosphaté ferrifère **	_	<u>.</u>	_	_	conducteur'	un peu c.
39	id. silicaté rose	Sibérie	Mus.	non conducteur.		peu cond.	
00	Fer natif	id	w.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur	
)1	id. sulfuré ***	Brosso	w.	id.	id.	id.	conductenr
)2	id. id. blanc	Piémont	w.	id.	esa ducteur.	_	_
)3	id. id. magnétique †	Bodenmais	w.	id.	bon cond.		_
)4	id. arsenical ††	Altenberg	W.	id.	id.	bon cond.	conducteur
)5	id. oxydulé (aimant) †††	Aoste	W.	id.	id.	_	_ 1
)6	Franklinite	New-Jersey	Mus.	non conducteur.	_	_	_
17	Fer oligiste	Campo Lago	W.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur	_ !
18	· Hématite	Elbe	W.	non conducteur.			- ;
19	Fer hydroxydé (Brauneisenstein)			_	conducteur.	-	_
0	Limonite (Ochriger Gelbeisenstein)	Jura	w.	très-pen cond.	id.	_	- 1
1	Fer carbonaté spathique	Auvergne	W.	non conducteur.	_	-	_
2	id. chrômé	Maryland	Mus.	id.	très-peu c.		
3	id., titané	Hongrie	w.	bon conducteur.	bon cond.	peu cond.	_
_ 4	Tantalite	Kimito	Mus.	non conducteur.			
5	Baïérine	Chanteloube	Mus.	id.	bon cond.	_	
. 16	Wolfram	Schlackenwald .	Mus.	id.	peu cond.	peu cond.	
_ 17	Fer phosphate	Cornouailles	Mus.	id.	-	_	_
_ 13	Dufrénite	Elleresreuth	Mus.	id.	_	_	
_1)	Delvauxine	Liège	Mus.	id.		_	_
_1)	Kakoxène	Zwirn	Mus.	id.	_		
JI -	Pharmacosidérite	Cornouailles	Mus.	id.	-	_	-
12	Arséniosidérite	La Romanèche .	Mus.	id.	_	-	-
	* Column NIV Harmon at The Column A (Chillip)						

<sup>\*</sup> Suivant MM. Hausmann et Henrici, la conductibilité de la braunite est la même, quelle que soit la direction de l'axe du cristal.

<sup>\*\*</sup> Sel impur, artificiel (?).

<sup>\*\*\*</sup> Cristal épais de 0°,15. — M. Faraday a constaté que sa conductibilité ne varie pas avec la température ; Exp. Res., § 440. — M. Fox a trouvé cette conductibilité plus grande pour l'électricité ordinaire que pour le courant voltaïque. Loc. cit., page 402.

<sup>†</sup> MM. Hausmann et Henrici n'ont trouvé aucune différence avec les diverses positions de l'axe.

<sup>††</sup> Décharge bien la bouteille de Leyde.

<sup>†††</sup> Le courant franchit facilement un cristel dodécaèdre, épais de 0=.14.

N. D'ORDRE.	NOM DU MINÉRAL.	LOCALITÉ.	COLLECTION.	WARTMANN.	HAUSMANN ET HENRICI.	PELLETIER.	POX.
123	Botryogène	Fahlun	Mus	non conducteur.		_	
124	Pittizite	Saxe	Mus.	id.	_	_	_
125	Cohalt arsenical	Saalfeld	11.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur	conducteur
126	id. gris (Kobaltglanz)	Tunaberg	W.	id.	id.	id.	-
127	id. oxydé noir (Erdkobalt)	Schneeberg	Mus.	id.	id.	peu cond.	
128	id. arséniaté cristallisé	id	Mus.	non conducteur.	_	_	_
129	Nickel arsenical	Vallais	22."	bon conducteur.	bon cond.	conducteur	conducteur
130	id. arsénio-sulfuré · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ebersdorf, Tunaberg.	Mus.	id.	id.		
131	id. antimonié sulfuré	Andréasberg	W.	id.	id.	_	
132	Zinc sulfuré translucide	-	Mus.	nou conducteur.	très-peu c.		isolant.
133	id. carbonaté	Altenberg	Mus.	id.		_	_
134	id. silicaté	Vieille Mont ., Carinthie	Mus.	conducteur.	-	-	
135	id. oxydé · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sparta	Mus.	id.	_	bon cond.	
136	id. sulfaté *	Ecosse	Melly	id.	-	_	_
137	Plomb sulfuré	Angleterre	W.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur	conducten
138	id. id. noir	Huelgoat	W.	id.	_	_	
139	id. sélénié	Hartz	Mus.	id.	peu cond.	_	- 1
140	Dufrénoysite	Binnen	Mus.	non conducteur,	_	_	
141	Bournonite	Hartz	Mus.	id.	très-peu c.	peu cond.	-
142	Plomb oxydé rouge (Mennige) **	Vivarais	Melly	peu conducteur.	conducteur	id.	-
143	id. carbonaté (Bleispath) ***	Zellerfeld	W.	non conducteur.	non cond.	conducteur	
144	Calédonite cristallisée transparente †	Leadhills	Mus.	id.	_	_	
145	Plomb sulfaté	Sardaigne	Mus.	id.		_	- 1
146	id. phosphate	Sibérie	W.	id.	_	_	
147	id. arséniaté	Cornouailles	Mus.	id.	_		-
148	Cotunnite	Vésuve	Mus.	id.	_	_	- 1
149	Plomb vanadiaté	Leadhills	Mus.	id.			
150	id chromaté cristallisé	Bérésow	W.	id.	_	_	-0
151	Mélanochroïte	id	Mus.	id.	- 1	_	
152	Plomb chrômé (Vauquelinite)	id	Mus	id.	_		- 1
153	id. molybdat醆·····	Bleiberg	Melly	id.	_	_	
151	id. tungstatė	Zinnwald	Mus.	id.	_	_	- 1
155	id. gomme	Huelgoat	Mus.	id.	-	-	_ 1
156	Etain sulfuré	SteAgnės	Mus.	id.	_	_	très-peu
157	id. oxydé ††† · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Saxe, Cornouailles Bohème	W Musée,	bon conducteur.	bon cond.	bon cond.	conducte + 1
158	Bismuth natif	Wittichen	W.	id.	id.	id.	
159	id sulfuré ++++	Bastnaës	Mus.	peu conducteur.	conducteur	_	isolan
160	id. id. cuprifère	Wittichen	Mus.	bon conducteur.	id.		id.
161	id. id. plumbo-cuprifère	Ekatelimbourg .	Mus.	id.	_		_
162	id. arsenical (et Cobalt arséniaté).	Saxe	W.	id.	_	_	-110

<sup>\*</sup> Ne laisse point passer l'étincelle.

<sup>\*\*</sup> Conduit un peu l'étincelle. La litharge artificielle est aussi un peu conductrice du courant.

<sup>\*\*\*</sup> Le minéral indiqué comme conducteur par Pelletier est le weisses Bleioxid (naturl. Bleiweiss).

<sup>†</sup> Ne conduit pas l'étincelle.

<sup>††</sup> Décharge assez bien la bouteille de Leyde sous une épaisseur de 0=.03.

<sup>†††</sup> Suivant M. Fox, l'étain oxydé conduit mieux l'électricité de tension que celle de la pile. Loc. cit., page 403.

<sup>††††</sup> M. Fox a trouvé que le bismuth sulfuré est un peu conducteur de l'étincelle. Ibid.

_												
N. D'ORDRE.	NOM DU MINÉRAL.	LOCALITÉ.	COLLECTION.	WARTMANN.	HAUSMANN ET HENRICI.	PELLETIER.	FOX.					
163	Bismuth oxydé	Saxe	Mus.	non conducteur.								
164	Urane oxydulé (Pechuran)	Bohême	W.	peu conducteur.	bon cond.	conductenr						
165	Chalkolite (Uranglimmer)	Cornouailles	Musée.	non conducteur.		c. à peine.						
166	Uranite	StYrieix.,	W.	id.		c. a perue.						
167	Cuivre natif	Sibérie	W.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur						
168	id. sulfure	SteAgnès	W.	id.	id.	bon cond.	conductenr					
169	id. id. argentifère	Ross-Island	Mus.	id.		Boll colla.	сопинетент					
170	Covelline (Kupferindia)	Vésuve	Mus.		bon cond.							
171	Phillipsite (Buntkupfererz) *	Saxe	Mus.	bon conducteur.	id.		conducteur					
172	Cuivre pyriteux (Kupferkies) **	Freiberg	W.	id.	id.	bon cond.	· id.					
173	id. gris cristallisé (Kupferfahlerz).	Servoz		peu conducteur.	conducteur.	Don cond.	id.					
174	Tennantite	Cornouailles	Mus.	bon conducteur.			id.					
175		Chessy	Mus.	non conducteur.	peu cond.		1a.					
176	Cuivre oxydule (Kupferroth)		W.	id.	peu cona.	peu cond.	_					
177	id. oxydé noirid. carbonaté bleu (Kupferlasur)	Siegen	Mus.		non cond.	_						
178		Chessy	W.	id.	ноп сопа.							
179		Sibérie	W.	id.								
180		Chili, Pérou	Mus.	id.								
181	id. phosphaté	Nijni Tagilsk	Mus.	id.	_	_						
182	id. arséniaté prismatique	Cornouailles	Mus.	id.	_	_	_					
183	id. id. micacé (Erinite)	Libethen	Mus.	id.	_		_					
184	Liroconite	Cornouailles	Mus.	id.			_					
185	Aphanèse	id	Mus.	id.	_	_	_					
	Euchroïte	Hongrie	Mus.	id.	_	_	-					
186	Cuivre arsénié	Condorrow	Mus.	bon conducteur.	_	_						
187	Dioptase	Kirghiz	Mus.	non conducteur,	. —		'					
188	Argent natif	Saxe	W.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur						
189	id. amalgamé	Carniole	W.	id.		id.	_					
190	id. antimonial ***	Andréasberg	Mus.	id.	bon cond.	—	_					
191	id. sulfuré (Glaserz) †	Freiberg	W.,	conducteur.	id.	conducteur	isolant.					
192	id. id. fragile (Schwartzgültigerz)		_	_	id.	id.	_					
193	id. id. (Polybasite)	Freiberg	W.	non conducteur.	_	-	-					
194	id. id. antimonio-cuprifère		-		bon cond.	_	, —					
195	id. antim. sulf. (Dunkles Rothgültigerez)	Himmelsfurth	_	conducteur.	id.	_	_					
196	Myargirite ††	Braunsdorf	W.	peu conducteur.	<i></i>	_	-					
197	Proustite ††† (lichtes Rothgültigerz)	-	—	_	bon cond.	-	-					
198	Argent chloruré ††††	Transylvanie	Mus.	bon conducteur.	_	peu cond.	-					
199	Or natif	Méxique	11.	id.	bon cond.	conducteur	_					
300	Platine natif (Polyxen de Hausmann)	Oural	W.	id.	id.	id.	- 1					
201	Iridosmine	id	W.	id.		_						
202	Sillimanite	Connecticut	Mus.	non conducteur.	_	_	-					
503	Disthène (Cyanit)	StGothard	W.	id.	conducteur.	_	<b>—</b> ,					
304	Andalousite	Tyrol	W.	id.		-	1					
	* Échantillon de 0°.09 de longuer. * M. Farga	day a constaté que le Clu	1h									

<sup>\*</sup> Échantillon de 0a.09 de longuer.

<sup>\*\*</sup> M. Faraday a constaté que la Chalkopyrite conduit aussi bien à chaud qu'à froid; Exp. Res., § 440.

<sup>\*\*\*</sup> Échantillon de 0=.032 d'épaisseur. † M. Faraday a constaté que cette substance conduit mieux à chaud qu'à froid ; Exp. Res., § 438. — M. Fox l'a trouvée un peu conductrice de l'électricité de tension. †† Id. ibíd.

<sup>†††</sup> Même remarque sur ce minéral qu'il nomme Ruby Silver ore ; Exp. Res., § 438.

<sup>++++</sup> Échantillon épais de 0m.017.

N. D'ORDRE.	NOM DU MINÉRAL.	LOCALITÉ.	COLLECTION.	WARTMANN.	HAUSMANN ET HENRICI.	PELLETIER.	FOX.
205	Staurotide	St'-Gothard	W.	non conducteur.	peu cond.		
206	Halloysite	Atzberg	Mus.	id.	_		_
207	Argile	Salève	W.	id.			
208	Gilbertite	StJust	Mus.	id.	_		
209	Allophane *	Wolfach	Melly	id.			
210	Savon de montagne	Dauphiné	W.	id.	_		
211	Grenat grossulaire	Piémont	W.	id.	peu cond.		
212	id. almandin	Fahlum	W.	id.	id.		
213	id. mélanite (Allochroïte)	Orient	W.	id.	conducteur	_	_
214	id. chromifère (Ouwarovite)	Bisserks	Mus.	id.	-		
215	id. manganésien_(Pyrop)	Grænland	-	_	peu cond.		_
216	Idocrase	Vésuve	w.	non conducteur.	id.		
217	Epidote (Strahlstein) **	Vallais	w.	peu conducteur.	id.		_
218	id. manganésifère	StMarcel	W.	non conducteur.	_		_
219	Paranthine ***	Norwège	Melly	id.	_	-	_
220	Gehlénite	Monzoli	Mus.	id.	_	- 1	_
221	Dichroïte (Cordiérite)	Finlande	Mus.	id.	_	-	_
222	Néphrite	Chine	Mus.	id.	-		-
223	Sordawalite (Fer résinite de Dufrénoy) .	Bodenmais	Mus.	id.	-		
224	Aigue-marine (mince lame)	Brésil	W.	id.	-		
225	Emeraude cristallisée	Sibérie	W.	id.	_	_	
226	Euclase	Brésil	Mus.	id.	-		
227	Phénakite	Takawaïa	Mus.	id.		_	
228	Feldspath	StGothard	W.	.id.	bon cond.	-	
229	Murchisonite	Dawlish	Mus.	id.		-	_
230	Albite (cristallisée et granulaire)	Brodbo	W.	id.		- }	_
231	Saussurite	Genève	W-	id.	-		
232	Labradorite	Labrador	W.	id.	-		-
233	Pétalite	Utöe	W.	id.			-
234	Oligoklase	Suède	Mus.	id.	-	-	
235	Spodumène (Triphane)	Utöe	W.	id.	-	-	-
236	Ryacolite	-	Mus.	- id.	-		;
237	Anorthite	Somma	Mus.	id.	_		
238	Pétrosilex	Nantes	Mus.	id.			1
239	Adinole	Salberg	Mus.	id.	-		1
240	Phonolite	Sanadoire	Mus.	id.	-	-	
241	Rétinite	Meissen	Mus.	id.		- [	- :
242	Perlite	Hongrie	Mus.	id.	-		'
243	Obsidienne	Vésuve · · · · · ·	W.	id.	- [	-	- ;
214	Ponce	Lipari	W.	id.	-	*****	- 1
245	Pinite †	StPardoux	W.	id.	conducteur	-	-
246	Gigantholite	_	Mus.	id.	-	-	
247	Gieseckite	Grænland	Mus.	id.	-		- 1

<sup>\*</sup> Conduit extrèmement peu l'étincelle. \*\* Dans le sens de l'axe. \*\*\* L'étincelle se décharge à travers un cristal épais de 0=.046. † MM. Hausmann et Henrici ont constaté une faible conductibilité dans le sens de l'axe.

N. D'ORDRB.	NOM DU MINÉRAL.	LOCALITÉ. OTILADOL		WARTMANN.	HAUSMANN ET HENRICI.	PELLETIER.	FOX.
248	Amphigène	Vésuve	W.	non conducteur.	_		
249	Sodalite (bleue)	Miask, Vésuve	Mus.	id.			
250	Cancrinite	Sibérie	Mus.	id.	_		
251	Davyne	Vésuve	Mus.	id.	_		
252	Néphéline	id.	W.	id.	_		
253	Beudantite	Hornhausen	Mus.	id.			_
254	Eléolite	Norwège	Mus.	id.	-		_
255	Dipyre	Mauléon	W.	id.	_		
256	Apophyllite	Andréasberg	W.	id.		_	_
257	Natrolite (Mésotype)	Auvergne	· W.	id.			_
258	Stilbite	Kongsberg	Mus.	id.	_	_	_
259	Epistilbite	id.	Mus.	id.	_		
. 260	Ædelforsite	Ædelfors	Mus.	id.	_		_
261	Sphérostilbite	Faröe	Mus.	id.	_		
262	Hypostilbite	id.	Mus.	id.	_		
263	Heulandite	id	W.	id.	_		_
264	Laumonite	Huelgoat	Melly	id.		i —	- 1
265	Prehnite cristallisée	Fassa	W.	id.		_	
266	Chabasie id.	Islande	w.	id.	_	_	- !
267	Harmotome	Andréasberg	w.	id.		_	
268	Analcime (trapézoïdal)	Fassa	w.	· id.		_	_
269	Kérolite	États-Unis	Mus.	id.	_	_	
270	Karpholite *	Bohême	Melly	id.	_	_	_
271	Pyrophyllite	Oural	W.	id.	_	[	
272	Chlorite	Savoie	W.	id.	peu cond.	_	_
273	Wollastonite	Pargas	Mus.	id.	_		
274	Talc lamelleux	Aoste	w.	id.	_		-
275	id. écailleux	StBernard	W.	id.	_		_
276	Pierre ollaire	Vallais	W.	id.		_	_
277	Serpentine	Taberg	Mus.	id.			- '
278	Picrolite	Zöblitz	Mus.	id.	_		-
279	Pennine (Wasserglimmer) **	Lenz	Mus.	id.	_	_	- 1
280	Péridot	Vésuve	W.	id.		_	-
281	Batrachite	Tyrol	Mus.	id.	_	-	-
282	Thraulite (Hisingérite)	Saxe	Mus.	id.	<u> </u>	_	- 1
283	Zircon	Espagne	Mus.	id.	_	-	- 1
284	Ostranite	Brévig	Mus.	id.	-	_	_
285	Æschynite	Sibérie	Mus.	id.	_	-	
286	Œrstedite	Arendal	Mus.	id.	-	_	_
287	Thorite	Brévig	Mus.	id.	_	_	-
:88	Grammatite	Tarentaise	- W.	id.	non cond.	isolant.	-
289	Hornblende ***	StGothard	W.	id.	conducteur	conducteur.	
290	Actinote	Zillerthal	Melly	peu conducteur.	peu cond.	-	-
291	Trémolite	Vallais	W.	non conducteur.	-	-	- 1
			1	l	<u> </u>		

<sup>\*</sup> Ne conduit pas l'étincelle.

\*\* Décharge la bouteille de Leyde sans étincelle.

\*\* J'ai vériûé la faible conductibilité pour l'électricité de tension des cristaux de hornblende dans des directions quelconques.

N. D'ORDRE.	NOM DU MINÉRAL.	LOCALITÉ.	COLLECTION.	WARTMANN.	HAUSMANN ET HENRICI.	PELLETIER.	FOX.
292	Nordenskioldite	StPétersbourg	W.	non conducteur.			_
293	Amphibolite	Binnen	Mus.	id.	-	_	
294	Pyroxène (Malakolith, Augit) *	Alla	W.	· id.	conducteur		_
295	Diopside **	id	W.	: id.	non cond.		_
296	Baïkalite	Pargas	W-	id.			_
297	Hédenbergite (Coccolit) ****	Petit StBernard	W.	id.	_	-	
298	Asbeste	Mont-Blanc	W.	id.	-	-	-
299	Basalte	Auvergne	W.	id.	_	_	_
300	Diallage †	Corse	W.	· id.	conducteur		-
301	Bronzite	.—	-	-	-	ben cond.	-
302	Hypersthène †† · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	StPaul	W.	non conducteur.	pen cond.	-	_
303	Yénite †††	Elbe	W.	peu conducteur.	conducteur	_	
304	Achmite ††††	Kongsberg	Mus.	non conducteur.	bon cond.		_
305	Sismondine	StMarcel	Mus.	id.	_	_	
306	Topaze	Saxe	W.	id.	-	_	-
307	Condrodite	Pargas	W.	id.	_	-	
308	Mica à un axe (Biotite)	États-Unis	Mus.	id.	peu cond.	-	
309	Mica à deux axes \$	· Sibérie	W.	id.	id.	_	
310	Lépidolite				_	pea cond.	-
311	Datholite	Arendal	W.	non conducteur.	. —	-	_
, 312	Tourmaline (verte, transparente) \$\$	StGothard	Melly	id.	peu cond.	-	
313	Axinite cristallisée	Oisans	W.	id.	id.	_	_
314	Sphène	Pormenaz	. W.	id.	presq. isol.	presq. isol.	
315	Lapis lazuli	Sibérie	W.	id.		peu cond.	
316	Haüyne	Vésuve	Melly	id.		_	-
317	Spinelle	Auvergne	W.	id.	c. à peine.	_	
318	Pléonaste	<del>-</del> ·	W.	id.	· id.	- 1	-
319	Gahnite	Suède	Mus.	id.	conducteur	-	-
320	Cymophane	Brésil	W.	id.	_	_	_
321	Mellite	Artern	Mus.	id.			-
322	Succin	Poméranie	W.	id.	nou cond.	non cond.	îsolant.
323	Asphalte	Val Travers	W.	id.	très-peu c.	_	-
324	Rétinasphalte	Angleterre			bon cond.	-	- 1)
325	Scheererite	Halle	W.	non conducteur.		_	-
326	Graphite	Angleterre	Mus.	bon conducteur.	bon cond.	conducteur	
327	Anthracite \$\$\$	Hartz	Mus.	id.	id.	bon cond.	
328	Houille \$\$\$\$	StÉtienne	11.	non conducteur.	peu cond.	peu cond.	
329	Lignite (Pechkohle)	Meissner	W.	id.	id.		-
330	Dysodyle	Châteauneuf	W.	id.		_	

#### ERRATA ET ADDENDA.

	Au lieu de	lisez
P. 201, ligne 16,	Faraday l'ont	Faraday, l'ont
203, p 7,	précédentes ; publiés	précédentes. Publiés
205, 5 5,	aĵouté en	ajouté, en
· 205, · 6,	et en note	et, en note,
205, 13,	252	253
	euxième doit se lire :	Les différences entre mes resultats et ceux de MM. Hausmann et Henrici sont surtout
		relatives aux minéraux suivants qu'ils indiquent comme bons conducteurs et que j'ai trouvés isolants: anatase, antimoine sulfuré, baryte et strontiane sulfatées, hausmannite, braunite, limonite, batérine, disthène, allochroite, idocrase, feldspath, pinite, bornblende, malacolite, diallage, achmite, gahnite. Je range le plomb sélénié parmi les bons conducteurs, tandis qu'ils ne le placent qu'entre les demi-conducteurs. — Ces savants ne s'accordent pas avec Pelletier en ce qui concerne le réalgar et le plomb carbonaté.
206. A la note l	l ajoutez	MM. Hausmann et Henrici ont trouvé, par exemple, un cristal bleu d'anotase du Dauphiné qui était un parfait conducteur, tandis qu'un échantillon jaune du Brésd isolait presque absolument.
207, hgne 3,	pour l'argent	pour le bismuth sulfuré cuprifère et pour l'argent
: 208, s 41,	(d.,	ga
≥ 208, ± 12,	Entra .	Entin,
s 208, s 47,	conduit mieux.	conduit le mieux
» 208, » 17 et 1	8 sens de l'axe	sens perpendiculaire à l'axe
•		
Tableau 1, Nº 38	Polyhalite	Polyhalite +++ et ajoutez en note : ++++ Non conducteur de l'électricité de tension.
, 1, note ***	Id. ibid	M. Faraday, ibid.
3, N° 102	csnducteur	conducteor
. 4, Nº 134	id. silicaté	silicaté manganésifère. Dans la colonne Wartmann, au lieu de : conducteur, lisez id.
. 4, Nº 135		même colonne, au lieu de id., lisez: conducteur.
4, Nº 136		même colonne, au lieu de id., lisez : non conducteur.
. 4, X° 145	Plomb sulfaté	Plomb sulfaté ††; ajoutez dans la colonne Localité, Ecosse apres Sardaigne, et, en note : †† Ne conduit pas l'étincelle. Les trois autres notes de la même page doivent être marquées d'une † additionnelle.
s 5, N° 495	Rothgültigerez	Rothgültigerz
o 5, note '	longuer	longueur.
5, note "	Chalkopyrite	chalkopyrite
5, note ††	Id. ibid	M. Faraday, ibid.
∍ 6, N° 206	Halloysite	Halloysite ", et ajoutez comme note" : Isolante pour l'électricité de tension. Ajoutez un " à l'indication de chacune des trois notes suivantes.
, 7, N° 280		ajoutez : peu conducteur, dans la colonne Hausmann.
. 7, N° 290	Actinote .	Actinote †, et ajoutez comme note † : Un échantillon de Pargas conduit assez bien l'étincelle.
* 8, Nº 310		Ajoutez — dans la colonne Localité.
» 8, note "	trouvé une	trouvé dans une malacolite de Norwège une. Ajoutez à cette note : — Divers cris- taux de pyroxène m'ont paru isolants pour l'électricité de tension.
s 8, note §§	axes, M	axes. — M.
» 8, id	perpendiculaire	perpendiculaire;



# OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

FAITES

## A L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE

DANS L'ANNÉE 1849.

PAR

E. PLANTAMOUR,

Brofesseur d'Astronomie à l'Académie de Genive.

GENÈVE.--IMPRIMERIE DE F. RAMBOZ ET Cie.

### OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

FAITES

## A L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE

DANS L'ANNÉE 1849.

#### OBSERVATIONS FAITES A LA LUNETTE MÉRIDIENNE.

Les observations ont été suspendues encore cette année, de la fin d'Août au commencement d'Octobre, pour cause de réparations au bâtiment de l'Observatoire. J'ai fait construire au mois d'Août une mire méridienne sur la crête du mont Salève; celle dont nous avions fait usage jusqu'alors, et qui était formée par le tronc d'un sapin situé près du sommet, n'offrait pas un point de repère suffisamment précis, et malgré la précaution que nous prenions de faire élaguer de temps en temps les branches inférieures, on pouvait craindre que le tronc, sur l'axe duquel on visait, ne conservât pas rigoureusement la même position. La nouvelle mire est une pyramide en maçonnerie, surmontée d'une pierre percée d'un trou en forme de losange; cette ouverture, à travers laquelle on voit le ciel, présente un point de repère très-précis. Cette mire est, d'après la moyenne de deux cents comparaisons, de 27",45 à l'Ouest du tronc de sapin, et comme ce dernier a été trouvé de 27",04 à l'Est du méridien,

le centre de l'ouverture de la nouvelle mire est de 0",41 à l'Ouest du méridien. Dans la réduction des observations de cette année, on a encore fait usage des indications de l'ancienne mire pour calculer les demi-sommes et les demi-différences des azimuts des mires Sud et Nord et en déduire l'erreur d'axe optique et la déviation azimutale; dès l'année prochaine, les indications de la nouvelle mire Sud seront substituées à celles de l'ancienne.

Les observations faites par M. Bruderer à la lunette méridienne dans l'année 1849 (pages 1—100), sont au nombre de 3962 en ascension droite, et 3523 en déclinaison. Les étoiles observées sont au nombre de 430, dont 46 étoiles fondamentales des Éphémérides de Berlin, 257 étoiles qui se trouvent dans divers catalogues et 127 anonymes dont la position n'a pas encore été déterminée.

#### RÉDUCTION DES ASCENSIONS DROITES.

Les observations des mires donnent en moyenne, pour la demi-somme des azimuts augmentée de l'erreur d'axe optique, les valeurs suivantes :

$$\frac{A+A''}{2}+c; \frac{A+A'''}{2}+c; \frac{A+A'''}{2}+c; \frac{A+A'''}{2}+c;$$
Cercle Ouest, du 1° Janv. au 20 Mars  $-21'',49-31'',54-45'',61$ 
Cercle Est, du 20 Mars au 12 Juin  $-19,39-29,15-42,85$ 
du 18 Juin au 11 Août  $-20,08-30,30-43,74$ 
du 15 Août au 28 Sept.  $-18,92-29,23-42,29$ 
Cercle Ouest, du 28 Sept. au 9 Octob.  $-21,26-31,79-45,19$ 
du 13 Octob. au 31 Déc.  $-19,10-29,57-42,93$ 
En adoptant pour la valeur de  $\frac{A+A''}{2}-20'',26$ 
 $\frac{A+A'''}{2}-30,68$ 
 $\frac{A+A'''}{2}-30,68$ 

il résulte	pour l	la va	leur	de	$\boldsymbol{c}$	:
------------	--------	-------	------	----	------------------	---

Cercle Ouest	, du 1er	Janv.	au 20	Mars	c = -1'',30
Cercle Est,	du 20	Mars	au 12	Juin	+ 1,10
	du 18	Juin	au 11	Août	+ 0,25
	du 15	Août	au 28	Sept.	+ 1,36
Cercle Ouest	du 28	Sept.	au 9 C	octob.	- 1,17
	du 13	Octob	. au 31	Déc.	+ 1.08

La correction constante -0'',21 a été ajoutée à la valeur de c pour tenir compte de l'aberration diurne.

Les passages de  $\alpha$  et  $\delta$  de la Petite Ourse ont donné pour les valeurs de n :

Cercle Ouest	, 15 Janvier					n =	= —	5",55
	du 16 Janvier au 27 Janvier				٠			6,75
	du 30 Janvier au 8 Février.						_	9,15
	9 Février						_	7,80
	du 12 Février au 14 Février	r					_	6,75
	du 15 Mars au 20 Mars			.`	٠		_	4,80
Cercle Est,	du 20 Mars au 21 Avril		٠		٠		+	1,05
	du 24 Avril au 1er Mai						+	3,00
	du 3 Mai au 10 Mai			٠	٠		+	5,70
	du 12 Mai au 19 Mai			٠			+	2,25
	du 23 Mai au 27 Mai						+	4,20
	du 28 Mai au 8 Juin						+	6,45
	du 17 Juin au 18 Juin				٠		+	4,50
	du 20 Juin au 21 Juin						+	5,70
	du 22 Juin au 4 Juillet			٠			+	7,20
	du 5 Juillet au 18 Juillet .			٠			+	5,55
	du 20 Juillet au 28 Juillet .						+	4,05
	du 31 Juillet au 17 Août						+	1,95
	du 21 Août au 29 Août						_	1,20

Le 9 Octobre on a corrigé une erreur de - 15" dans l'horizontalité de l'axe.

Cercle Ouest, du	9 Octobre au 23 Octobre		+	4",35
du	1 <sup>er</sup> Novembre au 8 Novembre .	٠		3,45
	19 Novembre		+	1,20
du	20 Novembre au 21 Novembre		_	1,05
du	28 Novembre au 29 Novembre		_	3,60
	2 Décembre			0,90
du	4 Décembre au 26 Décembre .		+	1.20

Les observations des mires donnent pour les demi-différences des azimuths des mires, augmentées de l'erreur azimutale a:

	А-	<i>-A</i> " .	A-A'''	$A - A^{W}$
	_	$\frac{1}{2} + a;$	$\frac{A-A^{\prime\prime\prime}}{2}+a;$	$\frac{}{2}+a;$
Cercle Ouest,	15 Janvier	. —13″,64	2",38	+10",80
	du 16 Jany. au 27 Jany.	- 10,61	+ 0,45	+ 13,36
	du 30 Jany. au 8 Févrie	r — 9,70		+ 13,80
	9 Février	10,56	+ 0,08	+ 13,26
	du 12 Févr. au 14 Févr	. — 12,05		+ 11,80
	du 15 Mars au 20 Mars	s — 14,46	- 4,21	+ 9,60
Cercle Est,	du 20 Mars au 21 Avri	l — 13,55	-3,56	+ 10,27
	du 24 Avril au 1er Mai	. — 12,88	- 4,58	+ 8,90
	du 3 Mai au 10 Mai	. — 13,98	- 4,12	+ 10,01
	du 12 Mai au 19 Mai .	. — 12,94	- 2,62	+ 10,30
	du 23 Mai au 27 Mai .	. — 14,43	- 4,74	+ 8,98
	du 28 Mai au 8 Juin .	. — 14,75	- 5,73	+ 8,22
	du 17 Juin au 18 Juin.	. — 14,30	<b>— 3,80</b>	+ 9,85
	du 20 Juin au 21 Juin.	15,53	- 5,56	+ 8,47
	du 22 Juin au 4 Juillet	. — 16,12	5,86	+ 7,65
	du 5 Juillet au 18 Juille	t — 15,08	- 5,30	+ 8,00
	du 20 Juillet au 28 Juille	t — .15,19	<b>— 4,71</b>	+ 8,58

En adoptant pour la valeur de 
$$\frac{A-A''}{2}$$
 — 6",87  $\frac{A-A'''}{2}$  + 3,43  $\frac{A-A^{\text{IV}}}{2}$  + 17,00

on en déduit pour la valeur de a et pour celle de m, erreur de l'instrument à l'équateur, calculée par la formule  $\frac{a}{\sin \varphi} + n \cot g$ .

Cercle Ouest	, 15 Janvier <i>a</i>	= $-6'',22$	m = -13'',93
	du 16 Janvier au 27 Janvier.	- 3,32	— 11,06
	du 30 Janvier au 8 Février.	- 3,01	— 12,93
	9 Février	- 3,57	— 12,42
	du 12 Février au 14 Février .	- 5,19	— 13,64
	du 15 Mars au 20 Mars	<b>—</b> 7,65	- 15,19
Cercle Est,	du 20 Mars au 21 Avril	- 6,82	- 3,43
	du 24 Avril au 1er Mai	- 7,48	7,46
	du 3 Mai au 10 Mai	- 7,21	<b>— 4,51</b>
	du 12 Mai au 19 Mai 4 .	- 6,17	6,38
	du 23 Mai au 27 Mai	<b>—</b> 7,89	<b>—</b> 6,90
	du 28 Mai au 8 Juin	- 8,59	- 5,71
	du 17 Juin au 18 Juin	- 7,17	<b>—</b> 5,62
	du 20 Juin au 21 Juin	- 8,77	- 6,67
	du 22 Juin au 4 Juillet	<b>—</b> 9 <b>,</b> 23	- 5,88
	du 5 Juillet au 18 Juillet	- 8,64	<b>—</b> 6,64
	du 20°Juillet au 28 Juillet	- 8,25	- 7,54

Cercle Est, du 31 Juillet au 17 Août $a=-7$ ",98	m = -9'',18
du 21 Août au 29 Août — 6,75	10,49
Cercle Ouest, du 9 Octobre au 23 Octobre. — 10,66	<b>— 10,59</b>
du 1 <sup>er</sup> Novembre au 8 Novemb. — 10,66	- 11 <b>,</b> 45
19 Novembre — 10,66	- 13 <b>,</b> 61
du 20 Novemb. au 21 Novemb. — 10,66	6 — 15,76
du 28 Novemb. au 29 Novemb. — 10,66	6 — 18,21
2 Décembre — 10,66	6 — 15,62
du 4 Décembre au 26 Décemb. — 12,65	<b>— 16,33</b>

Le tableau suivant renferme l'état de la pendule sidérale calculé pour le midi moyen de tous les jours d'observation, en tenant compte de la correction  $\frac{m}{15}$ .

État de la Pendule sidérale Arnold et Dent sur le temps sidéral, à Midi moyen.

DATE.	ÉTAT  de la  PENDULE.	MARCHE DIURNE.	DATE.	ÉTAT  de la  PENDULE.	MARCHE DIURNE.	DATE.	ÉTAT de la PENDULE.	MARCHE DIURNE.
Janvier 7 15 16 18 19 21 22 25 26 27 30 Février 1 2 3 4 5 5 7 8 9 12	+ 5°,63 + 13,08 + 13,98 + 15,62 + 16,46 + 17,95 + 20,53 + 21,23 + 22,04 + 24,65 + 26,26 + 26,26 + 27,67 + 28,29 + 30,27 + 30,96 + 31,69 + 33,62	+ 0,70 + 0,71 + 0,62 + 0,69 + 0,65 + 0,69	Février 13 14 15 16 Mars 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 31 Le 31, la pendu nettoyée; elle a Avril 6 8			Avril 11 13 18 19 22 24 25 26 27 29 30 Mai 1 2 3 4 5 10 11 12 13	+ 4°,5′ <sub>+</sub> + 4,90 + 4,5′ <sub>4</sub> + 4,13 + 2,7′ <sub>6</sub> + 1,1′ <sub>4</sub> + 0,48 - 0,2′ <sub>4</sub> - 0,88 - 2,2° <sub>9</sub> - 3,10 - 3,9′ <sub>4</sub> - 4,53 - 5,10 - 5,6° <sub>0</sub> - 6,08 - 9,03 - 9,8° <sub>2</sub> - 10,6° <sub>2</sub> - 11,6° <sub>6</sub>	- 0,57 - 0,50 - 0,48 - 0,60 - 0,79 - 0,80

DATE.	de la	ARCHE	DATE.	ÉTAT de la PENDULE.	MARCHE DIURNE.	DATE.	ÉTAT MARCHE!  de la  PENDULE.  DIURNE.
Mai 16 18 20 23 24 25 26 27 29 30 31 Juin 1 2 3 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juillet 1 2 3 4 6 7 8 9	- 14,30 - 16,27 - 18,47 - 21,60 - 22,52 - 23,40 - 24,19 - 25,08 - 26,42 - 27,69 - 28,23 - 28,77 - 29,31 - 30,83 - 31,87 - 39,09 - 39,80 - 40,76 - 41,65 - 42,38 - 45,78 - 45,78 - 45,78 - 45,78 - 45,78 - 45,78 - 45,78 - 45,78 - 46,73 - 47,57 - 48,39 - 49,32 - 50,37 - 51,42 - 52,38 - 53,32 - 55,15 - 57,25 - 57,25	05,90 0,96 1,10 1,04 0,92 0,89 0,67 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,72 0,72 0,71 0,96 0,89 0,72 0,72 0,73 0,88 0,71 0,89 0,88 0,71 0,89 0,89 0,89 0,19 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5	Juillet 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 31 Août 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 La pendate a et	- 59°,35 - 60,25 - 61,15 - 62,03 - 63,86 - 64,77 - 65,68 - 66,59 - 70,60 - 71,73 - 73,62 - 75,58 - 76,55 - 77,61 - 79,87 - 80,87 - 81,87 - 81,87 - 82,92 - 90,85 - 91,83 -	- 15,00 - 0,90 - 0,90 - 0,93 - 0,91 - 0,91 - 0,91 - 0,91 - 0,95 - 1,10 - 1,13 - 0,97 - 0,95 - 0,95 - 1,10 - 1,13 - 1,00 - 1,05 - 1,11 - 0,98 - 0,96 - 0,95 - 1,11 - 0,98 - 0,90 - 0,90 - 0,90 - 0,90 - 0,90 - 0,90 - 1,05 - 1,06		+ 14\$,90

#### RÉDUCTION DES DÉCLINAISONS.

Les lieux de l'équateur sur le cercle, déduits des observations des étoiles fondamentales, sont :

londamentales	, som .				
Cercle Ouest,	du 7 Janvier au 15 Janvier .				279°57′45″30
	16 Janvier	•	٠		49,57
	du 18 Janvier au 21 Janvier.				.46,10
	du 24 Janvier au 15 Mars.		0		48,97
	du 17 Mars au 20 Mars				50,53
Cercle Est,	du 20 Mars au 4 Avril	,			12 21 49,58
	du 13 Avril au 14 Avril				46,05
	du 18 Avril au 24 Avril			٠	50,07
	du 26 Avril au 1er Juin			٠	48,10
	2 Juin	•			22 13,80
	du 4 Juin au 20 Juin				18 36,76
	21 Juin				34,44
	du 22 Juin au 24 Juin	0			. 35,38
	25 Juin		٠	٠	32,03
	du 26 Juin au 29 Juin				32,94
	du 30 Juin au 2 Juillet,				34,54
	du 3 Juillet au 5 Juillet				32,99
	du 6 Juillet au 13 Juillet				34,70
	du 14 Juillet au 17 Juillet			٠	32,67
	du 18 Juillet au 21 Juillet			۰	34,34
	du 22 Juillet au 2 Août				<b>33,</b> 33
	du 3 Août au 6 Août	4			32,33
	du 17 Août au 21 Août				34,84
	22 Août				33,07
	du 23 Août au 24 Août				31,97

Cercle Est,	du 25	Août au	26 Ac	ût.						•	12°18′	33",52
		27 A	oût .									31,40
	du 28	Août au	30 Ac	oût								32,96
Cercle Ouest	du 9 (	Octobre :	au 12	Oct	obr	e					279 54	26,87
	du 17	Octobre	au 20	Oct	obi	e						28,58
	du 22	Octobre	au 23	Oct	obr	e						30,77
	du 30	Octobre	au 14	Nov	em	bre	<b>.</b>					29,23
	du 19	Novemb	re au :	28 N	Vov	em	bre					28,23
		29 N	ovemb	re								25,65
	du 2 I	Décembre	e au 20	6 Dé	écei	mbi	e.					33,58
La latitude	de l'Ot	servatoi	re, dé	duite	e de	e l'	obs	erv	ati	on du	Nadir	par la
réflexion des												
		15 Jan						,		46°11	158"25	
		13 Févi									57,25	
		19 Mars									56,34	
		20 Mar									57,00	
Cercle	Est.	20 Mar									62,58	
	,	25 Avr									59,00	
		24 Mai									59,25	
		26 Mai									59,80	
		5 Juin									59,73	
		19 Juin									58,14	
		22 Juin									58,61	
		29 Juin									57,92	
		21 Juil									57,54	
		16 Aoû	.t								59,74	
		25 Aoû									57,09	
Cercle	Ouest,	16 Déc									57,02	
			Ioyem						-	46°11	158"45	
		1,	10) 0111		•	•	•	•		70 11	30 40	

CALCUL DES ASCENSIONS DROITES ET DES DÉCLINAISONS MOYENNES DES ÉTOILES AU 1<sup>cr</sup> janvier 1849.

Les pages 101—123 renferment les positions moyennes des étoiles réduites au 1<sup>er</sup> Janvier 1849, au moyen des constantes données dans les Ephémérides de Berlin; on trouve à la suite de ces tableaux la comparaison des positions observées des étoiles fondamentales avec les positions tirées des mêmes Ephémérides.

#### RÉDUCTION DES OBSERVATIONS DU SOLEIL ET DES PLANÈTES.

Les pages 125—129 renferment les positions apparentes des centres du Soleil et des planètes corrigées de la parallaxe. Tous les éléments qui ont servi à la réduction de ces observations, tels que la durée du passage, le rayon du disque, la parallaxe horizontale, ont été tirés des Ephémérides de Berlin. C'est également aux positions tirées de ces Ephémérides que les positions observées ont été comparées.

#### OBSERVATIONS FAITES A L'ÉQUATORIAL.

Les pages 131—134 renferment les observations de la planète Métis que j'ai faites à l'équatorial dans l'année 1849. J'ai indiqué pour chaque comparaison avec l'étoile la différence des passages observés aux fils horaires du micromètre, ainsi que la différence en déclinaison mesurée en tours et en parties de tour de la vis micrométrique; la valeur d'un tour est de 1'22",827. Les corrections dues à l'erreur du micromètre, à la différence de réfraction et à la parallaxe sont notées à côté de chaque observation.

#### OCCULTATIONS D'ÉTOILES PAR LA LUNE.

Ces observations se trouvent à la page 135.

Observations faites à la lunette méridienne en Janvier 1849.

Sa.tor	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendale.	pour le niveau.	IÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	CTION.	du POLE.
	α Andromède γ Pégase α Baleine α Taureau ß Taureau	o. 0.42,45 o. 5.34,49 2.54.30,65 4.27.23,74 5.16.53,45	- 0,31 - 0,20 - 0,12 - 0,21 - 0,31	+ 6,97 + 6,66 + 6,65 + 6,95 + 6,91	308.13.34,7 294.18.53,5 283.28. 5,2 296.10.12,0 308.26.25,4	726,6 726,9 726,9 727,0	+ 3,8 + 3,4 + 3,2 + 2,7	+ 3,5 + 1,2 + 0,2 + 0,1	- 18,4 - 35,4 - 53,0 - 33,3 - 18,4	46,6 39,9 44,1 43,3 48,3
15	Soleil, bord 1, sup. α Andromède γ Pégase α Petite Ourse S Uranus, centre	19.48. 5,98 o. o.49,59 o. 5.41,76 i. 5.30,72 i. 9.18,27	+ 0,03 - 0,31 - 0,20 - 0,12	+ 14,22 + 14,03	259.10.28,3 308.13.34,6 294.18.54,0 8.27.29,8 286.39.33,4	733,9 733,1 733,0	+ 7,0 + 7,1 + 6,3	+ 8,0 + 6,2 + 4,6	$ \begin{array}{r} -2.12,4 \\ -18,4 \\ -35,3 \\ +52,0 \\ -47,1 \end{array} $	47,5 41,3 49,5
16	Soleil, bord 1, inf α Cassiopée α Petite Ourse S Uranus, centre α Bélier	19.52.24,06 0.32.14,24 1. 5.33,55 1. 9.22,89 1.58.55,73	+ 0,05 - 0,84 - 0,15 - 0,30	+ 15,04	258.49.11,0 335.40.21,9 8.27.31,8 286.40. 1,3 302.42.55,8	7 <sup>3</sup> 2,9 7 <sup>3</sup> 3,0 7 <sup>3</sup> 3,0 7 <sup>3</sup> 2,9	+ 5,7 + 6,1 + 6,0 + 5,8	+ 5,2 + 5,5 + 4,9 + 4,2	-2.15,9 + 9,5 + 51,9 - 47,2 - 24,9	50,2 51,5 47,0
τ8	Soleil, bord τ, sup. ζ Céphée 7 α Lézard 47 λ Pégase 32 ε Céphée	20. 0.58,58 22. 5.53,71 22.25.21,10 22.39.31,57 22.44.35,94	+ 0,05 - 0,90 - 0,68 - 0,30 - 1,22		259.45.44,9 337.25.17,3 329.28.19,8 302.44.29,4 345.22. 7,8	735,4 734,9 734,9	+ 6,8 + 7,4 + 7,4	+ 4,9 + 7,2 + 6,8	-2.10,4 + 11,3 + 3,3 - 24,6 + 19,8	
	Vénus, bord 1, centr.  a Pégase 30 Poissons  a Andromède  y Pégase	22.51.14,46 22.57.30,34 23.54.28,59 0. 0.51,97 0. 5.44,18	- 0,03 - 0,22 - 0,05 - 0,35 - 0,22	+ 16,40 + 16,58 + 16,46	271.25.27,7 294.21.59,1 273. 7.41,2 308.13.31,4 294.18.52,7	734,5 734,5 734,5	+ 7,5 + 7,4 + 7,3	+ 7,7 + 7,8 + 7,7 + 7,6 + 5,8	-1,20,0 - 35,1 -1,15,2 - 18,4 - 35,2	44,7
ı	α Petite Ourse S Uranus, centre 49 A Andromède 49 Baleine Lacaille 541 Anonyme	1. 5.32,65 1. 9.32,69 1.21,21,91 1.27,31,30 1.44.39,83 1.56. 9,66	- 0,15 - 0,61 + 0,03 + 0,16 + 0,10		8.27.29,8 286.40.54,7 326.11.26,7 263.32.16,9 248.22.26,5 255.23.20,1	735,0 735,1	+ 7,1	+ 5,8 + 5,8 + 5,6 + 5,3	+ 51,9 - 47,0 0,0 -1.49,9 -4.18,3 -2.42,6	49,5
-	A Bélier	1.58.57,42 3.34.54,58 3.42.14,06 3.46.33,75 3.58.19,98	- 0,30 + 0,05 + 0,06 + 0,08 + 0,05	+ 16,65	302.42.52,7 259.55.17,4 258.37.41,2 257.10. 7,0 259.11.55,4	735,2 735,6	+ 6,9 + 6,3	+ 5,2 + 3,7	- 24,8 -2.10,2 -2.18,5 -2.28,2 -2.14,7	44,1
	Lalande 7666 Lalande 7815 Lalande 8113	3.59.26,81 4. 3.34,34	+ 0,05 + 0,05 + 0,06		260.35.33,2 258.54.31,2				-2. 6,2 -2.16,7	

Le 7, Mire Sud-37P,83.

Le 15, Mire Sud-41P,00. Mire Nord  $B-9^{\circ}$ ,10. Mire Nord  $C-35^{\circ}$ ,43. Mire Nord  $D-66^{\circ}$ ,25. Niveau-5°,86.  $d=-22^{\circ}$ ,15. Nadir 146°9′ 43″,55.

Le 18, Mire Sud-37P, 15. Mire Nord B-12P, 95 Mire Nord C-38P, 36. Mire Nord D-68P, 34.

Observations faites à la lunette méridienne en Janvier 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BAROMÈTRE	Inté-	OMĖTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	Lalande 8312	4.44.20,69 4.52.20,94 5. 5.51,51 5. 7.34,46 5.17. 3,19 5.27.44,03 5.29.30,97 5.35.51,57 5.37. 6,92 5.37.31,12	ment.  + 0,11 - 0,23 + 0,05 - 0,56 + 0,05 - 0,61 - 0,03 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05	+ 16,78 + 16,89 + 16,55 + 16,64	254.45.30,6 296.10.13,9 261.52.13,2 323.55.46,9 323.46.17,7 261.56.59,4 325.48. 2,9 271.36. 1,1 308.26.28,6 273.52. 3,8	735,5		+ 3,0 + 2,8 + 2,5	-2.49,8 -33,3 -1.59,3 -2,1 -2,4 -1.59,0 -0,5 -1.21,1 -18,5 -1.14,7	45,5 48,4 45,3 50,9
	α Orion Argel. Z. 163, n° 190 δ Petite Ourse I Argel. Z. 76, n° 105 Argel. Z. 169, n° 17 Anonyme Anonyme δ+51°56′	6.20.50,65 6.22,52,57 6.32,26,18 6.34,38,20	- 0,16 - 0,70 - 0,71 - 0,74 - 0,75 - 0,75	+ 16,66	287.20.44,2 330.45.58,2 13.20.57,2 331. 9.31,9 331.33. 9,6 331.55.57,2	735,1	+ 4,6	+ 2,4	- 46,5 + 4,7 +1. 2,4 + 5,1 + 5,5 + 5,9	43,8
19	Soleil, bord 1, inf ζ Céphée 7 α Lézard 47 λ Pégase 32 ι Céphée α Poisson austral Vénus, bord 1, centr.	20. 5.14,40 22. 5.54,27 22.25.22,02 22.39.32,25 22.44.36,76 22.49.33,41 22.55.33,50	+ 0,06 - 0,90 - 0,68 - 0,30 - 1,22 + 0,15 - 0,03	+ 17,12	259.25.33,2 337.25.17,6 329.28.18,8 302.44.34,2 345.22. 7,5 249.36.17,1 271.55.14,6 294.21.58,7	733,9 733,3 733,3	+ 6,5 + 6,2 + 6,2	+ 3, <sub>7</sub> + 4, <sub>5</sub> + 4, <sub>1</sub>	-2.12,9 + 11,4 + 3,3 - 24,8 + 20,0 -3.55,2 -1.19,4	51,
	α Pégase 35 γ Céphée α Andromède γ Pégase α Cassiopée 16 β Baleine 37 μ Andromède α Petite Ourse S Uranus, centre	22.57.31,19 23.33.30,87 0. 0.52,73 0. 5.44,98 0.32.16,60 0.36.16,98 0.48.41,07 1. 5.34,25 1. 9.37,64	- 0,22 - 2,35 - 0,35 - 0,22 - 0,84 + 0,05 - 0,47 - 0,15	+ 17,26 + 17,38 + 17,27 + 17,49	294.21.36,7 356.44.54,4 308.13.32,5 294.18.56,8 335.40.17,6 261.10.38,8 317.38,40,2 8.27.28,1 286.41.26,3	733,2 733,1 733,1 733,1	+ 6,2 + 6,2 + 6,2 + 6,0 + 5,9	+ 4,2 + 4,3 + 4,2 + 4,0 + 3,8	- 35,5 + 33,9 - 18,6 - 35,6 + 9,6 -2. 2,5 - 8,6 + 52,3 - 47,3	43, 45, 44, 46, 48,
	49 A Andromède 49 Baleine ε App. Sculpteur Lacaille 541	1.21.22,91	- 0,61 + 0,03 + 0,11 + 0,16		326.11.27,4 263.32.20,4 254.11.50,3 248.22.27,2	733,1	+ 5,5	+ 3,4 + 3,4	-1.50,7 -2.54,7 -4.19,4	

Le 19, Mire Sud-36P,94. Mire Nord C-39P,18. Niveau-5P,64.

anoi	NOM	PASSAGE CONCLU		RECTION de .	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	laté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	a Bélier	n. m. s. 1.58.58,30	s. - 0,30	+ 17,55	302.42.51,7	733,1	+ 5,7	+ 3,4	- 24,9	43,1
	Soleil, bord 1, sup. a Petite Ourse S	20.13.44,05	+ 0,05		260.24. 8,2	739,2	+ 5,0	+ 4,5	-2. 7,5	
	E App. Sculpteur  α Bélier  α Baleine  α Lyre	1.38.52,68 1.58.59,59 2.54.42,69 18.32. 7,79	+ 0,11 - 0,30 - 0,13 - 0,49	+ 18,8 <sub>7</sub> + 18,8 <sub>4</sub> + 19,26	254.11.51,0 302.42.52,3 283.28. 8,1 318.36.43,0	738,6 738,6 738,6 737,9	+ 5,5 + 5,4 + 5,3 + 4,6	+ 5,2 + 4,2 + 2,8 + 5,4	-2.54,9 - 25,1 - 53,5 - 7,6	43,6 47,4 49,7
Н	Soleil, bord 1, inf		+ 0,05	1 -31-0	260. 5.12,0	736,9	+ 6,7	+ 9,5	-2. 6,7	7317
	Petite Ourse S	18.21.14,75 18.32. 9,83	- 0,49	+ 21,24	6.32.48,0 318.36.43,2	740,5 740,5	+ 4,6 + 4,6	+ 2,0 + 2,2	+ 49,6	51,1 50,6
	Soleil, bord 1, sup. Vénus, bord 1, centr. 35 y Céphée	20.30.34,26 23.21. 2,44 23.33.34,33 0. 0.56,79 0. 5.48,92 0.32.20,50 0.36.21,08 0.48.44,97 1. 5.33,05	+ 0,05 - 0,07 - 2,35 - 0,35 - 0,22 - 0,84 + 0,05 - 0,46	+ 21,52 + 21,28 + 21,56	261.21.14,9 274.57.19,4 356.44.51,5 308.13.30,3 294.18.58,8 335.40.18,9 261.10.37,6 317.38.43,0 8.27.28,5	739,6 738,3 738,3 738,0	+ 5,6 + 5,9 + 6,2 + 6,7 + 6,5	+ 6,1 + 7,7 + 8,8 + 8,6 + 7,1 + 6,3	-2. 1,4 -1.10,8 + 33,5 - 18,4 - 35,3 + 9,8 -2. 1,7 - 8,6 + 52,0	44,6 47,1 48,7
	Bélier	1.59. 2,15 2. 4.47,40 3.13.57,33	+ 0,05	+ 21,49	302.42.54,8 260.18.18,9 329.16.56,0	737,8 737,8 737,6	+ 6,2 + 6,1 + 5,7	+ 4,6 + 4,0 + 3,8	- 25,0 -2. 8,0 + 3,1	46,5
	alande 7098 alande 7617 alande 7622 alande 7666 alande 7815 Alande 8113 alande 8312 alande 8474 alande 8781 Alande 8781 Alande 9106 alande 9106 alande 9603 alande 9606	3.58.24,50 3.59.31,32 4. 3.38,86 4. 4.26,11 4.12. 3,26 4.17. 9,03 4.21.47,08 4.27.38,14 4.31.43,16 4.39. 1,28 4.44.25,50 4.52.25,62 4.58.19,08	+ 0,07 + 0,08 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,07 + 0,11 + 0,07 - 0,23 + 0,04 - 0,56 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04	+ 21,48	258.37.44,6 257.16.11,3 259. 4.18,6 260.30.14,5 258.56.37,2 254.45.33,7 258. 9.19,8 296.10.18,8 261.52.17,8 323.55.54,9 323.46.21,2 261.57. 2,7 261.53.36,8	737,6	+ 4,4	+ 1,6 + 1,5 + 0,5 - 0,1 + 0,1	-2.19,8 -2.29,6 -2.16,8 -2.8,0 -2.18,0 -2.51,3 -2.23,2 -33,7 -2.0,8 -2,3 -2,4 -2.0,6 -2.1,0	50,1

Le 24, Niveau-61,06.

Le 25, Mire Sud-37P,47. d=-23P,72.

4

Jours	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	DUÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
1.5.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ETRE.	laté- rieur.	Exté- rieur.	ПОЛ.	POLE.
	α Cocher	h. m. s. 5. 5.56,43 5. 7.39,26 5.17. 8,11 5.23.16,03	s. - 0,60 - 0,03 - 0,35 - 0,05	+ 21,90 + 21,41 + 21,62	325.48. 6,4 271.36. 2,0 308.26.26,6 273.52.11,3	736,9	+ 3,0	- 0,4	- 0,4 -1,22,2 - 18,7 -1,15,6	51,2 45,9 48,5
	Anonyme &-6°7' Anonyme Weisse, V, 921 Lalande 10873 Weisse, V, 924	5.27.48,95 5.28. 3,45 5.35.56,51 5.37.21,99 5.37.36,09	- 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05		273.53.29,1 273. 9.25,9	736,7	+ 2,6	- 0,5	-1.15,6 -1.17,6	
	Anonyme	5.47.22,65 5.58.35,54 6.11.55,26 6.20.55,19	- 0,16 - 0,68 - 0,70	+ 21,57	287.20.48,6 330. 8.20,3 330.45.58,1 13.20.56,9	20.5		- 0,5	- 47,1 + 4,1 + 4,7 +1. 3,2	48,t
	Argel. Z, 76, n°105. Argel. Z, 169, n°17. Anonyme	6.32.30,96 6.34.42,95 6.38.52,26 18.32.10,55	- 0,71 - 0,74 - 0,75 + 0,03 - 0,49 - 0,17	+ 21,51 + 21,94 + 21,93	331. 9.36,4 331.33.15,8 331.56. 2,3 263.28.37,9 318.36.39,9 288.26.58,5	736,5 736,4 732,8 732,2	+ 2,1 + 1,6 + 2,6 + 4,2	- 0,6 - 1,2 - 0,3 + 4,4	+ 5,1 + 5,5 + 5,9 -1.53,3 - 7,7 - 44,2	49,0 47,6 48,0
26	Soleil, bord 1, inf  A Petite Ourse S  A Persée  3 Taureau  A Orion	x. 5.35,63 3.13.58,09 5.17. 8,73	+ 0,05 - 0,67 - 0,35 - 0,16	† 22,24 † 22,25 † 22,21	261. 3.30,9 8.27.29,1 308.26.27,0 287.20.46,0	731,4 729,7 730,0 730,0	+ 4,9 + 5,2 + 3,6 + 3,6	+ 5,7 + 4,2 - 0,6 - 0,6	$ \begin{array}{r} -2. & 1.9 \\ + & 51.9 \end{array} $ $ \begin{array}{r} - & 18.6 \\ - & 46.7 \end{array} $	49,1 48,9 45,8
27	Soleil, bord 1, sup. 21 ζ Céphée 7 α Lézard 47 λ Pégase 32 ι Céphée	20.38.54,66 22. 5.59,81 22.25.27,26 22.39.37,65		4	261.51.30,0 337.25.19,1 329.28.21,5 302.44.30,4 345.22. 8,6	729,1 728,0 727,7	+ 5,7 + 5,7 + 6,0	+ 5,9 + 8,6 + 9,2	-1.57,1 + 11,2 + 3,2 - 24,2 + 19,4	
	α Poisson austral α Pégase 35 γ Céphée α Andromède	22.49.38,91 22.57.36,74 23.33.35,65 0. 0.58,23	+ 0,15 - 0,22 - 2,35	+ 22,66 + 22,86 + 22,98 + 22,84	249.36.11,0 294.21.58,3 356.44.54,1 308.13.32,0 294.18.58,1	727,6 727,6 727,4	+ 6,2 + 6,1 + 6,1	+ 9,7 +10,3 + 6,3 + 5,8	-3.48,8 - 34,5 + 33,3 - 18,3 - 35,1	51,4 44,9 46,4 46,4
	γ Pégase	0.32.21,84 0.36.22,54 0.48.46,41 1. 1.22,10	- 0,22 - 0,84 + 0,05 - 0,47 - 0,01	+ 22,96		727,1	+ 6,1	+ 5,5 + 5,5 + 5,4	+ 9,5 -2. 0,6 - 8,5 -1.27,5 + 51,5	50,4
	α Petite Ourse S 49 A Andromède.		- 0,61		326.11.30,0	726,9	+ 6,0	7 3,4	0,0	

Le 27, Mire Sud-38p, 10. Mire Nord B-12p,66. Mire Nord C-37p,83. Niveau-5p,51.

Jours	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM!	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU ,
1		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	æ.	rieur.	rieur.	ON.	POLE.
	49 Baleine	h. m. s. 1.27.37,68 2.20.31,29	+ 0,03 - 0,16	s,	263.32.21,3 287.45.18,5	726,7 726,6	5,9 + 5,6	+ 4,9 + 4,2	-1.49,0 - 45,0	"
	Piazzi II, 155 Lalande 5146 Lalande 5286	2.34.16,66 2.38.46,78 2.43.13,36	- 0,18 + 0,08		289.52.10,4 258.57.16,5	723,0	, 0,0	+ 4,0	- 41,7 -2.14,4	
	Lalande 5289  3 Petite Ourse I	2.43.16,30	+ 0,06 + 2,03	+ 22,99	25.10. 9,5	6.1			-2.13,4 +1.34,5	50,0
	x Baleine Piazzi II, 267 12 Eridan	2.54.46,81 3. 1.46,59 3. 6. 2,46	- 0,13 + 0,14 + 0,15	+ 23,05	283.28.10,3 251.36. 3,3 250.26. 1,1	726,5	+ 5,3	+ 3,7	- 52,5 -3.23,5 -3.40,8	51,0
п	z Persée Lalande 6809 Lalande 6861	3.13.59,07 3.33.40,84 3.35. 1,00	- 0,67 + 0,06 + 0,06	+ 23,25	329.16.58,0 259.54.37,3	726,5 726,4	+ 5,0	+ 2,4	+ 3,1 -2. 9,3	49,4
	Lalande 7098 Lalande 7217 Lalande 7632 Lalande 7666	3.42.20,24 3.46.39,87 3.58.26,02 3.59.32,82	+ 0,07 + 0,08 + 0,06 + 0,06		258.37.42,7 257.16. 9,3 259.11.51,9	726,3	+ 4,6	+ 1,5	-2.17,6 -2.27,5 -2.14,1	
	Lalande 7815 Lalande 8113 Lalande 8312	4. 3.40,30 4.12. 4,98 4.17.10,59	+ 0,05		260.35.30,0 258.54.29,4 254.45.30,2				-2. 5,7 -2.16,1 -2.49,1	
ı	Lalande 8474  Z Taureau  Lalande 8781  Anonyme	4.21.48,48 4.27.39,74 4.31.44,82 4.39. 2,80	+ 0,07 - 0,23 + 0,04 - 0,56	+ 23,10	258. 9.22,9 296.10.13,9 261.52.17,7 323.55.52,9	726,0	+ 3,5	+ 0,4	-2.21,4 $-33,2$ $-1.58,9$ $-2,2$	45,8
	Lalande 9106 Piazzi IV, 268 Lalande 9603	4.52.27,10 4.58.20,46	- 0,56 + 0,04 + 0,04		323.46 19,2 261.56.57,9	725,8	+ 3,2	+ 0,8	- 2,4 -1.58,5	
	Lalande 9606	4.58.24,16 5. 5.57.88 5. 7.40,83	+ 0,04 - 0,60 - 0,03	+ 23,38 + 23,00	261.50.14,0 325.48. 5,2 271.36. 4,9	725,7	+ 2,7	- 0,2	-1.59,3 - 0,4 -1.20,9	49,8 50,4
	3 Taureau Lalande 10366 Anonyme 8-6°7'	5.17. 9,59 5.23.17,47 5.27.50,57	- 0,35 - 0,05 - 0,05	+ 23,12	308.26.28,4 273.52.13,0				- 18,4 -1.14,4	50,5
	Anonyme Weisse, V, 734 Weisse, V, 921	5.28. 4,87 5.29.37,13 5.35.58,09	- 0,05 - 0,05 - 0,05		273.53.30,2				-1.14,3	
	Lalande 10873 Weisse, V, 964 a Orion	5.37.23,41	- 0,05 - 0,05 - 0,16	+ 23,16	273. 9.25,2 287.20.51,0	725,6	+ 2,3	o,o - o,6	-1.16,3 - 46,4	51,3
	Anonyme Anonyme Groombridge 1103.	5.52.59,37 5.58.37,35	- 0,15 - 0,70 - 0,72		287.16.13,6 330. 8.21,8	, -,-			- 46,5 + 4,0	

jours.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYEME DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Groombridge 1106. Argel. Z. 163, n° 190 3 Petite Ourse 1 Argel. Z. 76, n° 105 Argel. Z. 169, n° 17 Anonyme α Grand Chien	6.11.56,67 6.20.58,25 6.22,58,73	- 0,72 - 0,71 - 0,72 - 0,73 - 0,74 + 0,03	+ 23,08	331. 9.31.5 330.45.59.0 13.21. 2,4 331. 9.41.2 331.33.17.5 331.56. 4,0 263.28.41.0	725,3 725,3	+ 2,0	- 0,7 - 0,7 - 0,7 - 1,2	+ 5,0 + 4,7 +1. 2,3 + 5,1 + 5,5 + 5,8 -1.51,5	50.3
30	Soleil, bord 1, inf  \[ \alpha \text{ Andromède} \]  \[ \gamma \text{ Pégase} \]  \[ \alpha \text{ Cassiopée} \]  \[ \alpha \text{ Petite Ourse S} \]  \[ \alpha \text{ Bélier} \]  \[ \xi^2 \text{ Baleine} \]  85 Baleine	20.51.19,40 0. 1. 0,97 0. 5.53,19 0.32.24,60 1. 5.37,06 1.59, 6,28 2.20.33,97 2.34,47,48	+ 0,10 - 0,44 - 0,26 - 1,09 - 0,37 - 0,18 - 0,22	+ 25,67 + 25,56 + 25,55 + 25,63	262. 5. 1,5 308.13.32,6 294.18.59,7 335.40.17,1 8.27.27,4 302.42.53,9 287.45.17,7 290. 4. 7,0	730,7 731,1 731,3 731,5 731,5 731,8	+ 4,8 + 4,2 + 4,2 + 4,2 + 4,0 + 4,0	+ 2,9 + 3,2 + 3,4 + 3,2 + 2,5 + 1,8 + 2,0	-1.57,5 - 18,6 - 35,6 + 9,6 + 52,2 - 25,0 - 45,7 - 42,0	47,4 48,3 47,5 48,2 45,9
	Lalande 5146 Lalande 5289 α Baleine Piazzi II, 267 12 Eridan α Persée Lalande 7217	2.38.49,40 2.43.18,90 2.54.49,51 3. 1.49,35 3. 6. 5,03 3.14. 1,71 3.46.42,41	+ 0,12 + 0,12 - 0,14 + 0,23 + 0,24 - 0,86 + 0,15	+ 25,78	258.57.22,9 259. 7.15,9 283.28. 9,5 251.36. 7,5 250.26. 5,2 329.16.57,5 257.16. 7.5	731,9 732,0	+ 3,8	+ 2,0 + 1,6 + 1,2 + 0,8	$\begin{array}{r} -2.16,4 \\ -2.15,3 \\ -53,2 \\ -3.25,9 \\ -3.43,3 \\ +3,2 \\ -2.29,0 \end{array}$	49,7
	Lalande 8113 Lalande 8312 Lalande 8474	4.12. 7,30 4.17.13,13 4.21.50,98 4.27.42,38 4.31.47,68 4.39. 5,57 4.44.29,56 4.52.29,55	+ 0,12 + 0,18 + 0,13 - 0,28 + 0,10 - 0,73 - 0,73 + 0,10	+ 25,72	257.16. 7,5 258.54.33,7 254.45.33,0 258. 9.27,7 296.10.15,7 261.52.20,0 323.55.53,3 323.46.23,7 261.57. 3,1	732,0	+ 2,3	- o,1 - o,3	-2.17,8 -2.51,1 -2.23,0 - 33,5 -2. 0,2 - 2,3 - 2,4 -1.59,9	47,4
	Lalande 9603 Lalande 9606   Cocher  B Orion  Taureau Lalande 10366  Anonyme 3-6051	4.58.23,06 4.58.26,62 5. 6. 0,51 5. 7.43,68 5.17.12,23 5.23.20,13 5.28. 7,57	+ 0,10 + 0,10 - 0,78 - 0,01 - 0,44 - 0,03 - 0,03	+ 25,87 + 25,90 + 25,78	261.50.14,9 325.48. 7,7 271.36. 6,0 273.52.13,9	732,0	+ 2,0	- 0,2	-2. 0,4 - 0,4 -1.21,7 -1.15,2	52, 51,
	Anonyme	5.28.14,61 5.30.30,91 5.36. 0,87	- 0,03 - 0,03 - 0,03 - 0,03		273.56.49,3 273. 6.24,8 273. 2.44,5	732,1	+ 1,5	- 1,3	-1.15,1 -1.17,5 -1.17,7	1

NOM	PASSAGE CONCLU	CORRECTION de	_	MOVENNE des verniers	BAROMÈTRE	THERMO	MÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- la ment. pend		pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
α Orion	5.47.26,87 5.53. 2,20 5.58.40,25 6. 2.19,35 6. 2.56,69	- 0,18 - 0,18 - 0,89 - 0,92 - 0,92	s. 5,80	287.20.50,9 287.16.15,9 330. 8.24,2	nım.	ο	o	- 47,0 - 47,1 + 4,1 + 5,1	50,8
Argel. Z. 163,n° 190  Petite Ourse I  Argel. Z. 76,n° 105.  Argel. Z. 169,n° 17.  Anonyme  Grand Chien		- 0,91 - 0,92 - 0,92 - 0,94 + 0,08 + 26	5,00	330.45.59,6 13.21. 4,1 331. 9.37,7 331.33.18,6 331.56. 3,7 263.28.38,5	732,2	+ 1,1	- 1,6	+ 4,7 +1. 3,1 + 5,1 + 5,5 + 5,9 -1.52,8	51,0
Soleil, bord 1, sup.	20.59.31,24	+ 0,09		263.13.12,5	734,8	+ 4,6	+ 3,7	-1.52,2	
Soleil, bord 1, inf  Andromède  Pégase  Cassiopée  Baleine  37 \( \theta \) Andromède	21. 3.36,08 o. 1. 3,23 o. 5.55,44 o.32.26,96 o.36.27,48 o.48.51,43	+ 0,09 - 0,44 - 0,26 - 1,09 + 0,10 - 0,59	,84 ,98	262.57.53,9 308.13.31,7 294.18.59,4 335.40.17,2 261.10.38,2 317.38.40,8	735,8 734,9 735,0	+ 4,2 + 4,2 + 4.3	+ 3,1 + 4,0 + 4,0	-1.53,8 - 18,6 - 35,7 + 9,6 -2. 2,6 - 8,6	47,0 48,2 48,1
31 7 Balcine 2 Petite Ourse S 7 Taureau Lalande 8312 Lalande 8474 2 Taureau Lalande 8781	1. 1.27,04 1. 5.37,87 4.11.41,16 4.17.15,42 4.21.53,40 4.27.44,70 4.31.49,58	+ 0,03 - 0,27 + 0,19 + 0,13 - 0,28 + 0,09		269. o. 5,7 8.27.28,7 295.13.45,3 254.45.26,4 258. 9.20,8 296.10.15,0 261.52.12,5	735,0 735,8	+ 4,3 + 3,4	+ 3,9 + 1,9 + 1,7	-1.28,9 + 52,3 - 34,8 -2.50,8 -2.22,8 - 33,5 -2. 0,0	49,9
Anonyme	4.39. 7,67 4.43.57,42 4.52.32,05 4.58.25,46 5. 6. 2,86 5. 7.45,78 5.17.14,53	- 0,73   - 0,28   + 0,09   + 0,09   - 0,77   + 28   - 0,01   + 28   - 0,44   + 28	3,04	323.55.49,6 296.16.21,3 261.57. 0,8 261.53.33,9 325.48. 4,5 271.36. 2,0	736,0	+ 3,4	+ 1,6	- 2,3 - 33,4 -1.59,7 -2. 0,0 - 0,4 -1.21,4	48,6 47,6
Soleil, bord 1, sup. 35 y Céphée	21. 7.40,02 23.33.41,85 23.58. 6,79 0. 1. 3,87 0. 5.56,14 0.32.27,74	/ -   '	3,6 r 3,55	263.48. 8,2 356.44.50,2 279.36.43,0 308.13.32,5 294.18.56,9 335.40.19,6	737,8 737,1 737,0	+ 3,3 + 3,2 + 3,1	- 0,6 + 0,7 + 0,7	-1.51,6 + 34,5 -1. 1,6 - 18,9 - 36,3 + 9,8	47,6 45,2 50,9

e 1, Mire Sud-389,40. Mire Nord B-159,59. Mire Nord D-699,79. Niveau-61,30.

e 2, Mire Sud-37P,71. Mire Nord B-14P,12. Mire Nord D-69P,38.

e 3, Mire Sud-36°,55. Mire Nord B-14°,90. Mire Nord D-70°,33.

JOURS.	NOM  DES ASTRES-	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE.	Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE
		th menuica.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.		
		h. m. s.	5.	5.	0 1 11	mm.	0	0	1 11	٠,
	B Baleine	0.36.28,06	+ 0,10		261.10.38,7	737,0	+ 3,1	+ 0,8	-2. 4,4	
	37 4 Andromede	0.48.52,27	- 0,59		317.38.45,5				- 8,7	
	31 7 Baleine	1. 1.27,56	+ 0,03		269. 0. 6,2	737,0	+ 3,1	+ 1,0	-1.30,0	
	a Petite Ourse S	1. 5.40,55			8.27.28,7	n			+ 53,0	50,
	5º Baleine	2.20.36,77	- 0,18		287.45.18,9	737,2	+ 2,8	+ 0,1	- 46,4	
	Lalande 5146	2.38.52,18	+ 0,12		258.57.25,3	737,2	+ 2,4	- 0,4	-2.18,7	
1	Lalande 5286	2.43.18,88	+ 0,12		259. 7.22,0			- 0,7	-2.17,7	
1	Lalande 5289	2.43.21,78	+ 0,12	1 00 08	25.10. 6,8				+1.37,5	10
	Belie Ourse I	2.51.37,08	+ 2,62	+ 29,08	283.28.13,6	737,3	+ 2,2	- 0,9	- 54,2	49, 53,
H	Piazzi II, 267	3. 1.52,09	+ 0,23	7 20,70	251.36.13,9	10/10	1 0,2	1 2,9	-3.29,8	,
	12 Eridan	3. 6. 7,77	+ 0,24		250.26.14,3				-3.47,2	
	α Persée	3.14. 4,77	_ 0,86	+ 28,93	329.16.59,3			- 1,0	+ 3,2	50.
	Lalande 6809	3.33.56,28	+ 0,11	,, j-	259.54.39,7	737,6	+ 1,7	- 1,2	-2.13,0	
1	Lalande 6861	3.35. 6,46	+ 0,11		3 . 3.,					
	Lalande 7098	3.42.25,68	+ 0,12		258.37.48,3				-2.21,6	
	Lalande 7217	3.46.45,21	+ 0,14		257.16.14,9			- 1,9	-2.31,7	
	Lalande 7632	3.58.31,68	+ 0,12						0.0	
	Lalande 7666	3.59.38,52	+ 0,12		259. 4.19,8				-2.18,8	
	Lalande 7873	4. 5.25,64	+ 0,12		259.15.38,2	-	1		-2.17,6	
	Lalande 7874	4. 5.27,50	+ 0,12		. 50 5/ 250					
	Lalande 8113	4.12.10,14	+ 0,12		258.54.35,8 254.45.34,0				-2.20,0	
	Lalande 8312	4.17.16,03	+ 0,16		254.45.54,0 258. q.30,8				-2.25,5	
1	Lalande 8474	4.27.45,26	- 0,13	+ 28,66	296.10.17,3	737.9	+ 0,7	- 2,7	- 34,2	48
	Lalande 8781	4.31.50,38	+ 0,10	7 20,00	261.52.21,6	10,79	1 -4/	/	-2. 2,4	
	Anonyme 8+43°58'	4.39. 8,63	- 0,73		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				7.1	
	Lalande 9106	4.44.32,64	- 0,73		323.46.25,0			- 2,7	- 2,5	
	Piazzi IV, 268	4.52.32,64	+ 0,10		261.57. 8,7			'	-2. 2,0	
	Lalande 9603	4.58.26,00	+ 0,10			1				
	Lalande 9606	4.58.29,47	+ 0,10		261.50.19,0	738,1	+ 0,4	- 3,t	-2. 2,4	
	α Cocher	5. 6. 3,61	- 0,77	+ 29,09	325.48. 8,5				- 0,4	5:
	β Orion	5. 7.46,49	- 0,01	+ 28,76	271.36. 4,0	20		2	-1.23,4	4'.
	B Taureau		- 0,44	+ 28,85.	308.26.29,5	738,2	+ 0,3	- 3,2	- 19,0	30
	Lalande 10366	5.23.23,01	- 0,03		273.52.13,2				-1.16,6	
	Anonyme 8-6°2'	5.28.17,63	- 0,03		0.03 50 20 2				-1.16,8	
	Anonyme	5.28.22,77 5.30.34,03	- 0,03		273.50.39,3				-1.10,8	
	Weisse V, 756		- 0,03		273. 6.26,4				-1.18,8	
	Weisse V, 921 Weisse V, 964		- 0,02		273. 2.51,9			- 3,5	-1.19,1	
	Lune, bord 1, inf		- 0,30		297.35.53,2			- 75	- 32,4	
1	Anonyme		- 0,18		287.16.21,3				- 48,0	

9
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1849.

_										
JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE		OWÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
3.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	. Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
П		h m. s.	s.	s.	0 1 11	mm.	0	0	1 "	٠,
	Anonyme	5.58.42,89	- 0,89		330. 8.24,9	20		,	+ 4,x	
	Groombridge 1103.	6. 2.22,38	- 0,92		331. 9.59,6	738,7	- 0,7	- 4,0	+ 5,1	
	Argel. Z. 163,nº 190  8 Petite Ourse I	6.12. 2,76	- 0,91		330.46. 0,7 13.21. 2,9				+ 4,8	50,9
	Argel. Z. 76, nº 105.	6.23. 4,61	- 0,92		331. q.43,8				+ 5,2	30,9
	Argel. Z. 169, nº17.	6.32.38,15	- 0,92		331.33.21,3				+ 5,6	
	Anonyme	6.34.50,35	- 0,94		331.56. 7,2				+ 6,0	
П	α Grand Chien	6.38.59,48	+ 0,08	+ 28,83	263.28.42,4	739,0	- 0,9	- 4,2	-1.55,0	53,4
1	Coloil hand . inf	01.11/2			-C2 22 -F	=/ = 0	1 6 0		. 52 /	
4	Soleil, bord 1, inf  a Cassiopée	0 32.28,18	+ 0,09	+ 29,26	263.33.15,0 335.40.19,2	740,8 739,9	+ 2,8	- 0,9 + 0,5	-1.53,4 + 9,8	50,3
	α Petite Ourse S	1. 5.39,26	- 1,09	+ 29,20	8.27.28,4	739,8	+ 2,7	+ 0,8	+ 53,2	50,7
	a Bélier	1.59. 9,71	- 0,37	+ 29,16	302.42.54,4	739,9	+ 2,4	+ 0,3	- 25,5	46,4
		0 0.7	, ,	1 -5,						
5	Soleil, bord 1, sup.	21.15.44,54	+ 0,08		264.24. 6,7	740,0	+ 3,1	+ 0,8	-1.48,7	
1	35 y Céphée	23.33.42,85	- 3,03		356.44.50,9	739,2	+ 3,0	+ 2,9	+ 34,3	
1	α Andromède	0. 1. 5,19	- 0,44	+ 29,95	308.13.33,0	-3		. 2 -	- 18, <sub>7</sub> - 58,8	48,7
ш	Vénus, centre α Cassiopée	0. 6.10,65	- 0,10	1 00 80	280.39. 2,3 335.40.19,0	739,0	+ 3,0	+ 3,0	00,0	50,2
ш	Baleine	0.36.29,26	+ 0,10	+ 29,80	261.10.40,8	738,9	+ 3,0	+ 3,2	+ 9,7 -2, 3,6	30,2
Ш	31 η Baleine	1. 1.28,98	+ 0,02		269. 0. 4,2	700,9	, 5,0	, 0,2	-1.29,4	
п	α Petite Ourse S	1. 5.39,76	7		8.27.27,7	738,9	+ 3,0	+ 3,6	+52,6	49,5
ш	5º Baleine	2.20.38,23	- 0,18		287.45.19,1	738,7	+ 3,2	+ 2,4	- 46,1	
ш	85 Baleine	2.34.51,78	- 0,22		290. 4. 6,1				- 42,4	
	Lalande 5146	2.38.53,50	+ 0,12		258.57.19,7				-2.17,6	
	Lalande 5286	2.43.20,14	+ 0,12	1 2 20	259. 7.16,3				-2.16,5	1
ш	Baleine	2.51.50,55	+ 2,62	+ 30,38 + 29,96	25.10. 7,0 283.28. 8,8			į	+1.36,7	49,1 48,7
	Piazzi II, 267	3. 1.53,43	+ 0,22	+ 29,90	251.36.12.1				-3.28,2	40,7
	12 Eridan	3. 6. 9,11	+ 0,24		250.26. 9,2	738,6	+ 3,1	+ 1,1	-3.45,7	
и	α Persée	3.14. 5,73	- 0,86	+ 29,95	329.16.58,5	7 - 7 -	, , , ,	1 ' '	+ 3,2	50,0
п	Piazzi III, 54	3.18.26,24	- 1,18	. 5,5	338.18.40,9				+ 12,6	
1	39 b Struve { préc.	3.21.58,74	- 1,18		338.12.24,0			+ 1,2	+ 12,5	
	( 00000	3.22. 0,99	- 1,18							
	Lalande 6809	3.33.5 <sub>7</sub> ,66 3.35. <sub>7</sub> ,66	+ 0,11		ata tt ar /					
	Lalande 6861 Lalande 7008	3.42,27,06	+ 0,11		259.55.20,4 258.37.44,2				-2.11,9 $-2.20,3$	
	Lalande 7090	3.46.46,52	+ 0,13		257.16. 7,2	738,5	+ 2,8	+ 1,4		
1	Lalande 7632	3.58.32,78	+ 0,12		259.11.54,3	700,0	2,0	774	-2.16,5	
	Lalande 7666		+ 0,12		3.22.24,0					
	Lalande 7815	4. 3.47,26	+ 0,10		260.35.36,6			1	-2. 8,0	
-	Lalande 7873	4. 5.26,94	+ 0,12		259.15.31,4	1		!	-2.16,3	

Le 5, Mire Sud-379,41. Niveau-79,21.

10

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigeo	BAROMÈTRE	Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
		TH Meridica.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.		
	Lalande 7874 Lalande 8113 Lalande 8312 Lalande 8474	h. m. s 4. 5.28,60 4.12.11,44 4.17.17,41 4.21.55,20 4.27.46,64 4.31.51,64 4.39. 9,66 4.44.33.80 4.52.33,82 4.58.27,20	; + 0,12 + 0,13 + 0,20 + 0,13 - 0,28 + 0,10 - 0,73 - 0,73 + 0,10 + 0,10	+ 30,07	258.54.33,3 254.45.33,8 258. 9.27,3 296.10.16,4 261.52.14,6 323.55.48,4 323.46.24,0 261.57. 6,7	738,2 738,0	+ 2,3	- 0,2 - 0,3 - 0,6	-2.18,8 -2.52,5 -2.24,3 - 33,9 -2. 1,3 - 2,5 -2. 1,0	47,8
	Lalande 9606  Cocher  GOrion  Taureau  Lalande 10366  Anonyme	4.58.30,76 5. 6. 4,73 5. 7.47,68 5.17.16,43 5.23.24,31 5.28.18,91 5.28.33,95	+ 0,10 - 0,77 - 0,01 - 0,44 - 0,03 - 0,03	+ 30,21 + 29,98 + 29,98	325.48. 7,0 271.36. 3,3 308.26.31,5 273.52,17,7 273.56.56,6	738,0	+ 2,0	- 0,8	- 0,4 -1.22,4 - 18,8 -1.15,8 -1.15,7	50,8 48,1 52,9
	Veisse V, 756 Weisse V, 921 Weisse V, 964 α Orion Anonyme Groombridge 1103.	5.30.35,41 5.36. 4,92 5.37.44,35 5.47.31,13 5.53. 6,31 6. 2.23,71	- 0,03 - 0,03 - 0,02 - 0,02 - 0,18 - 0,18 - 0,92	+ 30,12	273.56.48,2 273. 6.22,9 273. 2.48,4 287.20.49,6 287.16.20,2	7 <sup>3</sup> 7,9	+ 1,8	- 0,7	-1.15,7 -1.18,0 -1.18,1 - 47,3 - 47,4	49,4
	Groombridge 1106. Argel. Z. 163, nº 190 & Petite Ourse I	6. 3. 0,97 6.12. 3,80 6.21. 3,33	- 0,92 - 0,91		331. 9.34,1 330.46. 4,1 13.21. 0,6	737,9	+ 1,5	- 1,1	+ 5,1 + 4,7 +1. 3,4	47.7
6	α Petite Ourse S	1. 5.39,76			8.27.28,2	735,6	+ 3,9	+. 4,5	+ 52,2	49,7
7	35 y Céphée α Andromède y Pégase Vénus, bord 1, centr. α Cassiopée	23.33.43,97 o. 1. 6,63 o. 5.58,64 o.14.11,19 o.32.30,18 o.48.54,79	- 3,03 - 0,44 - 0,26 - 0,12 - 1,09	+ 31,41 + 31,08 + 31,33	356.44.53,8 308.13.31,0 294.18.57,6 281.41.14,0 335.40.18,6 317.38.47,3	737,6 737,5 737,4	+ 4,1 + 4,2 + 4,2	+ 3,7 + 3,6 + 3,6	+ 34,1 - 18,7 - 35,9 - 56,7 + 9,7 - 8,6	47,5 46,7 50,8
	37 μ Andromède 31 η Baleine α Petite Ourse S ξ² Baleine Lalande 5289 β Petite Ourse I α Baleine	1. 1.30,44 1. 5.38,76 2.20.39,63 2.34.53,14 2.43.24,44 2.51.39,96 2.54.55,05	- 0,59 + 0,02 - 0,18 - 0,22 + 0,12 + 2,62 - 0,14	+ 31,59 + 31,45	269. o. 3,9 8.27.26,6 287.45.20,4 290. 4. 6,5 259. 7. 9,2 25.10. 5,1 283.28. 9,6	7 <sup>3</sup> 7,3 7 <sup>3</sup> 7,7	+ 4,2	+ 3,6 + 3,2 + 2,7 + 2,5 + 2,4	- 1.29,3 + 52,5 - 45,9 - 42,2 -2.16,1 +1.36,3 - 53,5	48,6 46,3 49,6

1011R	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO		RÉFRACTION	LIEU
,	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
to the state of th	Piazzi II, 267 12 Eridan α Persée Piazzi III, 54 39 b Struve { préc. suiv.	h. m s, 3. r 55,03 3. 6.10,53 3.14. 7,13 3.18.27,27 3.21.59,88 3.22. 2,38	+ 0,23 + 0,24 - 0,86 - 1,18 - 1,18	+ 31,40	251.36.10,0 250.26. 7,6 329.16.57,9 338.18.39,9 338.12.23,9	737,4	+ 3,9	+ 1,8	-3.27,3 -3.44,7 + 3,2 + 12,5 + 12,4	49,4
	Lalande 6809 Lalande 6829 Lalande 6861 <sup>t</sup> Eridan 33 / Eridan Lalande 7418	3.33.58,84 3.34.25,26 3.35. 9,06 3.40.52,51 3.47.48,49 3.52.38,33	+ 0,11 + 0,11 + 0,15 + 0,15 + 0,19 + 0,19		260. 1.48,4 256.18.10,5 254.56.36,0 255.46.21,6	737,6	+ 3,4	+ 1,5	-2.10,9 -2.37,6 -2.49,8 -2.42,4	
	Lalande 7632 Lalande 7666 Lalande 7815 Lalande 7873 Lalande 7874 Lalande 8130	3.58.34,00 3.59.40,90 4. 3.48,36 4. 5.28,08 4. 5.29,96 4.12.41,93	+ 0,12 + 0,12 + 0,11 + 0,12 + 0,12 + 0,14		259. 4.15,4 260.35.31,6 259.15.31,2 256.39.31,4				$\begin{bmatrix} -2.17,3\\ -2.7,8\\ -2.16,1 \end{bmatrix}$	
	Lalande 8312 Anonyme α Taureau 53 Eridan Piazzi IV, 157	4.17.18,63 4.22.33,02 4.27.47,90 4.31.47,66 4.32.54,88	† 0,19 † 0,21 - 0,28 † 0,06 † 0,06	+ 31,36	254.45.33,7 253. 0.24,0 296.10.17,5			+ 0,5	-2.52,1 -3.10,9 - 33,7	49,2
	Lalande 8918 89 Eridan Lalande 9106 Anonyme Lalande 9603 Lalande 9606	4.36.31,57 4.42.16,58 4.44.34,76 4.48.32,49 4.58.28,50 4.58.32,06	+ 0,17 + 0,09 - 0,73 - 0,73 + 0,10 + 0,10		256.31.58,8 263.23.20,3 323.46.21,4 323.51.52,8	737,5	+ 2,7	+ 0,1	-2.36,5 -1.53,3 - 2,4 - 2,4	
	2 Cocher	5. 6. 5,88 5. 7.48,92 5.17.17,71 5.24.10,11 5.28.22,79	- 0,77 - 0,01 - 0,44 - 0,03 - 0,03	+ 31,39 + 31,24 + 31,28	325.48.10,0 271.36. 6,6 308.26.31,2 273.40.10,9 274. 2.55,5	737,4	+ 2,4	- 0,2	- 0,4 -1.22,2 - 18,7 -1.16,3 -1.15,2	53,7 51,8 52,7
	Vorion	5.57.23,01	- 0,03 - 0,03 - 0,02 - 0,02 - 0,18 - 0,18 - 0,89 - 0,92	+ 31,36	273.56.45,2 273. 6.20,9 273. 2.45,3 287.20.49,9 287.16.20,9 329.54.59,6	737,4	+ 1,9	- 0,6	-1.15,6 -1.17,9 -1.18,1 - 47,2 - 47,4 + 3,9	49,9

Le 7, Niveau-7P, 14. d-25P,61.

12

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÉTRE	THERMO	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	<b>E</b>	ricur.	rieur.	0N.	POLE.
	Groombridge 1106. Argel. Z. 163, n°190 δ Petite Ourse I Argel. Z. 76, n° 105 Argel. Z. 169, n° 17 Anonyme α Grand Chien Lalande 13335 Anonyme δ-22°27′	6.21. 7,85 6.23. 6,61 6.32.40,64 6.34.52,08 6.39. 1,94 6.46.45,20 6.50.43,94	5. - 0,92 - 0,91 - 0,93 - 0,94 + 0,08 + 0,12 + 0,14	+ 31,32	331. 9.36,5 330.46. 3,5 13.21. 5,0 331. 9.42,9 331.33.18,2 331.56. 9,1 263.28.41,8 258.59.35,6	737,4 737,3	+ 1,4	- 1,2 - 1,5	+ 5,1 + 4,7 +1. 3,4 + 5,1 + 5,6 + 6,0 -1.53,6 -2.19,0	50,2
	Anonyme	6.50.45,18 6.54.37,72 7. 0.41,28 7. 4.48,00 7. 6.33,13 7. 6.52,55 7. 8. 3,95	+ 0,14 + 0,14 + 0,13 + 0,21 + 0,21 + 0,21		257.33.13,8 257.33.44,1 258.12.48,7 252.47.20,3	737,2	+ 0,9		-2.29,3 -2.29,3 -2.24,5	
8	α Andromède Vénus, bord 1, centr. α Cassiopée α Petite Ourse S α Baleine		- 0,44 - 0,13 - 1,09 - 0,14	+ 32,00 + 31,90 + 32,04	282.12.15,1 335.40.17,5 8.27.30,2	734,3 734,3 734,3 734,2	+ 3,6 + 3,6 + 3,7 + 3,6	+ 2,8 + 3,4 + 2,6 + 2,4	- 18,7 - 55,5 + 9,7 + 52,5	45,8 48,6 52,3
9	Soleil, bord 1, inf 35 y Céphée Andromèdey Pégase Vénus, bord 1, centr. a Cassiopée Baleine 37 µ Andromède	21.31.45,68 23.33.44,99 0. 1. 7,83 0. 6. 0,04 0.22. 8,19 0.32.31,32 0.36.32,12 0.48.56,17	+ 0,04 - 2,65 - 0,39 - 0,23 - 0,12 - 0,94 + 0,07 - 0,52	+ 32,68 + 32,53 + 32,67	265. 6.34,7 356.44.49,5 308.13.29,2 294.18.55,4 282.43.15,5 335.40.20,8 261.10.39,8 317.38.43,1	740,4 739,8 739,9	+ 4,4 + 4,5 + 4,5	+ 5,8 + 6,0 + 6,5	-1.43,7 + 34,0 - 18,6 - 35,8 - 54,2 + 9,6 -2. 2,0 - 8,6	45,6 44,8 53,0
	31 η Baleine	1. 1.31,60 1. 5.35,96 2.34.54,38 2.54.56,31 3. 1.56,19 3. 6.11,87 3.14. 8,25 3.18.28,76	- 0,19 - 0,13 + 0,17 + 0,18 - 0,75 - 1,03 - 1,03	+ 32,75	269. 0. 3,0 8.27.26,9 290. 4. 7,0 283.28. 6,6 251.36. 9,9 250.26. 6,9 329.16.59,4 338.18.40,7 338.12.29,0	740,0 740,3 740,4	+ 5,1 + 5,2 + 5,1	+ 7,2 + 5,4 + 4,9 + 4,8 + 4,6	-1.28,4 + 52,0 - 42,0 - 53,2 -3.26,0 -3.43,2 + 3,1 + 12,4 + 12,3	48, <sub>7</sub> 47, <sub>3</sub> 50, <sub>9</sub>
	39 b Struve { préc. suiv. Lalande 6809	3.22. 3,40	- 1,03		3,0	74-10	, .			

Le 9, Mire Sud-38", 19. Mire Nord B-13", 47. Mire Nord C-38", 39. Mire Nord D-69", 21.

13
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1849.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigee	BAROMÈTRE	THERM Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
		rii meriqieu.	ment.	pendule.	pour le niveau.	F .	rieur.	rieur.	). N	PULE.
	Lalande 6829 Lalande 6861	h. m. s. 3.34.26,78 3.35.10,44	s. + 0,08 + 0,08	5	260. 1.46,9	mn.	o	0	-2.10,3	"
	r <sup>6</sup> Eridan	3.40.53,79 3.47.49,99 3.52.39,81 3.58.35,52	+ 0,12 + 0,13 + 0,12 + 0,09		256.18. 9,2 254.56.34,0 255.46.15,8 259.11.52,5	740,6	+ 4,9	+ 4,2	-2.36,5 -2.48,6 -2.41,1 -2.15,3	
	Lalande 7666 Lalande 7873 Lalande 7874 Lalande 8130 Lalande 8312	3.59 42,38 4. 5.29,58 4. 5.31,50 4.12,43,31 4.17.19,93	+ 0,09 + 0,09 + 0,09 + 0,12 + 0,13		259.14.34,7 256.39.27,8 254.45.28,6			+ 4,2	-2.14,9 -2.33,8 -2.50,6	
	Anonyme	4.22.34,49 4.27.49,22 4.31.49.28 4.32.56,32	+ 0,15 - 0,25 + 0,04 + 0,04	+ 32,74	253. 0.22,3 296.10.14,3 265.22.59,3 256.31.54,3			+ 3,7	-3. 9,3 - 33,5 -1.43,3	46,2
	59 Eridan Lalande 9106 Anonyme Lalande 9603	4.42.18,22 4.44.36,22 4.48.33,87	+ 0,12 + 0,06 - 0,64 - 0,64 + 0,07		263.23.18,0 323.46.22,5 323.51.52,3	740,7	+ 4,5	+ 3,9	$ \begin{array}{r} -2.34,9 \\ -1.52,2 \\ -2,4 \\ -2,3 \end{array} $	
	a Cocher	5. 6. 7,18 5. 7.50,44 5.17.18,95 5.24.11.65 5.27.59,47	- 0,68 - 0,02 - 0,39 - 0,05 - 0,05	† 32,82 † 32,78 † 32,60	271.36. 3,5 308.26.26,0 273.40.10,1 273.52.28,8	740,7	+ 4,4	+ 3,6	-1.21,3 - 18,5 -1.15,7 -1.14,9	49,8 47,6
	Anonyme &-6°7' Weisse, V, 734 Anonyme Weisse, V, 921 Anonyme	5.27.59,87 5.29.46,85 5.31.30,77 5.36. 7,62 5.37.15,95	- 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,04 - 0,04		273.45.11,7	740,6	+ 4,2	+ 3,8	-1.15,2 -1.16,8	
	Lalande 10873 α Orion δ Petite Ourse I	5.37.32,95 5.47.33,73 6.21. 9,86	- 0,04	+ 32,77	287.20.48,2 13.21. 5,1	740,5	+ 3,7	+ 3,0 + 1,8	- 46,8 +1. 3,0	48, <sub>7</sub> 50,0
12	Soleil, bord 1, sup.   Andromède  y Pégase  Vénus, bord 1, centr.		+ 0,01 - 0,35 - 0,22 - 0,13	+ 34,78 + 34,54	266.38. 2,5 308.13.29,9 294.18.53,8 284.15.40,7	740,4 739,2 739,0	1 4 0	+ 5,4 + 6,9 + 6,9	-1.37,6 - 18,5 - 35,5 - 51,3	46,9 43,8
	α Petite Ourse S α Bélier α Baleine α Persée	1. 5.32,53 1.59.15,05 2.54.58,15 3.14.10,13	- 0,30 - 0,13 - 0,67	+ 34,67	8.27.29,9 302.42.51,8 283.28. 6,4 329.16.58,6	739,0 738,9 738,6 738,9	+ 5,8 + 5,5	+ 7,2 + 6,7 + 6,2 + 5,7	+ 52,0 - 24,8 - 52,9 + 3,1	52,3 45,1 47,5 50,2

Le 12, Mire Sud-38P,76.

14
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1849.

JOURS.	NOM  des astres.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERM(	Exté-	RÉFRACTION.	LIEU da POLE.
	Piazzi III, 54 396 Struve { préc. suiv.	h. m. s 3.18.30,46 3.22. 3,22 3.22. 5,52	s. - 0,92 - 0,92 - 0,92	s.	338.18.40,5 338.12.36,0	bun.	o	+ 5,5	+ 12,4	.,
	Lalande 6809 Lalande 6861	3.34. 2,10 3.35.12,42 3.40.55,81 3.47.51,87 3.52.41,71	+ 0,05 + 0,05 + 0,09 + 0,11 + 0,09		259.55.17,5 256.18. 6,7 254.56.31,5 255.46.16,0	738,9	+ 5,6	+ 5,6	-2. 9,8 -2.35,4 -2.47,4 -2.40,0	
	Lalande 7632 Lalande 7666 Lalande 7873 Lalande 7874 Lalande 8130	4. 5.33,48	+ 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,08		259. 4.10,0 259.14.33,2 256.39.25,8			+ 5,3	-2.15,2 -2.14,1 -2.32,6	-
	Lalande 8312 Anonyme	4.22.36,23 4.27.51,14 4.31.51,00	+ 0,10 + 0,12 - 0,23 + 0,02 + 0,02	+ 34,73	254.45.28,8 253. 0.21,2 296.10.13,3 265.19.49,4	738,9	+ 5,3	+ 5,3	-2.49,2 -3. 7,7 - 33,2 -1.42,8	45,6
	Lalande 8918 59 Eridan Lalande 9106 Anonyme Lalande 9603	4.36.35,01 4.42.20,12 4.44.38,08 4.48.35,71 4.51.56,58	+ 0,09 + 0,03 - 0,57 - 0,57 - 0,57 + 0,03		256.31.57,9 263.23.17,2 323.46.22,6 323.51.49,3 323.44.37,4 261.53.29,4			+ 4,5	-2.33,9 -1.51,5 - 2,4 - 2,3 - 2,4 -1.59,1	
	Lalande 9606  Cocher  GOrion  Taureau  Lalande 10389  Anonyme	4.58.35,42 5. 6. 9,23 5. 7.52,28 5.17.20,93 5.24.13,43	+ 0,03 - 0,60 - 0,03 - 0,35 - 0,06 - 0,06	+ 35,02 + 34,66 + 34,67	325.48. 5,9 271.36. 4,2 308.26.29,6 273.40. 8,4 273.52,29,4	738,7	+ 5,3	+ 4,5	- 0,4 -1,20,9 - 18,4 -1,15,1 -1,14,5	49,3 51,1 51,5
	Anonyme δ-6°7' Anonyme δ-6°16'. Weisse V, 921 Anonyme	5.28. 1,67 5.31.32,75 5.31.47,99 5.36. 9,59	- 0,06 - 0,06 - 0,05 - 0,05 - 0,05		273.45.10,3				-1.14,9 -1.16,5	
	Lalande 10873 \( \alpha \) Orion	5.37.34,69 5.47.35,76 5.57.26,01 6. 2.27,83	- 0,05 - 0,16 - 0,70 - 0,72 - 0,72	+ 34,85	287.20.47,3 329.54.58,5 331.10. 0,4	738,7	+ 5,0	+ 4,2	- 46,4 + 3,8 + 5,0	48,3
	8 Petite Ourse I	6.21.13,95	31/2		13.21. 1,9	738,6	+ 5,0	+ 4,2	+1. 2,3	45,5

## Observations faites à la lunette méridienne en Février 1849.

jouns.	NOM	PASSAGE CONCLU	0	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
18.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	corrigée pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
13	Soleil, bord 1, inf  A Andromède  Pégase  Cassiopée  Petite Ourse S  Cassiopée  50 u Andromède  4 Andromède  Cassiopée  Bélier  Belier  Beline  Persée	b. m. s 21.47.33,60 0. 1.10,59 0. 6. 2,86 0.32.33,96 0.37.53,17 1. 5.31,60 1.16.35,06 1.28.33,10 1.34.49,53 1.44.11,8t 1.59.15,77 2.54.58,95 3.14.10,91	5. + 0,02 - 0,35 - 0,22 - 0,84 - 0,14 - 0,95 - 0,53 - 0,68 - 1,10 - 0,30 - 0,13 - 0,67	+ 35,51 + 35,39 + 35,50 + 35,41	283.28. 6,0 329.16.58,9	737.4 736,5 736,5 736,9 736,9 737,0 737,0 737,0 737,0	+ 5,6 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,4 + 6,4 + 6,4 + 6,4	+ 3,9 + 5,8 + 5,8 + 5,8 + 6,2 + 5,9 + 6,2 + 5,7	-1.38,6 -18,5 + 9,6 -50,4 + 13,5 - 5,6 + 3,7 + 17,2 - 24,8 - 52,9 + 3,1	45,4 45,5 50,1 44,0 47,1 50,6
	Piazzi III, 54 396 Struve { Préc. suiv. Lalande 6809 Lalande 6829  **6 Eridan 133 / Eridan Lalande 7418 Lalande 7632 Lalande 7666 Lalande 7874 Lalande 8312  **α Taureau 135 Eridan Piazzi IV, 157 Lalande 8918 159 Eridan	3.18.31,02 3.22. 3,80 3.22. 5,94 3.34. 3,14 3.34.29,52 3.40.56,71 3.47.52,63 3.52.42,61 3.58.38,24 3.59.45,30 4. 5.34,26 4.12.46,04 4.17.22,84 4.27.51,82 4.31.51,96 4.32.59,00 4.32.59,00 4.42.20,92	- 0,92 - 0,92 - 0,92 + 0,05 + 0,05 + 0,09 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,09 + 0,10 - 0,23 + 0,02 + 0,09 + 0,09 + 0,05	+ 35,43	260. 1.47,7 256.18. 8,9 254.56.28,2 255.46.15,7 259.11.52,8 259.14.35,7 256.39.28,7 254.45.29,2 296.10.16,0 265.23. 2,9	7 <sup>3</sup> 7,7 7 <sup>3</sup> 7,9 7 <sup>3</sup> 8,2	+ 5,9 + 5,7 + 5,6	+ 5,t + 4,8 + 4,5	-2. 9,2 -2.35,5 -2.47,5 -2.40,1 -2.14,5 -2.14,3 -2.32,9 -2.49,6 -33,3 -1.42,7 -2.34,0 -1.51,6	48,2
	Lalande 9106 Anonyme Anonyme Piazzi IV, 294 Piazzi IV, 301 & Cocher & Orion B Taureau Anonyme Lalande 10389 Anonyme.	4.44.38,71 4.48.36,45 4.51.57,22 5. o. 6,07 5. 1. 6,19 5. 7.53,23 5.17.21,69 5.23.40,53 5.24.14,39	- 0,57 - 0,57 - 0,57 - 0,61 - 0,60 - 0,60 - 0,03 - 0,05 - 0,05 - 0,05	+ 35,76 + 35,63 + 35,44	323.46.20,5 323.51.48,5 323.44.33,2 326.42.36,0 325.48. 7,7 271.36. 1,8 273.38.50,7	738,4	+ 5,2	+ 4,2	- 2,4 - 2,3 - 2,4 + 0,6 - 0,4 -1.20,9 -1.15,2 -1.14,6	51,0 48,7

Le 13, Mire Sud-407,13. Mire Nord B-109,98. Mire Nord D-669,16.

## Observations faites à la lunette méridienne en Février 1849.

iours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de	MOVENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO	WÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
ł		rn menaien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	.55	rieur.	rieur.		IULL.
	Anonyme 8-6°7' Anonyme 8-6°14'.	b. m. s. 5.28. 2,51 5.31.33,65	s. - 0,05 - 0,05	5,	0 1 11	mor.	n	٥	<i>i n</i>	**
	Anonyme Anonyme	5.31.48,83 5.36.10,49 5.37.18,61	- 0,05 - 0,05 - 0,05		273.43.19,1				-1.15,0	
	Lalande 10873 Anonyme α Orion Piazzi V, 280 Argel. Z. 76, n° 72.	5.37.35,73 5.41.36,47 5.47.36,57 5.51.42,54 5.57.26,87	- 0,05 - 0,05 - 0,16 - 0,70 - 0,70	+ 35,68	273.16.39,8 287.20.48,9 329.51.28,1 329.54.57,2	738,5	+ 5,3	+ 3,8	-1.16,7 - 46,5 + 3,7 + 3,8	49,9
	Groombridge 1103. Groombridge 1106. Argel. Z. 163, nº 190 & Petite Ourse I	6. 2.28,61 6. 3. 5,69 6.12. 8,49 6.21.14,67	- 0,72 - 0,72 - 0,71		331. 9.58,7 330.46. 2,5 13.21. 5,9				+ 5,1 + 4,7 +1, 2,4	49,4
	Anonyme &+51°6'. Argel. Z. 76, n° 105 Argel. Z. 169, n° 17 Anonyme	6.32.44,51	- 0,72 - 0,72 - 0,73 - 0,73 + 0,03	+ 35,72	331. 9.41,2 331.33.17,7 331.56. 5,3 263.28.37,8	738,8	+ 5,0	+ 3,5	+ 5,1 + 5,5 + 5,9 -1.51,7	53,5
	Lalande 13335 Anonyme &-22°27' Anonyme	6.46.49,44	+ 0,06 + 0,07 + 0,07 + 0,07	,,	258.59.32,5 257.33. 7,8 257.29.10,3	700,0	, 4,0	, 5,5	-2.16,7 -2.26,8 -2.27,4	
	Anonyme	6.54.23,62 7. 0.45,58 7. 0.49,68	+ 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,12		257.29.10,3 258.16. 4,9 252.45.49,4				-2.27,4 -2.21,8 -3.12,0	
	Anonyme Anonyme Lalande 14578	7. 8. 8,23 7.16.27,87 7.21.54,50	+ 0,12 + 0,09 + 0,08	+ 35,80	252.54.32,9 256. 5.18,6 257.26.37,4				-3.10,3 -2.38,6 -2.27,8	51,1
	α Petit Chien β Gémeaux	7.32. 0,65 7.36.41,49	- 0,40 - 0,14 - 0,35	+ 35,59 + 35,78	312.10.47,3 285.34.52,8 308.21. 6,9	738,6	+ 4.7	+ 2,8	- 14,4 - 49,7 - 18,6	51,1 51,9 48,9
1	Vénus, bord 1, sup. Vénus, bord 1, centr. 37 μ Andromède α Petite Ourse S	0.41.47,65	+ 0,01 - 0,14 - 0,48		267.18.24,0 285.16.47,1 317.38.44,4 8.27.26,4	742,1 740,8	+ 5,8 + 5,8 + 5,9	+ 5,1 + 7,1 + 7,1	-1.35,4 - 49,6 - 8,6 + 52,1	49,3
	δ Cassiopée 50 υ Andromède 54 φ Andromède Cassiopée	1.16.35,70 1.28.33,77 1.34.50,29	- 0,97 - 0,52 - 0,68 - 1,10		339.24.38,7 320.36.49,2 329.53.22,5 342.53. 4,1	741,0	+ 5,9	+ 7,1	+ 13,5 - 5,5 + 3,7	

Le 13, Niveau-6P, 25. d-24P, 37. Nadir 146°9' 46", 22.

17
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1849.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERM!	DWÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	æ.	rieur.	rieur.	0N.	POLE.
	α Bélier	h. m. s. 1.59.16,51 4.51.58,04 5. o. 6,81	- 0,30 - 0,57 - 0,61	+ 36,16	323.44.38,3	mm.	+ 5,6	+ 4,9	- 2,4	"
	Piazzi IV, 3or α Cocher β Orion λ Taureau Anonyme	5. 1. 6,85 5. 6.10,41 5. 7.53,78 5.17.22,39 5.23,41,29	- 0,61 - 0,60 - 0,03 - 0,35 - 0,06	+ 36,25 + 36,20 + 36,17	326.42.35,6 325.48, 8,8 271.35.57,3 308.26.26,3 273.38.47,0			+ 4,7	+ 0,6 - 0,4 -1.21,3 - 18,5 -1.15,5	52,1 43,9 47,8
	Lalande 10389 Anonyme Weisse V, 756 Anonyme	5.24.15,17 5.28. 3,47 5.30.41,26 5.31.49,47	- 0,06 - 0,06 - 0,06 - 0,06		273.52. 0,2 273.43.20,9				-1.15,0 -1.15,5	
1	Weisse V, 921 Weisse, V, 964 a Orion d Petite Ourse I	5.36.10,99 5.37.50,37 5.47.37,09 6.21.15,20	- 0,05 - 0,05 - 0,16	+ 36,21	273. 6.19,3 273. 2.41,4 287.20.48,5 13.21. 5,9	743,0	+ 5,0	+ 2,8 + 2,5	-1.17,3 -1:17,6 - 46,9 +1. 3,0	49,1 49,8
	Lalande 1038g Anonyme Anonyme Weisse V, 921 Anonyme	5.24.15.63 5.28. 3,99 5.31.34,93 5.36.11,53 5.41.37,59	- 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04		273.40. 9,2 273.52. 3,4 273.45.10,5 273. 6.15,2 273.16.39,7	740,6 740,7	+ 5,2 + 5,2	+ 3,5	-1.15,5 -1.15,0 -1.15,3 -1.17,1 -1.16,3	
	2 Orion	5.47.37,71 5.51.43,79 5.57.28,31	- 0,04 - 0,16 - 0,70 - 0,70 - 0,72	+ 36,84	273.10.39,7 287.20.47,7 329.51.29,7 329.54.58,0 331. 9.54,6	740,7	+ 5,0	+ 3,1	- 46,7 + 3,8 + 3,8 + 5,1	48,5
	δ Petite Ourse I Anonyme α Gémeaux β Gémeaux	6.21.16,26 6.22.37,72 7.25.36,18 7.32. 2,13 7.36.42,83	- 0,72 - 0,40 - 0,14 - 0,35	+ 37,24 + 37,09 + 37,13	13.21. 8,2 331. 3.19,0 312.10.45,7 285.34.54,2 308.21. 5,5	740,8 741,0	+ 4,3 + 3,9	+ 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	+1. 2,8 + 5,0 - 14,5 - 49,9 - 18,7	51,7 49,2 53,2 47,3
16	Soleil, bord 1, inf Anonyme Anonyme Lalande 7873 Lalande 7874	21.59.16,82 3.49.31,47 3.52.56,52 4. 5.34,44 4. 5.36,34	0,00 - 0,57 - 0,57 + 0,02 + 0,02		267.27. 6,6 324. 0.29,9 323.37.50,2 259.15.27,6	7 <sup>3</sup> 9,9 7 <sup>3</sup> 8,5 7 <sup>3</sup> 8,5	+ 6,2 + 5,9 + 5,9	+ 6,8 + 7,0 + 6,9	-1.34,0 $-2,2$ $-2,5$ $-2.13,2$	
	Lalande 8130 Lalande 8312 Anonyme  Taureau 53 Eridan	4.12.48,13 4.17.24,89 4.22.39,27 4.27.53,98	+ 0,03 + 0,04 + 0,05 - 0,23	+ 37,64	256.39.25,5 254.45.22,2 253. 0.16,0 296.10.14,5		£	+ 6,7	-2.31,8 -2.48,4 -3. 6,7 - 33,0	47,1

Le 14, Mire Sud-401,00. Mire Nord B-121,72. Mire Nord D-691,16. Le 15, Mire Sud-381,29. Mire Nord C-371,76.

18
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	NOVENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERMO	MÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du
1	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	RE.	Inté- rieur.	rieur.	10N.	POLE.
	Piazzi IV. 157 Lalande 8918 59 Eridan Anonyme Anonyme.	4.48.38,45 4.51.59,23	0,00 + 0,03 0,00 - 0,57 - 0,57	5	265.19.49,2 256.31.53,8 263.23.14,4 323.51.49,7 323.44.35,8	nim.	0	+ 6,0	-1.42,3 -2.33,1 -1.51,0 - 2,3 - 2,4	rr
	Piazzi IV, 294 Piazzi IV, 301 α Cocher β Orion β Taureau Lalande 10389 Anonyme	5. 1. 8,25 5. 6.11,73 5. 7.55,21 5.17.23,79 5.24.16,29 5.28. 4,75	- 0,61 - 0,61 - 0,60 - 0,03 - 0,35 - 0,04 - 0,04	+ 37,61 + 37,66 + 37,60	326.42.30,8 325.48. 5,8 271.36. 3,7 308.26.28,1	738,2	+ 6,0	+ 5,0	+ 0,5 - 0,4 -1.20,7 - 18,4 -1.14,3	49,0 51,0 49,7
	Anonyme &-6°14'. Anonyme. Anonyme.  Orion Piazzi V, 280. Argel. Z. 76, n° 72. Groombridge 1 103.	5.51.44,59	- 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,16 - 0,70 - 0,70	+ 37,65	273.43.23,3 273.10.25,4 273.16.37,8 287.20.49,0 329.51.32,7 329.54.59,2	738,0	+ 5,8	+ 4,4	-1.14,7 -1.16,3 -1.16,4 - 46,3 + 3,7 + 3,8	50,3
	Groombridge 1106. Groombridge 1127. Anonyme	6. 3. 7,71 6. 7.25,08 6.12. 5,82 6.21.18,80 6.22.38,59 6.36.17,80 6.39. 8,21 6.43.46,18 6.46.51,56	- 0,72 - 0,72 - 0,85 - 0,72 - 0,72 - 0,72 - 0,00 + 0,01 + 0,01	+ 37,68	331. 9.35,5 336.16. 1,5 331.34.57,0 13.21. 8,7 331. 3.18,6 331.53.48,9 263.28.36,8 258.59. 4,6 258.59.30,5	738,0	+ 5,6	+ 4,0	† 5,0 + 10,3 + 5,4 +1. 2,2 + 4,9 + 5,8 -1.51,7 -2.16,8 -2.16,8	51,4
	Anonyme &-22°27 Anonyme Active Active Common 14578 Common Commo	6.50.51,25 6.54.18,79 6.54.25,67 7. 0.47,96 7. 0.51,58 7. 4.54,19 7. 8.10,29 7.16. 1,15 7.21.56,69 7.25.36,90 7.32. 2,73	- 0,40	+ 37,97 + 37,69 + 37,76	257.33.11,0 257.29. 8,4 257.29. 8,4 258.16. 7,9 252.45.45,3 252.54.30,7 256. 3. 7,5 257.26.35, 212.10.45,9 285.34.53,1	738,0	+ 4,6	+ 2,9 + 2,9	-2.26,9 -2.27,4 -2.27,4 -2.21,8 -3.12,0 -3.10,3 -2.38,9 -2.27,8 - 14,5 - 49,7 - 18,6	49,4 52,3 50,8

19
Observations faites à la lunette méridienne en Février et Mars 1849.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-		MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE	Inté-	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	Anonyme Anonyme Anonyme Piazzi VII, 266 Anonyme Anonyme	h. m. s 7.40.33,06 7.43.37,08 7.46.43,88 7.51. 1,07 7.51. 6,74 8. 0.14,13	ment.  s. + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,02 + 0,02 + 0,02	pendule.	258.49. 0,7 259. 5.18,8 258.58.47,2 257.34.25,0 257.15.19,1	738,0 738,0	rieur.	+ 2,5 + 2,5	-2.18,1 -2.16,4 -2.17,1 -2.27,0 -2.29,4	<i>(1</i>
	Soleil, bord 1, inf α Petite Ourse S α Bélier	23.40.52,11 1. 5.39,92 1.59.40,93 2.28.47,76 2.55.24,03 5. 8.18,08	- 0,10 - 0,24 - 0,22 - 0,12 - 0,05	+ 61,02 + 60,99 + 61,00	277.38.43,3 8.27.22,8 302.42.46,9 298.22. 0,5 283.28.10,2 271.36. 0,2	732,3 732,1 732,1 731,8 731,7 732,5	+ 5,8 + 6,4 + 6,6 + 6,4 + 6,4 + 5,9	+ 4.9 + 5.2 + 5.0 + 5.2 + 5.1 + 3.8	-1. 4,5 + 51,1 - 24,8 - 30,0 - 52,5 -1.20,4	52,0 43,2 52,4 48,5
1	Soleil, bord 1, sup.	1. 5.40,25	- 0,10		278.34.41,6	734,4	+ 5,6	+ 4,8	-1. 2,6	
	Vénus, bord 1, centr. 3 Petite Ourse I  a Baleine  a Persée  a Taureau  b Orion  a Taureau  a Petite Ourse I  a Gémeaux  a Petit Chien  b Gémeaux  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Jupiter, centre  a Hydre  Soleil, bord 1, inf  b Crand Chien  c Grand Chien  Soleil, bord 1, sup	2.35.29,58 2.52.15,38 2.55.25,79 3.14.37,05 4.28.18,44 5. 8.19,66 5.17.48,11 6.21.55,69 7.26. 1,36 7.32.27,37 7.37. 8,17 7.44. 1,96 7.45.13,16 9. 5. 4,29 9.21.14,19 23.51.51,71 5. 8.20,72 5.17.49,13 6.21.57,96 6.39.34,06	- 0,22 + 1,56 - 0,12 - 0,52 - 0,20 - 0,05 - 0,28 - 0,32 - 0,13 - 0,28 + 0,01 + 0,01 + 0,02 - 0,05 - 0,05 - 0,28	+ 62,93 + 62,77 + 62,63 + 62,65 + 62,56 + 62,71 + 62,94 + 62,71 + 62,88 + 63,70 + 63,60 + 63,99	299. 5.45,9 25.10. 7,0 283.38. 8,8 329.16.56,5 296.10.15,2 271.36. 0,2 308.26.29,9 13.21.18,2 312.10.49,4 308.21. 8,1 259. 5. 9,0 258.58.39,0 257.11.14,5 297.48.31,2 271.58.27,8 278.49.46,1 271.35.55,7 308.26.29,6 13.21.18,6 263.28.30,7	731,7 731,7 731,6 731,6 731,6 731,5 731,5 731,3 731,3 728,8 726,7 726,7	+ 8,5 + 8,9 + 9,0 + 8,6 + 8,3 + 8,1 + 7,9 + 8,0 + 7,9 + 8,5 + 9,1 + 9,1	+11,4 +11,1 +10,2 + 9,6 + 8,9 + 8,8 +10,1 + 8,7 + 8,4 + 8,2 + 6,8 + 6,6 +10,2 + 8,9 + 8,4 + 8,2	- 28,5 +1.32,6 - 51,4 + 3,0 - 32,4 -1.18,8 - 18,0 +1.0,3 - 14,0 - 18,1 -2.12,2 -2.13,0 -2.25,5 - 30,4 -1.18,3 - 17,8 +1.0,3 -1.47,9 - 58,6	48,7 52,1 51,3 49,2 50,1 51,9 55,0 51,1 48,4 46,1 51,4 46,1 51,9 55,3 52,9

Le 15 Mars, Mire Sud-42P,97. Niveau-6P,70.

Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le uiveau.	BARONÈTRE.	THERMO	DMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLB.
	α Petite Ourse S α Bélier Vénus, bord 1, centr. β Petite Ourse I α Baleine α Persée α Cocher β Orion δ Petite Ourse I α Grand Chien Piazzi VII, 266 Anonyme	2.52.17,58 2.55.27,59 3.14.38,77 5. 6.37,78 5. 8.21,63 6.21.58,56 6.39.34,88 7.51.27,71 7.51.33,47 7.56.15,03	s. - 0,24 - 0,22 + 1,56 - 0,12 - 0,53 - 0,47 - 0,05 0,00 + 0,02 + 0,02 + 0,02	s. + 64,50 + 65,00 + 64,60 + 64,40 + 64,59 + 64,62 + 64,83	302.42.48,9 298.47.40,2 25.10. 6,9 283.28. 7,3 329.16.55,8 325.48. 7,2 271.35.56,6 263.28.31,8 257.34.15,5 257.11.15,7	723,9 723,7 723,7 723,7 723,6 723,6 724,0	+ 9,0 + 9,6 + 9,6 + 9,6 + 9,1 + 8,5 + 8,5 + 8,4	+10,0 +10,1 +10,4 + 9,6 + 8,5 + 7,4 + 7,4 + 6,4	- 24,0 - 28,7 +1.31,8 - 51,0 + 3,0 - 0,4 -1.18,0 +1. 0,3 -1.47,7 -2.22,1 -2.24,9	76,3 48,2 51,0 50,9 50,4 47,0 53,3 54,3
	Anonyme. Anonyme. Anonyme. Lalande 16381. Lalande 16384. Lalande 17727. B. A. C. 3096. Jupiter, centre. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Lalande 19338.	8. o 41,07 8. 3.40,13 8. 8.14,54 8.14.43,89 8.51.50,67 8.57,38,22 9. 4.35,34 9.13. 7,74 9.21.16,27 9.24.14,56 9.32.38,86 9.36. 6,80 9.41.48,73	+ 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,02 + 0,03 0,00 + 0,04 - 0,01 + 0,01 - 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,04 + 0,04	+ 64,98	257.15.13,3 257.14.43,7 258. 6.29,0 257. 6.39,7 261.25.51.9 255. 5.35,3 297.50.35,5 259.50.21,0 271.58.25,0 258.30.48,7 258. 8.37,7 259.44.46,9 259.44.46,1 255.23.51,8 257.41. 6,5	724,0	+ 7,8	+ 6,1 + 7,0 + 5,4	-2.24,5 -2.24,6 -2.18,4 -2.25,6 -1.58,4 -2.42,0 -30,2 -2.7,2 -1.17,7 -2.15,9 -2.18,5 -2. 8,3 -2. 8,2 -2.40,1 -2.21,9	49,4
	Anonyme. Anonyme. Anonyme.  Lion Anonyme. Anonyme. Anonyme.	9.47.42,13 9.52.25,03 9.56.50,72 10. 1.25,98 10. 8.43,20	+ 0,03 + 0,04 + 0,02 - 0,17 + 0,02 + 0,02	+ 65,03	257.45.47,1 255.35.20,9 258.37.19,6 292.40.25,3 257.54.46,1 257.59.45,3	724,3	+ 7,5	+ 5,2	-2.21,4 -2.38,5 -2.15,6 - 37,3 -2.20,5 -2.19,9	49,1
2	Soleil, bord 1, inf  α Petite Ourse S  α Bélier  α Persée  α Cocher  β Orion	1. 5.41,79 1.59.45,53 3.14.39,81 5. 6.37,84	- 0,10 - 0,24 - 0,52 + 0,16 + 0,05	+ 65,66 + 65,46 + 65,30 + 65,13	329.16.55,2 326.31.27,2	727,4 727,4 727,5 727,7 728,2	+ 7,1 + 7,6 + 7,8 + 8,1 + 8,1	+ 5,4 + 6,8 + 6,3 + 7,3 + 7,0	- 59,7 + 51,2 - 24,5 + 3,1 + 0,4 +1.19,0	54,3 48,5 50,6 44,0 50,7

Le 19, Mire Sud-42°,51. Mire Nord B-9°,54. Mire Nord C-33°,14. Mire Nord D-66°,60. Niveau-5°,31 d-20°,20. Nadir 146°9′46″,87.

21

## Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1849.

Jours	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYEXXE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
	β Taureau	5.17.50,19 5.48. 5,17 6.22. 7,72 6.39.35,50	+ 0,11 + 0,07	s. + 65,09 + 65,10 + 65,51	343.53.11,7 4.58.53,2 278.58.29,1	728,2 728,5 728,7	+ 8,0 + 7,8 + 7,6	+ 7,0 + 6,4 + 6,7	+ 18,0 + 45,4 -1. 0,8	49,6 50,6 52,0
	α Grand Chien  Lalande 13213  Anonyme  Lalande 13625  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme	6.44.13,48 6.51.17,75 6.55.11,45 7. 1.15,08 7. 5.21,66 7. 7.26,23	+ 0,04 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03	+ 00,01	33.20.47,5 34.46.57,0 34.46. 5,2 34. 7. 4,7 39.34. 1,7 39.32.32,0	729,1	+ 7,5	+ 5,3	+2.13,5 +2.23,8 +2.23,7 +2.19,2 +3. 8,2 +3. 8,0	
	Anonyme δ-27°6'.  Anonyme.  Lalande 14578  α Sémeaux  β Gémeaux  Lalande 15163  Anonyme  Anonyme	7. 8.37,57 7.16.28,57 7.22.24,03 7.26. 3,28 7.32.29,93 7.37.10,39 7.40.24,04 7.44. 4,66 7.47.11,52	+ 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,07 + 0,07 + 0,03 + 0,03 + 0,03	+ 65,75 + 65,51 + 65,60	36.16.40,0 34.53.13,8 340. 8.53,5 6.44.50,8 343.58.31,3 32.36.26,6 33.14.30,8 33.21. 5,4			+ 4,6	+2.35,9 +2.25,0 + 14,1 + 48,7 + 18,3 +2. 9,9 +2.13,9 +2.14,6	52,1 49,9 51,3
	Piazzi VII, 266 Anonyme Anonyme Anonyme Lalande 16381	7.51.28,32 7.51.34,65 7.56.15,65 8. 8.15,44	+ 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03		34.45.25,2 35. 8.25,2 34.13.11,9	729,5	+ 7,0	+ 4,1	+2.24,3 +2.27,2 +2.20,5	
	Lalande 16384 Lalande 16649 Anonyme Lalande 17048 Anonyme. Lalande 17461 Lalande 17727 Anonyme	8.14-44,79 8.21.31,87 8.25.44,29 8.28.58,55 8.32.12,49 8.39.10,78 8.44-28,26 8.51.51,66 8.57.30,09	+ 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,04 + 0,03		35.12.54,4 35. 5.18,6 35.44.35,5 35.38.17,8 35.41. 4,0 35.34.15,7 35.43.14,7 30.53.45,7 37.21.11,5	729,8	+ 6,9	+ 5,0	+2.27,7 +2.26,7 +2.31,7 +2.30,8 +2.31,0 +2.30,2 +2.31,5 +2.0,1 +2.45,7	
	B. A. C. 3096. Jupiter, centre. Anonyme. A Hydre. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Lalande 19338.	9. 4.21,22 9.13. 8,68 9.21.16,79 9.24.15,36 9.28.41,32 9.32.39,66 9.41.49,71	+ 0,03 + 0,09 + 0,03 + 0,05 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03		354.28.10,0 32.29.19,6 20.21.17,4 33.48.48,7 34.11. 1,5 32.34.50,3 36.55.46,0 34.38.29,7			+ 4,3	+ 30,7 +2. 9,3 +1.18,9 +2.17,8 +2.20,4 +2.10,0 +2.42,3 +2.24,0	54,1

Le 20, Mire Sud-43",14. Mire Nord B-8",39. Mire Nord C-32",80. Mire Nord D-63",97. Niveau-5",26.

d-21",83. Nadir 146°9' 47",50.

Après l'observation de α Persée, on retourne l'instrument et on le laisse le cercle à l'Est. Après le retournement, Mire Sud-38°,90. Mire Nord C-29°,80. Niveau-0°,92.

Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1849.

JOURS	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM6	NÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
ľ	DES AVINES.	Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	RE.	rieur.	rieur.	ON.	POLE.
	Anonyme Anonyme Anonyme anonyme	h. m. s. 9.47.43,08 9.52.25,73 9.56.51,64 10. 1.26,18	s. + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,08	s. + 65,48	34.33.48,2 36.44.10,0 33.42.14,2 359.39.13,0	730,3	+ 6,1	+ 3,0	+2.23,5 +2.41,0 +2.17,8 + 37,9	49,8
21	Soleil, bord 1, sup.  A Petite Ourse S  Bélier  Vénus, bord 1, centr.  Baleine  A Persée  Taurcau  Cocher  3 Orion  B Taureau  Orion  Petite Ourse I  Grand Chien  Lalande 13213  Lalande 13335  Anonyme  Anonyme  Anonyme	2.55.28,85 3.14.39,53 4.28.21,52 5. 6.38,58 5. 8.22,96 5.17.50,99 5.48. 6,09 6.22.10,74 6.39.36,30 6.44.14,32 6.54.18,23 6.54.46,91 6.54.53,84 7. 1.15,66	+ 0,06 + 0,10 + 0,09 + 0,05 + 0,16 + 0,05 + 0,01 + 0,07 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03	+ 65,95 + 66,06 + 65,89 + 66,08 + 66,07 + 66,09 + 65,91 + 66,04 + 66,33	11.46.29,7 283.52.19,7 349.36.49,1 351.51.44,9 8.51.28,1 323. 2.41,5 356. 9.28,0 326.31.27,0 20.43.38,4 343.53.13,0 4.58.52,1 278.58.29,5 28.51. 7,0 33.20.42,0 33.20.17,3 34.46.54,2 34.50.36,7 34.50.36,7 34.7.0,2	732,6 731,6 731,2 731,1 731,1 731,0 730,6 730,6	+ 7,5 + 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,4 + 8,5	+ 7,6 + 8,3 + 9,2 +10,0 +10,1 +10,4 +10,4 + 9,9 + 9,2 + 8,8 + 8,5	+ 57.7 - 51.2 + 24.3 + 26.9 + 51.6 - 3.0 + 32.2 + 0.4 +1.18.4 + 17.9 + 45.1 -1.0,5 +1.48.4 +2.12.8 +2.12.8 +2.22.9 +2.23.4 +2.18.3	48,8 51,8 45,0 46,1 53,7 43,7 48,2 50,8 49,2 52,8 45,2
	Anonyme. Anonyme &-27°14' Anonyme &-27°6'. Anonyme &-27°6'. Anonyme. Lalande 14578.  a Gémeaux.  a Petit Chien. G Gémeaux. Lalande 15163. Anonyme.	7. 7. 7,54 7. 7.26,83 7. 8.38,36 7.16.29,33 7.22.24,77 7.26. 4,34 7.32.30,77 7.37.11,09 7.40.24,84 7.44. 5,34 7.47.11,98 7.51.29,29 7.51.35,01 7.56.16,55 8.57.30,65	+ 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,01 + 0,07 + 0,01 + 0,03 + 0,05 +	+ 66,43 + 66,37 + 66,32	39.33.58,8 39.24.16,7 36.16.36,3 34.53.10,2 340. 8.49,1 6.44.47,5 343.58.30,7 32.36.25,2 33.14.30,7 33.21. 4,7 34.45.21,4 35. 8.26,3 37.21. 3,0	730,8 730,6 730,6	+ 7,6	+ 7.8	+3. 6,8 +3. 4.9 +2.34,5 +2.23,7 + 14,1 + 48,4 + 18,2 +2. 9,2 +2.13,2 +2.14,1 +2.23,9 +2.26,9 +2.45,8 + 30,7	47,7 46,3 50,7

Le 20, d-17<sup>p</sup>,09. Nadir 146°9' 47",00. Le 21, Mire Sud-38p,45. Mire Nord B-6°,47. Mire Nord C-29p,38.

23
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1849.

					: mertaterne c					
Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigee pour le uiveau.	BARONÈTRE.	THERM  laté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
The second secon	Lalande 18250 Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Lalande 19338 Anonyme	h. m. s. 9. 8. 7,84 9.13. 9,18 9.16. 9,46 9.21.17,51 9.24.16,68 9.28.42,23 9.32.40,50 9.41.50,47 9.45.13,45 9.47.43,88 9.52.26,41 9.56.52,34 10. 1.26,98 19.44.31,20 20.37.23,15	5. + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,05 + 0,03 +	+ 66,35 + 66,29 + 66,50 + 66,72	34.34.49,1 32.29.18,4 32.24.25,1 20.21.12,9 33.48.49,5 34.11.0,5 32.34.53,1 36.55.43,8 34.38.29,0 34.33.48,0 36.44.10,2 33.42.16,7 359.39.12,9 3.52.43,4 327.37.20,3	730,7 729,6 729,5	+ 5,8 + 5,6 + 5,8	+ 1,9 + 0,7 + 3,0	+2.23,3 +2.9,6 +2.9,1 +1.19,1 +2.18,3 +2.21,0 +2.43,0 +2.24,6 +2.24,1 +2.41,6 +2.18,3 +38,1 +44,6 +1,5	51,0 49,1 47,0
	Soleil, bord 1, inf.  2 Persée.  2 Taureau  3 Petite Ourse I.  2 Grand Chien.  2 Gémeaux.  4 Petit Chien.  5 Gémeaux.  Jupiter, centre.  4 Hydre.  2 Lion.  Soleil, bord 1, sup.	o. 6.28,75 3.14.40,51 4.28.22,46 6.22.12,14 6.39.37,14 7.26. 5,30 7.32.31,73 7.37.12,09 9. 3.56,43 9.21.18,43 10. 1.28,14	+ 0,06 + 0,17 + 0,08 + 0,04 + 0,11 + 0,07 + 0,11 + 0,08 + 0,05 + 0,08	+ 66,89 + 67,04 + 67,19 + 67,41 + 67,35 + 67,34 + 67,28 + 67,46	11.55.10,4 323. 2.41,8 356. 9.27,6 278.58.28,3 28.51. 8,5 340. 8.50,7 6.44.50,2 343.58.30,0 354.26.24,8 20.21.18,4 359.39.14,1	728,3 726,0 725,5 725,1 724,9 724,9 724,7 724,6	+ 7.7 + 8.7 + 8.8 + 8.5 + 8.1 + 8.1 + 7.3 + 7.0 + 6.6 + 8.5	+ 7,4 + 9,4 + 9,5 + 7,2 + 7,0 + 4,8 + 4,7 + 4,0 + 8,2	+ 57.7 - 3.0 + 32.1 -1. 0.4 + 14.8,0 + 14.0 + 18.0 + 30.4 + 1.18,2 + 37.5 + 55.0	46,2 53,2 51,7 46,3 49,3 48,6 49,8 54,3 50,6
	3 Petite Ourse I  α Baleine Vénus, bord 1, centr.  α Persée	2.52.29,77 2.55.37,41 3.12. 3,20 3.14.47,96	- 0,46 + 0,06 + 0,10 + 0,17	+ 74,61 + 74,70 + 74,46	267. 9.36,8 8.51.34,6 349.30.48,3 323. 2.48,8	715,7 715,7	+ 8,2 + 8,8	+12,0	-1.30,3 + 50,2 + 23,5 - 3,0	54,6 50,0
3:	Soleil, bord 1, sup.  α Petite Ourse S  β Petite Ourse I  α Baleine  α Persée  Vénus, bord 1, centr.	0.39.21,89 1. 5.34,22 2.52.32,42 2.55.39,81 3.14.50,45 3.17.19,97	+ 0,07 - 0,46 + 0,06 + 0,17 + 0,10	+ 77,16 + 77,12 + 76,99	7.51.48,8 283.52.22,9 267. 9.33,5 8.51.33,0 349. 0.43,3	722,0 722,1 722,2 722,2	+ 7,9 + 8,2 + 9,0 + 9,0	+11,2 +12,0 +13,0 +13,0	+ 49,0 - 49,9 -1.30,7 + 50,4 + 23,0	50,1 50,4 48,9

Le 21, Niveau-09,97. d-169,31. Nadir 14609' 48",50:

Le 22, Mire Sud-381,46. Mire Nord B-51,66. Mire Nord C-301,16. Mire Nord D-601,10.

Le 31, Mire Sud-38º,65. Mire Nord B-8º,19. Mire Nord D-64º,16. Après l'observation de Vénus, la pendule a été enlevée pour être nettoyée; elle a été replacée le 5 Avril.

24

Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1849.

iouns.	NOM · DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		le la pendule.	MOYEXNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERMO	MÉTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
6	δ Petite Ourse I α Grand Chien α Gémeaux α Petit Chien β Gémeaux	h. m. s. 6.21.13,00 6.38.32,98 7.25. 1,04 7.31.27,47 7.36. 7,65	5. + 0,0/+ + 0,11 + 0,07 + 0,11	+ 3,23 + 3,28 + 3,36 + 3,19	278.58.24,1 28.51. 7,4 340. 8.53,1 6.44.47,9	718,2 718,2 718,2 718,7	+ 9,8 + 9,8 + 10,0	0 +11,4 +11,4 + 9,4	- 58,9 +1.45,4 + 13,7 - 47,2	48,6 42,7 52,0 45,7
	Jupiter, centre Lalande 18250 Anonyme  A Hydre  Carande Ourse  B Lion  Grande Ourse  Grande Ourse	7.50.25,95 9. 1. 7,79 9. 7. 4,81 9.12. 6,20 9.20.14,46 10. 0.24,00 10.54,26,69 11.41,26,02 11.45,56,77	+ 0,03 + 0,08 + 0,03 + 0,03 + 0,05 + 0,08 + 0,25 + 0,08 + 0,20	+ 3,50 + 3,47 + 3,46 + 3,50 + 3,23	34.48.40,2 354.20.18,6 34.34.57,6 32.29.25,8 20.21.17,8 359.39.14,0 309.48.14,3 356.56.27,4 317.49.58,7	718,7 719,1 719,2 719,4 719,6	+ 9,8 + 8,6 + 8,4 + 8,3 + 8,2 + 8,3	+ 8,4 + 6,8 + 6,6 + 6,5 + 7,1 + 5,6	+2.20,4 + 29.9 +2.20,1 +2. 6,6 +1.17,2 + 37,0 - 16,4 + 33,4 - 8,2	52,2 50,8 51,9 49,4 50,5
7	Soleil, bord 1, inf  a Pégase	1. 3.38,69 22.57.17,85	+ 0,07	+ 3,90	5.43.4 <sub>7</sub> , <sub>2</sub> 35 <sub>7</sub> .5 <sub>7</sub> .4 <sub>0</sub> , <sub>9</sub>	718,7 716,8	+ 9,8 + 9,5	+10,2 +10,0	+ 45,4 + 34,0	48,7
8	Soleil, bord 1 a Petite Ourse S	1. 7.18,49	+ 0,07							
IX	Soleil, bord 2 α² Gémeaux α Petit Chien β Gémeaux	1.20.28,20 7.25. 2,66 7.31.29,23 7.36. 9,45	- 0,07 + 0,11 + 0,07 + 0,11	+ 5,17 + 5,21 + 5,09	340. 8.54,9 6.44.50,0 343.58.32,4	716,6	+10,4	+ 8,6	+ 13,7 + 47,2 + 17,7	54,0 47,9 52,8
12	α Andromède α Cassiopée α Petite Ourse S	0. 0.40,10 0.32. 2,58 1. 4.17,96	+ 0,11	+ 5,31 + 5,41	344. 6.16,9 316.39.35,4 283.52.26,4	718,3 718,1 717,8	+ 8,7 + 8,9 + 9,2	+ 7,5 + 8,5 + 9,1	+ 18,0 - 9,2 - 50,1	51,3 48,4 49,3
13	Soleil, bord 1, sup.  2 Persée  Vénus, bord 1, centr  2 Taureau  Cocher  3 Orion  3 Taureau	3.13.38,73 3.41.12,45 4.27.20,61 5. 5.37,65 5. 7.22,06			2.59. 6,0 323. 2.46,1 346.45.40,3 356. 9.24,9 326.31.28,8 20.43.35,7 343.53.10,0	717,6 716,8 716,6 716,0 715,8 715,5	+ 9,5 +10,0 +10,2 +10,4 +10,6 +10,6	+12,1	+ 41,2 - 3,0 + 20,5 + 31,4 + 0,3 +1.16,2 + 17,4	46,8 49,4 43,5 44,4 46,5
	4 α Petite Ourse S		1		283.52.23,4	716,9			- 50,2	
1	8 α <sup>2</sup> Gémeaux α Petit Chien						+ 5,8	+ 0,2	+ 14,3 + 49,1	49.7

Le 13, Mire Sud-37°, 58. Mire Nord B-7°, 93. Mire Nord C-30°, 68. Mire Nord D-64°, 23. Niveau-0°, 38.

25
Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1849.

TOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	CORR	-	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
		Fil Méridiea.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.	)X	POLE.
	3 Gémeaux α Andromède α Petite Ourse S	n. m. s. 7.36. 9.35 a. 0.39,67 1. 4.23,39	s. † 0,11 † 0,11	\$. + 5,12 + 4,78	343.58.30,4 344. 6.17,5 283.52.31,2	723,9 721,7 720,6	+ 5,6 + 5,2 + 5,6	+ 0,2 + 1,6 + 3,8	+ 18,4 + 18,4 - 51,3	51,7 52,0 51,2
19	Soleil, bord 1, sup.	1.47.51,22 4.27.19,66	+ 0,08	+ 4,60	0.51.39,0 356. 9.28,4	720,0 71717	+ 6,1 + 6,8	+ 4,8 + 6,3	+ 38,9 + 32,1	53,6
21	α Andromède α Cassiopée α Petite Ourse S Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup>	0. 0.38,41 0.32. 0,64 1. 4.24,35 1.16. 1,06	+ 0,11 + 0,21	+ 3,46 + 3,30	344. 6.17,3 316.39.38,1 283.52.33,4 6.15. 0,6	728,4 728,4 728,3 728,3	+ 5,2 + 5,2 + 5,5 + 5,5	+ 4,2 + 5,0 + 5,3 + 5,4	+ 18,4 - 9,5 - 51,6 + 47,7	51,7 49,1 52,1
ľ	Soleil, bord 1, inf ? Petite Ourse I z Hydre 23 Chevelre de Bér.	1.59. 1,20 6.21.15,74 9.20.13,77 12.27.23,61	+ 0,08	+ 3,05	0.22.24,2 278.58.29,7 20.21.15,8 348.53.52,7	728,2 727,5 727,5 727,1	+ 6,0 + 6,8 + 6,3 + 6,0	+ 6,6 + 8,3 + 5,7 + 4,4	+ 38,4 -1. 0,4 +1.18,2 + 23,8	50,7 51,2
24	α Orion	5.47. 0,93 7.24.58,80 7.31.25,25 7.36. 5,59	+ 0,09 + 0,20 + 0,08 + 0,18	+ 1,43 + 1,66 + 1,44 + 1,54	4.58.5 <sub>2</sub> ,6 340. 8.5 <sub>2</sub> ,5 6.44.47,8 343.58.3 <sub>1</sub> ,5	721,9	+ 8,4	+ 8,5 + 8,5 + 8,5	+ 44,7 + 13,8 + 47,6 + 17,9	50,0 51,8 46,5 52,4
	α Lion	10. 0.21,78 12.27.22,03 0.31.58,34 1. 4.16,93	+ 0,11 + 0,16 + 0,40	+ 1,50	359.39. 9,7 348.53.52,5 316.39.35,4 283.52.31,4	723,4 724,1 725,8 725,7	+ 7,7 + 7,6 + 8,4 + 8,8	+ 5,7 + 5,3 +10,2 +10,4	+ 37,2 + 23,6 - 9,3 - 50,4	47,8 46,1 50,4
25	Soleil, bord 1, sup.  a Taureau Lune, bord 1, inf.	2.10.14,46 4.27.15,94 4.41.45,20	+ 0,09 + 0,11 + 0,12 + 0,12	+ 0,95	3.44.:5,8 358.50.59,6 356. 9.27,9 355.58.49,7	725,8 725,7 725,5 725,4	+ 9,2 + 9,5 + 9,7 + 9,7	+10,9 +10,8 +11,6 +11,6	+ 42,9 + 35,4 + 31,9 + 31,6	52,9
	a Cocher	5. 7.17,16 5.16.45,29 5.47. 0,31	+ 0,30 + 0,03 + 0,18 + 0,09	+ 0,91 + 0,79 + 0,84 + 0,83	326.31.30,7 20.43.37,2 343.53.11,8 4.58.53,8	725,3 725,3 725,3	+ 9.7 +10.0 +10.2	+11,8 +12,0 +12,5	+ 0,4 +1.17,3 + 17,6 + 44,2	44,2 48,2 47,9 50,7
	<sup>2</sup> Petite Ourse J <sup>2</sup> Grand Chien <sup>2</sup> Gémeaux <sup>2</sup> Petit Chien	6.38.30,26 7.24.58,12 7.31.24,61	0,00	+ 0,91 + 1,00 + 0,82	278.58.27,6 28.51. 7,6 340. 8.51,6 6.44.47,5	725,3	+10,1	+12,5	- 59,3 +1.46,2 + 13,8 + 47,4	49,1 44,8 50,9 46,0
	Anonymeα Lionα	9.51.20,47	+ 0,18 - 0,02 - 0,02 + 0,11		343.58.31,2 36.44.22,2 33.42.19,9 359.39. 9,9	725,0	+ 9,2	+ 9,1	+ 17,8 +2.36,4 +2.13,9 + 36,9	47,8

Le 19, Niveau-op,96.

26
Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU	_	LECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	_	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TON.	POLE.
	Anonyme.  Anonyme.  3o f Petit Lion.  4o Petit Lion.  51 m² Lion.  45 ω Grande Ourse  Grande Ourse  Carade Ourse  Anonyme.  Anonyme.  Weisse, XII, 1036.  Weisse, XIII, 301.  Weisse, XIII, 301.  Weisse, XIII, 486.  Anonyme.	10.27. 8,03 10.34.45,35 10.38.17,76 10.39.36,08 10.45.17,71 10.54.23,63 12.27.21,51 12.30.45,66 12.35.23,72	s 0,02 + 0,21 + 0,13 + 0,13 + 0,14 + 0,14 + 0,11 + 0,11 + 0,08 + 0,07 0,00	+ 1,16	34.24.59,1 34.20.0,0 337.47.52,3 42.36.23,7 2.55.31,7 345.14.35,0 352.36.1,4	725,3 725,4 725,7	+ 9,2 + 9,1 + 8,6	+ 7,8 + 7,8 + 8,2 + 5,5 + 5,1 + 4,4 + 4,0	+2.18,5 +2.18,4 + 11,5 +3.47,7 + 41,8 + 19,3 + 27,8 - 16,4 + 23,6 + 26,2 + 26,4 + 36,8 + 36,3 + 47,1 + 52,4 + 1.49,5	43,7
	Lalande 25543 Lalande 25617 Lalande 25824 Weisse, XII, 1043. Weisse, XIV, 34	13.45.44,10 13.48.15,05 13.56.24,43 13.58.54,74 14. 2.40,85 14.12.40,76 14.16.23,82 14.19.37,30 14.25.24,76 14.28. 8,05 14.42.23,12 14.42.34,54	- 0,01 - 0,01 + 0,04 + 0,04 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,01	+ 0,52 + 0,52	30.45.17.4 30.49.27,8 16.59.59,3 17. 8.15,8 17. 5.19,8 352.23.11.7 24. 0.38,3 24. 4.18,9 25. 1. 0,8 26. 0. 8,7 25.42.11.4 27.42. 1,5	725,8 725,8 725,7	+ 7,t + 6,9 + 6,9	+ 4,3	+1.58,8 +1.59,1 +1. 9,6 +1. 9,9 +1. 9,8 + 28,0 +1.30,1 +1.30,3 +1.33,7 +1.37,5 +1.36,4 +1.44,5	50,1
26	α Andromède α Cassiopée α Petite Ourse S Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup> Soleil, bord 1, inf. α Taureau α Cocher β Orion β Taureau	0. 0.35,19 0.31.57,68 1. 4.15,72 1.44.50,52 2.13.59,72 4.27.15,04 5. 5.31,97 5. 7.16,57 5.16.44,49	+ 0,18 + 0,40 + 0,10 + 0,11 + 0,12 + 0,30 + 0,03 + 0,03	+ 0,20	344. 6.16,6 316.39.35,7 283.52.31,4 2.52.58,1 359. 3.40,4 326.31.30,7 20.43.37,2	725,8 725,7 725,6 725,5 725,1	+ 8,4 + 8,7 + 8,9 + 9,4 + 9,8	+10,2 +10,4 +11,5 +11,7 +10,6	+ 18,0 - 9,3 - 50,2 + 41,1 + 35,8 + 0,4 +1.17,1	50,5 46,3 50,4 44,0 48,1

Le 25, Mire Sud-37P,97. Mire Nord] B-7P,83. Mire Nord C-29P,55. Mire Nord D-60P,50. Niveau-1P,14

d-14P,01. Nadir 146°9' 49",10.

27
Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1849.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERM Inté-	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU da POLE.
And the second s	Lune, bord 1, sup.  µ Gémeaux.  ∂ Petite Ourse I  γ Gémeaux.  α Grand Chien.  α Gemeaux.  α Petit Chien  β Gémeaux.  Jupiter, centre.  α Hydre.  f Petit Lion.  α Pompe pneumat.  49 Lion.  γ Grande Ourse.  23 Chevelte de Bér.  Anonyme  γ Grande Ourse I  Weisse, XII, 1036.  Weisse, XIII, 486.  Anonyme.  Lalande 25824  Weisse, XIV, 34  α Bouvier  Weisse, XIV, 34  α Bouvier  Weisse, XIV, 34  α Bouvier  Weisse, XIV, 360.  Anonyme  Weisse, XIV, 360.  Anonyme  Weisse, XIV, 512  Weisse, XIV, 512  Weisse, XIV, 587.  α Balance.  α² Balance  α² Balance  α² Balance	b. m. s.  5.46.12,46 6.13.49,13 6.21.17,41 6.28.59,10 6.38.29,52 7.24.57,42 7.31.23,79 7.36. 4,07 9. 3. 6,01 9.20.10,81 10.17.15,54 10.20.16,55 10.27. 7,81 10.34.44,80 11.41.22,64 11.45.53,21 12.27.20,78 12.30.44,82 12.35.23,08 12.59.59,40 13. 4.20,20 13. 4.32,15 13.18.51,77 13.28.17,69 13.33.33,12 13.56.23,75 13.58.53,94 14. 2.40,15 14. 8.48,00 14.12.40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18 14.16.23,00 14.12,40,18	+ 0,13 + 0,14 + 0,12 0,00 + 0,08 + 0,18 + 0,12 + 0,03 + 0,12 + 0,05 + 0,10 + 0,17 + 0,12 + 0,38 + 0,16 + 0,14 + 0,14 + 0,14 + 0,11 + 0,01 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,	+ 0,18 + 0,32 + 0,02 + 0,06 + 0,13	354. 0.35,3 349.46.27,3 278.58.26,4 355.50. 5,1 28.51. 5,7 340. 8.52,5 6.44.46,0 343.58.30,0 354.30.48,3 20.21.17,6 337.47.50,7 42.36.26,9 2.55.31,7 345.14.33,9 356.56.24,5 317.49.48,5 348.53.50,5 351.10.24,8 359.13.12,9 358.49.12,7 5.51.26,5 8.53.46,8 28.53.44,1 16.59.59,1 17. 8.18,2 17. 5.18,4 352.23.12,2 24. 0.39,1 24. 4.18,6 25. 1. 1,4 26. 0.10,2 25.42.18,7 18.53.42,9 27.42. 1,9	724,5 724,4 724,5 724,4 724,5 724,8 724,9 724,9 725,0 725,2 725,2 725,2 725,6	+10,5 +10,7 +10,8 +11,2 +11,0 +11,0 +10,6 +10,2 +10,2 +10,1 +10,2 +10,1 +10,2	+14,4 +14,6 +15,0 +16,2 +110,9 +10,4 +10,1 + 9,8 + 9,0 + 8,7 + 7,79 + 8,1 + 7,8 + 8,0 + 7,1 + 7,4 + 7,4	+ 28,8 + 23,8 + 31,0 + 1.45,0 + 13,5 + 46,4 + 17,4 + 29,8 + 11,4 + 3,45,3 + 41,4 + 19,2 + 33,1 - 8,1 + 23,3 + 25,9 + 36,3 + 35,8 + 46,4 + 51,6 + 1.48,1 + 1.8,5 + 1.8,9 + 1.29,2 + 1.32,5 + 1.35,0 + 1.35,0 + 1.35,0 + 1.35,0 + 1.43,2	47,2 41,8 51,5 43,6 50,4 51,4 48,2 45,2
	Soleil, bord 1, sup. f Petit Lion  a Pompe pneumat 49 Lion.	2.17.45,76 10.17.14,64 10.20.15,89 10.27. 7,14	+ 0,12 + 0,21 - 0,05 + 0,10		358.12.30,9 337.47.51,4 42.36.26,4 2.55.31,6	725,6 724,8	+11,4	+15,0	+ 34,1 + 11,3 +3.43,1 + 41,0	

Le 26, Mire Sud-39P,80. Mire Nord 6-28P,15. Niveau-1P, 13.

28
Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1849.

-				DOTION:	AND ALCOHOLD					-
75	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	DARONÈTRE.	THERMO	MÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
sauoi	DES ASTRES.	au	-	-	corrigée	)MÈT	Jes'	Exté-	ACT	du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instra- ment.	la pendule.	pour le niveau.	E.	Inté- rieur.	rieur.	10N.	POLE.
-		h. m. s.	s.	5.	0 1 11	nım.	0	0	1 11	
	40 Petit Lion	10.34.44,07	+ 0,18		345.14.34,1				+ 19,0	
	51 m2 Lion	10.38.16,46	+ 0,13							
	Lalande 20780	10.39.34,74	+ 0,13		352.36. 0,2			+12,9	+ 27,3	
1	45 ω Grande Ourse. α Grande Ourse	10.54.22,35	+ 0,27	- 0,06	328.22.12,2 309.48. 2,4			+12,9	+ 2,1	44,7
	Anonyme	10.59.14,20	+ 0,10	- 0,00	1.54.53,8				+ 39,6	TT1/
	Weisse, XI, 61	11. 4.51,46	+ 0,10		1.40. 6,4				+ 39,3	
	15 y Hydre et Coupe		0,00		29.11.34,8			+11,4	+1.48,1	
	Weisse, XI, 446 3 Lion	11.25.44,96	+ 0,10	- 0,50	3.32.26,6 356.56.27,7			+10,8	+ 42,2	51,3
	Grande Ourse	11.45.52,21	+ 0,12	- 0,87	317.49.50,2	725,0	+11,9	+11,3	- 8,1	47,1
	α Petite Ourse I	13. 4.35,27	1 0,00	3,-7	280.52.48,6	725,0	+11,6	+11,2	- 55,7	44,1
	Lalande 25824	13.56.23,15	+ 0,04		16.59.59,5	724,9	+11,5	+11,0	+1. 7,7	
	α Bouvier	14. 8.47,46	+ 0,13	- 0,55	352.23. 9,6	724,9	+11,5	+11,0	+ 27,2	47,6
28	α Andromède	0. 0.33,39	+ 0,18	- 1,64	344. 6.20,3	730,5	+10,4	+10,2	+ 18,1	54,3
	y Pégase	0. 5.25,76	+ 0,11	- 1,79	358. 0.44,0	, ,	7 - 7 -		+ 34,7	49,9
	α Cassiopée	0.31.55,62	+ 0,40	- 1,71	316.39.36,2	730,6	+10,8	+10,0	- 9,4	46,2
	α Petite Ourse S.,.	13. 4.11,27			283.52.31,3	730,6	+11,1	+10,5	- 50,7	49,0
120	ß Lion	11.41.20,26	+ 0,12	- 2,00	356.56.26,2	731,3	+10,4	+ 8,7	+ 33,4	50,5
	y Grande Ourse	11.45.51,01	+ 0,38	- 2,04	317.49.51,3	1			- 8,2	48,5
	23 Chevelre de Bér.		+ 0,16		348.53.52,9				+ 23,6	
	Anonyme	12.35.21,04	+ 0,14		351. 3.40,0	731,4	+10,4	+ 8,2	+ 26,1	
	α Petite Ourse I		T 0;14		280.52.52,6	731,4	+10,4	+ 8,1	- 56,8	47.5
	α Andromède	0. 0.32,29	+ 0,18	- 2,76	344. 6.19,4	730,5	+ 9.7	+10,5	+ 18,1	47,5 53,3
	« Cassiopée		+ 0,48	- 2,58	316.39.33,7	730,4	+11,0	+10,2	- 9,3	43,6
	α Petite Ourse S	1. 4.10,93			283.52.30,5	730,2	+11,3	+11,4	- 50,5	48,2
30	Soleil, bord 1, inf	2.29. 6,48	+ 0,12		357.48.17,4	729,5	+12,1	+11,8	+ 34,2	
	α Petite Ourse I	13. 4.34,51			280.52.54,5	726,8	+10,8	+ 9,4	- 56,2	50,2
	α Vierge	13.17.13,56	+ 0,03	- 2,94	22.42.48,3	726,7	+10,7	+ 9,5	+1.24,0	45,4
	Lalande 25824 Weisse, XIII, 1043		+ 0,04		16.59.59,3				+1. 8,5	
	Weisse, XIV, 34		+ 0,04		17. 5.15,8	726,6	+10.4	+ 8,7	+1. 8,7	
	α Bouvier	14. 8.45,02	+ 0,13	- 3,00	352.23.11,8	,, -	1	"	+ 27,5	50,5
	Weisse, XIV, 224.		+ 0,02		24. 0.40,6				+1.28,6	
	Anonyme		+ 0,02		24. 4.18,7		1		+1.28,7	
	Weisse, XIV, 360. Anonyme		+ 0,01		25. 1. 4,7				+1.35,6	
	Weisse, XIV, 512.		+ 0,01	1	25.42.18,1	1		+ 9,3	+1.34,5	
			,		,	1				

Le 27, Mire Sud-409,23. Mire Nord C-289,27. Mire Nord D-599,34. Le 28, Niveau-09,42.

29
Observations faites à la lunette méridienne en Avril et Mai 1849.

Sunus	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE des verniers	BANOMÈTRE	THERMO	)MĖTRE	RÉFRACTION	LIEU
rs.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	Noite	POLE.
	Weisse, XIV, 687.  α¹ Balance  α² Balance  γ Pégase  α Cassiopée  α Petite Ourse S	h. m. s. 14.37.16,84 14.42.19,74 14.42.31,10 0. 0.31,61 0. 5.24,14 0.31.53,86 1. 4. 9,53	5. † 0,04 † 0,01 † 0,01 † 0,18 † 0,11 † 0,40	- 2,91 - 2,97 - 3,46 - 3,45 - 3,52	18.53.45,1 27.42. 5,6 344. 6.17,3 358. 0.43,8 316.39.34,7 283.52.28,1	725,9 725,7 725,7	+10,3 +10,7 +11,1 +11,3	+ 9,3 +10,5 +11,5 +11,9	+1.13,1 +1.42,4 + 18,0 + 34,4 - 9,2 - 50,1	45,8 51,1 49,5 44,5 45,9
	Soleil, bord 1, sup.  a Taureau  Gorher  Gorion  Taureau  orion  Petite Ourse I  a Grand Chien  a Gémeaux  Petit Chien  Gémeaux  Fetit Lion  Petit Lion  Pompe pneumat  Lion  Juin  Lion  Lion  Juin  Lion  Lion	2.32.53,96 4.27.11,28 5. 5.27,95 5. 7.12,77 5.16.40,71 5.46.55,77 6.21.16,74 6.38.25,78 7.24.53,52 7.31.20,01 7.36. 0,31 10. 0.16,60 10.17.11,64 10.20.12,52 10.24.48,76 10.27. 3,80	+ 0,12 + 0,12 + 0,30 + 0,03 + 0,18 + 0,09 0,00 + 0,20 + 0,18 + 0,10 + 0,21 - 0,05 + 0,10 + 0,10	- 3,68 - 3,65 - 3,55 - 3,69 - 3,65 - 3,65 - 3,69 - 3,69 - 3,69 - 3,69 - 3,69	356.57.59,5 356. 9.28,7 326.31.33,8 20.43.37,7 343.53.16,5 4.58.54,5 28.51. 5,8 340. 8.50,8 6.44.46,2 343.58.30,5 359.39. 9,8 337.47.49,4 42.36.29,2 2.16.24,8 2.55.33,2	725,5 724,9 724,7 724,7 724,6 724,7 724,4 724,3	+12,3 +12,4 +12,4 +12,5 +12,7 +12,9 +13,0 +13,3 +12,6	+13,0 +14,6 +15,1 +15,4 +15,5 +15,5 +15,2 +14,9 +12,5 +12,7	+ 32,7 + 31,5 + 0,4 + 1,16,4 + 17,4 + 43,7 - 58,6 + 13,6 + 13,6 + 46,6 + 17,5 + 36,3 + 11,3 + 3,43,5 + 40,1 + 41,1	53,3 46,5 48,5 52,1 51,2 47,7 42,3 49,9 44,2 51,1 47,5
	49 Petit Lion Lune, bord 1, sup.  6 Grande Ourse  56 Lion  C Grande Ourse  Anonyme  Weisse, XI, 61  5 γ Hydre et Coupe  Weisse, XI, 446  Weisse, XI, 523  1 ω Vierge  3 Lion  G Grande Ourse	10.34.41,01 10.39.32,91 10.45.13,36 10.48. 8,51 10.54.18,65 10.58.44,89 11. 4.48,54 11.13.18,53	+ 0,18 + 0,09 + 0,27 + 0,09 + 0,52 + 0,13 + 0,10 + 0,09 0,00 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,12 + 0,30	- 3,64 - 3,53 - 3,60	345.14.34,6 4.28.47,8 328.22. 8,5 5.21.52,5 352.24.29,6 1.40. 8,3 5.29.53,2 29.11.35,1 3.32.28,9 3.15.31,8 356.56.25,8	724,6	+12,4	+11,8 +12,4 +12,6 +12,6 +11,5 +11,3	+ 41,1 + 19,0 + 43,4 + 2,1 + 44,8 + 27,1 + 39,2 + 45,0 + 1.47,5 + 42,0 + 41,7 + 32,9	49,8
	Weisse, XII, 1036, a Petite Ourse I Weisse, XIII, 301.	12.59.55,59	+ 0,11	- 3,00	359.13.15,0 280.52.49,7 5.51.25,8	724,8	+12,0	+ 9,4 + 8,9	+ 36,2 - 56,1 + 46,2	45,8

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERM	OMÈTRE  Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Weisse, XIII, 486. Anonyme. Lalande 25543 Lalande 25617 Lalande 25824 Weisse, XIII, 1043. Weisse, XIV, 34 A Bouvier Anonyme.	h. m. s. 13.28.13,95 13.33.29,48 13.45.39,88 13.47.10,84 13.56.20,01 13.58.50,51 14. 2.36,47 14. 8.44,40 14.14.49,46	s. + 0,07 0,00 - 0,01 - 0,01 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,13	s. - 3,62	8.53.45,6 28.53.45,3 30.45.18,5 30.49.27,2 17. 0. 1,1 17. 8.19,7 17. 5.18,7 352.23.12,9	num. 724,8	+11,4 +11,0	+ 8,8 + 9,0 + 8,5 + 8,5	+ 51,4 +1.47,6 +1.56,6 +1.56,9 +1. 8,3 +1. 8,6 +1. 8,6 +27,5 +1.23,2	51,8
	Anonyme.  Weisse, XIV, 512.  Weisse, XIV, 687.  \[ \alpha^1 \] Balance \[ \alpha^2 \] Balance \[ \alpha \] Andromède. \[ \gamma \] Pégase. \[ \alpha \] Cassiopée. \[ \alpha \] Cassiopée. \[ \alpha \] Petite Ourse S	14.14.49,40 14.17.56,62 14.28. 3,84 14.37.16,21 14.42.19,06 14.42.30,36 0. 0.30,97 0. 5.23,40 0.31.53,16 0.39.54,79 1. 4. 8,83	+ 0,02 + 0,01 + 0,04 + 0,01 + 0,01 + 0,18 + 0,11 + 0,40 + 0,42	- 3,60 - 3,72 - 4,12 - 4,21 - 4,25	22.24. 8,2 23.41.39,0 25.42.13,2 18.53.43,8 27.42. 7,2 344. 6.16,2 358. 0.44,2 316.39.34,2 315.21.25,6 283.52.29,3	724,8 725,3 725,3	+10,1 +11,4 +11,7 +12,0	+ 7.9 +12,4 +12,5 +13,5	+1.27,4 +1.34,7 +1.13,3 +1.42,7 + 17,8 + 34,2 - 9,2 - 10,4 - 49,8	47,7 49,9 49,8 43,9
2	Soleil, bord 1, inf α Andromède α Cassiopée η Cassiopée α Petite Ourse S	2.36.42,56 o. 0.30,15 o.31.52,42 o.39.54,14 1. 4. 7,93	+ 0,12 + 0,27 + 0,67 + 0,69	- 4,88 - 4,76	357.11.59,2 344. 6.14,8 316.39.33,1 315.21.21,1 283.52.29,2	724,6 724,5 724,5 724,5	+13,0 +13,3 +13,8 +14,3	+13,8 +15,3 +15,7 +16,3	+ 32,9 + 17,6 - 9,1 - 10,3 - 49,3	48,3 42,8 47,3
3	Soleil, bord 1, sup, α Taureau	2.40.31,44 4.27.10,04 5. 5.26,57 0. 0.29,85 0.31.52,16 0.39.53,79 1. 4. 4,93	+ 0,17 + 0,17 + 0,48 + 0,27 + 0,67 + 0,69	- 4,87 - 4,84 - 5,20 - 5,05	356.22.25,8 356. 9.25,1 326.31.31,5 344. 6.16,3 316.39.33,4 315.21.24,4 283.52.31,4	724,1 723,8 723,6 724,5 724,6	+16,0 +15,9 +16,2 +14,4 +14,7 +15,1	+16,6 +18,4 +19,2 +16,2 +16,3 +16,8	+ 31,5 + 31,0 + 0,4 + 17,6 - 9,1 - 10,3 - 49,2	49,2 43,9 49,8 43,0 49,3
5	Soleil, bord 1, inf.  Soleil, bord 1, sup.  Taureau  Cocher.  Gorion  Taureau.  Orion	2.44.21,24 2.48.11,60 4.27. 9,04 5. 5.25,39 5. 7.10,49 5.16.38,35 5.46.53,55	+ 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,47 0,00 + 0,27 + 0,11	- 5,86 - 6,01 - 5,84 - 5,94 - 5,82	356.36.48,2 355.47.44,2 356. 9.29,5 326.31.33,0 20.43.34,7 343.53.16,5 4.58.53,5	724,5 722,0 721,2 720,8 720,8 720,5	+16,0 +14,8 +15,3 +15,4 +15,7 +15,7	+18,8 +15,2 +17,1 +17,3 +17,3 +17,9	+ 31,6 + 30,8 + 31,0 + 0,4 +1.15,3 + 17,2 + 43,1	53,6 45,2 44,9 51,7 49,8

Le 1er, Mire Sud-398,61. Mire Nord C-288,70.

Le 3, Mire Sud-40°, 26. Mire Nord B-4°, 10. Mire Nord C-27°, 14. Mire Nord D-62°, 34.

## Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

Sanor	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERW	ONÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
s.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	loté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	ô Petite Ourse I α Andromède α Cassiopée α Petite Ourse S	6.21.17,24 0. 0.29,01 0.31.51,20 1. 4. 4,83	+ 0,27 + 0,67	s. - 6,09 - 6,07	278.58.29,4 344. 6.17,7 316.39.37,1 283.52.29,5	mm. 720,4 721,9 721,9 721,8	+15,8 +14,5 +14,9 +14,9	+18,1 +14,2 +14,6 +15,7	- 57,7 + 17,6 - 9,1 - 49,2	50,6 51,3 46,4 46,8
	Soleil, bord 2  \$\beta\$ Orion  \$\beta\$ Taureau  \$\alpha\$ Orion  \$\beta\$ Petite Ourse I  \$\alpha\$ Grand Chien  \$\alpha^2\$ Gémeaux  \$\alpha\$ Petit Chien  \$\beta\$ Gémeaux  \$\alpha\$ Hydre.  \$\alpha\$ Lion.	3. 9.44,06 5. 7. 7,47 5.16.35,41 5.46.50,25 6.21.14,74 6.38.20,50 7.24.47,98 7.31.14,79 7.35.54,75 9.20. 1,59 10. 0.11,18	+ 0,17 0,00 + 0,27 + 0,11 - 0,05 + 0,31 + 0,10 + 0,27 + 0,01 + 0,14	- 8,83 - 8,85 - 9,09 - 8,70 - 8,80 - 8,77 - 8,96 - 8,95 - 8,85	20.43.34,5 343.53.10,6 4.58.51,5 278.58.27,7 28.51. 4,3 340. 8.50,2 6.44.43,3 343.58.30,0 20.21.16,4 359.39. 9,4	725,0 725,0 724,8 724,6 724,5 724,5	+15,3 +15,5 +15,5 +16,0 +16,1 +15,7 +15,4	+17,0 +17,0 +16,9 +16,5 +16,5 +16,6 +15,4 +14,2	+1.15,8 + 17,3 + 43,3 - 58,4 +1.44,4 + 13,5 + 46,3 + 17,4 +1.15,2 + 36,1	45,8 45,7 48,2 46,9 41,3 49,1 41,4 50,5 49,6 47,5
	α Petite Ourse I Weisse, XIII, 301. Weisse, XIII, 486. Anonyme Lalande 25543 Lalande 25617 Lalande 25824 Weisse, XIII, 1043. Weisse, XIV, 34 α Bouvier Anonyme Anonyme Anonyme ΔNonyme ΔNonyme α Bouvier	13. 4.31,20 13.18.43,09 13.28. 8,67 13.33.24,26 13.45.34,78 13.45.34,79 13.58.45,30 14. 2.31,31 14. 8.39,08 14.14.44,28 14.17.51,47 14.25.13,90 14.27.58,62 14.37.10,89 14.42.13,74 14.42.25,14	+ 0,10 + 0,08 - 0,05 - 0,07 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,20 - 0,01 - 0,02 - 0,03 + 0,02 - 0,03 + 0,02 - 0,04 - 0,04	- 9,04 - 9,05	5.51.23,4 8.53.42,0 28.53.41,8 30.45.17,0 30.49.25,1 16.59.57,6 17. 8.17,8 17. 5.14,1 352.23. 7,5 22.24. 4,0 23.41.37,5 25.44.49,7 25.42.13,9 18.53.38,5 27.42. 5,9	725,1 725,0 725,0 725,0	+14,0 +13,0 +12,9	+ 9,9 +10,6 +10,9 +10,9	+ 46,0 + 51,1 +1.46,9 +1.55,8 +1.56,1 +1. 7,8 +1. 8,0 + 27,2 +1.26,8 +1.34,2 +1.34,1 +1.12,9 +1.42,2	47,5 45, <sub>7</sub>
12	Soleil, bord 1, sup.  α Lion	3.11.23,94 10. 0. 9,48 10.17. 4,42 10.24.41.48 10.26.56,75 10.34.33,93 10.38. 6,18	+ 0,18 + 0,09 + 0,17 + 0,09 + 0,09 + 0,15 + 0,12	– 10, <b>5</b> 7	354.10.31,4 359.39.11,7 337.47.50,5 2.16.22,9 2.55.32,6 345.14.34,4 352.40.18,3	724,0 732,1 732,3	+14,8	+17,4 +11,6 +11,0 +10,9 +10,7	+ 28,7 + 36,8 + 11,5 + 40,7 + 41,7 + 19,3 + 27,9	50,6

Le 5, Mire Sud-38°,93. Mire Nord B-6°,33. Mire Nord C-29°,13. Mire Nord D-60°,68. Niveau+0°,65. Le 10, Mire Sud-37°,24. Mire Nord B-7°,89. Mire Nord C-31°,21. Mire Nord D-63°,67.

32
Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE des verniers	BIROMÈTRE	THERM	MÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	45 ω Grande Ourse	h. m. s.	s. + 0,22	8	328.22.10,5	mm.	0	٥	+ 2,2	"
	56 Lion	10.48. 1,17	+ 0,08	١	5.21.48,3				+ 45,6	
	α Grande Ourse	10.54.11,57	+ 0,42	- 10,44	309.47.59,6			+10,4	- 16,4	43,7
	G Lion	11.13.11,55	+ 0,08		5.29.52,2	2 (		. 2	+ 46,0	
	45 y Hydre et Coupe		+ 0,01		29.11.35,9	732,6	+12,6	+ 9,3	+1.49,9	
	Weisse XI, 446	11.25.35,16	+ 0,08		3.32.25,5			+ 9,2	+ 42,9	
1	ι ω Vierge β Lion	11.41.11,98	+ 0,10	- 10,26	356.56.21,5			+ 9,2	+ 33,5	1=0
	y Grande Ourse	11.45.42,60	+ 0,31	- 10,15	317.49.45,0	732,7	+12,3	+ 9,3	- 8,2	47,2
1	23 Chevelre de Bér.	12.27.10,23	+ 0,14	10,10	348.53.47,2	732,9	+12,2	+ 9,0	+ 23,6	441/
1	Anonyme	12.30.34,32	+ 0,12		35r. 3.33,8	713	,,-	' 3/-	+ 26,1	
	Weisse, XII, 1036.		+ 0,09		359.13.11,1				+ 36,6	
	Weisse, XIII, 56	13. 4. 9,74	+ 0,10		358.49.11,1	732,8	+12,1	+ 8,5	+ 36,1	
1	α Petite Ourse I	13. 4.26,29								
1	Weisse, XIII, 3or	13.18.41,41	+ 0,08		5.51.23,6	732,8	+12,0	+ 8,5	+ 46,7	
	Weisse, XIII, 486	13.28. 7,13	+ 0,07		8.53.46,9			+ 8,5	+ 52,0	
1	Anonyme	13.32.15,68	+.0'01		28.54.41,4				+1.48,9	
	Anonyme 8-16°34' Lalande 25543		+ 0,01		30/5.5/			+ 8,5	+1.58,0	
	Lalande 25617	13.45.32,80	+ 0,01		30.45.15,4			+ 0,5	+1.58,3	
1	Lalande 25824	13.56.13,20	+ 0,05		16.59.58,4	732,6	+11,1	+ 8,5	+1. 9,1	
	Weisse, XIII, 1043.		+ 0,05		17. 8.16,2	102,0	T * * 7 *	, 0,0	+1. 9,4	
1	Weisse, XIV, 34	14. 2.29,77	+ 0,05	•	17. 5.16,7				+1. 9,3	
	α Bouvier	14. 8.37,58	+ 0,11	- 10,48	352.23.11,1	732,4	+11,1		+ 27,7	52,0
	Anonyme		+ 0,03		22.24. 8,2	'			+1.24,1	
1	Anonyme	14.17.49,90	+ 0,03	ļ	23.41.42,0				+1.28,3	
	Weisse, XIV, 458.		+ 0,02	1	25.44.48,3	732,2	+11,1	+ 8,5	+1.35,6	
1	Weisse, XIV, 512.	14.27.57,12	+ 0,02		25.42.17,2				+1.35,4	
	Weisse, XIV, 687.	14.37. 9,43	+ 0,04	H	18.53.43,9	2		. 0 =	+1.13,9	1.0
	α¹ Balance	14.42.12,14	+ 0,02	- 10,59	27.42. 5,0	732,2	+11,1	+ 8,5	+1.43,5	46,1
	α² Balance		+ 0,02	- 10,56	283.52.35,8	-2-2	1403	1.01	- 50,9	100
1	α Bélier		+ 0,13	- 11,19	349.36.50,8	732,3	+12,3	+10,4	+ 24,2	49,9
Ш	& Denet	1,30,20,30	7 0,13	- 11,19	349.36.30,6	751,9	71294	7.1,0	T 24,2	31,1
, 3	Soleil, bord 2	3.21.26,50	+ 0,11							
1.0	3 Taureau	5.16.33,09	+ 0,15	- 11,29	343.53.15,3	730,6	+13,6	+14,2	+ 17,6	50,5
	α Petite Ourse I	13. 4.27,28	1 ,50	1			' '		1	
16	Weisse, XII, 1036		+ 0,09		359.13.14,6	722,9	+14,1	+10,8	+ 35,9	
	Weisse, XIII, 56	13. 4. 6,02	+ 0,10		358.49.16,6				+ . 35,3	
	α Petite Ourse I				, -					
1	α Vierge	13.17. 2,06	1 + 0,03	1 - 14,40	22.42.50,0	722,9	1+14,1	1,10,8	1+1.23,2	46,3

Le 13, Mire Sud-37P,27. Mire Nord B-6P,99. Mire Nord C-31P,12. Mire Nord D-61P,36.

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

ionas.	NOM  des astres.	PASSAGE CONCLU ou Fil Méridien.		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE
			ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.	×	I VEEL
	α Bouvier	b. m. s. t4. 8.33,82	+ 0,11	- 14,23	0 1 11	nım.	0	0	1 11	11
17	α Andromède γ Pégase α Cassiopée η Cassiopée α Petite Ourse S	o. 0.19,79 o. 5.12,34 o.31.42,23 o.39.43,87 1. 4. 8,88	+ 0,15 + 0,10 + 0,33 + 0,35	- 15,76 - 15,67 - 15,81	344. 6.17,7 358. 0.38,9 316.39.38,2 315.21.24,9 283.52.33,7	727,8 727,8 727,8 727,6	+12,5 +13,0 +13,0 +13,2	+12,8 +13,8 +13,9 +13,7	+ 17,9 + 34,3 - 9,2 - 10,5 - 49,9	52,1 46,1 46,3
18	Soleil, bord 1, inf	3.38.53,62	+ 0,11		353. 2.12,1	727,7	+13,4	+15,1	+ 27,7	
19	α Andromède γ Pégase α Cassiopée α Petite Ourse S	o. 0.17,71 o. 5.10,16 o.31.40,12 1. 4. 8,04	+ 0,15 + 0,10 + 0,33	- 17,90 - 17,90 - 17,99	344. 6.18,3 358. 0.41,8 316.39.40,7 283.52.36,1	730,1 730,0 729,9	+11,9 +12,1 +12,3	+10,5	+ 18,1 + 34,6 - 9,3 - 50,5	53,1 49,6 48,6 49,1
20	Soleil, bord 1, sup.	3.46.49,62	+ 0,11		352. 4.59,4	728,1	+13,5	+12,5	+ 26,8	
23	Soleil, bord 1, sup.  a Orion  thydre  c Lion  c Cassiopée  Petite Ourse S  c Cassiopée  Belier	3.58.48,02 5.46.38,02 9.19.48,98 9.59.58,48 0.31.36,14 0.39.37,94 1.4.4,48 1.15.36,36 1.58.17,85	† 0,14 † 0,10 † 0,02 † 0,12 † 0,52 † 0,56 † 0,62 † 0,19	- 21,29 - 21,33 - 21,40 - 21,95	351.28.53,4 4.58.50,2 20.21.14,7 359.39. 9,2 316.39.41,5 315.21.25,0 283.52.34,2 312.55.16,6 349.36.50,7	733,1 732,8 733,1 733,1 732,1 732,0 731,9 731,7	+15,0 +15,0 +15,0 +15,0 +13,4 +13,4 +13,5 +14,2	+15,3 +14,2 +14,3 +13,3 +12,9 +13,0 +13,2 +14,2	+ 26,0 + 44,4 +1.16,4 + 36,7 - 9,3 - 10,6 - 13,0 + 23,9	48,9 49,7 48,7 49,2 46,6
24	Soleil, bord 1, inf.  a Grand Chien  a Grand Chien  b Gemeaux  c Lion  c Grande Ourse  c Lion  f Hydre et Coupe  v Vierge  g Crande Ourse  g Crande Ourse  C Lion  To Hydre et Coupe  v Vierge  c Lion  g Crande Ourse  Anonyme  Anonyme	4. 2,48,78 6.38. 6,94 7.24.34,62 7.35,41,37 9.59.57,56 10.24.29,60 10.53.59,09 11.12.59,43 11.16.59,46 11.30.18,98 11.40.59,70 11.45.29,67 12.26.58,07 12.30.22,24 12.35. 0,48	+ 0,18 - 0,02 + 0,25 + 0,21 + 0,12 + 0,11 + 0,67 - 0,02 - 0,02 + 0,11 + 0,49 + 0,17 + 0,17	- 22,12 - 22,07 - 22,25 - 22,31 - 22,26 - 22,38 - 22,71	351.49.29,5 340. 8.52,4 343.58.29,8 359.39. 8,6 2.16.20,9 309.48. 2,7 5.29.47,4 29.11.32,0 3.22.58,7 356.56.22,2 317.49.46,7 348.53.47,3 351. 3.37,3 351.10.21,3	731,1 729,9 729,5 729,5 729,4 729,4 729,4	+15,2 +15,4 +14,9 +14,7 +14,7 +14,4 +14,3 +14,0	+14,7 +15,1 +13,6 +13,5 +13,2 +13,2 +13,2 +12,7 +12,5	+ 26,4 + 13,7 + 17,6 + 36,4 + 40,2 - 16,2 + 45,1 + 1.47,8 + 41,9 + 32,8 - 8,1 + 23,2 + 25,7 + 25,8	51,0 50,3 47,8 48,0 48,0

Le 23, Mire Sud-38P,74.

Le 24, Mire Sud-39°,95. Mire Nord B-6°,22. Mire Nord C-29°,79. Mire Nord D-61°,95. Niveau+0°,90. d-5°,93. Nadir 146°9' 48",85.

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTHE	THERMO		RÉFRACTION	LIEU du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	THE.	Ioté- rieur.	Exté- rieur.	TON.	POLE.
	Weisse, XII, 1036. Weisse, XIII, 56 & Petite Ourse I Weisse, XIII, 301	13. 3.57,64 13. 4.26,08 13.18.29,39	s + 0,13 + 0,13 + 0,09	5.	359.13.11,5 358.49.10,7 280.52.42,8 5.51.23,7	729.7	+14,0	+11,1 +11,1 +11,1 +11,2	+ 36,1 + 35,6 - 56,1 + 46,1	43,9
	Anonyme	14.14.30,90 14.42. 0,36 14.42.11,92 14.50.51,95	+ 0,01 - 0,02 - 0,02 + 1,26	- 22,45 - 22,31 - 22,04	22.24. 2,6 27.42. 5,4 297.25.48,5	729,5	+13,6	+11,1 +11,3 +11,2	+1.22,9 +1.42,1	45,0
	Weisse, XIV, 1158. B. A. C. 4998 B. A. C. 5027 Lalande 27972 Anonyme. B. A. C. 5111 { Préc. suiv.	15. 0.36,69 15. 4. 8,54 15. 7.38,25 15.13.15,33 15.18.31,71	+ 0,06 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05		35.45.34,7 35.46.17,0 34.45.25,5 36.57.30,7 36.17.36,7	7.3			+ 58,7 +2.28,2 +2.28,4 +2.20,9 +2.38,3 +2.32,7	
	α Couronne α Serpent α Cassiopée η Cassiopée α Petite Ourse S δ Cassiopée	15.27.57,01 15.36.29,52 0.31.35,16 0.39.36,94 1. 4. 2,72 1.15.35,46	+ 0,21 + 0,09 + 0,52 + 0,56 + 0,62	- 22,37 - 22,43 - 22,97	345. 7.55,3 5.26,46,7 316.39,41,5 315.21.25,4 283.52.35,7 312.55.18,6	729,4 729,7 729,8 729,8	+13,2 +13,6 +13,6 +13,6	+10,5 +11,8 +11,9 +12,0	+ 19,1 + 45,5 - 9,3 - 10,6 - 50,4 - 13,1	50,8 47,7 49,2 48,0
	ε Cassiopée α Bélier Vénus, bord 2,centr. α Baleine α Persée	2.53.59,83 3.13.10,45	+ 0,67 + 0,19 + 0,15 + 0,08 + 0,41	- 22,88 - 23,06 - 22,92	309.26.53,1 349.36.49,7 355.32.47,1 8.51.28,1 323. 2.52,2	729,8 729,8 729,7 729,7	+13,8 +13,8 +14,2 +14,4	+12,5 +13,0 +13,8 +13,8	- 16,6 + 23,9 + 31,0 + 50,8 - 3,0	50,2 49,0 46,1
25	Soleil, bord 1, sup.  a Orion  b Petite Ourse I  a Grand Chien  a Gémeaux	4. 6.49,84 5.46.36,11 6.21. 2,54 6.38. 6,04 7.24.33,74	+ 0,17 + 0,10 - 0,02 + 0,25	- 23,20 - 23,01 - 22,94	351. 6.48,5 4.58.48,6 278.58.33,2 340. 8.52,0	729,4 729,1 728,8	+14,9 +15,4 +15,5	+14,9 +15,5 +16,2	+ 25,5 + 44,0 - 58,8 + 13,6	47,0 48,0 50,3
	Lune, hord 1, sup.  A Petit Chien  B Gémeaux  A Hydre  Lion  Lion	7.26.20,75 7.31. 0,35 7.35.40,57 9.19.47,17 9.59.56,66	+ 0,15 + 0,09 + 0,22 + 0,02 + 0,12 + 0,11	- 23,08 - 23,03 - 23,12 - 23,19	354.21. 4,0 6.44.45,5 343.58.28,9 20.21.17,9 359.39. 7,7 2.16.22,5	728,7 728,5 728,5 728,5	+15,8 +15,4 +15,4 +15,4	+15,2 +15,8 +16,1 +15,8	+ 29,4 + 46,9 + 17,6 +1.15,5 + 36,1 + 39,8	45,1 49,4 52,1 46,7
	α Grande Ourse σ Lion γ Hydre et Coupe ω Vierge	10.53.57,87 11.12.58,55 11.16.58,56	+ 0,67 + 0,10 - 0,02 + 0,11	- 23,44	309.48. 0,6 5.29.48,3 29.11.35,0 3.23. 1,7	728,5 728,5	+15,3 +15,3	+15,9 +15,0 +14,2 +13,5	- 16,0 + 44,8 +1.47,4 + 41,8	46,2

Le 25, Mire Sud-399,92. Mire Nord C-289,80. Niveau+09,38.

35

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU /
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	RE.	rieur.	rieur.	0N.	POLE.
	B Lion	h. ni. s.	s. + 0,14	s. - 23,28	356.56.22,9	nın.	o	0	+ 32,8	49,1
	y Grande Ourse	11.45.28,85	+ 0,49	- 23,20 - 23,50	317.49.47.4	728,6	+15,2	+13,7	- 8,1	49,0
	23 Chevelre de Bér.	12.26.57,21	+ 0,19		348.53.44,8	728,7	+15,1	+14,0	+ 23,0	
	Anonyme	12.34.59,38	+ 0,17		351. 3.36,6 351.10.24,0			+13,5	+ 25,5	
	Weisse, XII, 1036	12.59.35,98	+ 0,13		359.13.10,4			+13,0	+ 35,9	
	Weisse, XIII, 56	13. 3.56,92 13. 4.27,38	+ 0,13		358.49.10,2 280.52.41,9	729,2	+14,8	+13,1	+ 35,4   - 55,6	43,7
	Weisse, XIII, 301.	13.18.28,57	+ 0,09		5.51.25,4	729,4	+14,8	+13,4	+ 45,7	401/
	Weisse, XIII, 515.	13.29.42,53	+ 0,08		9.11.49,7				+ 51,4	
ı	Weisse, XIV, 224 Weisse, XIV, 295.	14.12.17,08	0,00		24. 0.42,2 22.45.10,2	729,5	+14,8	+13,6	+1.27,4	
	Weisse, XIV, 687.	14.36.56,71	+ 0,03		18.53.41,1	729,6	+14,6	+12,9	+1.12,4	
	α Balance α Balance	14.41.59,62	- 0,02 - 0,02	- 23,19 - 23,11	27.42. 6,5			+12,7	+1.41,5	45,5
	Betite Ourse	14.50.50,83	+ 1,26	- 23,13	297.35.43,8	729,6	+14,3	+11,7	- 30,2	42,8
	Weisse, XIV, 1158.		+ 0,06		12.44.38,2	, ,			+ 58,5	
	B. A. C. 4998 B. A. C. 5027	15. 4. 7,71 15. 7.37,51	- 0,05 - 0,05		35.45.33,9 35.46.33,4	729,6	+14,3	411,3	†2.28,0 †2.28,2	
	B.A.C.5111 préc.	15.23.52,73	- 0,05			/29,0	1-470	1 - 1,0		and the second
	( 2111A.	15.23.53,35	- 0,05	-2	36.17.43,4				+2.32,3	48,4
	α Couronne α Serpent	15.27.56,19 15.36.28,70	+ 0,21	- 23,19 - 23,25	345. 7.52,7 5.26.46,3	729,6	+14,1	+11,4	+ 19,1 + 45,4	47,3
	α Cassiopée	0.31.34,66	+ 0,52	- 23,51	316.39.39,0	730,3	+14,4	+14,6	- 9,2	47,3 46,8
	η Cassiopée α Petite Ourse S	0.39.36,14	+ 0,56		315.21.26,7 283.52.37,0	730,4 730,4	+14,5	+15,0	- 10,5 - 49,9	49,7
	a Bélier	1.58.16,29	+ 0,19	- 23,66	349.36.50,6	730,3	+14,9	+15,1	+ 23,8	51,0
	Vénus, bord 2, centr.		+ 0,15	2.2	355.51.10,6	2 2			+ 31,1	F - C
	β Petite Ourse I α Persée	2.50.53,10 3.13. 9,45	+ 0,41	- 23,37 - 23,94	267. 9.50,4 323. 2.51,9	730,3	+15,3	+16,8	-1.30,5 - 3,0	50,6 45,7
				134		1 - 1,-	, -,-	1 - 277	-,5	. "
26	Soleil, bord 2	4.13, 7,84 5.46.35,43	+ 0,17	- 23,89	4.58.47,0	729,8	+17,3	+18,9	+ 43,5	45,0
	Petite Ourse I	6.21. 3,82	1 0,10	20,09	278.58.34,4	729,8	+17,4	+19,5	- 58,2	49,5
	α Grand Chien	6.38. 5,26	- 0,02	- 23,78	27. 0.5.				2 /	
	α <sup>a</sup> Gémeaux α Petit Chien	7.24.32,88 7.30.59,53	+ 0,25	- 23,80 - 23,00	340. 8.51,0 6.44.46,0	729,5	+17,1	+19,6	+ 13,4	49,2 45,0
	B Gémeaux	7.35.39,63	+ 0,22	- 23,96	343.58.28,5				+ 17,3	48,5
	Lune, bord 1, sup.	8.28.35,46 9.19.46,49	+ 0,15	23 =2	356.20.20,8	729,3	+16,7 +16,8	+19,6 +19,8	+ 31,4	51,3
	α Hydre α Lion	9.19.40,49	+ 0,02	- 23,79 - 23,82	359.39.10,8	729,3	+16,6	+19,0	+ 35,8	49,5
	ρ Lion		+ 0,11		2.16.21,3	729,5	+16,6	+18,6	+ 39,5	

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

JOHES	NOM	PASSAGE CONCLU	CORR	ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	ONÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	стюх.	POLE.
	x Grande Ourse	h. m. s 10.53.57,05 11.12.57,79	+ 0,67 + 0,10	- 24,23	309.47.58,8 5.29.50,8	729,6 729,6	+16,6 +16,6	+18,8	- 15,9 + 44,5	44,5
	γ Hydre et Coupe ω Vierge 3 Lion	11.16.57,82 11.30.17,30 11.40.58,14	- 0,02 + 0,11 + 0,14	- 23,91	29.11.32,5 3.23. 1,3 356.56.26,1	729,6 729,6	+16,5	+17,5 +17,3 +16,7	+1.46,3 + 41,3 + 32,4	52,0
	y Grande Ourse 23 Chevele de Bér. Anonyme	11.45.28,04 12.26.56,41 12.30.20,48	+ 0,49 + 0,19 + 0,17	- 24,29	317.49.47,9 348.53.48,7 351. 3.38,5	729.7	+16,4	+16,3	- 8,0 + 22,9 + 25,4	49,7
	Anonyme	12.34.58,54 12.59.35,18 13. 3.56,04	+ 0,17 + 0,13 + 0,13		351.10.21,0 359.13.11,2 358.49.13,2	729,9	+16,2	+14,7	+ 25,6 + 35,7 + 35,2	•
	α Petite Ourse I Weisse, XIII, 301. Weisse, XIII, 515	13. 4.28,88 13.18.27.79 13.39.41,67	+ 0,09		280.52.43,0 5.51.24,0 9.11.49,1	7-313	1 - 0,-	1 - 1,7	- 55,4 + 45,5 + 51,2	45,1
	Anonyme 8-16°34' Weisse, XIV, 224.	13.32. 1,95	- 0,02 - 0,02 0,00		28.54.40,9 24. 0.42,1	730,0	+16,1	+14,7	+1.46,1	П
1	Weisse, XIV, 295.  B Petite Ourse Weisse, XIV, 1158.	14.15. 6,90	+ 0,01 + 1,26 + 0,04	- 23,91	22.45. 9,4 297.35.45,9 12.44.42,2	730,0 730,0	+15,5 +15,3	+13,1	+1.23,5 - 30,1 + 58,5	45,2
	B. A. C. 4998 B. A. C. 5027 Lalande 27980	15. 4. 7,04	- 0,05 - 0,05 - 0,05		35.45.36,2 35.46.22,9 34.40.44,9			+12,1 +12,1	+2.27,7 +2.27,8 +2.19,7	
	Anonyme	15.18.30,43	- 0,05 - 0,05 - 0,05		36.57.34,9 36.17.43,1			,,-	+2.37,6 +2.32,1	
	α Couronne α Serpent	15.27.55,39	+ 0,21	- 24,00 - 24,00	345. 7.55,2 5.26.51,2	730,0	+14,7	+11,5	+ 19,1 + 45,4	51,1 52,4
	Andromède γ Pégase α Cassiopée	0. 5. 3,62	+ 0,13 + 0,52	$\begin{vmatrix} -24,51 \\ -24,61 \\ -24.55 \end{vmatrix}$	344. 6.16,3 358. 0.40,8 316.39.38,1	731,6	+15,0	+15,7	+ 17,8 + 34,1 - 9,3	51.41 49,0 45,9
	η Cassiopée χ Petite Ourse S δ Cassiopée	0.39.35,32	+ 0,56		315.21.24.9 283.52.35,3 312.55.18,3	731,7 731,7 731,7	+15,4 +15,7 +15,7	+16,5 +16,0 +16,7	- 10,4 - 49,8 - 12,9	47-9
	Cassiopée  α Bélier  Vénus, bord 2, centr	1.43.10,01	+ 0,67 + 0,19 + 0,15	- 24,57	309.26.52,2 349.36.51,1 356. 8.40,0	731,7	+16,0	+17,3	- 16,4 + 23,7 + 31,4	51,5
	Baleine.	2.53.58,39	- 1,26 + 0,08 + 0,41	- 24,31 - 24,53 - 24,60	267. 9.47,3 8.51.27,8 323. 2.56,1	731,7	+16,4	+17,4	-1.30,6 + 50,3 - 3,0	47,2 48,5 49,8
2	Soleil, bord 2			34,00	0201 2100,1	,01,7	1.0,0	1 1-730	0,0	491

Le 26. Mire Sud-400,41. Mire Nord B-60,41. Mire Nord C-280,38. Mire Nord D-610,28. Niveau+00,16 d-60,72. Nadir 14609'48",30.

37
Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERM!	DMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE.
		***************************************	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.	.~	T VEE.
	δ Petite Ourse I α Grand Chien	6.21. 3,84 6.38. 4,44	s. - 0,02	s. - 24,60	278.58.32,5	731,0	+17,4	+19,5	- 58,3	47,3
	α Petit Chien	7.24.32,04	+ 0,25	- 24,63 - 24,83	340. 8.50,7 6.44.44,0	730,8	+17,5	+20,7 +20,5	+ 13,4	48,9
	ß Gémeaux	7.35.38,79	+ 0,22	- 24,79	343.58.27,2 351. 3.37,7	730,8 731,0	+17,5	+20,2 +17,3	+ 17,3 + 25,3	47,3
	Anonyme	12.34.57,60 12.48.43,12 12.59.39,70	+ 0,17 - 4,29  + 0,12		351.10.20,9 277.49.11,9 359.16.23,8	731,3	+17,3	+17,5 +17,0 +16,8	+ 25,4 -1. 1,2 + 35,6	/2 -
	α Petite Ourse I α Vierge Weisse, XIII, 515.	13. 4.30,32 13.16.51,52 13.29.40,87	+ 0,01	- 24,91	280.52.40,7 22.42.50,4 9.11.49,1	731,3	+17,2	+16,2	- 55,1 +1.22,6 + 51,0	43,2 46,4
	Anonyme &-16°34'  n Grande Ourse	13.32. 1,20 13.33. 8,27 13.41.11,50	-0.02 -0.02 +0.42	- 24,76	28.54.42,3 322.17.33,4	731,3	+17,2	+16,7	+1.45,6	44,0
	Weisse, XIV, 224 Weisse, XIV, 295.	14.12.15,30 14.16. 6,20	0,00	1,7,7	24. 0.43,8 22.45. 6,3	731,5	+16,8	+14,6	+1.27,3	1175
28	α Petite Ourse S δ Cassiopée	1. 3.57,72	+ 0,85		283.52.37,2 312.55.18,3	733,4 733,4	+17,5	+18,1 +18,2	- 49,6 - 12,8	49,7
ı	ε Cassiopée	1.43. 8,47 1.58.13,83 2.46.22,34	+ 0,97 + 0,25 + 0,15	- 26,13	309.26.55,5 349.36.51,5 356.40.37,0	733,4	+17,7	+19,2	- 16,3 + 23,6 + 31,9	51.9
ı	B Petite Ourse I α Persée	2.50.50,85 3.13. 7,09	- 1,81 + 0,59	- 26,07 - 26,19	267. 9.49,9 323. 2.54,3	733,3 733,1	+18,3	†20,0 †20,2	-1.29,8 - 2,9	50,0 47,8
29	Soleil, bord 1, sup.	4.22.59,72 6.38. 2,88	+ 0,24	- 26,20	350.26.46,5	732,9	+18,7	+22,8	+ 24,2	
	Weisse, XIV, 224.	14. 8.21,62	+ 0,21	- 26,30 - 26,30	352.23. 7,0	732,9	+18,8	+18,0	+ 26,8	49,7
	Weisse, XIV, 295.	14.16. 4,80 14.41.56,52 14.42. 8,06	- 0,02 - 0,06 - 0,06	- 26,34 - 26,22	22.45. 7,7 27.42.10,2		+10,0	+17,8	+1.40,4	48,1
	8 Petite Ourse S Weisse, XIV, 1158. B. A. C. 4998	14.50.47,65 15. 0.32,67 15. 4. 4,79	+ 1,81 + 0,06 - 0,12	- 25,64	297.35.45,9 12.44.39,8 35.45.35,1	732,9	+18,5	+17,0	- 29,7 + 57,7 +2.25,8	46,5
	B. A. C. 5027 Lalande 27972 Anonyme	15.18.27,97	- 0,12 - 0,12 - 0,13		34.45.24,8 36.57.28,5			+16,2	+2.18,7 +2.35,9	
	B. A. C. 5111 { préc. suiv.	1	- 0,12 - 0,12 + 0,29	- 26,15	36.17.42,3 345. 7.54,8			+16,0	+2.30,5 + 18,9	51,2

Le 27, Mire Sud-39 $^{\circ}$ ,78. Mire Nord B-6 $^{\circ}$ ,23. Mire Nord D-60 $^{\circ}$ ,00.

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOVENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM		RÉFRACTION	LIEU da
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	HON.	POLE.
	α Serpent	h. m. s. 15.36.25,56	+ O,11	- 26,40	5.26.44,0	mm. 733,2	+18,3	+15,9	+ 44.9	45,1
	α Cassiopée α Petite Ourse S	0.31,31,54 1. 3.57,05	+ 0,74	- 26,58	316.39.34,7 283.52.35,1	733,4	+18,0	+20,2	- 9,1 - 49,2	42,5
30	Soleil, bord 1, inf	4.27. 3,52	+ 0,23	-C	350.49.30,8 352.23. 6,5	7 <sup>3</sup> 2,7 7 <sup>3</sup> 3,3	+20,5	+21,8	+ 24,7	105
	α Cassiopée	0.31.31,00	+ 0,21	- 26,90 - 27,16	316.39.34,8	733,7	+19,0	+17,0	+ 27,0	49,5
1	α Petite Ourse S	1. 3.56,92	T 05/4	- 27,10	283.52.35,0	733,6	+18,7	+18,8	- 49,5	48,2
1	ε Cassiopée	1.43. 7,59	+ 0,97		309.26.50,8	733,7	+19,4	+19,6	- 16,3	40,0
	α Bélier	1.58.12,69	+ 0,25	- 27,32	349.36.50,3	733,7	+19,4	+19,7	+ 23,5	50,7
5	Vénus, bord 2, centr.		+ 0,16	71	357. 8.17,7	7 17		3.7	+ 32,4	''
	B Petite Ourse I	2.50.49,57	- 1,81	- 27,29	267. 9.49,5	733,6	+19,4	+21,0	-1.29,5	49,3
31	Soleil, bord 1, sup.	4.31. 7,72	+ 0,24		35o. g. 5,7	733,3	+20,5	+22,4	+ 23,9	
	a Orion	5.46.31,91	+ 0,12	- 27,39	4.58.51,5	732,7	+20,3	+24,7	+ 42,8	49,2
	α Grand Chien	6.38. 1,88	- 0,07	- 27,19		' '				
	α Petit Chien	7.30.56,05	+ 0,10	- 27,34	6.44.42,9	732,4	+21,2	+25,3	+ 45,5	41,5
1	α Hydre	9.19.42,89	0,00	- 27,35	20.21.15,7	732,2	+20,7	+23,7	+1.13,8	48,7
	α Lion	9.59.52,22	+ 0,16	- 27,52	359.39. 8,0	732,2	+20,9	+24,4	+ 35,2	46,4
	α Grande Ourse		+ 0,96	- 27,31	309.47.58,1	732,5	+20,8	+20,1	- 15,8	44,1
	3 Lion	11.40.54,56	+ 0,18	- 27,40	356.56.24,8	732,6	+20,6	+18,6	+ 32,3	51,0
1	y Grande Ourse	11.45.24,46	+ 0,70	- 27,54	317.49.40,8				- 8,0	43,1
	y Vierge	12.33.34,35	+ 0,06		12.58.13,0	732,9	+20,9	+17,8	+ 58,0	
	2 Petite Ourse I	12.48.42,35	- 6,18		277.49.13,4	22		1.0	-I. 1,3	
	Lune, bord 1, sup.	12.53.22,35	+ 0,03		15.27.15,7	733,0	+19,7	+18,0	+1. 3,2	1=1
	α Petite Ourse I α Vierge	13. 4.31,5 <sub>7</sub> 13.16.48,85		50	280.52.42,1				- 55,0	45,4
	Weisse, XIII, 515.	13.29.38,09	+ 0,08	- 27,59	9.11.46,0	733,0	+19,4	+17,2	+ 51,0	48,9
	n Grande Ourse	13.41. 8,79	+ 0,60	- 27,23	322.17.36.3	/33,0	11914	1-/12	- 3,7	47.7
	Lalande 25543	13.45.15,72	- 0,08	. 2 /,20	30.45.17,1			+17,0	+1.54,5	7/1/
ш	a Bouvier	14. 8.20,48	+ 0,21	- 27,43	352.23.10,0			77-	+ 27,0	53,2
	Weisse, XIV, 224	14.12.12,87	- 0,03	-/,+3	24. 0.42,8				+1.26,7	7,5
	Weisse, XIV, 295.	14.16. 3,65	- 0,03		22.45. 6,5	733,0	+19,3	+16,9	+1.22,7	
	Anonyme	14.24.56,54	- 0,04		26. 0.12,4			+16,8	+1.33,8	
	α¹ Balance	14.41.55,18	- 0,06	- 27,68	27.42. 4,4	733,0	+19,0	+16,1	+1.40,7	42,7
	α <sup>9</sup> Balance	14.42. 6,66	- 0,06	- 27,62						
	y Pégase	0. 5. 0,50	+ 0,17	- 27,83	358. 0.40,6	734,3	+18,5	+17,4	+ 34,0	49,5
	α Cassiopée	0.31,30,30	+ 0,74	- 27,90	316.39.43,1	734,4	+18,7	+18,2	- 9,1	50,9
	2 Petite Ourse S	0.48.29,90	+ 6,18		286.56. 5,6	734,4	+18,8	+18,3	- 44,5	
	α Petite Ourse S	1. 3.56,22	. 0~		283.52.37,3	734,4	+18,8	+18,8	- 49,5	49,3
1	& Cassiopée		+ 0,85		312.55.19,1	734,4	+18,8	+19,0	- 12,8	
1	ε Cassiopée	1.43. 6,77	+ 0,97		309.26.56,3	734,4	+19,3	+19,9	- 16,3	

Le 31, Mire Sud-419,12.

39
Observations faîtes à la lunette méridienne en Mai et Juin 1849.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	4.1.111	ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	Inté-	OMÉTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	α Bélier Vénus, bord 2,centr. β Petite Ourse I	h. m. s. 1.58.12,19 2.45.30,60 2.50.49,02	+ 0,25 + 0,16 - 1,81	s. - 27,85 - 27,80	349.36.51,1 357.20.39,7 267. 9.45,5	734,4 734,6	+19,5	+20,4	+ 23,5 + 32,7 -1.29,6	51,6 45,0
	Soleil, bord 1, inf  a Orion  a Grand Chien  Petit Chien  G Gémeaux	4.35.12,20 5.46.31,33 6.38. 1,16 7.30.55,51 7.35.35,49	+ 0,23 + 0,12 - 0,07 + 0,10 + 0,30	- 27,98 - 27,91 - 27,87 - 27,98	350.32.35,8 4.58.49,1 6.44.48,4 343.58.29,3	734,3 733,7	+20,9 +21,3 +21,5	+23,8 +23,0 +24,6	+ 24,4 + 43,1 + 45,6 + 17,1	47,1 47,1 49,1
	α Hydre α Lionα Grande Ourse τ Lion β Lion	9.19.42,41 9.59.51,68 10.53.52,87 11.12.53,69 11.40.54,00	0,00 + 0,16 + 0,97 + 0,11 + 0,18	- 27,82 - 28,05 - 27,91 - 27,95	20.21.17,5 359.39. 6,4 309.47.58,8 5.29.46,0 356.56.24,2	733,1 733,1 733,0	†21,7 †21,8 †21,7	+23,8 +23,8 +24,5 +23,1	+1.13,8 + 35,3 - 15,6 + 43,8 + 31,9	50,6 45,0 45,0 50,1
	γ Grande Ourse γ Vierge 2 Petite Ourse I α Petite Ourse I α Vierge h Vierge	11.45.23,71 12.33.34,07 12.48.42,22 13. 4.32,37 13.16.48,40 13.24.34,96	+ 0,70 + 0,06 - 6,18 - 0,02 - 0,02	- 28,25 - 28,04	317.49.41,0 12.58.15,5 277.49.10,0 22.42.54,1 21.43.42,2	733,0 733,3 733,3	+22,1 +21,9 +21,8	+23,2 +21,6 +21,2 +20,2 +20,0	- 7,8 + 57,2 -1. 0,5 +1.21,6 +1.18,8	45,9
	Weisse, XIII, 515 Anonyme Anonyme &-16°34' Lune, bord 1, sup. Lalande 25543 Lalande 25617	13.29.37,73 13.31.57,98 13.33. 5,00 13.41.27,98 13.45.15,40 13.47.46,29	+ 0,04 - 0,07 - 0,07 + 0,01 - 0,09		9.11.46,0 28.54.47,7 19.26.56,0 30.45.18,0 30.49.27,0	-227	laro	+20,0 +20,0	+ 50,5 +1.44,6 +1.12,4 +1.53,5 +1.53,8	
	Piazzi, XIII, 294  5 π Hydre  x Vierge  λ Uierge  λ Vierge	13.47.40,29 13.57.18,73 13.57.21,51 14. 4.24,80 14. 8.19,84 14.10.30,78	- 0,09 - 0,14 - 0,14 - 0,02 + 0,21 - 0,04	- 28,07	38.10.24,4 21.54.37,4 25. 0.25,2	733,4	†21,0	+19,4	+1.19,6 +1.29,5	
	Anonyme	14.14.25,38 14.24.56,10 14.29.53,38 14.33.19,31 14.41.54,78	- 0,02 - 0,04 - 0,12 - 0,12 - 0,06	- 28,08	22.24. 3,7 26. 0.10,3 34.58.52,4 35. 6. 5,2 27.42. 4,4	733,5 733,8	+20,8	+19,0 +18,7	+1.21,1 +1.33,2 +2.19,3 +2.20,2 +1.40,0	42,0
	α² Balance β Petite Ourse S α Serpent α Cassiopée 2 Petite Ourse S	14.42. 6,20 14.50.45,35 15.36.23,86 0.31.30,22 0.48.29,40	- 0,06 + 1,81 + 0,11 + 0,74 + 6,18	- 28,08 - 27,81 - 28,11 - 28,03	297.35.42,5 5.26.47,6 316.39.40,9 286.56. 5,6	733,8 733,5 733,9 733,9	+20,5 +19,5 +19,8 +19,8	+18,4 +16,9 +21,0 +21,2	- 29,6 + 44,7 - 9,0 - 44,0	44,0 48,9 48,8

Le 1, Mire Sud-40°, 73. Mire Nord B-6°, 42 Mire Nord C-27°, 32. Mire Nord D-59°, 43. Niveau+1°, 63.

Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1849.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	0020	ECTION le la	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BAROMÈTRE	THERMO	OMĖTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	α Petite Ourse S  ĉ Cassiopée  α Bélier  Vénus, bord 2, ceutr. β Petite Ourse I	b. m. s. 1. 3.58,12 1.15.30,14 1.43. 6,31 1.58.11,59 2.45.31,46 2.50.48,53	ment. + 0,85 + 0,97 + 0,24 + 0,15 - 1,81	pendule.  - 28,48  - 28,25	283.52.37,6 312.55.19,5 309.26.53,3 349.36.48,1 357.31.38,4 267. 9.46,7	733,9 733,9 733,9 733,9 733,8	120,0 +20,2 +20,4 +20,4 +21,1	rieur. +22,6 +23,1 +23,0 +22,6 +23,4 +23,5	- 48,8 - 12,6 - 16,1 + 23,3 + 32,6 -1,28,8	50,3 48,5 46,6
2	Soleil, bord 1, sup. Mercure, bord 1, ctre    Grand Chien	4.39.17,29	+ 0,25 + 0,27 - 0,07 + 0,16 + 0,06 - 6,18	- 28,35 - 28,54	349.52.52,5 347.19.55,7 12.58.38,0	733,6 733,1	+22,2 +23,1	+25,8 +28,8 +22,2	+ 23,3 + 23,0 + 57,1 -1, 0,3	40,0
	2 Petite Ourse I α Petite Ourse I α Vierge Weisse, XIII, 515. 5 π Hydre x Vierge	13. 4.34,86 13.16.47,92 13.24.34,56 13.29.37,11 13.57.21,08 14. 4.24,24	- 0,02 - 0,02 + 0,04 - 0,14 - 0,02	- 28,51	277.49.34,7 280.53. 6,0 22.43.17,0 21.43. 8,3 9.12.19,0 38.16.45,2 21.55. 6,7	733,1 733,1 733,3 733,4	+22,3 +22,7 +22,2 +22,0	+21,5 +21,2 +21,2 +21,2 +19,7	- 54,3 +1.21,3 +1.18,4 + 50,3 +2.45,9 +1.19,4	10,3
	α Bouvier	14.10.30,24 14.14.24,62 14.18.17,46 14.24.55,44 14.29.31,70 14.33.18,61		- 28,64 - 28,76	25. 1.17,7 22.24.35,9 24.34. 2,1 26. 0.37,4 23. 6.21,9 35. 6.33,2	733,4	+21,7	+19,5 +19,5	+1.29,4 +1.20,9 +1.27,8 +1.33,0 +1.23,1 +2.19,9	
	α Balance α Serpent α Pégase α Andromède γ Pégase α Cassiopée 2 Petite Ourse S	14.42. 5,58 15.36.23,48 22.56.46,30 0. 0. 7,01 0. 4.59,68 0.31.29,52	- 0,06 + 0,11 + 0,17 + 0,30 + 0,17 + 0,74 + 6,18	- 28,70 - 28,49 - 29,01 - 28,89 - 28,71 - 28,77	27.45.11,7 5.27. 8,9 357.58. 4,8 344. 6.43,7 358. 1. 6,6 316.40. 6,5 286.56.34,1	733,3 733,5 733,6 733,6 733,7 733,7	+21,5 +21,7 +20,1 +19,7 +20,1 +20,3	+18,6 +18,4 +16,0 +20,2 +21,0	+1.40,1 + 44,5 + 34,0 + 17,5 + 33,6 - 9,0 - 43,9	8,5 10,1 17,2 19,4 15,4 14,5
	α Petite Ourse S δ Cassiopée ε Cassiopée Vénus, bord 2, sup. β Petite Ourse 1	1. 3.56,32 1.15.29,69 1.43. 5,75 2.45.40,80 2.50.47,95	+ 0,85 + 0,97 + 0,15 - 1,81	- 28,78	283.53. 2,2 312.55.42,7 309.27.21,4 357.41.52,3 267.10.16,3	733,6 733,6 733,7	+20,3 +20,7 +21,3	+22,0 +22,7 +23,0 +23,0 +23,2 +23,2	- 43,9 - 48,8 - 12,6 - 16,1 + 32,8 -1.28,8	16,1
	Soleil, bord 1, inf	4.43.22,93	+ 0,25		350.17.32,2	733,5	+21,4	+24,4	+ 23,9	1

Le 2, après l'observation de Mercure, le niveau du cercle a été enlevé, la bulle ayant presque complétemen disparu par suite de la chaleur; le niveau a été replacé dans la soirée. Mire Sud-40°,17.

Le 3, après l'observation du Soleil, le niveau a encore été enlevé ponr la même raison; il a été replacé le 4 après avoir laissé s'échapper un peu d'éther.

41
Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigee pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté-	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
4	α Cassiopée	h. m. s. 0.31.28,58	+ 0,74	- 29,80	316.36.31,0	731,3	+21,4	+22,5	- 9,0	39,0
	2 Petite Ourse S	0.52.27,60	+ 6,18		286.52.57,7 283.49.26,0	731,4	+21,5	+22,8	- 43,4 - 48,6	38,5
	Vénus, bord 2, sup. B Petite Ourse I	2.46.25,44 2.50.47,34	+ 0,16	- 29,31	357.55.15,8 267. 6.39,0	731,3	+22,4	+23,4 +23,2	+ 33,0	38,5
5	Soleil, bord 1, sup.	4.51.34,87	+ 0,26 + 0,34	- 29,80	349.28.18,2 340. 5.40,7	731,0	+23,6	+26,1 +30,6	+ 22,8	38.0
	α Petit Chien β Gémeaux	7.30.53,37	+ 0,10	- 30,00 - 20,87	6.41.34,7 343.55.19,2	730,0	+24,5	+30,8	+ 44,5	32,6
	B Lion	11.40.51,86	+ 0,19	- 30,03 - 30,38	356.53.11,6 317.46.31,4	730,2	+24,6	+25,6	+ 31,5	37,4 34,4
	α Petite Ourse I 2 Vierge	13. 4.36,41	- 0,02	- 29,99	280.49.32,7 22.39.43,0	730,8	+24,3	+22,8	- 7,7 - 53,6 +1.20,3	38,0 36,9
	a Cassiopée 2 Petite Ourse S	0.31.28,02	+ 0,74	- 30,40	316.36.28,1 286.52.53,7	732,4	+22,3	+21,2 +22,0	- 9,0 - 43,8	36,1
	Petite Ourse S Vénus, bord 2, sup.		+ 0,16	2	283.49.24,8 358. 1.59,3	732,4 732,2	+22,3	+22,4 +23,8	- 48,7 + 33,2	37,1
	β Petite Ourse I α Persée		+ 0,59	- 30,17 - 30,49	267. 6.38,9 322.59.45,0	732,2	+22,7	+24,4	-1.28,5 - 2,9	38,2 37.7
6	Soleil, bord 1, inf  a Petite Ourse I	4.55.41,50	+ 0,25		349.53.34,5 280.49.30,5	731,8 731,8	+23,4	+26,6 +19,0	+ 23,3 - 54,7	34,8
	α Vierge h Vierge	13.16.45,64	- 0,02 - 0,02	- 30,76	22.39.36,8	731,7	+22,3	+19,4	+1.21,7	32,2
	η Grande Ourse Lalande 25543	13.41. 5,45	+ 0,60	= 30,48	322.14.22,4 30.42. 5,7			+19,0	- 3, <sub>7</sub> +1.53, <sub>3</sub>	35,0
	Lalande 25617 Piazzi, XIII, 294	13.47.43,80	- 0,09 - 0,14		30.46.17,8 38. 7.14,2	731,7	+22,1	+19,3	+1.53,6	
	5 π Hydre × Vierge	13.57.18,97	- 0,14	2 66	21.51.24,2	2.0			+1.19,3	
	Weisse, XIV, 278. Weisse, XIV, 283.	14. 8.17,22	+ 0,21	- 30,66	352.19.56,1	731,8	+21,8	+19,1	+ 26,7	39,9
	Weisse, XIV, 360.		- 0,03 - 0,04		24.32.20,3 24.57.52,8	731,9	+21,7	+19,0	+1.27,9	
7	Soleil, bord 1, sup.		+ 0,26	- 30,74	349.15.52,8	731,5	+22,0	+22,3	+ 22,9	
	Mercure, bord 1, ctre α 2 Gémeaux	6.42.28,41 7.24.25,68	+ 0,26	- 30,86	348.19. 3,2 340. 5.39,2	730,5	+22,5	+23,2	+ 21,9	36,8
	α Petit Chien β Gémeaux		+ 0,10	- 30,95 - 31,00	6.41.32,2	730,4	+22,4	+24,6	+ 45,5	31,3

Le 5, Niveau+1P,50. d-0P,00. Nadir 146°6' 37",03. Le 6, Mire Nord B-5P,51. Mire Nord D-59P,96.

Des Astres   Fill Méridien   Pendale   Penda	1==					o mentacement					
Weisse, XIV, 360.   14.19. 5,62   -0,04   35.43.86   15.18.33,25   -0,13   36.54.22,8   38.12.48,8   729,5   421,5   418,6   42.33,8   729,5   421,6   42.5,7   42.5   4	JOURS.	NOM	ан		de	DES VERNIERS	BAROMÈTI	~		RÉFRACTIO	
Weisse, XIV, 360.  B. A. C. 5027			ril Meridien.			pour le niveau.	=	rieur.	rieur.		I ULL.
B. A. C. 5027			h. m. s	S	5.	0 1 11	mm.	0	0	1 11	",
Anonyme   15.18.23,25   - 0,13   2.48.83,86   + 0,16   3.48.33,86   + 0,16   3.50.44,96   - 1,81   3.13. 2,05   + 0,59   - 31,49   36.5,6.66   322.59,43,8   727,8   +21,9   +25,7   + 33,1   +26,0   -1.27,3   36,4   36.5,5.7,7   36.6   322.59,43,8   727,8   +21,9   +25,7   + 33,1   +26,0   -1.27,3   36,4   36.5,5.7,7   36.6   322.59,43,8   727,8   +21,9   +25,7   + 33,1   +26,0   -1.27,3   36,4   36.5   32.59,43,8   727,8   +21,9   +25,7   + 33,1   +26,0   -1.27,3   36,4   36.5   32.59,43,8   727,7   +22,2   +26,3   -2.9,9   36,5				, ,							
Vénus, bord 2, sup.   2,48,33,86   + 0,16     3 Petite Ourse 1   2,50,44,96   - 1,81   3.13.2,05   + 0,59   - 31,49   322.59,43,8   727,8   +21,9   +25,7   + 33,1   36,				,			729,5	+21,0			
B Petite Ourse 1   2.50.44,96   - 1,81   - 31,56   267. 6.36,6   322.59.43,8   727,7   +22,2   +26,3   - 2.9,9   36,36   36,259.43,8   3				, .			727.8	+21.0			
8 Soleil, bord 1, inf					- 31,56		/2/10	113			36,6
A Grand Chien   6.37.57,72   -0.07   -31,34     348.33.48,7   726,0   +23,6   +27,4   +21,6     349.53.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   726,0   +23,6   +27,4   +21,6     348.33.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   726,0   +23,6   +27,4   +28,5   +13,0   348.33.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   725,9   +24,4   +28,5   +13,0   348.33.48,7   725,9   +24,4   +28,5   +13,0   348.33.48,7   725,9   +24,4   +28,6   +44,5     33,   41,15   41		α Persée		+ 0,59			727,7	+22,2	+26,3	2 '	36,3
A Grand Chien   6.37.57,72   -0.07   -31,34     348.33.48,7   726,0   +23,6   +27,4   +21,6     349.53.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   726,0   +23,6   +27,4   +21,6     348.33.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   726,0   +23,6   +27,4   +28,5   +13,0   348.33.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   725,9   +24,3   +28,6   +44,5     33,   348.33.48,7   725,9   +24,4   +28,5   +13,0   348.33.48,7   725,9   +24,4   +28,5   +13,0   348.33.48,7   725,9   +24,4   +28,6   +44,5     33,   41,15   41	8	Soleil, hard t. inf.	5. 3.55.35	+ 0.26		3/0/2 10	726.7	+22.6	+27.1	+ 22.0	
Mercure, bord 1, ctre   a <sup>2</sup> Gémeaux   7.24, 25, 04   + 0, 34   - 31, 49   a Petit Chien   7.30, 51, 75   a Petite Chien   7.30, 51, 75   a Petite Ourse I .   13, 4, 34, 90   x Vierge   14, 4, 21, 22   - 0, 02   a Bouvier   14, 4, 21, 22   - 0, 03   Weisse, XIV, 278.   14, 15, 3, 56   - 0, 03   Weisse, XIV, 283.   14, 15, 9, 70   - 0, 04   Lalande 2662 .   14, 29, 49, 73   Lalande 2662 .   14, 29, 49, 73   Lalande 26736   14, 33, 15, 53   - 0, 12   a Petite Ourse S .   14, 45, 15, 16   - 0, 06   - 31, 69   3 Petite Ourse S .   14, 50, 41, 11   + 1, 81   - 31, 77   297, 32.28, 0   12, 41, 22, 1   15, 0.27, 31   + 0, 06   12, 41, 52, 54   - 1, 10   a Petite Ourse S .   1, 45, 77, 73   + 0, 06   12, 41, 52, 54   - 1, 10   a Petite Ourse S .   1, 45, 77, 73   - 38, 98   297, 32.28, 0   724, 2   + 19, 7   + 16, 0   - 29, 5   + 16, 0   + 57, 2   12, 44, 49, 94   - 1, 31, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34					- 31,34	049.42. 1,9	7,	,,-	1-7,-	119	
A Petit Chien   7,30,51,75   4 0,70   - 31,60   6.41.35,1   725,9   +24,3   +28,6   + 44,5   33,			6.45.22,19	+ 0,26							
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	1							. , .		34,2
X Vierge   14, 4, 21, 22   -0,02   4, 8, 16, 12   +0,21   -31,75   352,19.57,3   Weisse, XIV, 278   14,15, 3,56   -0,03   Weisse, XIV, 283   14,15, 9,70   -0,04   Lalande 26662   14,29,49,73   -0,12   Lalande 26736   14,21,41,51,06   -0,06   31,69   352,155,2   724,4   +20,4   +16,5   +2,19,4   +1,39,5   33,				+ 0,10	- 51,60	6.41.35,1	725,9	+24,5	+28,0	+ 44,5	33,3
A Bouvier   14. 8.16,12				- 0.02		21.51.27.0	724.5	+21,7	+17.8	+1.18.0	
Weisse, XIV, 283. Weisse, XIV, 360. Lalande 26662  Lalande 26736  Δ¹ Balance  Δ¹ Balance  β Petite Ourse S  α Petite Ourse I  α Baleine		α Bouvier			-31,75		7 - 17-		, , ,		41,2
Weisse, XIV, 360.   14.19. 4,90   -0,04   Lalande 26662   14.29,49,73   -0,12   Lalande 26662   14.29,49,73   -0,12   24.57.50,9   35. 2.55,2   724,4   +20,4   +16,5   +2.19,4   +1.39,5   33,   27.38.56,0   27.38.56,0   27.38.56,0   27.38.56,0   72.4,3   +20,3   +16,0   +1.39,5   33,   27.38.56,0   27.38.56,0   27.38.56,0   72.4,3   +20,3   +16,0   +16,0   +2.19,4   +1.39,5   33,   27.38.56,0   27.38.56,0   72.4,3   +20,3   +16,0   +16,0   +2.19,4   +1.39,5   33,   27.38.56,0   27.38.56,0   72.4,2   +19,7   +16,0   -2.9,5   +16,0   +57,2     12.41.22,1     1											1
Lalande 26662  Lalande 26736  Lalande 26736  Δ¹ Balance  Δ¹ Balance  Δ¹ Balance  Δ¹ Balance  Δ¹ Balance  Δ¹ Balance  Δ² Petite Ourse S  Δ² Petite Ourse I  Δ² Balance  Δ² Balance  Δ² Balance  Δ² Balance  Δ² Petite Ourse I  Δ² Balance  Δ² Balance  Δ² Balance  Δ² Balance  Δ² Balance  Δ² Petite Ourse I  Δ² Balance  Δ² Balance  Δ² Ay.10.11,1  Δ² 4,1.22,1											
Lalande 26736   14.33.15,53   -0,12   14.41.51,06   -0,06   -31,80   35. 2.55,2   724,4   +20,4   +16,5   +2.19,4   +1.39,5   33,			14.19. 4,90	, ,		24.37.30,9				+1.29,0	
α² Balance       14.41.51,06       -0,06       -31,80       27.38.56,0       724,3 $+20,3$ $+1.39,5$ 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33,	1		14.33.15,53			35. 2.55,2	724,4	+20,4	+16,5	+2.19,4	
β Petite Ourse S Weisse, XIV, 1158. $14.50.41,11$ 15. 0.27,31 $+ 1,81$ 4 0,06 $+ 31,77$ 15. 0.27,31 $+ 297.32.28,0$ 12. 0,06 $+ 19,7$ 12. 0,06 $+ 16,0$ 12. 0,24 $+ 16,0$ 12. 0,24 $+ 16,0$ 12. 0,24 $+ 16,0$ 12. 0,25 $+ 16,0$ 12. 0,27 $+ 16,0$ 13. 0,23. 0,40,5 14. 0,02 15. 0,08 16.			14.41.51,06	- 0,06		27.38.56,0		+20,3			33,1
Weisse, XIV, 1158. 15. 0.27,31 $+$ 0,06 $+$ 12.41.22,1 $+$ 16,0 $+$ 57,2 $+$ 16,0 $+$ 57,2 $+$ 17. Soleil, bord 1, inf. $+$ 23,4 $+$ 23,4 $+$ 24.0 $+$ 24.0 $+$ 25.0 $+$ 26 $+$ 26 $+$ 26 $+$ 27. $+$ 27. $+$ 28. 1,95 $+$ 2.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47 $+$ 3.50.36,47						2 0	,		1.6		2.2
Soleil, bord 1, inf $\alpha$ Petite Ourse S $\alpha$ Relite Ourse I $\alpha$ Relite Ourse I $\alpha$ Relite Ourse I $\alpha$ Relien R					- 31,77		724,2	+19,7			31,3
α Petite Ourse S α Bélier 1. 4. 7,72 α Bélier β Petite Ourse I α Baleine 2.53.44,73 γ Θερεία Ourse I α Baleine 2.53.44,73 γ Θερεία Ourse I α Baleine α Baleine α Baleine α Baleine α Baleine 3. 3.23,66 α Persée 3. 3.23,66 α Persée 3. 3.23,66 α Petite Ourse I α Baleine 3. 3.23,66 α Persée 3. 3.23,66 α Petite Ourse I α Baleine 3. 3.23,66 α Petite Ourse I α Soleil, bord I, sup. α Detite Ourse I α Petite Ourse I 13. 4.30,13 α Vierge 13. 4.30,13 α Vierge 14. 8. 8,96 α Bouvier 15. 4. 7,72 α Bouvier 16. 8,96 α Bouvier 17. 10. 38,84 α Bouvier 18. 16. 3,736 α Bouvier 19. 16. 3. 34. 35. 34. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35	١.	77 01330, 2117, 1130.	13. 0.27,31	7 0,00		12.41.22,1			710,0	T 3//12	
α Bélier	17			+ 0,12		349.10.11,1	727,6	+19,9	+18,6	+ 23,4	
β Petite Ourse I   2.50.36,47   - 1.10   - 38,84   267. 6.47.9   731.9   15,8   144,6   + 50,8   37.1   14,8   + 34,5   1	Ι.				20.00	2/- 22 /- 5	-2	1.5	20	1 0/0	/2
α Baleine       2.53.44,73       + 0,02       - 38,71       8.48.12,6       731,9       +15,8       +14,6       + 50,8       37,         Vénus, bord 2, sup.       3. 3.23,66       + 0,08       - 38,50       358.13.11,0       358.13.11,0       731,9       +15,8       +14,6       + 50,8       37,         18 Soleil, bord 1, sup.       5.45.17,15       + 0,12       - 38,92       348.37, 7,2       731,8       +15,8       +14,9       - 3,0       42,         18 Soleil, bord 1, sup.       5.45.17,15       + 0,12       - 38,92       359.35.56,4       731,0       +15,8       +16,7       + 22,6       42,         α Petite Ourse 1       13.46.36,013       - 0,05       - 38,98       - 38,98       280.49.31,5       731,1       +16,7       + 16,5       - 55,1       36,4       + 16,2       + 16,5       - 55,1       36,4       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,5       - 55,1       36,4       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 16,2       + 15,3       - 37,3       35,3       + 16,2       + 15,		& Petite Ourse I					752,0	+13,7	+13,0		- /
Vénus, bord 2, sup. $3.3.23,66 + 0,08 = 3.12.55,59 + 0,35 = 38,50$ $358.13.11,0 = 32.259,50,3$ $731,9 = 15,8 = 14,8 = 34,5 = 34$							731.0	+15,8	+14.6		37,2
[18] Soleil, bord 1, sup. $5.45.17,15$ $+ 0.12$ $+ 0.07$ $- 38.92$ $348.37. 7.2 35.35.56,4 731.0 + 16.7 + 18.2 4 35.9 36.4 35.9 35.56,4 731.0 + 16.7 + 18.2 4 35.9 36.4 35.9 35.56,4 731.1 + 18.0$			3. 3.23,66		",	358.13.11,0				+ 34,5	
σ Lion		α Persée	3.12.55,59	+ 0,35	- 38,50	322.59.50,3	731,9	+15,8	+14,9	- 3,0	42,1
σ Lion	18	Soleil, hord T. sun	5.45.17.15	+ 0.12		348.37. 7.2	731.8	+16.3	+16.7	+ 22.6	
α Petite Ourse I   13. 4.30,13   -0,05   -38,98   22.39,38,0   -115,3   -115,3   -3,7   35,1   -38,98   -38,99   -38,98   -38,99   -38,93   -38		σ Lion			- 38,92					'	36,4
7 Grande Ourse 13.40.56,95 + 0,36 - 38,99 322.14.20,7 731,3 +17,3 +15,3 - 3,7 35,6 80uvier 14. 8. 8,96 + 0,11 - 38,93 Weisse, XIV, 278 14.14.56,10 - 0,07 Weisse, XIV, 283 14.15. 2,40 - 0,07		α Petite Ourse I	13. 4.30,13		.5	280.49.31,5	731,1	+18,0			36,2
Weisse, XIV, 278 14.14.56,10 - 0,07 Weisse, XIV, 283 14.15. 2,40 - 0,07							2 2	1 2			34,7
Weisse, XIV, 278 14.14.56,10 - 0,07   Weisse, XIV, 283 14.15. 2,40 - 0,07   24.32.19,0   +14,4 +1.29,3					- 38,99	322.14.20,7	731,3	+17,3	+15,3	- 3,7	35,2
Weisse, XIV, 283 $  14.15.2,40   -0.07   24.32.19.0   +14.4   +1.29.3  $					- 50,95						
W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									+14,4		
weisse, AIV, 490   14.24.43,00   - 0,07     23.41.37,5     +1.33,3		Weisse, XIV, 458	14.24.43,66	- 0,07	-	25.41.37,5				+1.33,5	

Le 8, Mire Sud-40P,23. Niveau+0P,80.

Le 12, Mire Sud-37,52. Mire Nord B-7,65. Mire Nord C-31,80. Mire Nord D-63,66.

43

Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	ONÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
s.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Lalande 26662 Lalande 26736 $\alpha^*$ Balance $\alpha^2$ Balance $\beta$ Petite Ourse S	h. m. s 14.29.42,51 14.33. 8,41 14.41.43,92 14.41.55,38 14.50.34,40	s. - 0,13 - 0,13 - 0,08 - 0,08	- 38,92 - 38,88 - 38,69	34.55.38,7 35. 2.59,3 27.39.58,1	731,4	+16,4	+13,8	+2.21,1 +2.22,1 +1.41,5 - 30,1	3 <sub>7,4</sub>
	Anonyme Nouv <sup>lle</sup> étoile (Hind) Anonyme Weisse, XVII, 47	15. 4.22,50 16.50.27,03 17. 1.53,30 17. 3.22,12	+ 1,10 - 0,13 - 0,07 - 0,08 - 0,08		35.14.36,0 24.56.27,3 27.18.17,5	731,4 731,7	+16,0	+13,1	+2.23,9 +1.31,9 +1.41,1	
	α Hercule α Petite Ourse S	17. 7. 9,13 1. 4. 4,81	+ 0,08	- 38,84	357.43.56,1	731,7	+14,2	+10,7	+ 34,4	36,6
	Soleil, bord 1, inf  a llydre  b Lion  The Hydre	5.49.26,05 9.19.30,63 9.59.40,08 13.57. 9,65	+ 0,12 - 0,04 + 0,07 - 0,18	- 39,48 - 39,57	349. 7.30,7 20.18. 3,2 359.35.55,0 38.13.11,0	731,3 731,2 731,2 731,5	+17.7 +18,5 +19,8 +17,1	+22,4 +21,0 +21,7 +19,1	+ 22,8 +1.14,4 + 35,5 +2.45,9	38,6 34,6
	x Vierge α Bouvier α Couronne α Serpent	14. 4.13,18 14. 8. 8,14 15.27.39,74 15.36.12,34	- 0,04 + 0,11 + 0,15 + 0,04	- 39,74 - 39,68 - 39,72	21.51.24,6 352.19.51,5 345. 4.40,9 5.23.34,9	731,9	+17,0	+15,4	+1.19,4 + 26,7 + 18,9 + 44,9	37,0 41,7 38,7
	Soleil, bord 2  a Lion  Petite Ourse I  Bouvier  s' Balance	5.55.52,83 9.59.39,08 13. 4.32,20 14. 8. 7,30 14.41.42,26	+ 0,17 + 0,09	- 40,54 - 40,54	359.35.57,8	733,9	+21,5	+24,9	+ 35,2	37,2
	α <sup>2</sup> Balance	14.41.53,44 14.50.32,50 15. 3.50,41 15. 7.20,40	- 0,10 - 0,10 + 1,39 - 0,17	- 40,59 - 40,83 - 40,19	27.41.35,5 297.32.26,4 35.42.25,7 35.43. 8,2	734,0	+20,0	+18,3	+1.40,3 - 29,7 +2.25,5 +2.25,6	32,8 32,1
	α Couronne	15.27.38,87 15.36.11,40 16.50.25,50 16.59.58,28	+ 0,19 + 0,05 - 0,08 - 0,10	- 40,50 - 40,65	345. 4.35,3 5.23.31,2 27.23.48,0	734,0	+19,5	+17,5	+ 18,8 + 44,7 +1.40,6	36,1 34,9
	Weisse, XVII, 47  a Hercule  a Ophiuchus  Pallas	17. 3.20,24 17. 7. 7,24 17.27.17,08 17.44.30,93	- 0,10 + 0,10 + 0,09 + 0,17	. – 40,72 – 40,58	27.15.22,0 357.43.59,7 359.37.26,9 347.42.47,1	734,0 734,0 734,0	+17,0 +17,0 +16,9	+13,9 +14,0 +13,7	+1.40,0 + 34,1 + 36,6 + 21,9	40,2
	α Petite Ourse S α Bélier β Petite Ourse I α Baleine	1. 4. 4,98 1.57.59,53 2.50.34,36 2.53.42,31	+ 0,16 - 1,39 + 0,02	- 41,15 - 41,08 - 41,21	283.49.26,6 349.33.37,9 267. 6.40,5	734,6	+17,9 +17,8	+16,7	- 49,9 + 23,1 -1.29,4	36.9 40,0 35,6

Le 18, Mire Sud-39°,80. Mire Nord B-6°,35. Mire Nord C-30°,90. Mire Nord D-62°,87. Niveau+0°,22. Le 19, Mire Sud-40°,24. d-8°,17. Nadir 146°6′38″,62.

44

Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	MÈTRE	RÉFRACTION	LIEU da
ns.	DES ASTRES-	Fil Méridien.	l'instru- meut.	la pendule.	pour le niveau.	BTRE.	laté- rieur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
	Vénus, bord 2, sup. α Persée α Taureau	h. m. s. 3. 9.47,16 3.12.53,11 4.26.34,20	+ 0,10 + 0,44 + 0,11	s. - 41,00 - 41,22	357.59.21,6 322.59.44,6 356. 6. 8,9	734,4 734,4	+18,6 +19,8	+20,7 +23,5	+ 33,6 - 2,9 + 30,9	36,3 35,0
21	Soleil, bord 1, sup. 3 Gémeaux	10.53.39,01	+ 0,17 + 0,20 - 0,05 + 0,09 + 0,73 + 0,10 + 0,53	- 41,38 - 41,26 - 41,40 - 41,35 - 41,48 - 41,57	348.35. 1,3 343.55.18,2 20.18. 1,6 359.35.54,6 309.44.43,9 356.53.11,8 317.46.29,0	734,0 733,4 733,1 733,2 732,9	+20,8 +21,2 +24,3 +25,2 +24,5	+23,9 +27,0 +27,4 +27,1 +27,0 +26,2	+ 22,1 + 17,0 +1.13,0 + 34,9 - 15,5 + 31,5 - 7,8	37,2 35,9 33,7 29,6 38,7 32,4
	α Petite Ourse I α Vierge η Grande Ourse 5 π Hydre χ Vierge α Bouvier	13. 4.33,63 13.16.34,62 13.40.54,11 13.57. 7,77 14. 4.11,00 14. 8. 6,28	- 0,07 + 0,45 - 0,18 - 0,06 + 0,14	- 41,71 - 41,68	280.49.28,2 22.39.34,3 322.14.15,8 38.13.10,0 21.51.24,0 352.19.52,9	732,5 732,5 732,4 732,5	+24,3 +24,0 +23,6 +23,2	+25,0 +24,9 +22,6 +23,5 +22,2	- 53,6 +1.20,2 - 3,6 +2.44,0 +1.18,6 + 26,4	34,4 28,8 30,8
	Lalande 26662 Lalande 26736 α¹ Balance α² Balance Anonyme Lalande 27972 Anonyme	14.33. 5,85 14.41.41,46 14.41.52,84 15. 4.19,58 15.13.56,63 15.18.13,11	- 0,16 - 0,16 - 0,10 - 0,16 - 0,16 - 0,17 - 0,17	- 41,39 - 41,43	34.55.39,3 35. 2.55,9 27.41.38,5 35.14.34,7 34.42.14,3 36.54.21,0 36.14.31,9	732,6	+21,7	+20,6 +21,0 +20,3	+2.18,1 +2.18,8 +1.39,3 +2.20,5 +2.16,8 +2.33,8 +2.28,5	34,8
	α Couronne α Serpent Nouv <sup>lle</sup> étoile (Hind Weisse, XVII, 47	15.23.35,35 15.27.38,04 15.36.10,64 16.50.23,71 17. 3.19,62	- 0,17 + 0,19 + 0,05 - 0,08 - 0,10	- 41,33 - 41,40	345. 4.32,8 5.23.33,0 24.56.26,5 27.15.20,3 357.43.57,3	732,6 732,6	+21,3 +20,6	+19,1 +17,8	+ 18,6 + 44,3 +1.29,8 +1.38,5	33,6 36,4
	A Hercule Anonyme Ophiuchus Pallas Anonyme  y Dragon	17.12.41,00 17.27.16,24 17.43.39,77 17.48.50,69 17.52.27,05	+ 0,10 - 0,10 + 0,09 + 0,17 + 0,17 + 0,48	- 41,55 - 41,43 - 41,29	27.10.39,5 359.37.25,4 347.44.22,3 347.48.32,0 320.47.58,3	732,6 732,4	+20,3	+17,5 +17,5 +17,7 +17,5	+ 33,6 +1.38,3 + 36,1 + 21,6 + 21,7 - 5,1	37,5 36,6 32,0
	2 Petite Ourse S α Petite Ourse S α Bélier β Petite Ourse I α Baleine Vénus, bord 2, sup.	1. 4. 1,8t 1.57.58,77 2.50.33,90 2.53.41,6t	+ 0,20 - 1,76 + 0,03 + 0,13	- 41,90 - 41,85 - 41,92	285.43.22,5 283.49.24,2 267. 6.41,4 8.48.13,4 357.53.32,0	732,5 732,4 732,0	+19,9 +20,0 +20,4 +20,7	+16,0 +19,0 +21,4 +21,6 +21,9	- 46,6 - 49,3 -1.29,2 + 49,5 + 33,2	30,8 35,1 36,5 37,4

Le 21, Mire Sud-42P,90. Mire Nord B-6P,55. Mire Nord C-29P,92. Mire Nord D-62P,73. Niveau-0P,99

45
Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1849.

Jouns.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM laté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE.
		211 5101101101	ment.	pendule.	pour le niveau.	,F8	rieur.	rieur.		TOLL.
	Soleil, bord 1, inf	b. m. s. 5. 1.52,47 9.19.28,03	6. + 0,21 - 0,07	- 42,10	349. 6.54,4 20.18. 1,3	731,6 730,1	+22,6 +23,0	+24,2 +28,4	+ 22,6 +1.12,4	35,1
	α Lionα Grande Ourse	9.59.37,30	+ 0,11	-42,10 $-42,29$ $-42,18$	359.35.56,5 309.44.46,6	729,9 729,6	+23,2 +23,0	+28,3 +28,1	+ 34,6	35,4 32,3
	3 Lion	11.40.39,56	+ 0,13	- 42,20 - 42,43	356.53.12,6 317.46.33,4	729,5	+24,2	+27,4	+ 31,2	39,2 36,9
	α Petite Ourse I α Vierge	13. 4.36,25 13.16.33,76	- 0,00	- 42,58	280.49.24,9 22.39.37,2	729,5 729,5	+24,2	+25,1 +25,2	- 7,7 - 53,4 +1.19,8	31,3
	η Grande Ourse  σ. Bouvier	13.40.53,13 14. 8. 5,38	+ 0,57	-42,52 $-42,41$	322.14.22,2 352.19.48,4	729,4	+23,9 +23,5	+23,8	- 3,6 + 26,3	3 <sub>7</sub> ,3 33,8
	Lalande 26662	14.29.38,86	- 0,21 - 0,21		34.55.43,5 35. 2.5 <sub>7</sub> ,9	7-300	,,	†22,1	+2.16,7 +2.17,6	
	α * Balance α * Balance	14.41.40,54	- 0,13 - 0,13	-42,33 $-42,29$	27.38.56,8				+1.38,3	33,0
	B. A. C. 4959	14.50.30,35 14.56.15,64	+ 1,76	- 41,85	297.32.22,8 37.27.56,2	729,7	+22,9	+21,4	-29,2 $+2.37,1$	29,4
	Anonyme	14.59 48,40	- 0,22 - 0,20		37.22. 2,0 35.14.33,5				+2.36,3 +2.19,5	
	B. A. C. 5027 Lalande 27980	15. 7.18,58	- 0,21 - 0,20		35.43. 8,8 34.3 <sub>7</sub> .43,4			+20,8	+2.23,2	
	Anonyme  Couronne  Serpent	15.18.12,21	+ 0,25	- 42,17	36.54.25,9 345. 4.37,5		12	10-0	+2.32,5	38,3 35,5
	α Ophiuchus Piazzi, XVII, 200.	15.36. 9,98 17.27.15,64 17.34.13,15	+ 0,06	- 42,05 - 42,01	5.23.32,5 359.37.28,1 347.42.34,2	729,5 729,7	+22,3	†21,0 †18,2	+ 43,8	39,3
	Pallas	17.42.48,41	+ 0,22 + 0,22 + 0,22		347.46.20,6				+ 21,5 + 21,5 + 21,6	
	y Dragon	17.52.26,12	+ 0,60	- 42,11	320.48. 2,5 285.43.25,2	729,5 729,4	†20,7 †20,5	+17,7	- 5,0 - 46,2	36,6 34,2
	a Lyre 3 Petite Ourse I	18.31. 9,43	+ 0,38 - 1,76	- 42,21 - 42,90	333.39.39,2 267. 6.41,7	728,6	+20,3	+16,8	+ 7,2 -1.29,4	39,8 36,5
	α Baleine α Persée	3.12.51,19	+ 0,03	- 42,91 - 42,86	322.59.41,2	0.0			- 2,9	32,9
	Venus, bord 2, sup.	3.14.27,80	+ 0,13		357.47.24,0	728,6	+20,4	+19,9	+ 33,2	
23	Soleil, bord 1, sup. a Petite Ourse I	6. 6. 0,93 13. 4.36,03	+ 0,21		348:36.13,3	727,8	+21,4	+23,4	+ 22,0	
24	Soleil, bord 1, inf		+ 0,21	- 44,01	349. 8.25,2 359.35.57,0	726,6 725,6	+22,4	+23,0 +25,0	+ 22,6 + 34,8	36,1
	3 Lion y Grande Ourse	11.40.37,66	+ 0,13	- 44,07 - 44,20	356.53.13,2 317.46.30,0	725,7	+23,1	+24,6	+ 31,4	40,1 33,5

Le 22, Mire Sud-43°,59. Mire Nord B-5°,07. Mire Nord C-28°,28. Mire Nord D-59°,38. Niveau+0°,20. d-7°,25. Nadir 146°6'36",77.

Le 23, Mire Sud-41P,55. Mire Nord C-28P,76.

46
Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1849.

iouns.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	NOVENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERM	OMÈTRE Exté-	RÉFRICTION	LIEE
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	E.	rieur.	rieur.	9.	POLE.
	α Petite Ourse I α Vierge α Petite Ourse S β Petite Ourse I α Baleine α Persée Vénus, bord 2, sup.	h. m. s. 13. 4.36,69 13.16.31,98 1. 3.59,98 2.50.31,30 2.53.39,01 3.12.49,43 3.19.27,30	- 0,09 - 1,76 + 0,03 + 0,56 + 0,13	5. - 44,34 - 44,26 - 44,60 - 44,69	280.49.25,9 22.39.39,7 283.49.23,6 267. 6.40,0 8.48.13,2 322.59.41,5 357.33.29,8	726,1 728,5 728,8 728,8 728,8 728,8	+23,3 +21,7 +22,3 +22,5 +22,5	+23,0 +22,7 +20,4 +24,4 +24,3 +24,4	- 53,5 +1.20,1 - 48,8 -1.27,9 + 48,8 - 2,9 + 32,4	32,2 34,3 35,0 35,9 37,0 33,1
25	Soleil, bord 1, sup.  a Petite Ourse I  a Vierge  n Grande Ourse  a' Balance  a' Balance	6.15.18,41 13. 4.39,00 13.16.31,24 13.40.50,53 14.41.37,90 14.41.49,20	+ 0,21 - 0,09 + 0,57 - 0,13 - 0,13	- 45,07 - 45,05 - 44,95 - 45,07	348.38. 8,5 280.49.26,9 22.39.35,7 322.14.15,9 27.38.53,3	728,8 728,5 728,5 728,6	+23,4 +24,0 +24,0 +24,4	+27,7 +25,0 +24,4 +23,4 +20,7	+ 21,7 - 53,3 +1.19,9 - 3,6 +1.38,5	33,4 30,1 31,3 29,8
	β Petite Ourse S α Couronne α Serpent α Scorpion Ο Ophiuchus Piazzi, XVII, 200. Pallas	14.50.27,71 15.27.34,51 15.36. 7,32 16.19.27,45 17.27.13,10 17.34.10,83 17.40.17,05	+ 1,76 + 0,25 + 0,06 - 0,23 + 0,11 + 0,22 + 0,22	- 44,30 - 44,77 - 44,70 - 44,94 - 44,57	297.32.21,4 345. 4.33,0 5.23.27,3 38.21.20,3 359.37.25,9 347.42.29,7 347.54. 5,0	729,6 729,6 729,6 729,9	+24,0 +22,5 +22,2 +21,8	+20,5 +20,3 +19,8 +18,6 +18,5	- 29,2 † 18,5 † 44,0 †2.46,2 † 35,8 † 21,4 † 21,6	28,5 34,8 30,9 36,0 37,6
	Anonyme	17.48.47,35 17.52.23,62 18.20.27,64 2.50.30,50 3.12.48,87 3.22. 2,88	+ 0,22 + 0,60 - 1,76 + 0,56 + 0,13	- 44,61 - 45,00 - 45,29	347.48.31,0 320.47.56,1 285.43.17,8 322.59.41,4 357.26. 0,4	729,8 729,8 730,5	+21,5 +21,3 +23,0	+18,8 +18,7 +24,9 +24,9	+ 21,5 - 5,0 - 46,0 - 2.9 + 32,2	31,2 27,8 33,0
	Soleil, bord 1, inf  a Lion  y Grande Ourse  Lune, bord 1, sup  Petite Ourse I  vierge  Grande Ourse  Bouvier  lande Ourse  Beautiful ourse Sup  Petite Ourse Sup	6.18.26,81, 9.59.34,04 11.40.36,06 11.45. 5,76 11.47. 6,07 13. 4.35,75 13.16.30,56 13.40.49,89 14. 8. 2,02 14.41.37,02 14.41.48,38 14.50.27,11	+ 0,20 + 0,11 + 0,13 + 0,67 + 0,03 - 0,09 + 0,57 + 0,17 - 0,13 - 0,13 + 1,76	- 45,52 - 45,65 - 45,62 - 45,74 - 45,67 - 45,73 - 45,83 - 45,83 - 45,84	349.11.34,0 359.35.56,4 356.53.10,7 317.46.29,7 9.28.11,3 280.49.25,5 22.39.34,6 322.14.15,6 352.23.52,0 27.38.51,1	730,6 730,4 730,4 730,6 730,6 730,7 730,7	+23,5 +24,1 +24,3 +24,3 +23,9 +23,9 +23,2 +22,8	+26,0 +27,2 +24,9 +23,5 +23,5 +22,7 +21,0 +20,0 +19,7	+ 22,5 + 34,8 + 31,5 + 50,0 - 53,7 +1.20,4 - 3,6 + 26,5 +1.39,0	35,6 37,8 33,0 31,6 30,6 31,2 38,1 28,1
	Anonyme Lalande 27980	15. 4.15,53	~ 0,20 - 0,20	,,,,,	35.14.32,9 34.37.31,5			+19,7	+2.20,4	

Le 24, Mire Sud-419,74. Mire Nord 6-269,65. Le 25, Mire Sud-429,26.

47
Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERM Inté-	OWÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE
		rn meriaien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	573	rieur.	rieur.		I VEII.
	Anonyme  B. A. C. 5111 { préc. suiv. a Couronne	h. m. s. 15.18. 8,73 15.23.30,31 15.23.30,83 15.27.33,69 15.36. 6,22	s. - 0,22 - 0,21 - 0,21 + 0,25 + 0,06	- 45,59 - 45,79	36.54.21,8 36.14.35,0 345. 4.30,0 5.23.28,1	730,8	+21,7	+19,1 +19,0	+2.28,2 + 18,6 + 44,2	32,0 32,0
	Anonyme	15.41.38,69 15.46.35,27 15.48. 5,48 15.52.41,28 15.59.34,68 17.32.44,59 17.39.27,07	+ 0,21 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,22 + 0,22		354.48. 9,3 354.41.23,7 354.59.40,0 347.47.58,0 347.57.19,7	730,9 730,9	+21,7	+18,6 +16,8	+ 22,4 + 29,6 + 29,5 + 29,8 + 21,7 + 21,9	
	Anonyme.  γ Dragon  δ Petite Ourse S  α Lyre  β Petite Ourse I  α Baleine  γ Persée  Vénus, bord 2, sup  α Cocher	17.48.46,17 17.52.22,67 18.20.27,12 18.31. 5,85 2.50.29,17 2.53.37,49 3.12.48,05 3.24.44,28 5. 4.45,87	+ 0,22 + 0,60 + 0,38 - 1,76 + 0,03 + 0,56 + 0,13 + 0,49	- 45,56 - 45,83 - 46,27 - 46,17 - 46,15 - 46,03	347.48.36,3 320.47.58,0 285.43.18,0 333.39.31,8 267. 6.42,1 8.48. 8,7 322.59.41,7 357.18. 8,3 326.28.29,0	730,9 731,0 731,1 731,0	+21,3 +21,5 +21,7 +21,7	+16,5 +16,4 +20,7 +20,7	+ 21,7 - 5,1 - 46,4 + 7,2 -1.29,3 + 49,6 - 2,9 + 32,6 + 0,3	33,3 27,9 33,6 36,3 33,7 33,2
27	ß Orion  Soleil, bord 1, sup.  Hydre  Lion  Grande Ourse  Petite Ourse I  Vierge  Grande Ourse  Bouvier  Bouvier  Balance	5. 6.30,32 (6.22.35,01 (9.19.23,55 (9.59.33,12 10.53.33,75 13. 4.35,68 13.16.29,64 13.40.49,05 14. 8. 1,10 14.41.36,08	- 0,07 + 0,21 - 0,07 + 0,11 + 0,93 - 0,09 + 0,57 + 0,17 - 0,13	- 46,38 - 46,55 - 46,43 - 46,65 - 46,49 - 46,64 - 46,76	20.40.18,2 348.42.16,3 20.18. 0,0 359.35.56,7 309.44.49,2 280.49.26,3 22.39.34,0 322.14.14,0 352.23.51,4 27.38.51,3	730,9 730,8 730,0 729,8 729,6 729,4 729,3 729,3 729,3	+22,2 +22,5 +22,5 +22,6 +22,7 +23,0 +23,1 +23,2 +22,9	+21,2 +22,0 +22,8 +23,3 +23,6 +23,0 +23,0 +22,3 +23,2 +20,9	+1.15,3 + 22,3 +1.13,8 + 35,2 - 15,6 - 53,7 +1.20,4 - 3,6 + 26,2 +1.38,5	35,8 36,2 34,2 32,4 29,0 29,7 37,3 27,8
	α³ Balance	14.41.47,52 14.50.25,95 14.56.11,01 15. 3.44,35 15.13.12,05 17.38.37,51 18.20.25,26 2.50.28,22 2.53.36,65	- 0,13 + 1,76 - 0,22 - 0,21 - 0,20 + 0,22 - 1,76 + 0,03 + 0,56	- 46,74 - 45,94 - 47,16 - 47,04 - 47,01	297.32.23,5 37.27.54,2 35.42.25,6 34.37.33,8 348. 0.39,5 285.43.21,9 267. 6.40,1 8.48. 9,4	729,4 729,4 729,3 729,0 728,9	+22,7 +20,5 +19,3 +21,4	+20,1 +20,0 +16,7 +15,7 +21,2 +21,6	- 29,2 +2.37,5 +2.23,3 +2.15,7 + 21,9 - 46,4 -1.28,9 + 49,4 - 2,9	32,1 34,5 34,3 31,4

Le 26, Mire Sud-41P,44. Mire Nord C-29P,20.

Le 27, Mire Sud-42P,04. Mire Nord B-5P,12. Mire Nord C-28P,97. Mire Nord D-60P,03. Niveau+0P,02.

48
Observations faites à la lunctte méridienne en Juin 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU ou Fil Méridien.		ECTION le la pendule.	MOYEXNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO	Exté- rieur.	néfraction.	LIEU du POLE.
	Vénus, bord 2, sup.	h. m. s. 3.27.29,02	s. + 0,13	s.	357. 9.45,4	728,9	+21,8	+21,8	+ 32,2	71
28	Soleil, bord 1, inf.  a Lion  Grande Ourse  B Lion  Grande Ourse  Petite Ourse I  Vierge  Lune, bord 1, sup  Petite Ourse S  Petite Ourse S  Petite Ourse S	13.16.28.76 13.25.39,15 18.20.25,00	+ 0,21 + 0,11 + 0,93 + 0,13 + 0,67 - 0,09 - 0,05	- 47,45 - 47,11 - 47,21 - 47,52 - 47,52	348.44.31,8 359.35.54,9 309.44.45,4 356.23. 9,6 317.46.28,6 280.49.25,1 22.39.35,5 17.54.51,5 285.43.17,5 283.49.25,4	728,4 727,8 727,8 727,7 728,0 728,0 728,0 728,8 728,7	+23,4 +23,6 +23,5 +23,5 +23,5 +23,5 +23,5 +21,5 +20,8	+24,6 +26,1 +25,5 +24,8 +23,5 +23,2 +23,1 +18,9 +17,3	+ 22,t + 34,8 - 15,5 + 31,8 - 7,7 - 53,5 + 1,20,2 + 1, 7,4 - 45,9 - 49,3	34,2 30,4 37,1 32,0 31,4 30,4 28,5 36,3
	Bélier  β Petite Ourse I  α Baleine  α Persée  Vénus, bord 2, sup.	2.53.35,73	+ 0,20 - 1,76 + 0,03 + 0,56 + 0,13	- 47,84 - 48,20 - 47,98 - 47,86	267. 6.41,3 8.48.10,4 322.59.42,3 357. 1.23,3	728,9 728,9 728,8	+21,0 +21,0 +21,0	+19,5 +19,7 +20,0	-1.29,4 + 49,8 - 2,9 + 32,2	35,0 35,8 33,8
29	Soleil, bord 1, sup.	13. 4.34,87 13.40.47,25 14. 7.59,31 14.10.10,31 14.13.50,56	+ 0,21 + 0,57 + 0,17 - 0,11 - 0,08 - 0,13	- 48,25 - 48,41	348.47.52,1 280.49.24,9 322.14.16,9 353.19.45,4 24.57.33,1 21.44. 1,3	728,5 727,9 728,0 728,0	+22,2 +22,3 +22,0 +21,7	+21,1 +20,0 +19,1 +18,3 +18,0	+ 22,4 - 54,2 - 3,6 + 26,6 +1.29,2 +1.18,9	30,5 32,8 31,9
	2 Balance	14.41.45,76 14.50.23,61 15. 3.42,68 15.13.10,58 15.23.27,81	- 0,13 + 1,76 - 0,21 - 0,20 - 0,21	- 48,49 - 48,16	27.41.32,1 297.32.26,3 35.42.24,0 34.37.32,9 36.14.28,4	7 18,0	+21,4	+17,7	+1.39,7 - 29,5 +2.24,6 +2.16,8 +2.29,0	29,0 33,8
	α Couronne Anonyme	15.25.25,37 15.27.31,01 15.36. 3,76 15.41.36,23 15.46.32,68	- 0,21 + 0,25 + 0,06 + 0,21 + 0,15 + 0,15	- 48,25 - 48,24	345. 4.35,4 5.23.30,8 348.35.30,2 354.51.28,9	728,t	+20,5	+16,5	+ 18,7 + 44,5 + 22,5 + 29,8	3 <sub>7</sub> ,8 35,3
	Lalande 29147  Lalande 29147  Ophiuchus  Piazzi, XVII, 191  Pallas  Anonyme	15.52.38,86 17.27. 9,52 17.32.42,27 17.37. 0,02	+ 0,15 + 0,11 + 0,21 + 0,21 + 0,21	- 48,17	354.41.20,7 359.37.24,2 347.47.59,2 348. 8.23,8 347.48.30,3	728,2 728,0	+20,0 +19,7	+15,5 +15,3	+ 29,7 + 36,1 + 21,6 + 22,1 + 21,7	36,9
	y Dragon.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		- 48,07	320.47.51,5			+15,2		27,8

Le 29, Mire Sud-419,94. Niveau+09,02. d-89,73. Nadir 14606'36",62.

49
Observations faites à la lunette méridienne en Juin et Juillet 1849.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION le la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERMO	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	3 Petite Ourse S  2 Lyre  2 Persée  Vénus, bord 2, sup.	h. m. s. 18.20.24,20 18.31. 3,29 3.12.45,61 3.33.10,64	+ 0,38 + 0,56 + 0,13	- 48,41 - 48,70	322.59.41,0 356.52.32,3	727,8 726,2 726,1	+19,7 +19,8 +19,9	+13,4 +17,2 +16,9	- 46,7 - 2,9 + 32,2	28,7 32,5
30	Soleil, bord 1, inf   Cassiopée  Petite Ourse S  Bélier  Mars, bord 2, centre  Petite Ourse 1  Baleine  Persée  Vénus, bord 2, sup.  Cocher  G Orion  Taureau	6.34.58,77 0.31.10,23 1. 4. 2,12 1.57.51,21 2. 2. 8,14 2.50.25,00 2.53.33,81 3.12.44,67 3.36. 6,56 5. 4.42,37 5. 6.26,72 5.15.54,73	+ 0,21 + 0,70 + 0,10 - 1,76 + 0,03 + 0,56 + 0,13 + 0,49 - 0,07 + 0,26	- 49,40 - 49,74 - 50,19 - 49,96 - 49,68 - 49,63 - 50,05 - 50,03	349.22.55,4 316.36.22,7 283.49.23,6 349.33.35,5 1.24.43,5 267. 6.40,1 8.48. 8,0 322.59.44,3 356.43.23,8 326.28.24,8 20.40.15,4 343.50. 4,0	725,5 725,6 725,8 726,0 726,1 726,5 726,6 726,6 726,8 726,8	+21,3 +18,5 +18,4 +18,6 +18,6 +18,7 +18,8 +19,0 +19,5 +19,5	+22,4 +15,2 +15,5 +16,2 +16,2 +16,9 +17,3 +17,7 +18,4 +18,5	+ 22,8 - 9,1 - 49,5 + 23,6 + 38,4 -1.29,1 + 50,0 - 2,9 + 0,3 + 1,15,6 + 17,2	32,9 34,3 39,4 33,1 34,1 35,8 29,9 35,7 37,5
1	Soleil, bord 1, sup.  \[ \alpha \ \text{Lion} \\  \alpha \ \text{Bélier} \\  \alpha \ \text{Baleine} \\  \alpha \ \text{Persée} \\  \text{Vénus, bord 2, sup.} align*	1.57.50,11 2.53.32,79 3.12.43,71	+ 0,21 + 0,11 + 0,20 + 0,03 + 0,56 + 0,13	- 50,15 - 50,87 - 51,01 - 50,68	348.55.10,0 359.35.56,7 349.33.35,4 8.48. 7,0 322.59.44,2 356.34. 7,6	7 26,8 727,4 730,3 730,4 730,3 730,3	+20,0 +20,4 +18,8 +18,9 +18,9 +19,2	+20,0 +20,9 +16,6 +17,2 +17,8 +17,9	+ 22,6 + 35,4 + 23,7 + 50,2 - 3,0 + 31,9	36,7 39,6 33,4 35,6
2	Soleil, bord 1, inf  A Petite Ourse I  A Vierge  A Balance  B Petite Ourse I  Balaince  B Petite Ourse I  Baleine  Persée  Vénus, bord 2, sup  Gocher  Gorion  Taureau	13. 4.31,93 13.16.24,92 14.41.31,42 14.41.42,64 2.50.23,00 2.53.31,95 3.12.42,73 3.42.10,26 5. 4.40,41 5. 6.24,69	+ 0,20 - 0,09 - 0,13 - 0,13 - 1,76 + 0,03 + 0,56 + 0,13 + 0,49 - 0,07 + 0,26	- 51,32 - 51,38 - 51,58 - 52,12 - 51,69 - 51,64 - 52,12 - 52,00	349.31. 4,3 280.49.27,3 22.39.34,9 267. 6.42,1 8.48. 8,1 322.59.43,1 356.24.36,7 326.28.27,5 20.40.15,1 343.50. 3,5	730,1 730,4 730,5 731,8 731,7 731,5 730,8 730,8	+20,3 +20,7 +20,7 +20,0 +20,3 +20,3 +20,8 +20,9	+21,6 +20,9 +20,2 +18,5 +18,7 +19,4 +20,6 +21,9 +22,1	+ 23,2 - 54,2 +1.21,3 -1.30,1 + 50,0 - 2,9 + 31,5 + 0,3 +1.15,1 + 17,1	33,0 31,1 34,6 34,5 34,6 32,5 35,3 36,9
	Soleil, bord 1, sup a Lion	9.59.27,42	+ 0,21	- 52.10	349. 4. 5,2 359.35.53,6 280.49.23,7	730,1	+21,0   +21,8   +21,7	+23,1 +25,7 +24,0	+ 22,6 + 34,9 - 53,6	33,1

Le 2, Mire Sud-427,13.

50

Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE	THERMO	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	α Vierge β Petite Ourse S	h. m. s. 13.16.24,06 14.50.19,49	s. - 0,09 + 1,76	s. - 52,17 - 52,01	22.39.35,5 297.32.23,1	729,1 729,7	+21,7 +22,2	+23,8 +21,1	+1.20,2 - 29,2	30,6 31,3
	B. A. C. 5111 { Préc. suiv. a Couronne	15.23.23,79 15.23.24,23 15.27.26,99 15.35.59,88 15.41.32,19	- 0,21 - 0,21 + 0,25 + 0,06 + 0,21	- 52,23 - 52,10	36.14.31,8 345. 4.32,6 5.23.28,5 348.35.29,2	729,7 729,8	+21,8 +21,6	†20,1 †20,1 †20,0	+2.27,6 + 18,5 + 44,0 + 22,3	35,4 33,0
	Anonyme 8+17°26' Lalande 29016 Lalande 29147 7 × Hercule		+ 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,15		354.48. 3,6 354.41.19,5			+19,4	+ 29,5 + 29,4	
	B. A. C. 5368 Lalande 29607 19 Hercule	16. 0.25,98 16. 5.45,71 16.11.18,00 16.19.20,11	+ 0,15 + 0,20 + 0,24 - 0,23	- 52,27	354.50.14,1 350.20.39,6 38.21.18,8	72917	+20,8	+18,8	+ 29,6 + 24,4 +2.47,2	35,3
	Nouv <sup>lle</sup> étoile (Hind) Lalande 31157 Weisse, XVII, 47	16.50.13,02 16.59.46,72 17. 3. 8,78	- 0,11 - 0,13 - 0,13		24.56.20,2 27.23.43,7 27.15.13,3	729,7 729,7	+20,4	+17,5	+1.29,5 +1.38,8 +1.38,2	
	α Hercule Anonyme ô Petite Ourse S α Lyre	17. 6.55,90 18. 7.34,84 18.20.21,42 18.30.59,35	+ 0,12 + 1,90 + 0,38	- 52,07 - 52,37	357.43.53,7 296.32.44,4 285.43.17,6 333.35.29,6	729,5 729,5 729,4 729,4	+20,3 +20,3 +20,3 +20,3	+17,1 +16,7 +16,6 +16,5	+ 33,5 - 30,9 - 46,3 + 7,2 + 37,0	36,0 30,0 33,5
	Mars, bord 2, centre β Petite Ourse I α Baleine α Persée	2.50.22,05 2.53.31,05 3.12.41,77	+ 0,11 - 1,76 + 0,03 + 0,56	- 52,94 - 52,80 - 52,70	0.40.47,7 267. 6.43,2 8.48. 6,7 322.59.41,2	728,5 728,3	+20,2 +20,8 +21,3	+20,3 +21,7 +21,7 +22,5	-1.28,7 + 49,3 - 2,9	37,0 32,6 32,7
l i	Vénus, bord 2, sup. Soleil, bord 1, inf  a Petite Ourse I	3.45.17,18 6.51.26,55 13. 4.35,10	+ 0,13		356.14.5 <sub>7</sub> ,5 349.40.45,2 280.49.23,9	728,2 727,6 725,7	+21,8 +23,5 +22,8	+22,5 +25,5 +24,1	+ 30,9 + 23,0 - 53,3	30,2
1	α Vierge α Couroune α Serpent	13.16.23,08 15.27.26,13 15.35.58,82	- 0,09 + 0,25 + 0,06	- 53,13 - 53,08 - 53,15	22.39.36,2 345. 4.32,8 5.23.29,2	725,5	+22,7	+24,0 +21,5 +21,5	+1.19,7 + 18,3 + 43,5	30,9 35,5 33,3
	α Cassiopée α Petite Ourse S α Bélier	0.31. 5,54 1. 4. 2,12 1.57.46,71 2.15.45,96	+ 0,54 + 0,15 + 0,08	<ul><li>54,48</li><li>54,45</li></ul>	316.36.18,9 283.49.24,0	732,0 732,2	+18,8 +18,6 +18,7	+10,3 +11,2 +15,0	- 9,4 - 50,7 + 37,2	29,6 33,9
	3 Petite Ourse I Vénus, bord 2, sup.	2.50.20,00 3.51.41,88	- 1,36 + 0,11	- 54,46	267. 6.45,1 355.55. 4,6	732,6 732,6	+18,8	+15,4 +16,6	-1.31,2 + 31,3	36,1
10	Soleil, bord 1, sup.	6.59.38,39	+ 0,16		349.20.33,1	732,5	+19,8	+18,7	+ 23,3	

Le 3, Mire Sud-42P,70.

51
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROJIÈTRE.	Inté- rieur.	OMÉTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	α Petite Ourse I α Vierge η Grande Ourse α Couronne α Serpent α Ophiuchus	h. m. s 13. 4.29,64 13.16.20,94 13.40.40,33 15.27,24,32 15.35.57,04 17.27, 2,80	- 0,07 + 0,44 + 0,19 + 0,04 + 0,08	- 55,23 - 55,14 - 54,93 - 54,94 - 54,93	280.49.32,2 22.39.35,2 322.14.16,6	732,9 732,9	+20,4 +20,4 +18,0	+19,0 +19,0 +18,8 +14,3	- 54,8 +1.21,9 - 3,7 + 36,6	36,8 32,2 32,9
	Pallas	17.31.39,81 17.52.13,72 18. 7.32,88 18.20.20,28 18.30.56,87 23.59.41,68	+ 0,16 + 0,47 + 1,47 + 0,30 + 0,20	- 54,61 - 54,94 - 55,44	348.43.47,6 320.47.54,7 296. 2.45,5 285.43.19,4 333.39.29,1 344. 2.58,2	734,1 734,0 734,0 734,0 734,5	+18,0 +17,5 +17,4 +17,4 +17,5	+14,2 +14,0 +13,3 +13,2 +11,1	+ 23,0 - 5,1 - 31,4 - 47,1 + 7,4 + 18,1	33,1 31,8 34,0 30,6
	y Pégase	0. 4.33,84 0.31. 4,72 1. 4. 3,02 1.57.45,69 2.18.27,24 2.50.18,45	+ 0,09 + 0,54 + 0,15 + 0,08 - 1,36	- 55,69 - 55,35 - 55,50 - 55,93	357.57.23,7 316.36.26,8 283.49.25,6 359.57.59,8 267. 6.45,6	734,5 734,8 735,2	+17,6 +16,4 +17,6	+12,7 +14,4 +16,9	+ 31,7 - 9,3 - 50,3 + 36,8 -1.30,9	40,0 37,8 36,0 36,8
	α Baleine α Persée Vénus, bord 2, sup. α Gocher β Taureau δ Petite Ourse I	2.53.28,19 3.12.39,22 3.54.58,72 5. 4.36,81 5.15.49,19 6.20.28,42	+ 0,02 + 0,43 + 0,11 + 0,38 + 0,20	- 55,76 - 55,49 - 55,47 - 55,76	8.48. 5,7 322.59.39,7 355.45. 8,6 326.28.29,7 343.50. 0,0 278.55.34,3	735,3 735,4 735,4	+18,2 +18,5 +18,5	+17,2 +17,3 +18,2 +20,0 +21,6	+ 50,5 - 3,0 + 31,1 + 0,3 + 17,3 - 58,2	33,3 31,1 34,3 33,7 36,4
7	α Grand Chien  Soleil, bord 1, inf α Hydre Jupiter, centre α Lion α Grande Ourse β Lion	6.37.33,56 7. 3.43,81 9.19.14,15 9.40.40,59 9.59.23,58 10.53.24,13 11.40.25,66	+ 0,15 - 0,05 + 0,09 + 0,08 + 0,71	- 55,90 - 55,95 - 55,82 - 55,97	349.26.30,0 20.17.59,5 357.31.28,5 359.35.53,3 309.44.49,3 356.53.11,1	735,4 735,1 733,9 733,9 733,8 733,6	+20,6 +20,6 +20,5 +20,9 +20,8 +20,9	+21,6 +22,4 +24,1 +22,2 +22,1	+1.44,3 + 23,2 +1.14,3 + 32,6 + 35,6 - 15,7 + 31,9	37,0 33,7 32,9
	y Grande Ourse α Cassiopée I α Petite Ourse I α Vierge η Grande Ourse α Bouvier	11.44.55,07 12.31. 5,22 13. 4.30,76 13.16.19,94 13.40.39,37 14. 7.51,60	+ 0,10 + 0,52 - 0,54 - 0,07 + 0,44 + 0,13	- 56,21 - 55,95 - 56,22 - 56,08 - 56,07	317.46.30,7 248. 4.57,8 280.49.25,5 22.39.34,8 322.14.19,0 352.19.48,5	733,4 733,4 733,4 733,4 733,4 733,5	+21,2 +21,3 +22,7 +21,3 +21,3 +21,5	+22,9 +22,8 +21,3 +22,6 +22,6 +22,2	+ 31,9 - 7,9 -4. 6,6 - 54,3 +1.21,0 - 3,6 + 26,5	39,1 33,1 30,8 30,5 31,0 35,4 35,6
	α² Balance	14.41.37,82 14.50.15,68 15.27.23,19	- 0,10 + 1,36 + 0,19 + 0,04	- 56,33 - 55,95 - 56,05 - 56,13	27.41.39,7 297.32.24,5 345. 4.32,7 5.23.29,4	733,6	+21,3	+21,7 +21,7 +21,0 +20,5	+1.39,0 - 29,3 + 18,5 + 44,2	36,1 33,1 36,1 34,5

### Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-	ECTION de la pendule.	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigee  pour le niveau.	BARONÈTRE	THERMO	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
-	Anonyme	h. m. s. 15.41.28,47	ment.	pendule.	348.35.29,1	mon.	rieur.	rieur.	+ 22,4	"
	Auonyme 8+17°26' Lalande 29016 Lalande 29147 7 x Hercule	15.46.24,74 15.47.55,14 15.52.30,86 16. 0.21,48	+ 0,12 + 0,12 + 0,12 + 0,12		354.48. 6,0 354.41.25,9 354.50.46,3			+21,0	+ 29,5 + 29,4 + 29,6	
	B. A. C. 5368 Lalande 29591 Lalande 29607	16. 0.21,80 16. 5.24,66 16. 5.41,62	+ 0,12 + 0,15 + 0,15	,	350.22.27,1				+ 24,4	
	Lalande 29775  Scorpion  Nouvile étoile (Hind)	16.12.27,03 16.19.16,12 16.50. 9,06	+ 0,18 + 0,18 - 0,18 - 0,08	- 56,20	345.55. 5,0 38.21.21,4 24.56.25,4	734,2 734,2	+21,3	+20,4 +19,6	+ 19,5 +2.47,0 +1.29,4	37,6
	Lalande 31157 Weisse, XVII, 47 & Hercule Anonyme	16.59.42,64 17. 3. 4,82 17. 6.51,88	- 0,09 - 0,09 + 0,10 - 0,09	- 56,10	27.23.48,9 27.15.19,7 357.43.53,0 27.10.39,9	734,2	+21,0	+20,1	+1.38,6 +1.38,1 + 33,3 +1.37,6	35,7
	Anonyme  2 Ophiuchus  Pallas	17.16. 9,34 17.27. 1,68 17.30.56,31	- 0,09 - 0,09 + 0,08 + 0,16	- 56,05	27.23.58,0 359.37.22,7 348.49.49,0	1		+19,9	+1.37,6 +1.38,6 + 35,9 + 22,7	36,6
	Anonyme	17.48.35,95	+ 0,17 + 0,17 + 0,47 + 1,47	- 55,81	347.54.18,8 347.48.25,3 320.47.58,3 296.32.46,6			+19,2	+ 21,7 + 21,7 - 5,1 - 30,9	37,0
	<ul><li>Petite Ourse S</li><li>Δ Lyre</li><li>β Petite Ourse I</li></ul>	18.20.17,61 18.30.55,39 2.50.17,60	+ 0,30	- 56,42 - 56,71	285.43.19,2 333.39.28,0 267. 6.42,3	734,4	+20,5	+18,2 +18,2	- 46,4 + 7,2 -1.29,7	32,6 33,0 34,6
	α Baleine	2.53.27,17 3.12.38,07 3.58.19,06	+ 0,02	- 56,80 - 56,68	8.48. 6,1 322.59.42,0 355.34.58,1	735,2 735,2 735,0	+20,9 +20,9 +21,6	+20,9 +20,9 +21,9	+ 49,9 - 2,9 + 30,5	33,3
	6 Orion  3 Taureau	5. 4.35,65 5. 6.20,08 5.15.48,11	+ 0,38	- 56,65 - 56,80 - 56,87	326.28.27,5 20.40.16,7 343.50. 3,6	734,7	+21,4 +21,5	+22,2 +22,4	+ 0,3 +1.15,4 + 17,2	32,1 38,2 37,2
8	Soleil, bord 1, sup.	9.59.22,60	+ 0,15 + 0,08 + 0,71	- 56,92 - 57,15	349.33.18,2 359.35.52,6 309.44.50,7	733,6 733,3 733,0	+22,2 +22,3 +22,5	+27,9 +28,8 +29,8	+ 22,9 + 34,7 - 15,4 + 31,1	32,1
	3 Lion γ Grande Ourse α Persée Vénus, bord 2, sup.	3.12.37,01	+ 0,10 + 0,52 + 0,43 + 0,11	- 57,00 - 57,26 - 57,78	356.53. 8,0 317.46.29,0 322.59.42,9 355.24.47,8	732,9 733,6 733,5	+23,1 +22,3 +22,5	+30,1 +22,3 +23,4	+ 31,1 - 7,7 - 2,9 + 30,0	35,3 31,8 34,5
	α Cocher β Orion	5. 4.34,51	+ 0,38	- 57,80 - 57,91	326.28.26,2				+ 0,3	30, 37,

Le 7, Mire Sud-40°,89. Mire Nord B-5°,98. Mire Nord C-29°,07. Mire Nord D-60°,24. Niveau-1°,3 d-10°,90.

53
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

JOURS	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERM		RÉFRACTION	LIEU du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	[0N.	POLE.
	ß Taureau	h. m. s 5.15.47,07	+ 0,20	- 57,93	343.5o. 3,1	733,3	+23,2	+25,6	+ 17,0	35,5
9	Soleil, bord 1, inf.	7.11.52,97 13. 4.32,33	+ 0,15		350.12. 6,9	732,8	+23,4	+27,0	+ 23,6	
	α Bouvier	14. 7.49,36	+ 0,13	- 58,29 - 58,43	352.19.50,1 27.41.41,0	731,8 731,8	+24,0 +24,1	+26,2 +25,1	+ 26,0 +1.37,7	36,9 36,2
	β Petite Ourse S  α Couronne α Serpent	14.50.13,29 15.27.20,99 15.35.53,76	+ 1,36 + 0,19 + 0,04	- 58,21 - 58,23 - 58,20	345. 4.33,3 5.23.31,2	731,9	+24,3	+24,8	+ 18,2 + 43,5	36, <sub>7</sub> 35,8
	Anonyme	15.41.26,15	+ 0,16		348.35.34,4 354.51.27,1				† 22,1 † 29,2	
	Lalande 29016 Lalande 29147 Anonyme	15.47.52,90 15.52.28,78 15.59.22,14	+ 0,12 + 0,12 + 0,12		354.41.24,1 354.5q.42,8			+22,8	+ 29,1	
	Lalande 29591 Lalande 29607	16. 5.22,64 16. 5.39,43	+ 0,15		350.22.24,7		-		+ 24,1	
	Lalande 29775	16.11.11,89 16.12.24,97 16.19.14,07	+ 0,18 + 0,18 - 0,18	- 58,25	345.55. 1,7	732,3	+23,9	+22,2	+ 19,3	36,5
	Y Dragon	17.52.10,28	+ 0,47	- 58,04	320.47.57,6 296.32.45,5	732,3	+23,0	+20,7	- 5,0 - 30,6	37,0
	δ Petite Ourse S α Lyre β Petite Ourse I	18.20.14,87 18.30.53,53 2.50.15.70	+ 0,30 - 1,36	- 58,29 - 58,48	285.43.17,5 333.39.29,2 267. 6.43,9	732,2	+22,8	+20,6 +20,6	$\begin{vmatrix} -45.8 \\ +7.1 \\ -1.28.6 \end{vmatrix}$	32,0 34,7 37,1
	α Baleine	2.53.25,27 3.12.36,11	+ 0,02	- 58,76 - 58,72	8.48. 7,1 322.59.43,9	733,0 733,0 733,2	+23,2 +23,2 +23,3	+23,6 +23,8 +22,6	+ 49,2	33,9 35,4
i	Vénus, bord 2, sup.    Cocher  Orion	4. 5. 8,76 5. 4.33,71 5. 6.18,06	+ 0,11	- 58,65 - 58,86	355.14.34,2 326.28.28,4 20.40.15,7	733,1	+23,5	+23,1	+ 29,9 + 0,3 +1.15,0	32,8 37,2
	B Taureau	. , 3	+ 0,20	- 58,83	343.49.58,7	733,1	+23,6	+24,2	+ 17,0	32,1
ı	Soleil, bord 1, inf	7.15.57.49	+ 0,15		350.19.26,3 349.55.36,7	732,6	+23,9	+26,0	+ 23,8	
	Soleil, bord 1, sup.  Bouvier  Petite Ourse S	7.20. 1,70 14. 7.47,54 14.50.11,29	+ 0,15 + 0,13 + 1,36	- 60,08 - 60,06	352.19.48,9 297.32.22,2	731,9	+23,7	+23,2	+ 26,3	36,2 31,3
-	α Couronne α Serpent Anonyme	15.27.19,15 15.35.51,84 15.41.24,17	+ 0,19 + 0,04 + 0,16	- 60,04 - 60,10	345. 4.30,0 5.23.32,0 348.35.34,8	732,0	+23,5	+21,5 +21,5 +21,3	+ 18,5 + 43,9 + 22,2	34,0 37,2
	Anonyme 8+17°26' Lalande 29016	15.46.20,76	+ 0,12		354.48. 6,5			+21,1	+ 29,4	
		15.47.51,06	, ,		354.48. <b>6,</b> 5 354.41.23,8			+21,1	+ 29,4	

54 Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO Inté-	DMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE.
1_		rii meridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	į įzas	rieur.	rieur.	<b>P</b>	TULL.
	Anonyme	h. m. s. 15.59.20,28 16. 0.17,35 16. 0.17,75	5· + 0,12 + 0,12 + 0,12	5.	354.59.43,1	nım.	0	0	+ 29,6	••
	Lalande 29591 Lalande 29607 19 Hercule	16. 5.20,80 16. 5.37,72 16.11.10,07	+ 0,15 + 0,15 + 0,18		350.22.25,5				+ 24,3	
	Lalande 29775	16.12.23,05 16.19.12.21 17. 6.48,10 18.20.12,78	+ 0,18 - 0,18 + 0,10	- 60,10 - 59,87	345.55. 2,4 38.21.17,0 357.43.49,0 285.43.19,7	732,3 732,3 732,3	+22,8 +22,4 +22,0	+20,5 +19,6 +20,1	+ 19,4 +2.46,4 + 33,3 - 45,9	32,5 32,4 34,7
	β Lion  γ Grande Ourse  α² Balance  β Petite Ourse S	11.40.20,80 11.44.50,15 14.41.32,86 14.50.10,47	+ 0,10 + 0,52 - 0,10 + 1,36	- 60,78 - 61,02 - 61,24 - 60,81	356.53, 8,3 317.46.28,7 27.41.37,1 297.32.25,9	729,8	+22,8	+22,4	+ 31,8 - 7,8 +1.38,7 - 29,2	36,3 31,0 33,4 35,1
	α Couronne α Serpent Anonyme Anonyme δ+17°26'	15.27.18,21 15.35.50,80 15.41.23,35	+ 0,19 + 0,04 + 0,16 + 0,12	- 60,97 - 61,13	345. 4.33,3 5.23.28,9 348.35.30,8	728,7	+22,2	+20,8	+ 18,4 + 43,8 + 22,2	37,3 34,1
	Lalande 29016 Lalande 29147 Anonyme 7 × Hercule B. A. C. 5368	15.47.50,12 15.52.26,06 15.59.19,52 16. 0.16,42 16. 0.16,90	+ 0,12 + 0,12 + 0,12 + 0,15 + 0,15		354.48. 6,8 354.41.22,8 354.59.43,3			+20,5 +20,5	+ 29,4 + 29,2 + 29,5	
	Lalande 29591 Lalande 29607 19 Hercule	16. 5.19,92 16. 5.36,82 16.11. 9,23	+ 0,15 + 0,15 + 0,18		350.22.25,1				+ 24,2	
	Lalande 29775 α Scorpion Lalande 31157 Weisse, XVII, 47	16.12.22,29 16.19.11,17 16.59.37,94 17. 2.59,98	+ 0,18 - 0,18 - 0,10 - 0,10	- 61,13	345.55. 2,9 38.21.22,9 27.23.50,6 27.15.18,8	729,1 729,0	+22,0 +21,7	+20,0 +19,9 +20,0	+ 19,4 +2.46,1 +1.37,8 +1.37,3	38,0
	α Hercule Pallas δ Petite Ourse S	17. 6.46,92 17.27.34,89 18.20. 9,73	+ 0,10	- 61,05	35 <sub>7</sub> .43.54,8 349.23.41,2	729,0 729,0	+21,7 +21,6	+19,7 +19,5	+ 33,1 + 23,2	38,1
	Weisse, XVIII, 997. Anonyme Lalande 35317 Lalande 35359	18.38.37,88 18.41.49,49 18.48.39,75 18.49.38,26	- 0,10 - 0,10 - 0,13 - 0,13		27. 8.49,7 27. 8. 6,0 31. 0.11,4	729,0	+21,3	+18,6	+1.37,3 +1.37,3 +1.54,8	
	Anonyme Anonyme 54 Dragon	19. 0. 0,97 19. 8.27,43 19.10.15,12	+ 0,57 + 0,58 + 0,58		315. 4.44,7 314.54.41,0	729,0	+21,0	+18,3 +18,2	- 10,6 - 10,7	
	Anonyme	19.48.44,08	+ 0,42		323.27.31,7				- 2,5	

Le 12, Mire Sud-417,06.

55

### Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

					1	1	1			
Sanor	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE des verniers	BAROMÈTRE	THERM	OMĖTRE	RÉFRACTION	LIEL du
ns.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	corrigée pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
-3	Anonyme	h. m. s. 20. 9.23,14 20.14.24,20 20.19. 9,76 20.23.36,22 20.27.27,31 3.12.33,63 5. 4.31,01 5. 6.15,37 5.15.43,63	5. + 0,35 + 0,35 + 0,33 + 0,32 + 0,43 + 0,43 - 0,05 + 0,20	- 61,32 - 61,45 - 61,62 - 61,46	328.45.59,4 328.55.43,0 330.53.11,3 331.10.40,8 331. 2.46,8 322.59.43,8 326.28.27,7 20.40.14,4 343.50. 4,3	728,7 728,4 728,2	+19,7 +20,4 +20,7	+16,8 +16,9 +18,9 +19,0 +20,8	+ 2,5 + 2,5 + 4,5 + 4,8 + 4,7 - 3,0 + 0,3 +1.15,6 + 16,7	35,3 31,9 37,0 37,4
	α Lion	9.59.18,00 10.53.18,35 13. 4.28,80 13.16.14,20 15.27.17,27 15.35.50,00 16.19.10,27 18.20. 8,57 3.12.32,79 4.10.10,42 4.19.23,62 4.26.13,56 5. 4.30,29 5. 6.14,39 5.15.42,79	+ 0,08 + 0,71 - 0,07 + 0,19 + 0,04 - 0,18 + 0,43 + 0,10 + 0,12 + 0,11 + 0,38 - 0,05 + 0,20	- 61,51 - 61,47 - 61,90 - 61,90 - 61,92 - 62,02 - 62,20 - 62,40 - 62,20 - 62,62 - 62,32	359,25,56,0 309,44,49,4 280,49,27,9 22,39,32,8 345. 4,33, c 5,23,26,3 38,21,20,7 285,43,17,6 322,59,43,3 357, 2,34,8 354,34, 1,8 356,6,7,8 326,28,30,5 20,40,13,5 343,50, 2,6	7-1,7 7-27,4 7-27,3 7-27,2 7-27,8 7-28,2 7-28,5 7-30,0 7-29,9 7-30,0	+21,5 +21,5 +21,6 +21,2 +20,8 +19,9 +19,5 +19,3 +19,3	+21,8 +21,6 +21,0 +21,0 +21,0 +19,3 +18,7 +16,2 +15,9 +17,2 +17,3 +17,6 +17,6	+ 35,3 - 15,7 - 54,0 +1.20,8 + 18,5 + 44,0 +2.46,6 - 46,3 - 3,0 + 32,6 + 29,5 + 31,4 + 0,3 +1.16,2 + 17,4	35,2 32,1 32,8 29,1 37,3 31,8 36,3 32,9 34,9 36,5 34,7 36,5 36,5
14	Soleil, bord 1, inf    Grande Ourse  Grande Ourse  Petite Ourse I  Vierge  Grande Ourse  Bouvier  Course S  Couronne  Serpent  Anonyme & 17°23'  Hercule  B. A. C. 5368  Lalande 29591	16. 0.14,62 16. 0.15,00	+ 0,14 + 0,71 + 0,10 + 0,52 - 0,07 + 0,44 + 0,13 + 1,36 + 0,19 + 0,04 + 0,12 + 0,12 + 0,12 + 0,15	- 62,19 - 62,66 - 62,84 - 62,74 - 62,75 - 62,76 - 62,78 - 62,78	350.52.54,5 309.44.50,8 356.53. 7,7 317.46.26,2 280.49.25,6 22.39.33,3 322.14.14,2 352.19.44,0 297.32.22,5 345. 4.24.7 5.23.25,6	729,9 729,4 729,3 728,9 728,8 728,8 728,8 728,9	+20,1 +21,0 +21,4 +21,4 +21,5 +21,5 +21,5 +21,2	+19,7 +22,2 +22,1 +21,9 +21,9 +21,5 +21,0 +20,6 +20,0	+ 24,9 - 15,7 + 31,8 - 7,8 - 53,9 +1.20,7 - 3,6 + 26,4 - 29,2 + 18,5 + 44,0	33,3 35,7 28,3 30,5 29,6 30,9 31,6 31,6 29,0 31,2

56

Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU	00200	ECTION le la pendule.	MOYENNE  DES VERNIERS  COFFIGER  POUR le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO	DHÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Lalande 29607 19 Hercule Lalande 29775   Scorpion  Nouvlie étoile (Hind) Lalande 31157	16.59.36,14	+ 0,15 + 0,18 + 0,18 - 0,18 - 0,08 - 0,10	- 62,76	345.54.59,1 38.24.18,9 24.56.22,7	729,1 729,1	+20,4 +20,2	+18,1 +16,5	+ 19,5 +2.47,1 +1.29,7	35,0
	Anonyme. Weisse, XVII, 47 α'Hercule. Anonyme. Anonyme. Pallas. Piazzi, XVII, 200.	17.33.52,77	- 0,10 - 0,10 + 0,10 - 0,10 - 0,15 + 0,15	- 62,73	27.18.13,5 357.43.48,6 27.10.39,2 27.24. 0,6 349.38.51,5 347.42.31,6	729,1	+19,1	+16,2 +16,0	+ 1.38,7 + 33,6 +1.38,2 +1.39,2 + 23,7 + 21,6	32,7
	Lalande 32523  δ Petite Ourse S  α Bélier  Mars, bord 2, centre  β Petite Ourse I  α Baleine	2.39.55,90 2.50.10,35 2.53.20,89	+ 0,16 + 0,15 + 0,09 - 1,36 + 0,02	- 63,29 - 63,47 - 63,28	347.54.17,5 285.43.20,7 358. 9.48,8 267. 6.45,2 8.48. 3,7	729,0 729,5 729,5	+18,0 +19,4 +19,4	+15,7 +14,8 +16,4 +17,0	+ 21,8 - 46,6 + 34,1 -1.30,3 + 50,2	36,0 36,3 32,4
1	Soleil, bord 1, sup.  Soleil, bord 1, inf  A Petite Ourse I  Grande Ourse  Taureau  Vénus, bord 2, centr.  Orion	7.40.14,75 13. 4.29,85 13.40.30,63 4.26.10,68 4.30,32,88	+ 0,15 + 0,14 + 0,44 + 0,11 + 0,12 + 0,05	- 64,60 - 65,36 - 65,48	350.30.35,5 351.11.54,1 280.49.27,4 322.14.16,3 356. 6. 5,5 354. 4. 0,1 4.55.34,0	729,2 728,0 726,6 726,4 728,8 728,8 728,8	+20,7 +20,7 +21,7 +21,7 +20,5 +20,5 +20,7	+21,2 +22,4 +22,8 +22,6 +19,3 +19,4 +20,5	+ 24,3 + 25,0 - 53,6 - 3,6 + 31,1 + 28,6 + 43,2	32,4 33,0 34,2 36,8
	Soleil, bord 1, sup. α Lion	9.59.14,21 10.53.14,65 11.40.16,32 11.44,45,53 13. 4.29,44 13.16.10,46 13.40.29,83 14. 7.42,13 14.50. 5,45 15.27.13,61 15.35.46,22	+ 0,15 + 0,08 + 0,71 + 0,10 + 0,52 - 0,07 + 0,44 + 0,13 + 1,36 + 0,19 + 0,04 - 0,18	- 65,29 - 65,29 - 65,54 - 65,59 - 65,42 - 65,47 - 65,67 - 65,53	350.50.15,5 359.35.54,0 309.44.50,6 356.53. 6,5 317.46.30,3 280.49.28,6 22.39.34,0 322.14.15,0 352.19.45,8 297.32.21,1 345. 4.28,4 5.23.27,9 38.21.17,3	728,6 728,3 728,3 728,1 728,2 728,4 728,4 728,4	+21,5 +22,1 +22,4 +22,6 +22,5 +22,6 +22,7 +22,5 +22,0	+22,8 +24,6 +25,4 +25,5 +24,2 +24,2 +23,6 +22,5 +22,0 +20,2	+ 24,5 + 35,0 - 15,5 + 31,4 - 7,7 - 53,4 + 1,20,0 - 3,6 + 26,2 - 29,1 + 1,85 + 43,9 + 2,46,5	34,0 32,8 34,2 32,2 33,6 29,8 31,8 33,4 30,8 33,1 33,6 32,7

Le 14, Mire Sud-41P, 31. Mire Nord B-5P, 66. Mire Nord C-29P, 85. Mire Nord D-60P, 92. Niveau-OP, 44

57
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

Jours.		PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE		OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU   du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
		h. m. s.	8.	5	0 1 //	mm.		0	1 11	11
	A Hercule	17. 6.42,46	+ 0,10	- 65,49	357.48.47,6	728,6	+20,8	+17,3	+ 33,4	32,0
	Anonyme	17.12.16,90	- 0,10		27.10.38,0			+16,6	+1.37,9	}
	Anonyme Pallas	17.16. 0,26	- 0,10 + 0,15		27.23.57,6 350. 2.53,6			+10,0	+ 24,0	
	y Dragon	17.52. 3,03	+ 0,47	- 65,21	320.47.50,2	728,6	+20,5	+17,0	- 5,1	31,7
	Anonyme	18. 7.21,60	+ 1,47	30,21	296.32.38,0	7-0,0	120,0	12/,0	- 30,7	01,7
	Petite Ourse S	18.20. 7,05	747		285.43.13,7	728,6	+19,4	+16,6	- 46,3	30,3
	α Lyre	18.30.46,35	+ 0,30	- 65,46	333.39.25,2					33,0
1	Weisse, XVIII, 997.	18.38.33,32.	- 0,10		27. 8.49,4			+16,1	+ 7,2 +1.38,1	1
	Anonyme	18.41.45,00	- 0,10		27. 8. 4,4				+1.38,1	
	Lalande 35317	18.48.35,18	- 0,13		31. 0.11,9			+15,5	+1.55,9	
	Lalande 35359	18.49.34,10	- 0,13		2 " //			1.55		
	Anonyme	18.59.55,92 19. 8.22,85	+ 0,58		315. 4.40,2	728,2	+19,2	+15,5 +15,3	- 10,6	
	54 Dragon	19.10.10,75	+ 0,59		314.54.37,9	720,2	T19,2	713,3	- 10,8	
	α Taureau	4.26. 9,90	+ 0,11	- 66,17	356. 6. 6,5	727,8	+20,8	+21,7	+ 30,8	35,0
	Vénus, bord 2, centr.	4.34.21.06	+ 0,12		353.54.17,5	1 / 1 / 1	, -	+21,0	+ 28,1	
	Z Orion	5.45.53,85	+ 0,05	- 66,14	4.55.31,7	727,6	+21,5	+23,6	+ 42,6	33,8
	Soleil, bord 1, inf	7.48.17,00	+ 0,14	C D	351.32.17,8	727,2	+21,9	+26,0	+ 25,0	0.4
	Z Taureau	4.26. 8,96	+ 0,11	- 67,13	356. 6. 5,2	727,3	+21,3	+18,8	+ 31,1	34,1
	Vénus, bord 2,centr.	4.38.11,86	+ 0,12	CC -0	353.44.40,5	727,2	+21,1	+19,3	+ 28,2	2 . 0
	α Cocher 3 Orion	5. 4.25,67	+ 0,38	- 66,98	326.28.30,7		100 =	1000	+ 0,3	34,8
	3 Taureau	5. 6. 9,99 5.15.38,17	+ 0,20	- 67,13 - 67,08	20.40.11,4 343.50. 1,9	727,1 727,1	+20,7	+20,0	+1.15,2	34,8
	Orion	5.45.53,07	+ 0,05	- 66,94	4.55.29,1	727,I	+21,3	+20,6	+ 43,1	32,0
		0.40.00,07	1 0,00	30,34	4.50.29,1	1-/1-	,,-	120,0	1 40,1	02,0
19	Soleil, bord 1, sup.	7.52.17,07	+ 0,12		351.11.19,3	726,6	+21,8	+22,0	+ 24,9	
20	α Taureau	4.26. 7,10	+ 0,08	- 69,08	356. 6. 6,7	727,9	+19,8	+18,4	+ 31,2	35,9
	Vénus, bord 2, centr.	4.45.59,94	+ 0,10	09,00	353.26. 2,6	727,9	+19,9	+17,8	+ 28,0	33,9
	α Cocher	5. 4.23,97	+ 0,28	- 68,84	326.28.28,4	1-713	פיפיי	1-7,-	+ 0,3	32,2
	& Orion	5. 6. 8,02	- 0,04	- 69,13	20.40.12,6	728,0	+20,0	+18,3	+1.15,8	36,9
	ß Taureau	5.15.36,31	+ 0,15	- 69,04	343.50. 3,1			+18,4	+ 17,3	37,0
	α Hydre	9.19. 0,97	- 0,04	- 69,06	20.17.55,4	729,2	+31,3	+21,6	+1.14,0	34,3
	α Lion	9.59.10,25	+ 0,06	- 69,26	359.35.51,2	729,4	+21,5	+20,2	+ 35,6	33,9
	α Petite Ourse I	13. 4.25,02	, ,,,,,	3,20	559.55.51,2	7-314	,,-	,-	, 55,6	30,3
	n Grande Ourse	13.40.25,95	+ 0,32	- 69,38	322.14.13,8	730,3	+20,8	+18,6	- 3,7	30,5
į į	α Bouvier	14. 7.38,20	+ 0,10	- 69,32	352.23.44,0	730,5	+20,4	+18,1	+ 26,7	32,3
	Nouvlle étoile (Hind)	16.49.56,12	- 0,06		24.56.23,9	731,5	+19,2	+14,5	+1.30,7	1
	Anonyme	17. 1.23,72	- 0,07		27.18.12,6		ļ	+14,3	+1.39,7	

Le 17, Mire Sud-43°, 11. Mire Nord C-27°, 80. Mire Nord D-60°, 21. Niveau-1°, 59.

Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

sanor.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYEXNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	)MĖTRE	RÉFRACTION	LIEU
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	α Hercule Anonyme Anonyme	h. m. s. 17. 6.38,74 17.12.13,12 17.15.56,52	s. + 0,07 - 0,07 - 0,07	- 69,21	357.43.46,3 27.10.37,9 27.23.55,4	AL,a,	o	0	+ 33,9 +1.39,2 +1.40,1	31,8
	Pallas	17.22.36,72 17.26.48,64 17.32.21,29 17.39.35,31	+ 0,10 + 0,06 + 0,12 + 0,12	- 69,07	350.38. 2,7 359.37.21,2 347.47.53,5 347.54.21,5	731,5	+17,9	+14,4	+ 25,1 + 36,4 + 21,9 + 22,1	37,7
	δ Petite Ourse S α Lyre		+ 0,12 + 0,22 - 0,07 - 0,07	- 69,29	285.43.16,0 333.39.28,5 27. 8.43,0	731,6	+17,2	+11,6	- 47,3 + 7,4 +1.40,1	32,6 37,6
	Lalande 35317 Lalande 35359 Anonyme Anonyme 54 Dragon	18.48.31,42	- 0,09 - 0,09 + 0,43 + 0,43		315. 4.35,1 314.54.35,1	731,7	+17,0	+11,2 +11,2	- 10,9	
	α Taureau Vénus, bord 2, centr. α Cocher	4.26. 6,32 4.49.57,14	+ 0,08 + 0,10 + 0,28 - 0,04	- 69,89 - 69,82 - 70,06	356. 6. 5,2 353.16.58,9 326.28.28,7 20.40.10,2	732,9 732,9 733,0	+18,1 +18,3 +18,3	+16,2 +16,3 +16,3	+ 31,6 + 28,1 + 0,3 +1.16,8	34,9 32,4 35,7
2:2	Soleil, bord 1, inf  Z Taureau Vénus, bord 2, centr.  C Cocher  3 Orion  3 Taureau	8. 4.14,32 4.26. 5,16 4.53.56,84 5. 4.21,67 5. 6. 5,97 5.15.34,32	+ 0,10 + 0,08 + 0,09 + 0,28 - 0,04 + 0,15	- 71,08 - 71,21 - 71,23 - 71,08	352.17.23,6 356. 6. 6,9 353. 8.12,1 326.28.27,6 20.40. 9,1 343.49.57,8	732,9 731,5 731,5 731,4 731,4	+19,5 +18,5 +18,7 +18,7 +18,8	+18,3 +17,8 +17,6 +17,7 +17,8	+ 26,7 + 31,4 + 27,8 + 0,3 +1.16,3 + 17,4	36,5 31,3 34,3 31,8
23	Soleil, bord 1, sup.  a Lion  Petite Ourse I	0.50. 8.28	+ 0,10	- 71,24	351.57.50,4 359.35.53,3 280.49.29,5	730,1 729,2 727,9	+20,2 +22,3 +21,7	+23,6 +26,2 +26,5	+ 25,8 + 34,8 - 53,0	33,1 34,0
24	Soleil, bord 1, inf	8.12. 9,00	+ 0,10		352.41.59,5	723,7	+21,3	+20,5	+ 26,7	
25	Soleil, bord 1, sup.  \[ \alpha \text{ Lion} \\	13. 4.23,38	+ 0,10 + 0,06 + 0,52 + 0,07 + 0,38 - 0,05	- 73,23 - 73,05 - 73,30 - 73,33	352.23. 7,2 359.35.51,8 309.44.53,2 356.53. 9,7 317.46.32,7 280.49.31,0 22.39.33,7	725,7 725,7 725,7 725,7 725,7	+20,2 +20,7 +21,0 +20,8 +20,8	+18,0 +20,2 +20,5 +20,1 +20,1 +20,0	+ 26,6 + 35,4 - 15,7 + 31,9 - 7,9 - 54,1 +1,21,6	32,3 33,5 37,9 33,3 34,2 31,6

Le 21, Mire Sud-41P,89. Niveau-1P,48. d-14P,73. Nadir 146°6'36",80. Le 25, Mire Sud-40P,94. Mire Nord B-5P,58. Mire Nord C-29P,37. Mire Nord D-61P,44.

59

Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

Jours	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYEANE des verniers	BAROWÉTRE	THERM	DHĖTRE	RÉFRACTION	LIEU :
R 5.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	corrigée pour le niveau.	ÉTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	α Bouvier	h. m. s 14. 7.34,10	s. + 0,10	- 73,36	352.19.45,3	725,8	+20,5	+19,4	+ 26,4	33,4
26	Soleil, bord 1, inf  A Lion  Grande Ourse  Grande Ourse  Fetite Ourse I  Vierge  Grande Ourse  Grande Ourse  Nouville étoile (Hind, Anonyme  Hercule  Petite Ourse S  Lyre  Vénus, bord 2, centr.  Taureau	17. 1.17,44 17. 6.33,56 18.19.57,75 18.30.37,71	+ 0,09 + 0,06 + 0,52 + 0,07 + 0,38 - 0,05 + 0,32 - 0,04 + 0,10 - 0,06 - 0,07 + 0,07 + 0,15	- 74,19 - 73,93 - 74,19 - 74,37 - 74,24 - 74,38 - 74,35 - 74,13	353. 7.57,2 359.35.54,9 309.44.52,0 356.53. 8,3 317.46.30,1 280.49.29,4 2.239.34,5 322.14.14,9 20.11.31,3 352.19.45,4 24.56 27,2 27.18.18,2 27.18.18,2 285.43.11,1 333.39.22,7 352.35.23,2 343.50. 2,6	727,5 727,2 725,8 716,7 726,1 726,1 726,1 726,1 726,1 726,9 727,0 727,1 731,2	+20,4 +21,0 +21,7 +21,9 +21,4 +21,6 +21,7 +21,8 +21,7 +20,4 +20,2 +20,3 +20,2 +19,3	+20,1 +22,2 +22,2 +22,7 +22,7 +22,1 +22,1 +22,0 +21,9 +11,8,9 +18,8 +19,1 +18,8 +20,2 +20,2 +17,9	+ 27,3 + 35,2 - 15,6 + 31,6 - 7,8 - 53,7 +1.20,3 - 3,6 +1.13,3 + 26,2 +1.28,7 +1.37,5 + 33,2 - 45,6 + 7,1 + 27,1 + 17,4	35,2 32,2 36,2 30,5 32,8 31,2 31,6 33,4 32,4 30,7 32,8 36,7
27	Soleil, bord 1, sup.            Grande Ourse	8.23.57,68 10.53. 4,49 11.40. 6,36 11.44.35,69 13. 4.21,59	+ 0,09 + 0,52 + 0,07 + 0,38	- 75,27 - 75,13 - 75,34	352.49.42,3 309.44.52,3 356.53. 9,2 317.46.28,3 280.49.28,5	731,5 731,5 731,5 731,6	+21,0 +21,0 +21,3 +21,4	+21,2 +21,2 +21,0 +21,0	+ 27,1 - 15,8 + 32,0 - 7,9 - 54,3	32,1 37,5 28,6 31,2
	α Vierge η Grande Ourse α Scorpion α Ophiuchus δ Petite Ourse S α Lyre 54 Ďragon Weisse, XIX, 594. Anonyme	13.16. 0,56 13.40.19,75 16.18.56,53 17.26.42,56 18.19.56,56 18.30.36,72 19.10. 0,73 19.22.27,73 19.25.35,81	- 0,05 + 0,32 - 0,13 + 0,06 + 0,22 + 0,43 0,00 0,00	- 75,42 - 75,34 - 75,59 - 75,11 - 75,11	22.39 32,1 322.14.15,7 38.21.14,2 359.57.15,3 285.43.12,2 333.39.22,7 314.51.42,1 12.26.16,0	731,6 732,4 732,5 732,6 732,6	+21,3 +20,1 +19,0 +17,4 +17,6	+21,0 +20,9 +17,0 +16,0 +13,8 +13,7 +12,8 +12,6 +12,3	+1.21,2 - 3,6 +2.48,6 + 36,3 - 47,0 + 7,3 - 11,0 + 58,1 + 58,3	29,7 32,3 31,6 32,5 30,7 33,2
	Weisse, XIX, 711.  y Aigle Anonyme  z Cocher Vénus,bord 2,centr.	19.27. 3,87 19.37.51,74 19.41.10,95 5. 4.17,18	0,00 + 0,05 + 0,32 + 0,28 + 0,10	- 75,74 - 75,88	2. 2.39,1 322.39.51,5 326.28.28,5 352.27.55,9	732,6 732,7 732,7	+16,7 +18,3 +18,5	+11,6 +15,8 +16,0	+ 40,3 - 3,4 + 0,3 + 27,2	31,6
28	Soleil, bord 1, inf  B Lion	8.27.52,47	+ 0,09	- 76,08	353. 3.10,2 356.53.11,2	732,0	+19,6	+19,4	+ 27,5 + 31,9	39,5

Le 26, Mire Sud-419,74. Mire Nord B-59,86. Mire Nord C-309,58. Mire Nord D-619,07. Niveau-10.52. Le 27, Mire Sud-409,75. Mire Nord B-59,61. Mire Nord C-309,71. Mire Nord D-619,97.

60

### Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

501.10r	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO	DHÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da
	DLS ASTRIA.	Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	RE.	rieur.	rieur.	lon.	POLE.
-		h. m. s.	5.	5.	0 / 11	mm.	0	0	1 11	.,
	y Grande Ourse	11.44.34,61	+ 0,38	- 76,40	317.46.31,9	731,1	+20,3	+21,7	- 7,8	32,2
	α Cassiopée I	12.30.45,60	- 0,40	- 76,33	248. 5. 3,5 280.49.28,6	731,0	+20,4	+21,9	-4. 6,1 - 54,1	$\frac{3_{2,5}}{3_{1,3}}$
	α Petite Ourse I α Vierge	13.15.59,42	- 0,05	- 76,48	22.39.34,1	730,9 730,9	+20,6	†21,9 †22,0	+1.20,Q	31,5
	n Grande Ourse	13.40.18,77	+ 0,32	- 76,29	322.14.15,2	730,9	+20,6	+22,0	- 3,6	31,8
	α Bouvier	14. 7.31,04	+ 0,10	- 76,38	352.19.44,4	730,9	+20,6	+22,0	+ 26,4	32,6
	3 Balance	τ5. 7.38,60	- 0,04	6.10	21. 6.36,2	730,9	+20,4	+21,7	+1.16,4	0 "
	α Couronne	15.27. 2,53	+ 0,14	- 76,48	345. 4.30,1	730,9	+20,4	+21,1	+ 18,5	35,9
l	Lune, bord 1, sup.	15.33.36,90	- 0,07		26.50.54,2 31.39.49,4	730,4	+20,4	+21,1	+1.35,5	
	α Scorpion	16.18.55,43	- 0,13	- 76,68	38.21.16,8	731,0	+20,4	+18,5	+2.47,3	32,9
1	Anonyme	17. 1.15,66	- 0,07	7-,	27.18.17.8	731,2	+20,1	+17,2	+1.38,7	
	a Hercule	17. 6.31,62	+ 0,07	- 76,28	357.43.47,4				+ 33,5	33,4
1	Anonyme	17.12. 5,86	- 0,07		27.10.39,9				+1.38,2	
	Anonyme	14.15.49.16	- 0,07		27.23.52,7			+16,7	+1.39,2	
	2 Ophiuchus	17.19.46,92	+ 0,10	- 76,33	351.45.15,7 359.37.17,2	731,3	+,19,6	+16,6	+ 26,3	34,3
	Piazzi, XVII, 191.	17.32.13,93	+ 0,13	70,00	009.07.17,2	10110	179,5	1-0,0	7 30,1	04,0
	Piazzi, XVII, 207.	17.33.42,93	+ 0,13		347.44.57,6				+ 21,7	
1	Lalande 32523	17.39.28,05	+ 0,13		347.54.11,8	731,2	+19,3	+15,8	+ 21,9	
	Lalande 32548	17.39.57,63	+ 0,13							2
	y Dragon	17.51.52,22	+ 0,34	- 76,00					- 5,1 +1.35,8	37,7
	Anonyme 8-14°13'	17.59.58,06	- 0,07		26.29. 4,7				+1.55,0	
	Anonyme	18. 0.25,54	- 0,07		26.28.10,9	731,2	+19,0	+16,3	+1.35,7	
	& Petite Ourse S	18.19.56,51	0,07			100,0	1 2 37	, ,,,		
	α Lyre	18.30.35,69	+ 0,22	- 76,14		731,3	+18,9	+15,0	+ 7,3 +1.38,8	32,5
	Weisse, XVIII, 997.		- 0,07		27. 8.45,0				+1.38,8	
	Anonyme		- 0,07		27. 8. 3,9			+15,2	+1.38,7	
ł	Lalande 35317 Lalande 35359		- 0,09							
	Anonyme	18.59.45,28	- 0,09		315. 4.36,4			+14,6	_ 10,7	
	Anonyme	19. 8.12,13	+ 0,43		314.54.28,6		ļ	1 -4,5	- 10,9	
	54 Dragon	19.10. 0,15	+ 0,43		, , ,				/3	
	Weisse, XIX, 432.		0,00		12.31. 2,4				+ 57,8	
	Weisse, XIX, 594.		0,00		12.26.16,8				+ 57,7	
	Anonyme &-0°13'.		0,00							
	Weisse, XIX, 711.		0,00	- 76,61	2. 2.40,3		1		+ 40,0	32,7
	Anonyme		+ 0,32	70,01	322.39.47,6	731,1	+17,5	+13,4	- 3,3	02,7
	α Baleine		+ 0,03	- 76,98	8.48. 4,5	731,3	+18,3	+13,1	+ 51,0	36,41
	α Persée				322,59.38,5		+18,0	+14,1	- 3,0	

Le 28, Mire Sud-419,81. Mire Nord B-59,58. Mire Nord C-309,52. Mire Nord D-619,09. Niveau-19,66.

61
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO Inté- rieur.	DMÈTRE  Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Mars, bord 2, centre  Taureau  Cocher  Orion  Taureau  Vénus, bord 2, centr.  Grand Chien	h. m. s. 3.17.10,14 4.25.59,40 5. 4.16,27 5. 6. 0,09 5.15.28,51 5.18.37,58 6.37.12,50	5. † 0,08 † 0,08 † 0,28 – 0,04 † 0,15 † 0,10 – 0,08	- 77,00 - 76,82 - 77,06 - 77,06	355.23.10,1 356. 6. 7,4 326.28.27,4 20.40.10,5 343.50. 1,3 352.20.45,7 28.47.36,7	731,2 731,2 731,0	+18,3 +18,7 +18,8 +19,3	+14,2 +17,3 +18,0 +18,2 +19,2	+ 30,9 + 31,4 + 0,4 +1.16,2 + 17,4 + 26,8 +1.44,3	37,6 30,9 36,7 35,5
29	Soleil, bord 1, sup.	8.31.46,30	+ 0,09		353.17.32,5	730,3	†20,2	+23,1	+ 27,4	
31	α Petite Ourse I α Couronne α Serpent	13. 4.17,89 15.26.59,27 15.35.3 <b>1</b> ,90	+ 0,07	- 79,76 - 79,85	280.49.31,5 345. 4.30,5 5.23.27,1	729,7 730,0	+21,8	+23,2 +20,8	- 53,8 + 18,5 + 43,9	33,9 36,5 33,9
	3 Scorpion	15.55.22,42 16.18.52,13 17. 2.41,20	- 0,04 - 0,06 - 0,03	- 79,87	31.39.50,6 38.21.19,7 27.15.17,8	730,1 730,1	+21,4	+20,0 +19,1	+1.57,8 +2.46,8 +1.38,1	35,2
	Anonyme  Anonyme  Ophiuchus  S8 Ophiuchus	17. 6.28,22 17.12. 2,80 17.26.38,16 17.33. 6,28	+ 0,03 - 0,03 + 0,03 - 0,05	- 79,69 - 79,51	357.43.49,7 27.10.40,1 359.37.18,9 33.52.31,1	730,4	+20,3	+18,8 +18,3	+ 33,4 +1.37,6 + 35,1 +2.11,7	35,5 35,4
	Lalande 32523 Lalande 32548 4 Sagittaire	17.39.24,95 17.39.54,61 17.49.17,83	+ 0,07 + 0,07 - 0,06		347.54.17,5 36. 3.50,0	730,4	+20,3	+18,2	+ 21,7	2 - 2
	y Dragon	17.51.48,87 17.56. 7,02 17.59.55,02 18. 0.22,28	+ 0,16 - 0,03 - 0,03	- 79,44	320.47.45,2				<b>-</b> 5,0	30,3
	Lune, bord 1, sup.  \( \) Sagittaire  \( \) Petite Ourse S	18. 5.31,84 18.17.22.41 18.19.52,64	- 0,04 - 0,06		31.42.20,8 37.45.41,7 285.43. 9,7			+17,7	+1.59,0 +2.41,5 - 46,1	30,2
	Weisse, XVIII, 997. Anonyme Lalande 35317	18.30.32,63 18.38.19,20 18.41.30,94 18.48.21,16	+ 0,10 - 0,03 - 0,03 - 0,04	- 79.29	333.39.20,2 27. 8.47,8 27. 8. 7,6	730,4	+20,1	†18,2 †18,1	+ 7,2 +1.37,6 +1.37,7	31,6
	Lalande 35359 Anonyme Anonyme	18.49.19,84 18.59.42,57 19. 8. 8,91	- 0,04 + 0,21 + 0,21		31. 2.25,5 315. 4.35,9 314.54.32,7	730,5	+20,0	+17,7	+1.55,5 - 10,6 - 10,8	
	Weisse, XIX, 432. Weisse, XIX, 594.	19.16.30,63	+ 0,21 0,00 0,00		12.31. 8,6				+ 57,1	
į,	Anonyme		0,00		12.32.25,4				+ .57,3	

Le 31, Niveau-21,00.

62

Observations faites à la lunette méridienne en Juillet et Août 1849.

JOHNS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM	DVĖTRE	RÉFRACTION	LIEU
is.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Anonyme γ Aigle Δ Aigle α Cocher β Orion β Taureau Vénus, bord 2,centr.	h. m. s. 19.30.28,23 19.37.47,96 19.41. 6,97 19.46.36,83 5. 4.13,27 5. 5.57,99 5.15.25,51 5.31.23,60	5. 0,00 + 0,02 + 0,15 + 0,01 + 0,13 - 0,02 + 0,07 + 0,05	5. - 79,56 - 79,66 - 80,08 - 80,31 - 80,25	12.26.49,7 2. 3.41,3 322.39.49,3 6.15.35,1 326.28.27,5 20. 4. 8,5 343.50. 0,7 352. 1.19,7	730,3 730,3 731,6 731,7	+19,3 +19,3 +19,7 +19,8	+16,2 +16,2 +16,2 +16,2 +17,5 +18,2 +18,0	+ 57,1 + 39,6 - 3,3 + 46,0 + 0,4 +1.16,4 + 17,4 + 26,4	33,7 36,2 31,0 35,3 35,0
1	Soleil, bord 1, inf.  A Petite Ourse I  G Vierge.  Grande Ourse.  Lalande 31:157.  Weisse, XVII, 47.  A Hercule.  Anonyme.  A Ophiuchus.  Weisse, XVII, 1208		+ 0,05 - 0,02 + 0,16 - 0,03 - 0,03 + 0,03 + 0,03 - 0,03 - 0,03	- 80,64 - 80,54 - 80,49 - 80,48	354.33.19,0 280.49.26,7 22.39.30,7 322.14.14,9 27.15.16,6 357.43.46,5 27.10.42,2 359.37.19,6 26.29. 6,2	731,9 732,0 732,0 732,0 732,8 732,8 732,8	+20,7 +20,9 +21,2 +21,2 +19,1 +18,5 +18,5	+20,3 +20,2 +20,0 +20,1 +16,4 +15,2 +16,0	+ 29,2 - 54,5 +1.21,6 - 3,7 +1.39,6 +1.39,1 + 33,8 +1.38,9 + 36,4 +1.36,0	28,2 29,1 31,2 33,2 37,5
	Anonyme & 14°13' Anonyme  \$ Sagittaire  \$ Petite Ourse S Anonyme Anonyme  \$ Dragon  Weisse, XIX, 432 Weisse, XIX, 594  \$ Aigle	17.59.53,82 18. 0.21,22 18.17.21,37 18.19.51,93 18.30.31,39 18.59.40,95 19. 8. 77.77 19. 9.55,91 19.16.29,73 19.22.22,43 19.26.58,73	- 0,03 - 0,03 - 0,06 + 0,10 + 0,21 + 0,21 + 0,21 0,00 0,00 0,00	- 80,52 - 80,68	26.28.13,6 37.45.40,6 285.43.12,6 333.39,22,3 315. 4.30,1 314.54.29,1 12.31. 3,0	732,8 732,8	+18,9 +18,9 +18,4	+16,0 +15,8 +15,8 +15,7 +14,7 +14,5	+1,36,0 +2,43,7 - 46,6 + 7,3 - 10,7 - 10,9 + 57,8 + 57,8	32,8 34,0
	Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme.  Ac Cygne. Cocher. Cocher	19.37.46,84 19.41. 5,89 19.46.35,76 19.48.24,78 20.23.17,19 20.27. 8,38 20.34.59,49 5. 4.12,39 5. 5.56,09 5.15.24,59 5.35.42,50	+ 0,02 + 0,15 + 0,02 + 0,15 + 0,11 + 0,11 + 0,13 + 0,13 - 0,02 + 0,07 + 0,05	- 80,73 - 80,58 - 81,00 - 81,34 - 81,17	2. 2.40,3 322.39.51,4 323.27.22,5 331.10.30,3 331. 2.40,1 327.33.38,9 326.28.29,6 20.40. 7.7 343.50. 0,7 351.55.24,3	732,9 732,9 732,9 732,3 732,3	+18,3 +18,0 +18,0 +18,2 +18,3	+15,4 +12,2 +12,2 +16,2 +16,3 +17,1	+ 39,9 - 3,3 - 2,5 + 4,9 + 4,8 + 1,4 + 0,4 + 1,16,8 + 17,5 + 26,4	29,4 33,0 35,1 35,1

Le 1, Mire Sud-40P,81. Mire Nord B-5P,97. Mire Nord C-31P,16. Mire Nord D-62P,10. Niveau-2P,20.

63
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM-	OMÈTRE   Exté-	RÉFRACTION	LIEU du
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	RE.	ricur.	rieur.	.NO	POLE.
	α Orion	h. m. s. 5.45.39,02	+ 0,02	- 81,33	4.55.29,1	mnı	o	+17,3	+ 43,9	34,2
2	Soleil, bord 1, sup.           Grande Ourse	8.47.17,10 10.52.58,62 11.40. 0,10 11:44.29,59 12.30.40,66	+ 0,05 + 0,25 + 0,03 + 0,18 - 0,19	- 81,34 - 81,38 - 81,54 - 81,25	354.16.50,9 309.44.54,2 356.53. 8,4 317.46.31,2 248. 5. 6,1	731,5 730,7 730,4 730,0	+19,5 +20,3 +20,4 +20,7	+19,2 +20,5 +20,6 +20,4	+ 29,0 - 15,8 + 32,0 - 7,7 -4. 7,1	32,6 36,7 30,7 32,8
	α Petite Ourse I  η Grande Ourse  α Bouvier  α Couronne  α Serpent	13. 4.17,58 13.40.13,59 14. 7.26,02 15.26.57,35 15.35.30,02	+ 0,16 + 0,05 + 0,07 + 0,02	- 81,51 - 81,37 - 81,65 - 81,70	322.14.15,2 352.19.46,4 345. 4.29,4 5.23.25,3	729,6 729,5	+20,7 +20,8 +20,4	+20,7 +20,8 +19,2	-4. 7,1 - 3,6 + 26,4 + 18,5 + 44,1	31,5 34,7 35,6 32,4
	α Scorpion Weisse, XVII, 47 α Hercule Anonyme	15.55.20,42 16.18.50,37 17. 2.39,18 17. 6.26,25 17.12. 0,68	- 0,04 - 0,07 - 0,03 + 0,03	- 81,62 - 81,63	31.39.50,0 38.21.19,0 27.15.17,0 357.43.46,3	729,5 729,5 729,7	+20,3 +20,2 +20,0	+19,1 +18,6 +17,9	+1.58,1 +2.47,0 +1.38,0 + 33,4	34,8 3 <sub>2</sub> ,8
	Anonyme  α Ophinchus Piazzi, XVII, 191. Piazzi, XVII, 200.	17.15.44,00 17.26.36,22 17.32. 8,75 17.33.33,73	- 0,03 - 0,03 + 0,06 + 0,06	- 81,43	27.10.38,3 27.23.53,6 359.37.17,6	729,8	+19,9	+17,4	+1.37,8 +1.38,8 + 36,0	35,2
	Lalande 32523 Lalande 32548 4 Sagittaire y Dragon Weisse, XVII, 1208 Anonyme	17.39.22,81 17.39.52,42 17.49.15,69 17.51.46,67 17.56. 4,80 17.59.52,76	+ 0,06 + 0,06 - 0,06 + 0,16 - 0,03 - 0,03	- 81,62	347.54.13,4 36. 3.42,9 320.47.45,6 26.29. 5,1 26.29.39,1	729,9	+19,5	+16,6 +16,4 +16,3	+ 21,8 +2.28,2 - 5,1 +1.35,6 +1.35,7	31,0
	Anonyme 8-14°11' \( \) Sagittaire \( \) Petite Ourse S \( \) Lyre \( \) Weisse, XVIII, 997.	18. 0.20,28 18.17.20,27 18.19.49,15 18.30.30,59 18.38.17,06	- 0,03 - 0,06 + 0,10 - 0,03	- 81,31	37.45.41,9 285.43.12,3 333.39.19,8 27. 8.45,6	729,8	+18,9	+15,7 +15,5 +15,2	+2.43,1 - 46,5 + 7,3 +1.38,6	32,9 31,7
	AnonymeLalande 35317Lalande 35359AnonymeAnonyme	18.41.28,72 18.48.19,06 18.49.17,76 18.59.40,25 19. 8. 6,73	- 0,03 - 0,04 - 0,04 + 0,21 + 0,21		27. 8. 2,7 31. 2.20,7 315. 4.35,2 314.54.33,5	729.7 729.7	+18,4	+15,2 +15,2 +15,2 +13,8	+1.38,6 +1.56,5 - 10,7 - 10,9	
	Weisse, XIX, 432. Weisse, XIX, 594. Anonyme. Weisse, XIX, 711.	19. 9.54,77 19.16.28,41 19.22.21,35 19.25.51,15 19.26.57,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		12.31. 3,2 12.26.17,0 12.30.21,0		A THE STATE OF THE	+13,6	+ 57,8 + 57,6 + 57,8	

Le 2, Mire Sud-402,93. Mire Nord B-71,22. Mire Nord C-301,76. Mire Nord D-631,29.

64

#### Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOVENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	TUERN		RÉFRACTION	LIEU
5.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRB.	laté- rieur.	Exté- rieur.	HON.	POLE.
		b. m. s	,	۲.	0 1 11	mm.	0	0	, ,,	21
	Weisse, XIX, 903.	19.33.32,54	- 0,02						. 0	
	Weisse, XIX, 905.	19.33.36,02	- 0,02	0	20.57.49,2				+1.18,1	2,
	y Aigle	19.37.45,82	+ 0,02	- 81,70	2. 2.40,9				+ 40,0	34,0
	Anonyme	19.41. 4,87	+ 0,15	- 81,81	322.39.51,5				- 3,3	
	ß Aigle	19.48.23,83	+ 0,01	- 01,01	323.27.23,8				- 2,6	
	Anonyme	19.55.15,66	+ 0,14		324.27.37,8	719,7	+17,2	+12,6	- 1,6	
	α Cocher	5. 4.11,33	+ 0,13	- 82,10	326.28.29,3	7 *91/	1./5-	712,0	+ 0,4	32,7
	B Orion	5. 5.55,04	- 0,02	- 82,41	20.40. 8,1	729,3	+18,3	+16,2	+1.16,5	35,4
	B Taureau	5.15.23,47	+ 0,07	- 82,33	343.50. 1,2	7-31-	- /	+16,4	+ 17,4	35,5
	Vénus, bord 2, centr.	5.40. 3,04	+ 0,05	, , , , , ,	351.50. 3,0	729,3	+18,3	+17,2	+ 26,2	
1	α Orion	5.45.38,03	+ 0,02	- 82,35	4.55.29,5	, ,		+17,4	+ 43,7	34,5
3	Soleil, bord 1, inf	8.51. 8,26	1 0,04		355. 4. 7,3	728,7	+19,3	+20,3	+ 29,7	
	α Grande Ourse	10.52.57,59	+ 0,25	-82,35	309.44.52,5	727,8	+20,2	+23,0	- 15,6	30,9
1	3 Lion	11.39.59,26	+ 0,03	- 82,21	356.53, 8,4	727,7	+20,6	+24,1	+ 31,5	36,2
	y Grande Ourse	11.44.28,55	+ 0,18	- 82,57	317.46.30,8			+24,1	- 7,8	30,0
	α Cassiopée I	12.30.39,56	- 0,19	- 82,38	248. 5. 1,3	727,5	+21,1	+24,8	-4. 2,6	32,2
H	α Petite Ourse I	13. 4.17.80		0 / 1	280.49.29,2	727,3	+21,2	+24,5	- 53,3	31,0
1	α Vierge	13.15.53,34	- 0,02	- 82,45	22.39.33,0	727,2	+21,5	+24,2	+1.19,9	29,8
	n Grande Ourse	13.40.12,41	+ 0,16	- 82,67	322.14.15,3	727,2	+21,6	+24,6	- 3,6	31,4
	α Bouvier	14. 7.24,84	+ 0,06	- 82,53	352.19.46,4	727-2	+21,7	+24,6	+ 26,0	34,3
1	α² Balance	14.41.11,22	+ 0,48	$\begin{vmatrix} -82,54 \\ -82,76 \end{vmatrix}$	27.41.34,0	727,2	+21,5	724,1	+1.07,4	29,9
1	3 Balance	15. 7.32,45	- 0,02	- 02,70	21. 6.36,6	727,2	+21,4	+22,2	+1.15,9	
1	a Couronne		+ 0,07	- 82,67	345. 4.26,3	727,2	+21,3	+21,7	+ 18,3	32,3
1	α Serpent		+ 0,02	-82,73	5.23.24,1	12/92	12190	+21,2	+ 43,7	30,9
1	3 Scorpion		- 0,04	02,70	31.39.49,7	727,3	+21,2	+20,8	+1.57,0	00,9
	Scorpion		- 0,07	- 82,78	38.21.19,7	727,3	+21,0	+20,1	+2.45,6	34,1
	Lalande 31157		- 0,03		27.23.46,7	727,3	+20,8	+19,4	+1.37,8	
	Weisse, XVII, 47		- 0,03		27.15.15,5	1-11-		. 3/.	+1.37,5	
Н	α Hercule		+ 0,03	- 82,59	357.43.48,5			İ	+ 33,1	34,8
	Anonyme		- 0,03		27.10.41,4				+1.37,1	
	Anonyme 8-1507'.	17.15.42,98	- 0,03				1			
	Piazzi, XVII, 91		- 0,03		27.16.16,5	727,3	+20,4		+1.37,5	
	α Ophiuchus		+ 0,03	- 82,44				+18,4	+ 35,7	33,1
	Piazzi, XVII, 191.		+ 0,06	Ì	347.47.49,8			+18,3	+ 21,5	1
	Piazzi, XVII, 200.		+ 0,06							'
1	Lalande 32523		+ 0,06		21-5-11			1- 0		1
	Lalande 32548		+ 0,06		347.59.44,1	727,2	+20,1		+ 21,7	1
-	4 Sagittaire		- 0,05	0. 50	36. 3.43,2			+17,6	+2.27,0	100
41	y Dragon	17.51.45,70	1 + 0,16	1 - 82,50	320.47.43,8	1	t	1	- 5,0	29,

Le 3, Mire Sud-41P,84. Mire Nord B-6P,88. Mire Nord C-31P,10. Mire Nord D-60P,79. Niveau-2P,40.

65
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

louns.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE
_			ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.		
	Weisse, XVII, 1208 Anonyme Anonyme δ-14°11' λ Sagittaire	17.56. 3,90 17.59.51,80 18. 0.19,40 18.17.19,49	- 0,03 - 0,03 - 0,03 - 0,06	\$.	26.29. 5,3 26.29.38,1 37.45.39,7	727,2	+19,9	+17,8	+1.34,7 +1.34,8 +2.41,4	"
	δ Petite Ourse S α Lyre	18.19.48,79 18.30.29,49 18.38.16,20 18.41.27,80	+ 0,10 - 0,03 - 0,03	- 82,40	285.43. 9,5 333.39.20,0 27. 8.42,7 27. 8. 1,8	727,0	+19,4 +19,3	+17,4 +17,2 +16,5	+ 7,2 + 1.37,6 + 1.37,7	30,7 31,9
	Lalande 35317 Lalande 35359 Anonyme Anonyme & +57°24'		- 0,04 - 0,04 + 0,21 + 0,21		31. 2.19,5 315. 4.32,2	7 <sup>2</sup> 7,0 7 <sup>2</sup> 6,9	+19,3 +18,6	+16,3 +15,0	+1.55,5 - 10,6	
	54 Dragon Weisse, XIX, 432. Weisse, XIX, 594. Weisse, XIX, 711.	19. 9.53,87 19.16.27,49 19.22.20,27 19.26.56,47	0,00 0,00 0,00		314.51.40,1 12.31. 1,6 12.26.14,8			+ 14,7	- 10,9 + 57,4 + 57,2	
	Weisse, XIX, 903. Weisse, XIX, 905. A Aigle	19.33.31,51 19.33.35,10 19.37.44,62 19.41. 3,69 19.46.33,56	- 0,02 - 0,02 + 0,02 + 0,15	- 82,90 - 82,93	20.56.25,5 2. 2.37,7 322.39.52,1				+1.17,5 + 39,7 - 3,3	30,7
	Anonyme	19.48.22,60 19.55.14,72 5. 5.54,18 5.44.25,18	+ 0,01 + 0,15 + 0,14 - 0,02 + 0,05	- 83,30	323.27.23,1 324.27.35,8 20.40, 6,9 351.45, 0,0	726,9 725,7 725,6	+17,3 +18,0 +18,3	+13,6 +17,0 +18,7	- 2,5 - 1,6 +1.15,9 + 25,8	33,7
4	Soleil, bord 1, sup. 3 Lion	8.54.58,74 11.39.58,20 11.44.27,37 13. 4.17.90 13.15.52,14 13.40.11,37 14. 7.23,70 14.41.10,04	+ 0,04 + 0,03 + 0,18 - 0,02 + 0,16 + 0,05 - 0,03	- 83,27 - 83,73 - 83,69 - 83,69 - 83,67 - 83,71	354.48.15,0 356.53. 8,0 317.46.31,3 280.49.27,9 22.39.30,7 322.14.12,5 352.19.48,3 27.41.33,2	725,1 724,4 724,2 724,2 724,0 723,9 723,9	+20,1 +21,7 +23,8 +24,0 +23,7 +23,5 +23,0	+22,6 +26,8 +26,5 +26,0 +26,1 +25,9 +25,5	+ 29,0 + 31,1 - 7,7 - 52,8 +11,19,0 - 3,5 + 25,8 +1,36,5	35,4 30,4 30,4 26,7 28,8 34,0 28,3
	β Petite Ourse S  α Couronne  δ Petite Ourse S  Anonyme  Anonyme δ+57°24′  54 Dragon	14.49.46,79 15.26.55,25 15.35.28,04 18.19.48,36 18.59.38,43 19. 8. 5,05	+ 0,48 + 0,07 + 0,02 + 0,21 + 0,21 + 0,21	- 83,63 - 83,73 - 83,86	297.32.15,4 345. 4.23,5 5.23.23,2 285.43. 7,2 315. 4.28,7	723,9 725,3 725,7	+22,5 +20,4 +20,2	+25,5 +23,6 +23,5 +17,4 +16,8 +16,8	- 28,5 + 18,1 + 43,1 - 45,9 - 10,6	25,8 29,4 29,4 28,8
1	α Cocher		+ 0,13	- 84,16				710,0	+ 0,4	30,9

Le 4, Mire Sud-411,08. Mire Nord B-61,17. Mire Nord C-301,95. Mire Nord D-611,29. d-177,07.

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOURS	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOVENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERN Inté-	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	β Orion β Taureau α Orion Vénus, bord 2, centr.	h. m. s 5. 5.53,12 5.15.21,41 5.45.36,04 5.48.48,76	- 0,02 + 0,07 + 0,02 + 0,05	5. - 84,39 - 84,44 - 84,38	20.40. 4,8 343.50. 2,3 351.40.17,2	mm. 7 24,9 724,9 724,8	+19,0 +19,2 +19,3	+16,0 +16,2 +16,2	+1.16,1 + 17,3 + 25,9	32,0 36,6
6	Soleil, bord 1, inf     Grande Ourse   GLion   Grande Ourse   A Petite Ourse I	9. 2.38,12 10.52,54,61 11.39,56,06 11.44.25,49 13. 4.16,04	+ 0,03 + 0,25 + 0,03 + 0,18	- 85,30 - 85,39 - 85,58	355.52,28,2 309.44.56,7 356.53.10,1 317.46.36,0 280.49.31,1	729,6 730,0 730,1 730,3	+21,0 +21,3 +21,6 +21,8	+24,2 +22,7 +22,4 +21,9	+ 30,3 - 15,7 + 31,8 - 7,8 - 54,0	34,2 38,1 34,7 32,0
	α Vierge	13.15.50,16 14. 7.21,74 14.41. 8,12 14.49.44,73 15.26.53,29	- 0,02 + 0,05 - 0,03 + 0,48 + 0,07	- 85,60 - 85,60 - 85,60 - 85,53 - 85,64	22.39.34,7 352.19.44,7 27.41.34,4 297.32.15,9 345. 4.27,9	730,3 730,5 730,7	+21,8 +21,8 +21,8 +21,5	+22,4 +22,0 +21,3 +20,6	+1.20,7 + 26,4 +1.38,8 - 29,2 + 18,5	32,5 33,1 31,9 25,6 34,3
	α Serpent  β' Scorpion α Scorpion Lalande 31166 α Hercule Lalande 31506	15.35.25,96 15.55.16,40 16.18.46,15 16.59.36,56 17. 6.22,19 17.11.30,54	+ 0,02 - 0,04 - 0,07 - 0,04 + 0,03 - 0,04	- 85,71 - 85,79 - 85,64	5.23.24,6 31.39.45,4 38.21.20,6 32.45.21,2 357.43.41,0 32.41.12,3	731,2 731,3 731,5	+21,3 +21,2 +20,5	+20,6 +20,1 +19,1 +17,8	+ 44,0 +1.58,0 +2.47,1 +2.5,2 + 33,5 +2.4,8	31,9 36,4 28,0
	Piazzi, XVII, 91 Piazzi, XVII, 117. α Ophiuchus Piazzi, XVII, 191. Piazzi, XVII, 207.	17.16.44,58 17.20.59,29 17.26.32,18 17.32. 4,87 17.33.333,76	- 0,03 - 0,06 + 0,03 + 0,06 + 0,06	- 85,43	27.16.18,1 38.24.32,4 359.37.13,1			+17,6	+1.38,4 +2.48,5 + 36,1 + 21,6	31,3
	Lalande 32548 4 Sagittaire y Dragon Weisse, XVII, 1208 Auonyme 8-14°13'	17.39.48,47 17.49.11,71 17.51.42,80 17.56. 1,02 17.59.48,98	+ 0,06 - 0,06 + 0,16 - 0,03 - 0,03	- 85,40	347.59,43,5 36, 3.45,2 320.47.46,4 26.29, 4,5	731,6	+19,7	+16,9	+ 21,9 +2.28,2 - 5,1 +1.35,5	32,7
	Anonyme λ Sagittaire δ Petite Ourse S α Lyre Lalande 34849	18. 0.16,46 18.17.16,47 18.19.45,34 18.30.26,43 18.37.46,24	- 0,03 - 0,06 + 0,10 - 0,04	- 85,43	26.28. 9,4 37.45.42,9 285.43.12,2 333.39.16,3	731,6 731,6	+19,5	+17,1	+1.35,5 +2.42,7 - 46,4 + 7,2	33,7
	Anonyme  Lalande 35068  Lalande 35317  Lalande 35359  Anonyme  Anonyme	18.39.11,90 18.42.43,90 18.48.15,12 18.49.13,84 18.56.33,37 18.59.19,93	- 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 + 0,21 + 0,21		30.43.11,9 30.42.35,4 31. 2.23,0 315. 1.49,6 314.59. 3,6	731,7	+19,0	+15,6	+1.54,5 +1.54,6 +1.56,4 - 10,7 - 10,8	

67
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOHRS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERM	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
١.		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	RE.	rieur.	rieur.	0N.	POLE.
	Anonyme 8+57°24' 54 Dragon Anonyme 8+57°35' Piazzi, XIX, 156. Anonyme. Anonyme. Weisse, XIX, 903. Weisse, XIX, 905.  A sigle Anonyme. Lalande 40654 Lalande 40817 Lalande 40817 Lalande 4180 Lalande 4180 Lalande 41957 Anonyme.  Ca Cocher Ca Orion Ca Taureau Corion Venus, bord 2, centr. Mercure, bord 2, cetre	h. m. s. 19. 8. 2,75 19. 9.50,83 19.14.46,20 19.21.40,31 19.25.47,29 19.30.22,25 19.33.32,45 19.37.41,72 20.47.33.42 20.51, 5,34 20.55.33,62 20.59.23,55 21. 4.20,33 21.20.42,96 21.24.37,08 21.29.33,96 5. 4. 7,43 5. 5.51,19 5.15.19,49 5.45.34,13 5.57.40,78 8.29. 1,84	5. + 0,21 + 0,21 + 0,22 0,00 0,00 0,00 - 0,02 + 0,02 + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,09 + 0,09 + 0,09 + 0,05 + 0,05 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,09 + 0,09 + 0,09 + 0,05 + 0,09 + 0,09 + 0,05 + 0,05	- 85,80 - 85,80 - 86,37 - 86,37 - 86,42 - 86,34	314.51.37,9 314.34.56,5 12.30.18,6 12.26.44,3 20.57.45,0 339.45.25,8 341.14.11,3 340.53.47,6 342.18.32,1 345.24.15,6 350.46.35,4 352.14.57,9 351.56. 8,1 326.28.30,0 20.40. 8,5 343.49.59,0 4.55.25,7 351.32.16,6 352. 5.15,4	731,7 731,7 731,7 732,5 732,5 732,5 732,5 732,5	+18,4 +17,9 +18,1 +18,3 +18,5 +18,6 +19,8	+14,3 +12,5 +12,5 +12,5 +16,0 +16,2 +16,4 +16,8 +19,9	- 10,9 - 11,2 + 57,7 + 57,6 + 13,5 + 14,6 + 16,1 + 19,4 + 25,5 + 27,2 + 26,9 + 1,16,8 + 17,5 + 44,0 + 26,0 + 26,0 + 26,3	33,3 36,7 33,6 31,4
	Soleil, bord 1, sup. 3 Lion. y Grande Ourse. x Petite Ourse I. x Vierge. y Grande Ourse. x Bouvier. x Balance. 3 Petite Ourse. x Couronne. x Serpent. x Serpent. Lalande 31166 Piazzi, XVI, 309. x Hercule. Lalande 31506. Piazzi, XVII, 91.	9. 6.26,96 11.39.55,06 11.44.24,37 13. 4.17,05 13.15.49,26 13.40. 8,39 14. 7.20,74 14.41. 7,08 14.49.43,63 15. 7.28,28 15.26.52,23 15.35.24,96 15.55.15,34 16.59.35,56 17. 0.42,78 17. 6.21,30 17.11.29,58 17.16.43,52	+ 0,04 + 0,03 + 0,18 - 0,02 + 0,16 + 0,05 - 0,03 + 0,48 - 0,02 + 0,07 + 0,02 - 0,04 - 0,04 + 0,03 - 0,04 - 0,03	- 86,39 - 86,68 - 86,48 - 86,59 - 86,58 - 86,62 - 86,55 - 86,69 - 86,69	355.37.30,7 356.53. 9,8 317.46.30,7 280.49.30,5 22.39.31,9 322.14.15,4 352.19.44,7 27.41.32,8 297.32.15,7 21. 6.34,8 345. 4.30,3 5.23.25,7 31.39.47,7 32.45.17,3 357.43.43,3 32.41.16,2 27.16.17,5	731,9 731,2 731,0 730,9 730,8 730,6 730,6 730,6 730,6 730,7 730,8 730,9	+20,0 +20,9 +21,3 +21,3 +21,3 +21,3 +21,4 +21,4 +21,3 +21,0 +21,0 +21,0	+20,4 +23,2 +23,6 +23,7 +23,8 +23,6 +22,9 +22,9 +22,6 +22,7 +22,2 +20,6 +19,8 +19,8	+ 30,5 + 31,8 - 7,8 - 53,8 +1.20,4 - 3,6 + 26,2 +1.38,2 +1.16,1 + 18,4 + 43,7 +1.57,0 +2. 3,8 +33,2 +2. 3,8 +1.37,8	37,8 29,2 31,4 29,5 31,4 32,9 29,7 25,5 36,7 32,7

Le 6, Mire Sud-41P, 33. Mire Nord B-6P, 56. Mire Nord C-30P, 89. Mire Nord D-61P, 49. Niveau-2P, 05.

## 68 Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	ONÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ETRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Piazzi, XVII, 117. a Ophiuchus	h. m. s. 17.20.58,29 17.26.31,28	s. - 0,06 + 0,03	s. - 86,32	38.24.35,5 359.37.16,7	mm.	٥	+18,8	+2.47,7 + 35,9	34,8
	Piazzi, XVII, 191. Piazzi, XVII, 207. Lalande 32523 Lalande 32548	17.32. 3,85 17.33.32,97 17.39.17,97 17.39.47,69	+ 0,06 + 0,06 + 0,06		347.44.5 <sub>7</sub> ,3 347.59.43,5	731,0	+20,4	+18,3	+ 21,5	а
	4 Sagittaire y Dragon Anonyme	17.49.10,61 17.51.41,67 17.56, 9,82	- 0,06 + 0,16 - 0,04	- 86,51	36. 3.45,5 320.47.45,2 32.44.12,0	731,0	+20,4	+17,8	+3.27,6 - 5,1 +2. 4,9	31,7
	B. A. C. 6158  Petite Ourse S  Lyre  Anonyme	18. 1.54,08 18.19.44,91 18.30.25,57 18.35.39,22	+ 0,10	- 86,28	32. 8.19,3 285.43. 8,0 333.39.17,8 30.47.24,6	731,0 731,0	+20,2 +19,5	+16,1 +16,1	+2. 1,9 - 46,5 + 7,2 +1.55,1	29,6 30,8
	Lalande 34849 Anonyme Lalande 35068	18.37.45,12 18.39.10,82 18.42.42,76	- 0,04 - 0,04 - 0,04		30.47.24,0 30.43.15,9 30.42.38,3				+1.54,8 +1.54,8	
	B. A. C. 6477 Anonyme 8+57°27' Anonyme Anonyme	18.49.45,50 18.51.54,43 18.56.32,63 18.59.19,31	+ 0,21 + 0,21 + 0,21 + 0,21		315. 1.52,3 314.5q. 6,0	731,0	+18,4	+15,0	- 10,7 - 10,8	
	Anonyme &+57°24' 54 Dragon Anonyme	19. 8. 1,99 19. 9.49,97 19.14.45,47	+ 0,21 + 0,21 + 0,21		314.51.40,0 314.43.29,9	701,0	(10,4		- 10,9 - 11,1	۱
	Piazzi, XIX, 156 Anonyme &-0°13'. Anonyme Weisse, XIX, 903	19.21.39,51 19.25.46,43 19.30.21,35 19.33.27,66	0,00 0,00 - 0,02		314.34.55,8 12.26.48,1 20.56.25,5				+ 57,5	
	Weisse, XIX, 905. Vaigle	19.33.31,20 19.37.40,80 19.40.59,77	- 0,02 + 0,02 + 0,15	- 86,72					+1.17,9 + 39,9 - 3,3	36,6
	Anonyme	19.46.29,75 19.48.18,78 19.55.11,02	+ 0,01 + 0,15 + 0,14	- 86,75	323.27.18,6 324.27.31,8	731,t	+17,7	+14,2	- 2,5 - 1,6	
	AnonymeLalande 39393Anonyme	20. 8.57,80 20.13.59,10 20.18.44,72 20.23.11,02	† 0,12 † 0,12 † 0,11		328.45.47,0 328.55.27,9 330.52.58,6 331.10.28,4			+13,7	+ 2,0 + 2,1 + 4,6 + 4,9	
	Anonyme Anonyme Anonyme Lalande 40654	20.27. 2,26 20.34.53,71	+ 0,11 + 0,13 + 0,08 + 0,08	- 86,37	331. 2.36,1 327.33 40,8 339.45.27,0 341.14.11,9	731,2	+17,5	+13,4 +13,4 +13,6	+ 4,8 + 1,4 + 13,4 + 14,9	33,
	Lalande 40817		+ 0,08		041114,111,9				1 14.9	

Le 7, Mire Sud-41P,90. Mire Nord B-5P,97. Mire Nord C-29P,96. Mire Nord D-60P,70. Niveau-2P,58

69
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

10URS.	NOM	PASSAGE CONCLU		LECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	TUERN	ONÈTRE	RÉFRA	LIEL
ts.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	LACTION.	POLE.
	Lalande 40979 Lalande 41180 Lalande 41800 Lalande 41957 Anonyme	b. m. s. 20.59.22,57 21. 4.19,29 21.20.42,14 21.24.36,40 21.29.33,09	+ 0,08 + 0,07 + 0,05 + 0,05 + 0,05	5	342.18.34,7 345.24.19,0 353.46.35,8 352.15. 0,6 351.56.11,6 326.28.29,9	731,2 731,3	+18,0 +18,3	+14,1	+ 16,0 + 19,3 + 25,4 + 27,2 + 26,8	22
	α Cocher	5. 4. 6,47 5. 5.50,17 5.15.18,67 5.45.33,11 6. 2. 9,16 6.19.46,59	+ 0,13 - 0,02 + 0,07 + 0,02 + 0,05	- 87,14 - 87,41 - 87,27 - 87,39	320.20.29.5 20.40. 6,5 343.50. 0,1 4.55.26,6 351.28.55,5 378.55.38,1	731,1 731,1 731,1 731,1	+18,0 +18,7 +18,9 +19,1	+18,4 +18,3 +18,7 +19,0 +18,5	+ 0,4 +1.16,1 + 17,4 + 43,6 + 25,7 - 58,5	33,2 34,2 34,6 32,0 31,4
	Soleil, bord 1, inf  Grande Ourse  Grande Ourse  Petite Ourse I  Vierge  Bouvier  Bouvier  Petite Ourse S  Balance	9.10.15,00 10.52.52,53 11.39.53,96 11.44.23,45 13. 4.16,18 13.15.48,04 14. 7.19,66 14.41. 6,14 14.49.42,25 15. 7.27,34	+ 0,04 + 0,25 + 0,03 + 0,18 - 0,02 + 0,05 - 0,03 + 0,48 - 0,02	- 87,36 - 87,48 - 87,59 - 87,69 - 87,65 - 87,85	356.26. 7,2 356.53. 8,8 317.46.34,3 289.49.39,7 22.39.31,4 352.19.45,7 27.41.35,2 297.32.19.7 21. 6.32,0	730,3 729,5 729,1 729,0 728,6 728,6 728,6	+20,6 +21,5 +21,7 +21,7 +21,6 +21,6	+22,4 +22,9 +22,9 +22,2 +21,9 +22,1 +21,8	+ 31,3 + 31,7 - 7,8 - 53,7 +1.20,6 + 26,3 +1.38,2 - 29,1 +1.16,1	36,7 32,6 31,5 29,2 34,0 32,2 29,4
	α Couronne α Serpent Lalande 31166 Piazzi, XVI, 309 α Hercule	15.26.51,23 15.35.23,96 16.59.34,65 17. 0.41,84 17. 6.20,10	+ 0,07 + 0,02 - 0,04 - 0,04 + 0,03	- 87,67 - 87,68 - 87,71	345. 4.24,7 5.23.23,7 32.45.19,9 357.43.46,5	728,5 728,6	+21,5 +21,3	+21,5 +21,5 +20,9	+ 18,4 + 43,7 +2. 3,4 + 33,0	31,1 30,8 33,2
	Lalande 31506 Piazzi, XVII, 91 Piazzi, XVII, 117.  a Ophiuchus Piazzi, XVII, 191. Piazzi, XVII, 207.	17.11.28,40 17.16.42,48 17.20.57,07 17.26.30,12 17.32. 2,74 17.33.31,59	- 0,04 - 0,03 - 0,06 + 0,06 + 0,06	- 87,47	32.41.20,0 38.24.41,3 359.37.20,7 347.47.51,1 347.44.59,5	728,7	+21,2	+20,6	+2. 3,1 +2.46,3 + 35,6 + 21,4 + 21,4	38,6
	Lalande 32523 Lalande 32548 y Dragon Anonyme ð Petite Ourse S z Lyre	17.39.16,67 17.39.46,43 17.51.40,86 17.56. 8,86 18.19.41,67 18.30.24,45	+ 0,06 + 0,06 + 0,16 - 0,04 + 0,10	- 87,30 - 87,39	347.59.44,7 320.47.46,4 32.44.17,2 285.43. 8,9 333.39.17,8	728,8 728,8 728,8 728,8	+21,2 +21,2 +20,8 +20,7	+19,5 +19,3 +18,6 +19,0	+ 21,6 - 5,0 +2. 4,0 - 46,0 + 7,2	33,2 31,2 31,0
	Anonyme	18.49.44,47 18.51.53,29 18.59.17,93	+ 0,21 + 0,21 + 0,21		314.51.38,8 314.59. 717	728,7	+20,3	+17,0	- 10,8 - 10,7	

Le 8, Mire Sud-4xP,46. Mire Nord B-6P,08. Mire Nord C-30P,63. Mire Nord D-6PP,04. Niveau-2P,40. d-x6P,84.

70

## Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	54 Dragon	h. m. s. 19. 9.48,75 19.14.44,45 19.21.38,25 19.25.23,49 19.30.20,21 19.33.30,10 19.37.39,58 19.41.59,84 19.46.28,61	5. + 0,21 + 0,22 0,00 0,00 - 0,02 - 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,01	- 87,94 - 87,75 - 87,89	314.51.38,7 314.43.34,0 314.34.56,2 12.32.19,5 12.26.51,5 20.57.53,8 2. 2.41,2 3.49.10,2	nm. 728,7	+20,4	+17,1	- 10,8 - 10,9 - 11,1 + 57,1 + 57,0 +1.17,2 + 39,5 + 42,2 - 2,5	34,8 34,1
9	Anonyme Anonyme 3 Taureau Vénus, bord 2,centr,	19.48.17,46 19.55. 9,80 5.15.16,73 6.11. 9,32	+ 0,13 + 0,14 + 0,07 + 0,05	- 89,27	323.27.20,9 324.27.36,7 343.50. 1,0 351.23.30,5	728,7 730,1 730,4	+19,6 +19,6 +20,7	+15,4 +19,6 +22,1	- 2,3 - 1,6 + 17,3 + 25,3	35,5
10	Soleil, bord 1, sup. y Grande Ourse α Petite Ourse I α Vierge α Bouvier α Balance β Petite Ourse S β Balance α Couronne α Serpent β Scorpion α Scorpion Piazzi, XVII, 91. Piazzi, XVII, 117. α Ophiuchus β Petite Ourse S	9.17.49,68 11.44.21,59 13. 4.14,64 13.15.46,18 14. 7.17,62 14.41. 3,98 14.49.40,21 15. 7.25,26 15.26.49,29 15.35.21,86 15.55.12,24 16.18.42,03 17.16.40,58 17.20.55,35 17.26.28,22 18.19,41,22	+ 0,04 + 0,18 - 0,02 + 0,05 - 0,03 + 0,48 - 0,02 + 0,07 - 0,03 - 0,07 - 0,03 - 0,07 + 0,03	- 89,43 - 89,53 - 89,66 - 89,68 - 89,73 - 89,57 - 89,75 - 89,85 - 89,34	356.29. 6,6 317.46.33,5 280.49.33,5 22.39.36,6 352.19.44,1 27.41.32,9 297.32.19,6 21. 6.37,0 345. 4.26,3 5.23.25,8 31.39.52,2 38.21.19,8 27.16.18,3 38.24.35,8 359.37.18,3 285.43.7,0	731,0 731,1 731,1 731,2 731,2 731,4 731,4 731,5 731,6 731,7 731,7	+20,8 +21,2 +21,8 +21,8 +22,4 +22,8 +22,3 +22,3 +21,2 +21,2 +21,2 +21,2 +21,2 +21,2 +20,3	+22,9 +25,4 +24,7 +24,6 +24,7 +23,9 +23,8 +23,7 +23,4 +22,8 +21,6 +19,6 +19,6	+ 31,3 - 7,8 - 53,6 +1.20,2 + 26,1 +1.38,0 - 29,0 +1.15,9 + 18,3 + 43,6 +1.56,9 +2.45,7 +1.37,8 +2.47,4 + 35,8 - 46,1	31,4 34,0 34,2 32,2 29,8 29,2 32,7 32,9 34,3
	A Lyre γ Aigle α Aigle β Aigle Anonyme Anonyme Lalande 39198 Lalande 39393 Anonyme	18.30.22,47 19.37.37,98 19.41.58,00 19.46.26,83 19.48.15,68 19.55. 8,04 20. 8.54,95 20.13.55,90 20.18.41,52	+ 0,10 + 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,15 + 0,14 + 0,12 + 0,12 + 0,11 + 0,11	- 89,34 - 89,53 - 89,58 - 89,66	333.39.20,5 2. 2.41,4 3.49. 7,1 323.27.23,9 324.27.32,4 328.45.43,9 328.55.23,5 330.52.53,2 331.10.22,6	731,9 732,2 732,3	+20,3 +20,0 +20,0	+17,1 +16,8	+ 7,2 + 39,6 + 42,2 - 2,5 - 1,6 + 2,5 + 2,6 + 4,6 + 4,8	29,7 34,3 35,3 31,2

71
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

Anonyme	JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	CORR l'instru- ment.	ECTION de l la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERM Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEL du POLE.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Anonyme. Lalande 40654 Lalande 40817 Lalande 40817 Lalande 41800 Lalande 41800 Lalande 41800 Lalande 41800 Lalande 41800 Anonyme	20.26.59,18 20.47.29,30 20.51. 1,366 20.55.29,64 20.59,19,65 21. 4,16,19 21,20.39,14 21,24.33,30 21,29.30,00 5,45.30,39 6,15.41,76 6,19.43,54 6,36.59,68 7.29.53,75 7.34.34,09 9. 2.43,82  9.21.36,14 13. 4,15,62 14. 7,16,74 14.41. 3,18 14.49.39,25 15. 7,24,52 15. 26.48,35 15.35,21,10 15.55.11,36 16.18.41,21 17.26.27,04 17.32.55,08 17.40.13,69 17.40.13,69 17.40.13,69 17.40.13,69 17.40.13,69 17.40.13,69 17.40.13,69 17.40.13,69 17.40.13,69 17.40.13,69 17.51.37,88 17.56. 6,22 18. 2.32,12 18.19.39,30 18.35.35,40 18.37.41,22 18.39, 6,96 18.42.38,96	+ 0,11 + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,06 + 0,01 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,04 + 0,03 + 0,03 + 0,05 - 0,04 + 0,03 - 0,04 - 0,06 + 0,06 + 0,00 - 0,04 - 0,06 +	- 90,18 - 90,09 - 90,13 - 90,24 - 90,20 - 90,47 - 90,52 - 90,49 - 90,50 - 90,65 - 90,51	331. 2.30,5 339.45.23,1 341.14.10,4 340.53.43,9 342.18.31,1 345.24.17,2 350.46.32,0 352.14.58,7 4.55.27,3 351.21,27,8 278.55.40,8 28.47.33,6 340. 5.44,2 6.41.24,7 343.55.17,5 353.53. 0,8 357.18.28,5 280.49.29,5 352.19.42,1 27.41.34,0 297.32.16,8 21. 6.37,1 345. 4-27,2 31.39.50,5 38.21.17,9 359.37.16,5 33.52.29,2 347.59.44,5 320.47.44,9 32.44.19,2 32. 2.58,2 285.43. 8,1 333.39.21,9 30.47.21,4 30.43.19,2 30.42.41,2	732,3 732,4 732,4 732,5 732,5 732,6 732,6 732,2 731,0 730,7 730,8 730,9 730,8 730,9 730,8 731,3	+19,8 +19,8 +19,7 +19,8 +19,7 +19,8 +19,9 +20,2 +21,3 +21,4 +23,6 +24,3 +24,8 +25,0 +24,5 +24,4 +23,5	+16,6 +15,4 +14,8 +14,6 +18,8 +19,1 +20,3 +23,0 +23,0 +23,1 +28,5 +27,7 +27,5 +27,7 +27,5 +27,2 +21,0 +21,1 +20,6 +20,5 +20,4	+ 4,7 + 13,3 + 14,8 + 14,5 + 15,9 + 19,2 + 25,2 + 27,0 + 26,6 + 43,6 + 25,6 + 43,6 + 1,44,4 + 46,2 + 17,4 + 28,2 + 136,7 - 28,6 + 1,14,9 + 1,55,4 + 2,43,4 + 2,43,6 + 2,5,8 + 1,55,4 + 1,55,6 + 1,55,6 + 1,53,6 +	33,3,28,0 37,6 29,5 33,4 30,5 29,8 29,6 26,8 33,4,2 8,7 30,1 34,6

Le 11, Mire Sud-42P,07. Mire Nord B-6P,47. Mire Nord C-31P,23. Mire Nord D-62P,23.

72
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

Jours.	NOM. DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	"OYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	Inté- rieur.	ONÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Piazzi, XIX, 156. Weisse, XIX, 711. Anonyme. Weisse, XIX, 903. Weisse, XIX, 905.	h. m. s 18.51.50,49 18.56.28,31 18.59.15,23 19. 9.50,95 19.14.41,00 19.21.35,21 19.26.48,73 19.30.17,47 19.33.23,96 19.33.27,44 19.37.36,88	+ 0,21 + 0,21 + 0,21 + 0,20 + 0,21 + 0,22 0,00 0,00 - 0,02 - 0,02 + 0,02	- go,63	314.51.38,4 315. 1.53,9 314.59. 3,2 316.37,45,5 314.43.32,1 314.34.59,8 12.30.43,6 12.26.46,7 20.56.26,0	731,6	+21,2	+19,6	- 10,7 - 10,6 - 10,6 - 9,0 - 10,9 - 11,1 + 56,8 + 1.16,8	"
	A Aigle	19.41.56,96 19.46.25,81 19.48.14,60 19.50. 7,34 19.52.34,28 3.49. 1,58 3.53.38,38	+ 0,02 + 0,01 + 0,15 + 0,15 + 0,14 + 0,03 + 0,05	- 90,63 - 90,62 - 90,68	3.49.10,7 323.30.31,0 353. 7.46,9	731,7	+20,8 +20,3	+17,7	+ 39,3 + 42,0 - 2,5 + 25,1	3 <sub>7</sub> ,3 34, <sub>7</sub>
	γ Taureau	4. 9.42,54 4.25,45,62 5. 4. 2,63 5. 5.46,37 5.15.14,83 5.45.29,27 6.20.14,86 7.29.52,83 7.34-32,99	+ 0,03 + 0,04 + 0,13 - 0,02 + 0,07 + 0,02 + 0,05 + 0,01	- 91,23 - 91,13 - 91,32 - 91,23 - 91,33 - 91,18 - 91,32	357. 2.33,2 356. 6. 6,7 326.28.29,5 20.40. 7,7 343.49.59,5 4.55.27,5 351.19.50,9 6.41.27,1	731,1 731,1 731,1 731,0 730,9 730,9	+20,3 +20,4 +20,4 +21,0 +21,2 +21,6	+17,0 +18,2 +20,2 +20,7 +21,5 +22,9	+ 32,7 + 31,3 + 0,4 +1.15,6 + 17,2 + 43,3 + 25,3 + 45,7	38,2 32,8 35,4 33,6 33,6
12	Soleil, bord ι, inf α Petite Ourse I α Vierge	9.25.22,10 13. 4.16,84 13.15.44,70	+ 0,03	- 90,99	357.36.29,7 280.49.28,2 22.39.31,2	729,6 728,2 728,1	+23,0 +23,5 +24,0	+24,6 +31,1 +31,1	+ 32,5 - 52,2 +1.18,1	29, 26,
,	Soleil, bord 1, inf α Petite Ourse I α Bouvier α Scorpion α Hercule Lalande 31506 Piazzi, XVII, 91	9.32.52,84 13. 4.17,25 14. 7.13,92 16.18.38,19 17. 6.14,30 17.11.22,46 17.16.32,46	+ 0,11 + 0,13 + 0,02 + 0,11 + 0,04 + 0,05	- 93,21 - 93,53 - 93,35	358.13. 1,7 280.49.30,6 352.19.42,4 38.21.13,7 357.43.47,5 32.41.11,6 27.16.15,1	729,7 729,7 729,7 729,9 730,0	+22,2 +22,6 +22,4 +21,5 +20,4	+21,2 +20,9 +21,9 +19,0 +18,4	+ 33,6 - 54,1 + 26,3 +2.46,8 + 33,3 +2.4,4 +1.38,3	29 30 29 35
	Piazzi, XVII, 117.  a Ophiuchus  y Dragon	17.20.51,31 17.26.24,28 17.51.34,82	+ 0,02 + 0,11 + 0,28	- 93,15 - 93,07	38.24.34,7 359.37.18,3 320.47.45,8	730,2	+20,3	+16,8	+2.48,5 + 36,1 - 5,1	37 38

Le 14, Mire Sud-389,03.

73
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

101.48	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de	MOYEME DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERW Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE.
		ти шегданей.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.	-	TULE.
	Anonyme	h. m. s 17.56. 3,08 18. 1.23,68 18.19.33.94 18.30.18,61 19. 9.47.90 19.37.34,00 19.41.54,14 19.46.23,09 19.50. 4,85	+ 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,33 + 0,10 + 0,10 + 0,09 + 0,20	- 93,03 - 93,42 - 93,35 - 93,31	32.44.13,1 32. 1.38,7 285.43.10,0 333.39.15,3 316.37.44,2 2. 2.39,8 3.49. 9,3 6.15.25,1 323.30.30,1	730,3 730,3 730,5 730,5	+19,6 +19,6 +19,5 +19,5	+15,0 +15,1 +14,9 +14,6 +13,6	+2. 6,0 +2. 2,0 - 46,6 + 7,3 - 9,2 + 39,9 + 42,6 + 46,5 - 2,5	33,2 29,8 34,8 34,3 28,5
	Anonyme ô†47°40′ Anonyme Lalande 39198 Lalande 39393 Anonyme  A Cygne  Corion  Petite Ourse 1 Vénus, bord 2, centr.  Grand Chien	19.52.31,10 20. 8.51,22 20.13.52,38 20.18.37,84 20.23. 4,56 20.26.55,60 20.34.46,99 5.45.26,71 6.19.37,44 6.34. 1,72 6.36.55,80	+ 0,25 + 0,23 + 0,23 + 0,21 + 0,21 + 0,21 + 0,21 + 0,24 + 0,10 + 0,13 + 0,04	- 92,96 - 93.89 - 93.98	328.45.39,5 330.52.53,2 331.10.21,4 331. 2.29,4 327.33.35,3 4.55.27,4 2-8.55.39,5 351.18. 3,2 28.47.31,5	730,8 730,8 731,9 731,9	+19,4 +19,4 +19,3 +19,4 +19,5	+13,6 +13,6 +13,6 +16,7 +18,6 +19,6	+ 2,6 + 4,6 + 4,9 + 4,8 + 1,4 + 43,9 - 58,5 + 25,4 + 1.44,3	29,8 33,7 31,1 26,4
	Soleil, bord 1, sup. B Lion	9.36.37,16 11.39.47,34 11.44.16.67 13. 4.13,24 13.16.41,38 13.40. 0,65 14. 7.13,04 15.26.44,53 15.35.17,20 16.18.37,43 17. 0.34,98 17. 11.21,56 17.16.35,52 17.20.50,63 17.26.23,48 17.32.51,50 17.36.32,17 17.41.41,86	+ 0,11 + 0,41 + 0,31 + 0,06 + 0,28 + 0,13 + 0,16 + 0,10 + 0,02 + 0,04 + 0,04 + 0,05 + 0,02 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,002 + 0,03 + 0,03 + 0,06	- 93,98 - 94,16 - 94,19 - 94,03 - 94,08 - 94,15 - 94,25 - 94,28 - 94,19 - 93,93	357.59.58,0 356.53. 8,5 317.46.38,3 280.49.32,9 22.39.30,7 322.14.15,5 352.19.43,1 345. 4.27,0 5.23.21,6 38.21.15,3 32.43.40,2 357.43.44,3 32.41.14,9 27.16.15,2 38.24.33,7 35.37.15,3 35.37.15,3 40. 1.26,1 46.47.48,4	732,0 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,7 731,7 731,7	+21,7 +22,0 +22,0 +22,0 +22,0 +22,0 +21,7 +21,4	+20,8 +21,6 +22,7 +22,7 +22,7 +21,9 +21,0 +19,5 +18,7	+ 33,5 + 32,0 - 7,9 - 54,0 + 120,8 - 3,6 + 26,4 + 18,5 + 44,0 + 2,5,1 + 33,4 + 36,0 + 2,12,3 + 36,0 + 2,12,3 + 3,6,4 + 5,18,9	36,4 35,0 31,4 29,2 30,6 31,4 33,7 29,3 31,6 32,0
r	γ Dragon Anonyme	17.51.33,96	+ 0,28	- 93,90					- 5,1 +2. 5,4	29,4

Le 15, Mire Sud-389,51. Mire Nord B-79,06. Mire Nord C-309,88. Mire Nord D-619,57. Niveau-20,24.

74
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS  corrigée pour le niveau.	BARONÉTRE	THERMO	OMĖTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
			шен.	ренцине.	1			ricut.		
	Anonyme  & Petite Ourse S  a Lyre  Anonyme  Anonyme	18. 1.22,58 18.19.33,69 18.30.17,80 19. 9.47,20 20. 8.50,26	+ 0,04 + 0,20 + 0,33 + 0,23	- 93,83	32. 1.38,3 285.43. 4,8 333.39.16,3 316.37.40,8 328.45.43,4	732,1 732,3	+20,1	+17,3 +17,4 +17,4 +15,4 +14,2	+2. 1,3 - 46,4 + 7,2 - 9,2 + 2,6	28,4 30,9
	Lalande 39198 Lalande 39393 Anonyme Anonyme Δ Cygne Lalande 40654 Lalande 40817 Lalande 40979	20.13.51,54 20.18.37,08 20.23. 3,54 20.26.54,66 20.34.45,93 20.47.24,46 20.50.56,60 20.55.24,88 20.59,14.81	+ 0,23 + 0,21 + 0,21 + 0,21 + 0,24 + 0,17 + 0,17 + 0,17	- 94,01	328.55.27,0 330.52.54,5 331.10.26,4 331. 2.32,3 327.33.34,5 339.45.18,5 341.14.11,0 340.53.44,1 342.18.28,5	732,2	+18,5	+14,0 +14,0 +13,5	+ 2,6   + 4,6   + 4,9   + 4,8   + 1,4   + 13,4   + 14,9   + 16,1	29,3
	Lalande 41180 Lalande 41800 Lalande 41957 Anonyme	21. 4.11,61 21.20.34,34 21.24.28,74 21.29.25,32 5.45.25,65 6.19.35,74 6.27.24,92 6.36.54,92 6.38.39,24	+ 0,16 + 0,13 + 0,13 + 0,13 + 0,10 + 0,12 + 0,04 + 0,13	- 94,97 - 94,91	345.24.12,3 350.46.35,9 352.15. 0,2 351.56. 9,9 4.55.25,5 278.55.42,6 355.46.47,5	732,2 732,1 731,1 731,1	+18,4 +18,4 +19,2 +19,3 +19,4	+13,2 +13,1 +16,4 +17,7	+ 19,4 + 25,4 + 27,2 + 26,8 + 43,9 - 58,6 + 31,0 + 25,6	31,9 34,0
16	Soleil, bord 1, inf  B Lion  Grande Ourse  Bouvier  Ophiuchus  Soleil, bord 1, inf  Bouvier  Soleil, bord 1, inf  Bouvier	9.40.20,98 11.39.46,34 11.44.15,55 14. 7.11,80 17.26.22,54 17.32.50,46 17.36.31,15	+ 0,11 + 0,11 + 0,31 + 0,13 + 0,11 + 0,03 + 0,02	- 94,98 - 95,27 - 95,30 - 94,86	358.50.37,2 356.53. 6,8 317.46.31,8 352.19.42,6 359.37.16,6 33.52.34,0 40. 1.31,1	730,3 729,4 728,6 728,1	+20,7 +22,7 +24,5 +22,8	+22,0 +26,9 +26,6 +26,7 +22,0	+ 34,3 + 31,3 - 7,7 + 25,9 + 35,3 +2. 9,7 +3. 2,7	34,0 28,5 30,4 34,9
	Anonyme y Dragon Anonyme Anonyme ð Petite Ourse S α Lyre	17.41.40,74 17.51.32,94 17.56. 1,44 18. 1.21,50 18.19.31,44 18.30.16,75	+ 0,01 + 0,28 + 0,04 + 0,04 + 0,20	- 94,90 - 94,91	46.47.52,8 320.47.43,8 32.44.20,9 32. 1.43,6 285.43. 5,7 333.39.19,5	728,3 728,1 728,0 728,0	+22,6 +22,3 +22,0 +22,0	+21,0 +20,9 +19,9 +19,6 +19,9	+5.13,2 - 5,0 +2. 3,3 +1.59,5 - 45,7 + 7,1	32,0 30,1 34,2
	Anonyme  γ Aigle  α Aigle  Anonyme  Anonyme	19. 9.46,19 19.37.32,06 19.41.52,32 19.50. 2,56 19.52.29,60	+ 0,33 + 0,10 + 0,10 + 0,26 + 0,25	- 95,35 - 95,16	316.37.42,7 2. 2.40,3 3.49.12,6 323.30.29,0 324.38.45,8	728,0 728,0 728,0	+21,7 +21,4 +21,3	+17,7	- 9,0 + 39,2 + 41,8 - 2,5 - 1,4	34,6 3 <sub>7</sub> ,1

Le 16, Niveau-2P, 10. d-17P, 07. Nadir 1/6°6′35″, 10.

75
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corregce pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	REFRACTION.	LIEU du POLE.
	Anonyme.  Lalande 39198.  Lalande 39393.  Anonyme.  Anonyme.  α Cygne.  Anonyme.  Lalande 40654.  Lalande 40817.  Lalande 40979.  Lalande 41180.  Lalande 41800.  Lalande 41957.  Anonyme.	h. m. s. 20. 8.49,24 20.13.50,28 20.18.36,04 20.23. 2,24 20.26.53,80 20.34.45,07 20.47.23,64 20.50.55,72 20.55.23,84 20.59.13,85 21. 4.10,57 21.20.33,22 21.24.27,62 21.29.24,36	5. + 0,23 + 0,93 + 0,21 + 0,21 + 0,21 + 0,24 + 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,16 + 0,13 + 0,13 + 0,13 + 0,13	s. 94,87	328.45.44,3 328.55.28,1 330.52.54,9 331.10.22,2 331. 2.31,4 327.33.36,6 339.45.14,9,2 340.53.44,4 342.18.28,2 345.24.11,3 350.46.34,5 352.14.58,5 351.56. 9,2	728,0 728,0 727,9 728,0	+20,3 +20,3 +19,9 +20,1	+17,4 +17,4 +17,0 +16,6	+ 2,5 + 2,5 + 4,5 + 4,5 + 1,4 + 13,2 + 14,7 + 14,3 + 15,8 + 19,0 + 24,9 + 26,7 + 26,3	31,7
	Soleil, bord 1  α Orion  μ Gémeaux  δ Petite Ourse I  γ Gémeaux  α Grand Chien  Vénus, bord 2, centr.	9.46. 4,54 5.47.23,91 6.14.13,09 6.21.32,20 6.29.23,04 6.38.53,10 6.49.57,16	+ 0,11 + 0,10 + 0,14 + 0,12 + 0,04 + 0,13	+ 23,24	4.55. 28,3 349,43.13,5 278.55.44,5 355.46.49,8 28.47.32,0 351.20.43,3	729,6 729,5 729,5 729,5	+18,8 +18,7 +18,4 +18,5	+15,0 +16,3 +16,3 +16,4 +16,4	+ 44,0 + 23,8 - 58,8 + 31,1 +1.45,1 + 25,7	35,0 35,3 28,2
21	Soleil, bord 1, sup.  Soleil, bord 1  A Hercule  Ophiuchus  Petite Ourse S  Aigle  Aigle  Anonyme  Anonyme  Lalande 39198  Lalande 39393  Anonyme   9.49.47,26 10. 0.52,60 17. 8. 7,16 17.28.17,12 17.34.45,00 18.21.28,54 19.39.27,00 19.43.47,14 19.48.15,91 19.51.57,50 19.54.24,32 20.10.44,14 20.15.45,46 20.20.30,88 20.24.57,32 20.28.48,46 20.36.40,05 20.51.50,30	+ 0,11 + 0,06 + 0,06 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,03 + 0,03	+ 19,57 + 19,74 + 19,59 + 19,66 + 19,52	358.57.11.9 357.43.46,9 359.37.15,2 33.52.27,0 285.43. 7,9 2. 2.40,0 3.49.11.7 6.15.29,5 323.30.29,5 324.38.47,0 328.45.44,2 328.55.23,2 330.52.56,7 331.10.24,3 331. 2.30,7 327.33.35,3 339.34.47,0	729,4 733,4 733,5 733,5 733,5	+16,9 +16,9 +16,5 +16,3 +16,2	+13,5 +13,5 +13,5	+ 34,6 + 33,8 + 36,4 + 2.13,6 - 46,9 + 40,0 + 42,7 + 46,6 - 2,5 - 1,4 + 2,7 + 4,6 + 4,9 + 4,8 + 1,4 + 13,3	35,4 34,9 31,9 35,7 37,7 33,7	

Le 17, avant l'observation du Soleil, la pendule a été avancée de deux minutes.

76
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

Sunor	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE		OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	RE.	Inté- ricur.	Exté- rieur.	10N.	POLE.
	Lalande 40S17	h. m. s	+ 0,04	` `	340.53.45,5	1st Ell	0	0	+ 14,6	**
	Lalande 40017	21. 1. 8,67	+ 0,04		342.18.30,9				+ 14,6	
	Piazzi, XXI, 22	21. 5.15,49	+ 0,05		345.21.39,5	733,4	+15,9	+12,8	+ 19,4	
	Lalande 41180	21. 6. 5,37	+ 0,05							
1	Lalande 41800	21.22.28,22	+ 0,05		350.46.33,2				+ 25,5	
1	Lalande 41957	21.26.22,58	+ 0,05		352.14.58,5 353.11. 7,7	733,4	1 - 5 -	1-0/	+ 27,3	
,	Gémeaux		+ 0,05		349.43.13,7	732,0	+15,9	+12,4	+ 24,2	
	& Petite Ourse I	6.21.25,62	1 0,00		278.55.47,7	732,0	+15,4	+13,1	- 59,7	37,0
	y Gémeaux	6.29.19,10	+ 0,05		355.46.45,5	• ′		+13,3	+ 31,5	7,50
1	α Grand Chien	6.38.49,00	+ 0,10		28.47.29,6	731,9	+15,4	+13,6	+1.46,5	27,7
	Vénus, bord 2, centr.	7. 8.41,54	+ 0,05		351.31.29,6	731,9	+15,4	+13,9	+ 26,2	
1/2	Soleil, bord 1, sup.	10. 4.33,48	+ 0,06		0.16.27,3	731,2	+16,9	+17,8	+ 36,9	
1	α Vierge	13.17.34,06	+ 0,09	+ 18,59	22.39.32,7	729,9	+17,8	+19,4	+1.21,5	32,3
1	Lune, bord 1, sup.	13.36.10,75	+ 0,09		18.25.33,6	729.9	+17,8	+19,4	+1. 9,8	
1	z Bouvier	14. 9. 5,78	+ 0,05	+ 18,69	352.19.45,1	730,0	+18,0	+19,2	+ 26,6	33,4
	α Hercule		+ 0,06	+ 18,51	357.43.47,4	729,8	+17,9	+18,0	+ 33,4	35,6
	α Ophiuchus 58 Ophiuchus		+ 0,05	+ 18,84	359.3 <sub>7</sub> .14,4 33.5 <sub>2</sub> .3 <sub>1</sub> ,6	729.9	+17,9	+17,4	+ 36,0	33,8
	3 Sagittaire	17.38.24,83	+ 0,13		40. 1.27,8	·			+3. 5,9	
1	Piazzi, XVII, 245.	17.42.31,32	+ 0,14		46.58.13,8	729,9	+17,9	+17,3	+5.24,5	
ш	y Dragon	17.53.26,96	+ 0,02	+ 19,03	320.47.40,2	7 3.3	. ,,5		- 5,1	29,2
	Weisse, XVII, 1213		+ 0,10		26.25. 9,3				+1.35,0	
1	Anonyme	18. 3.15,46	+ 0,11		32. 1.40,2	730,0	+17,7	+17,4	+2. 0,9	
	Anonyme 8-19°46' 8 Petite Ourse S		+ 0,12		285.43.10,2			1	- 46,3	35,6
	α Lyre	1 . / /	+ 0,04	+ 19,01	333.39.14,5	730,3	+17,6	+17,0	+ 7,2	30,3
	Anonyme	,	+ 0,04	1 19,01	316.37.42,6	730,3	+17,4	+16,5	- 9,I	30,3
	Aigle	19.39.26,04	+ 0,07	+ 18,63	2. 2.39,5	730,4	+17,3	+16,0	+ 39,6	34,9
	α Aigle	19.43.46,22	+ 0,07	+ 18,75	3.49. 8,5				+ 42,3	34,2
	3 Aigle		+ 0,07	+ 18,57	6.15.29,0				+ 46,1	32,8
	Anonyme 8+32°32'	20.49.17,48	+ 0,04		22-27/2-	2.1		1 - 1		
i	Anonyme Lalande 40817	1 311	+ 0,04		339.34.43,0 340.53.43,3	730,4	+17,1	+14,7	+ 13,2	
	Lalande 40079		+ 0,04		342.18.27,5				+ 16,0	
	Piazzi, XXI, 22	6.1.0	+ 0,05		345.21.38,1	730,4	+16,1	+12,7	+ 19,3	
	Lalande 41180		+ 0,05			, ,,				
i	Lalande 41800	21.22.27,24	+ 0,05		350.46.33,2			+11,9	+ 25,5	
	Lalande 41957	21.26.21,56	+ 0,05		352.14.58,2	0 /			+ 27,3	
i	Lalande 42125	21.30.23,18	+ 0,05		353.11. 9,7	730,4	+16,1	+11,7	+ 28,4	
1	μ Gémeaux	6.14. 8,39	+ 0,05		349.43.10,6	729,8	1 +13,7	110,6	+ 24,3	

Le 22, Mire Sud-37P,02. NHe Mire Sud-4P,01. Mire Nord C-31P,92. Niveau-4P,10.

77
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOITES	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	_	OVĖTRE	RÉFRACTION	LIEU du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	E.	laté- ricur.	Exté- rieur.	10N.	POLE.
	δ Petite Ourse I γ Gémeaux α Grand Chien Vénus, bord 2, centr.	6.21.23,22 6.29.17,94 6.38.47,92 7.13.24,28	+ 0,06 + 0,10 + 0,05	+ 18,05	278.55.43,t 355.46.45,8 28.47.28,4 351.35.28,8	729,9 729,9	+15,9 +16,3	+12,7 +12,8 +13,0 +13,4	- 59,6 + 31,5 +1.46,5 + 26,3	32,3
23	Soleil, bord 1, inf.  7 Grande Ourse  A Bouvier  Lune, bord 1, sup.  8 Petite Ourse S  G Balance  Couronne  Serpent  Petite Ourse S  Lyre  Anonyme  A Aigle  A Aigle  Anonyme 3+32°32′	10. 8.13,64 13.41.52,23 14. 9. 4,60 14.25.58,32 14.51.26,79 15. 9.12,08 15.28.36,09 15.37. 8,90 18.21.24,70 18.32. 9,28 19.11.38,66 19.39.24,69 19.43.44,90 19.48.13,79 20.49.16,22	+ 0,06 + 0,02 + 0,05 + 0,09 0,00 + 0,09 + 0,05 + 0,07 + 0,02 + 0,02 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07	+ 17,47 + 17,52 + 17,37 + 17,46 + 17,54 + 17,64 + 17,44 + 17,44 + 17,42	1. 8.34,1 322.14.19,8 352.19.41,3 22.17.47,0 297.32.22,0 21. 6.37,7 345. 4.24,0 5.23.21,2 285.43. 8,6 333.39.15,4 316.37.38,8 2. 2.39,0 3.49. 9.3 6.15.27,8	729,0 728,5 728,3 728,4 728,4 728,4 728,5 729,1 729,3 729,3	+17,3 +18,3 +18,7 +18,9 +19,2 +19,1 +18,9 +17,7 +17,9 +17,8	+18,5 +21,0 +21,2 +21,4 +21,0 +21,0 +20,8 +20,7 +18,1 +17,9 +16,4 +15,4	+ 37,9 + 26,4 + 119,7 - 29,2 + 1.16,3 + 43,9 - 46,1 + 7,2 - 9,1 + 39,7 + 42,3 + 46,2	33,8 29,3 30,1 30,7 29,0 33,8 31,3 34,6 34,1 31,8
	Anonyme Lalande 40817 Lalande 40979 Piazzi, XXI, 22 Lalande 41180 Lalande 41800 Lalande 42125 Lalande 42125	20.51.48,32 20.57.16,74 21. 1. 6,69 21. 5.13,37 21. 6. 3,27 21.22.26,26 21.26.20,44 21.30.22,08	+ 0,04 + 0,04 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05	38	339.34.42,6 340.53.43,3 342.18.28,8 345.21.34,2 350.46.32,6 352.14.53,1 353.11. 6,4	729,1 729,3 729,3 729,3	+16,5 +16,3 +16,2 +16,2	+12,5 +12,5 +12,6 +12,1	+ 13,2 + 14,6 + 16,0 + 19,3 + 25,4 + 27,1 + 28,3	
	Weisse, XXII, 399.  Neptune  Lalande 44152  µ Gémeaux  ð Petite Ourse I  γ Gémeaux  α Grand Chien  Vénus, bord 2, centr.	21.58.21,71 22.19. 3,27 22.23. 1,86 22.28.47,94 22.39.38,76 6.14. 7,31 6.21.23,59 6.29.16,92 6.38.46,72 7.18. 7,42	+ 0,08 + 0,09 + 0,11 + 0,11 + 0,05 + 0,06 + 0,10 + 0,05	+ 17,38	11. 5.10,6 23.11.53,1 31.19.20,8 30.37, 2,3 349.43.10,1 278.55.43,0 355.46.46,5 28.47.31,3 351.40, 1,1	729,0 728,9 729,8 729,8 729,8	+15,0 +14,7 +16,0 +16,3 +16,7	+10,9 +10,7 +10,7 +15,0 +15,6 +15,8 +16,0	+ 55,5 +1.25,7 +1.59,8 +1.56,0 + 24,0 - 59,1 + 31,2 +1.45,4 + 26,1	32,5 28,6
24	Soleil, bord 1, sup.  a Petite Ourse I  Vierge	10.11.53,60 13. 6. 5,20 13.17.31,80	+ 0,06	+ 16,36	0.57.16,0 280.49.34,7 22.39.31,8	729,7 729,5 729,5	+18,4 +18,9 +19,0	+20,7 +20,9 +20,9	+ 37,4 - 54,2 +1.21,0	30,9 31,1

Le 23, Mire Sud-38p, 15. Mire Sud N.-5p, 01. Mire Nord B-6p, 83. Mire Nord C-32p, 96. Mire Nord D-62p, 58.

78

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENAE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	MÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	IÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
		h. m. s.	s.	5	0 / //	nım.	0	0	1 11	,,
	n Grande Ourse	13.41.51,10	+ 0,02	+ 16,36	322.14.17,7	729,5	+19,0	+20,9	- 3,6	31,5
ш	α Bouvier	14. 9. 3,70	+ 0,05	+ 16,63	352.19.40,9	729,4	+19,1	+20,7	+ 26,5	29,0
	α <sup>2</sup> Balance	14.42.49,78	+ 0,10	+ 16,46	27.41.36,5			+20,I	+1.39,0	35,1
	B Petite Ourse S	14.51.25,69	0,00	+ 16,35	297.32.20,5	729,5	+19,3	+20,0	- 29,3	28,4
1	Balance	15. 9.11,06	+ 0,09		21. 6.34,6			+19,7	+1.16,8	
	Lune, bord 1, sup.	15.15.34,44	+ 0,10	6 52	25.38. 8,9	729,5	+19,1	+19,7	+1.31,3	2
1	α Couronne	15.28.35,15	+ 0,05	+ 16,53	345. 4.24,9	729,5	+19,1	+16,5	+ 18,5	31,7
	γ Aigle	19.39.23,86	+ 0,07	+ 16,48	2. 2.37,6	730,3	+18,1	710,5	+ 39,5	33,2
1	α Aigle	19.48.12,81	+ 0,07	+ 16,44	3.49. 8,0				+ 42,2	31,7
	A Angle	19.40.12,01	+ 0,07	+ 10,44	6.15.27,8				<b>-</b> 2,3	31,7
	Anonyme	19.56.53,76	+ 0,03		324.27.26,0	730,4	+18,0	+16,1	- 1,6	
-	α Capricorne	20. 9.35,74	+ 0,10	+ 16,57	25.14.50,5	750,4	710,0	120,1	+1.31,1	30,6
1	α Capricorne	20. 9.59,60	+ 0,10	+ 16,48	25.14.59,5				11.0191	00,0
	Lalande 39106	20.14.44,59	+ 0,13	7 10,40	39.28. 5,7	730,4	+18,0	+16,1	+3. 0,4	
	Lalande 39704	20.27.51,39	+ 0,03		330.56. 3,1	730,2	+18,2	+15,6	+ 4,6	
1	α Cygne	20.36.36,73	+ 0,03	+ 16,60	327.33.33,0	,,-	,,-	,-	+ 1,4	30,3
	Anonyme 8+32°32'		+ 0.04		0-,,-				- 71	
1	Anonyme	20.51.47,20	+ 0,04		339.34.42,6			+15,4	+ 13,1	
	Anonyme	21. 1.25,26	+ 0,04		342.14.25,1			+15,4	+ 15,8	
1	Piazzi, XXI, 22	21. 5.12,21	+ 0,05		345.21.35,7	730,2	+17,7	+15,3	+ 19,1	
	Lalande 41180	21. 6. 2,15	+ 0,05			, ,			. 3	
	α Céphée	21.15.19,02	+ 0,01	+ 16,58	310.21.40,0	730,2	+17,7	+15,2	- 15,4	31,3
1	B Céphée	21.27. 3,57	0,00	+ 16,93	302.24.41,9				- 24,0	28,2
	Lalande 42125	21.30.20,86	+ 0,05		353.11. 9,5	730,2	+17,5	+15,2	+ 28,1	
	α Verseau	21.58.20,51	+ 0,08	+ 16,17	13.20.19,4	730,2	+16,9	+13,5	+ 59,5	32,9
1	Weisse, XXII, 399.		+ 0,08		11. 5. 9,8	730,2	+16,7	+12,9	+ 55,1	
	Neptune	22.22.54,42	+ 0,09		23.12.38,1				+1.25,2	
1	Lalande 44152	22.28.46,64	+ 0,11		31.19.20,6				+1.59,1	
	Lalande 44290	22.32.11,86	+ 0,11		32.15. 6,7				+2. 4,3	
H .	Lalande 44551	22.39.37,50	+ 0,11		30.37. 1,9	730,1	+16,3	+12,3	+1.55,5	
1	Vénus, bord 2, centr.		+ 0,05		351.45. 6,9	2			+ 26,2	20.7
	α² Gémeaux	7.25.13,78	+ 0,04	+ 15,90	340. 5.45,8	731,0	+17,3	+17,0	+ 13,6	38,4
	α Petit Chien	7.31.39,85	+ 0,07	+ 15,65	6.41.23,9	2	1 4		+ 46,7	29,9
	ß Gémeaux	7.36.20,19	+ 0,05	+ 15,57	343.55.17,0	731,0	+17,4	+17,2	+ 17,5	33,1
	α Hydre	9.20.25,75	+ 0,09	+ 15,63	20.17.47,2	730,6	+17,9	+19,6	+1.14,7	30,8
25	Soleil, bord 1, inf	10.15.32,88	+ 0,07		1.49 45,4	730,5	+18,4	+20,5	+ 38,7	
23	α Petite Ourse I	13. 6. 3,09	, 0,0/		3149 40,4	/00,0	, 20,4	120,0	1 50,7	
	y Aigle	19.39.22,62	+ 0,07	+ 15,25	2. 2.39,5	731,2	+17,8	+15,4	+ 39,7	35,4
	α Aigle	19.43.42,86	+ 0,07	+ 15,41	3.49. 7,7	10.113	, - ,,,	,,4	+ 42,4	33,8
	B Aigle			+ 15,23					+ 46,3	29,3
-	0.000	J.1-1-109	1-1	,,	4,5		,		, , , , ,	3,

Le 24, Mire Sud-389,27. Mire Sud N.-49,91. Mire Nord C-319,06. Niveau-49,06.

79
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

_					- meriateme					
JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		de la pendule.	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BAROUÊTRE.	THERM	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
6	α' Capricorne α' Capricorne α' Capricorne α Verseau Anonyme Weisse, XXII, 399. Neptune Lalande 44152 Lalande 44290 Lalande 44551 γ Taureau α Taureau Ματs, bord 2, centre α Cocher β Orion μ Gémeaux α Petite Ourse I γ Gémeaux α Grand Chien α' Gémeaux α Grand Chien α' Gémeaux α Grand Chien α Petite Ourse I γ Gémeaux γ Fetite Chien β Gémeaux α Grande Ourse I α Vierge η Grande Ourse I α Scorpion Lune, bord 1, sup α Scorpion Lune, bord 1, sup α Petite Ourse S Lalande 42125 α Verseau Anonyme Weisse, XXII, 399. Neptune Lalande 44152 Lalande 44290 g' Verseau g' Verseau	5. 5.49,41 5. 7,32,47 5.17. 1,09 5.47.15,55 6.14. 5,05 6.21.20,68 6.29.14,74 6.38.44,68 7.25.12,74 7.27.35,00 7.31.38,69 7.36.19,21 10.19.11,90 13. 6. 5,21 13.17.25,64 13.41.48,85 15.37. 5,40 16.20.25,43 16.55.56,28 17. 8. 1,49 18.21.19,60 21.30.18,30 21.58.18,09 22.14.21,74 22.18.59,65 22.22.39,46 22.28.44,08 22.32. 9,48	5. + 0,10 + 0,10 + 0,08 + 0,09 + 0,11 + 0,06 + 0,06 + 0,05 + 0,07 + 0,05 + 0,07 + 0,05 + 0,07 + 0,09 + 0,11 + 0,08 + 0,09 + 0,11 + 0,08 + 0,09 + 0,11 + 0,01 + 0,01	+ 15,38 + 15,15 + 14,57 + 14,57 + 15,00 + 14,51 + 14,57 + 14,63 + 14,57 + 14,63 + 14,57 + 14,63 + 14,57 + 14,57	25.15. 0,1  13.20.21,0 33.11.53,4 11. 5. 9,9 23.13. 7,4 31.19.16,6 32.15. 4,5 30.37. 2,1 357. 2.33,2 356. 6. 3,8 351.24.19,8 326.28.31,2 20.40. 0,8 343.49.59,7 4.55.28,3 349.43.14,3 278.55.43,3 355.46.48,3 28.47.31,4  351.50.45,2 6.41.26,4 343.55.17,2  1.38.45,7 22.39.29,8 322.14.16,3 5.23.26,3 38.21.17,1 30.17.55,7 357.43.46,5 285.43. 6,1 353.11.10,0 13.20.19,3 33.11.53,7 11. 5.10,7 23.13.45,6 31.19.15,5 32.15. 4,3 31.53.21,0	731,3 731,2 731,0 731,6 731,6 731,7 731,8 731,8 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,0 730,9 730,8 730,8 730,8 730,8 730,8 730,7 730,8 731,0	+17,6 +16,3 +15,3 +16,3 +16,3 +16,2 +15,5 +15,5 +15,7 +15,7 +16,5 +19,3 +19,3 +19,3 +19,3 +17,1 +17,1	+13,8 +11,8 +11,4 +11,4 +11,2 +8,7 +8,7 +10,6 +10,9 +12,7 +13,9 +13,9 +14,9 +15,7 +19,7 +20,6 +20,8 +20,4 +19,9 +18,8 +18,5 +16,8 +13,8 +12,6 +12,1	+1.32,0 +1.0,0 +2.10,7 +55,5 +1.25,8 +1.59,8 +2.5,1 +1.56,1 +33,7 +26,6 +0,4 +1.18,3 +17,8 +44,6 +24,1 -59,5 +31,4 +1.46,0 +26,4 +1.7,6 +38,6 -54,3 +1.21,2 -3,6 +44,0 +24,6 +47,0 +25,4 +47,0 +26,5 +47,0 +26,5 +47,0 +26,5 +47,0 +26,5 +47,0 +26,5 +47,0 +26,5 +47,0 +26,5 +47,0 +26,5 +47,0 +28,2 +59,8 +21,0,4 +55,4 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +12,5,7 +22,4,8 +	32,1 35,1 35,1 35,1 34,6 32,9 35,3 36,2 32,0 29,5 32,7 33,4 33,5 29,4 29,8 34,3 32,6 34,9 31,6 33,3

Le 25, Niveau-3P,48. d-23P,71. Nadir 146°6′36″,43. Le 26, Mire Sud-3gP,68. Mire Sud N.-5P,89. Mire Nord B-5P,73. Mire Nord D-61P,22.

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

IOURS	NOM	PASSAGE CONCLE		ECTION de	MOYEME DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	_	OWĖTRE	RÉFRACTION	LIEU du
Į.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	10N.	POLE.
	Lalande 44551 α³ Gémeaux Vénus, bord 2,centr. 3 Gémeaux	1. m. s. 22.39.35,14 7.25.11,42 7.32.19,22 7.36.18,07	5. + 0,11 + 0,04 + 0,05 + 0,05	+ 13,49	30.37. 0,4 340. 5.45,3 351.56.52,8 343.55.19,3	731,1 731,4 731,4	+15,7	+11,6 +16,8 +17,0	+1.55,9 + 13,6 + 26,4 + 17,6	3 <sub>7</sub> ,8 35,4
27	Soleil { bord 1 bord 2 a Petite Ourse I a Vierge grande Ourse a Scorpion a Hercule a Ophiuchus	10.22.50,00 10.24.59,76 13. 6. 4,28 13.17.28,52 13.41.47,79 16.20.24,49 17. 8. 0,26 17.27.10,14	+ 0,07 + 0,09 + 0,02 + 0,13 + 0,06 + 0,06	+ 13,11 + 13,12 + 13,09 + 12,77 + 12,86	280.49.35,0 22.39.29,9 322.14.16,2 38.21.18,c 357.43.44,6 359.37.16,7	729,5 728,8 728,8 729,2 729,4	+19,4 +20,8 +20,3 +20,3 +20,1	+24,0 +24,6 +24,4 +22,1 +20,2	- 53,6 +1.19,9 - 3,6 +2.44,9 + 33,1 + 35,8	30,9 28,3 29,6 31,9 32,7 26,2
	58 Ophiuchus Lune, bord 1, sup.  y Dragon Anonyme.  3 Petite Ourse S Anonyme  y Aigle  a Aigle	17.34.38,32 17.47. 7,32 17.53.20,62 18. 4.15,08 18.21.17,76 19.11.33,80 19.39.20,06 19.43.40,24	+ 0,11 + 0,11 + 0,02 + 0,11 + 0,02 + 0,07 + 0,07	+ 12,84 + 12,70 + 12,80	33.52.31,7 31.26.44,3 320.47.37,6 32. 2.59,5 285.43. 3,8 316.37.41,2 2. 2.36,1 3.49. 7,3	729,4 729,5 729,5 729,7 729,5	+19,8 +19,5 +19,3 +19,0 +18,8	+17,9 +17,9 +17,2 +16,3 +16,2	+2.11,4 +1.57,3 - 5,0 +2. 0,9 - 46,2 - 9,1 + 39,5 + 42,2	27,4 29,7 32,0 33,4
	A Aigle     Anonyme     α ' Capricorne     α ' Capricorne     α Grand Chien     α ' Gémeaux     Petit Chien     Vénus, bord 2, centr.	19.48. 9,15 19.56.49,90 20. 9.32,10 20. 9.56,02 6.38.42,52 7.25.10.40 7.31.36,51 7.37. 4,04	+ 0,07 + 0,03 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,04 + 0,07 + 0,05	+ 12,95 + 12,95 + 12,92 + 12,46 + 12,44 + 12,25	324.27.25,3 25.14.56,7 28.47.30,8 340. 5.44,7 6.41.22,4 352. 3.30,7	729,5 729,5 729,5 729,5	+18,8 +18,7 +18,0 +19,3	+15,6 +15,6 +19,1 +21,5	+ 46,1 - 1,6 +1.31,2 +1.44,1 + 13,3 + 45,9 + 26,1	27,9 27,3 36,8 27,7
28	Soleil, bord 1, inf.  2 Scorpion  Δ Hercule.  Δ Ophiuchus.  δ Petite Ourse S.  Lune, bord 1, sup.  Δ Cygne.  Piazzi, XXI, 1.  Δ Céphée	10.26.28,48 16.20.23,29 17. 7.59,21 17.28. 9,20 18.21.16,14 18.38.56,88 20.36.32,27 21. 2.29,31 21.15.14,45	+ 0,07 + 0,13 + 0,06 + 0,06 + 0,01 + 0,01 + 0,04 + 0,01	+ 11,91 + 11,74 + 11,93 + 12,22	2.52.43,4 38.21.17,4 357.43.45,0 359.37.14,5 285.43. 5,5 31.43.20,0 327.33.33,0 342.41.59,8 310.21.41,3	729,4 729,2 729,4 729,4 729,7 729,6 729,6	+20,3 +19,8 +19,7 +19,7 +18,7 +18,5 +18,3 +17,9	+19,8 +19,1 +17,5 +17,9 +16,4 +16,4 +14,5 +13,3	+ 40,2 +2.46,6 + 33,4 + 35,9 - 46,4 +1.59,6 + 4,4 + 16,4 - 15,5	33,c 33,4 34,2 31,3 31,4
	3 Géphée Lalande 42125	21.26.58,39 21.30.16,48	0,00	+ 11,81	302.24.40,1 353.11. 9,7	729,6 729,6		+13,9	- 24,1 + 28,1	27,7 35,4

Le 27, Mire Sud-409,11. Mire Sud N.-69,35.

81

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1849.

Jouns.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERM Inté-	ONÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
		Fil Méridien.	ment.	pendale.	pour le niveau.	£	rieur.	rieur.	0X.	POLE.
	Anonyme Weisse, XXII, 399. Neptune	h. m. s 22.14.19,79 22.18.57,71 22.22.25,16 7.25. 9,36 7.31.35,47 7.36.16,03 7.41.49,10	+ 0,11 + 0,08 + 0,09 + 0,04 + 0,07 + 0,05 + 0,05	+ 11,38 + 11,19 + 11,32	33.11.54,8 11. 5. 8,5 23.14.58,3 340. 5.44,1 6.41.25,3 343.55.15,8 352.10.46,8	729,4 729,3	+16,2	+11,7 +11,3 +15,9	+2.10,3 + 55,4 +1.25,7 + 13,6 + 46,7 + 17,6 + 26,7	36,4 31,5 31,8
	Soleil, bord r  A Petite Ourse I  Vierge  Grande Ourse  Bouvier  Couronne  Seerpent  Scorpion  Hercule  Ophiuchus  Sagittaire  Piazzi, XVII, 248.  Dragon  Lalande 33111	10.30. 6,54 13. 6. 3,25 13.17.26,32 13.41.45,35 14. 8.57,70 15.28.29,21 15.37. 1,98 16.20.22,09 17. 7.58,14 17.28. 8,06 17.38.16,67 17.42.31,10 17.53.18,72 17.56.49,98	+ 0,07 + 0,09 + 0,02 + 0,05 + 0,05 + 0,07 + 0,13 + 0,06 + 0,06 + 0,13 + 0,14 + 0,02 + 0,01	+ 10,93 + 10,72 + 10,70 + 10,69 + 10,73 + 10,69 + 10,81	280.49.37,8 22.39.30,2 322.14.19,2 352.19.45,5 345. 4.26,6 5.23.25,1 38.21.2c,2 357.43.44,5 359.37.15,3 40. 1.26,4 46.35.35,2 320.47.41,0 32. 1.55,0	728,3 728,1 728,0 727.9 727.7 727.7 727.7 727.7	+19,4 +19,4 +19,4 +19,5 +19,5 +19,5 +19,0 +19,0	+19,4 +19,6 +19,4 +19,5 +19,8 +19,0 +18,5 +17,7 +17,3	- 54,4 +1.21,2 - 3,6 + 26,5 + 48,5 + 43,9 +2.46,3 + 35,8 +3.5,2 +5.11,5 - 5,0 +2.0,8	32,2 30,0 32,2 33,3 33,3 33,0 35,5 32,8 34,9
	B. A. C. 6158 Anonyme δ Petite Ourse S π Sagittaire Anonyme Lune, bord 1, inf γ Aigle β Aigle β Aigle	18. 2.31,32 18. 4.13,22 18.21.15,22 18.32. 2,69 19. 1. 0,26 19. 7.19,56 19.10.32,47 19.31.12,50 19.39,18,08 19.43,38,20 19.48. 6,97	+ 0,11 + 0,04 + 0,11 + 0,11 + 0,11 + 0,11 + 0,07 + 0,07 + 0,07	+ 11,16 + 10,74 + 10,78 + 10,64	32. 2.56,4 285.43. 5,5 333.39.15,0 33.31.42,7 33.29. 0,5 33.25.56,3 31.35.22,0 2. 2.38,9 3.49. 7,1 6.15.29,5	727,9 728,0 728,2 728,3	+18,9 +18,6 +18,6 +18,5	+16,7 +17,2 +17,1 +15,9 +15,7 +15,4	+2. 1,0 - 46,2 + 7,2 +2.10,2 +2.10,0 +2. 9,7 +1.59,1 + 39,6 + 42,3 + 46,1	31,6 31,8 35,1 33,5 33,9
	Anonyme.  Anonyme &\(^47^051'\)  \[ \alpha^1\) Capricorne.  \[ \alpha^2\) Capricorne.  \[ \alpha\) Capricorne.	19.51,48,68 19.56,48,18 20. 9.29,84 20. 9.53,72 20.14,38,78 20.20,28,22 21.14,13,60 21.30,15,44	+ 0,07 + 0,03 + 0,03 + 0,10 + 0,10 + 0,13 + 0,11 + 0,01 + 0,05 + 0,08	† 10,70 † 10,63 † 11,22	323.30.24,0 25.15. 0,7 39.28.10,5 30.34.53,5 310.21.41,5 353.11. 6,7	728,4 728,2 728,3 728,2	+17,4	+14,2 +12,1 +11,6	- 2,5 +1.31,5 +3. 1,1 +1.54,2 - 15,6 + 28,3	32,2 33,2 35,0

Le 29, Mire Sud-39°, 05. Mire Sud N.-5°, 21. Mire Nord B-6°, 94. Mire Nord C-29°, 89. Mire Nord D-61°, 62.

# Observations faites à la lunette méridienne en Août, Septembre et Octobre 1849.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO	DUÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Anonyme Lalande 43804 Neptune Lalande 44152 Lalande 44290 g' Verseau Lalande 44551 a' Gémeaux	<b>22.39.31,</b> 96 <b>7.25: 8,</b> 30			33.20.32,0 32.28.42,4 23.15.34,2 31.19.18,7 32.15. 7,5 31.53.21,0 30.37. 0,7 340. 5.44,9 6.41.25,6	728,1 728,1 728,0 727,9		+10,5 +15,3	+2.11,2 +2.6,0 +1.25,7 +1.59,5 +2.4,8 +2.2,8 +1.55,9 + 13,6	37,2 31,8
30	A Petit Chien  B Gémeaux Vénus, bord 2,centr.  Soleil, bord 2	10.35.52,76	+ 0,07 + 0,05 + 0,05	+ 10,23	343.55.18,5 352.18.34,6	727,9			+ 46,7 + 17,5 + 26,8	34,3
	α Bouvier α <sup>2</sup> Balance	14. 8.56,70 14.42.43,06			352.19.45,8 27.41.34,5	726,5 726,3	+20,3 +20,1	+21,0	+ 26,3 +1.38,4	33,3 32,8
	Le 31 Août, les obse Le 21 Septembre, M	lire Sud-40P,	44. Mire	Sud N6	cause de répa ,40. Mire Noi p,44. Mire No	rd <i>B</i> –5P	,53. Mi	re Nord Mire I re Nord	C-29°,46 Nord D-5 C-26°,69	6. 9°,88.
	Le 28 » N				87. Mire Nord				Nord <i>D-</i> 5 57 <sup>p</sup> ,17.	01,22.
					rcle est placé à 3 <sub>P,</sub> 52. Mire No			no Novd	D 500 85	
	Le 3 Octobre, Mire	,	,						Niveau-	
					1. Mire Nord			Mire I Nord C-	Nord $D-6$	
	Le 6 » Mire	Sud-46P,58.	Mire Suc	1 N13P,8	4. Mire Nord	B-6P,03	B. Mire	Nord C		
					e tourillon orie vé ; il a été rep			é de 60,		
	α <sup>1</sup> Capricorne α <sup>2</sup> Capricorne α Cygne Anonyme Piazzi, XXI, 1	20. 9.21,54 20.35.57,84 20.51. 8,72	- 0,01 + 0,37 + 0,26		266.55.40,2 312.38.25,7 309.31. 3,8			1	1	<b>25,</b> 3

83
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1849.

Jouns.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERM Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	a Céphée	h. m. s. 21.14.39,88 21.30.22,94 21.57.43,19 22. 5.19,83 22.19. 9,19 22.38.57,57 22.56.50,34 0. 0.17,69 0. 5. 9,98	+ 0,67 + 0,16 + 0,05 + 0,05 + 0,07 + 0,19 + 0,13 + 0,23 + 0,13	5. - 20,70 - 20,99 - 21,20 - 20,94 - 21,06	298.33.50,9 278.52.43,9 337.22.19,5 281.14.12,7 302.41.35,5 294.19. 1,1 308.10.31,2 294.15.55,4	726,1 726,2 726,1 725,9 725,9 725,8	+13,0 +12,9 +12,2 +11,2 +10,8 +10,8	+ 7,5 + 7,1 + 7,1 + 7,1 + 6,8 + 7,9	- 29,2 -1. 0,6 + 11,2 - 55,8 - 24,3 - 34,8 - 18,1 - 34,7 + 54,7	27,7 24,8 27,9 23,3 27,3
	α Couronne α Scorpion	15.27.52,74 16.19.45,99	+ 0,22 - 0,07.	- 24,86 - 24,74	307. 8.27.9 253.51.47,8	730,7	+13,4 +13,7	+13,6 +13,7	- 19,0 -2.50,3	26,3 26,4
	Soleil, bord 1, sup.  a Ophiuchus  y Dragon  b Petite Ourse S  a Lyre  y Aigle  a Aigle  a Aigle  a Capricorne  a Capricorne  Lalande 39106  p Capricorne  Lalande 39704  a Cygne  Lalande 40197  Piazzi, XX, 367  Anonyme  Piazzi, XXI, 1  Lalande 41276	13.27.18,13 17.27.30,64 17.52.39,64 18.20.12,67 18.31.24,05 19.43. 0,60 19.47.29,55 20. 8.52,55 20. 9.16,34 20.14. 1,39 20.19.50,64 20.27. 7,58 20.35.52,79 20.41.44,86 20.46. 7,07 20.51. 3,40 21. 1.50,65 21. 8.16,00	+ 0,02 + 0,12 + 0,46 + 0,31 + 0,11 + 0,10 + 0,09 - 0,01 - 0,08 - 0,04 + 0,36 + 0,37 - 0,03 - 0,02 + 0,26 + 0,24 - 0,05	- 25,66 - 26,00 - 25,98 - 26,05 - 26,02 - 26,01 - 26,02 - 26,18 - 25,86	270.53. 0,8 292.35.45,5 331.25.19.7 6.29.54,5 318.33.46,9 290.10.26,0 288.23.55,4 285.57.35,5 266.58. 2,0 252.44.48,7 261.38. 5,1 321.17. 8,9 324.39.37,1 263.52.20,8 264. 5.22,3 312.38.23,4 309.31. 6,9 259.48.44,0	733,6 733,6 733,8 733,9 734,5 734,7 734,8	+13,4 +13,5 +13,5 +13,7 +13,6 +13,7 +13,4 +13,3	+14,8 +15,8 +15,4 +15,6 +14,6 +12,2 +11,8 +11,4 +11,1 +11,1 +11,0 +10,5 +10,6	-1.19,3 - 36,4 + 5,1 + 46,9 - 7,3 - 40,4 - 43,1 - 47,1 - 1.33,3 -3. 4,8 - 1.56,6 - 4,7 - 1,4 - 1.46,0 - 1.45,1 - 13,4 - 16,7 - 2.7,0	26,3 30,5 27,8 28,5 27,3 26,6 28,8 30,0
	a Céphée	21.14.34,45 21.26.17,61 21.30.17,88 21.57.37,99 22. 5.14,63 22.13.41,82 22.19. 3,85 22.24.41,69	+ 0,67 + 1,01 + 0,16 + 0,05 + 0,56 - 0,05 + 0,07 + 0,43	- 25,83 - 25,99 - 26,09	349.48.34,9 298.33.52,5 278.52.43,5 337.22.22,3 259. r. 5,8 281.14.17,5 329.25.24,7	735,3 735,7	+12,7	+10,6 +10,5	+ 24,6 - 29,3 -1. 0,7 + 11,2 -2.12,2 - 55,9 + 3,3	34,2

Le 13, Mire Sud-417, 16. Mire Sud N.-87,67. Mire Nord B-57,51. Mire Nord C-267,36. Mire Nord D-607,37. Le 16, Niveau-17,82.

Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1849.

SHOOF	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE		OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
1	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ME.	Inté-	Exté- rieur.	ION.	POLE.
	Lalande 44241 g¹ Verseau Lalande 44560 α Poisson austral α Pégase Lalande 45260 Lalande 46421 Lalande 46526	h. m. s. 22.30.35,70 22.35. 4,04 22.39. 6,70 22.48.54,58 22.56.51,30 23. 0.17,60 23.33.27,79 23.36.38,13	5. - 0,04 - 0,04 - 0,10 + 0,13 - 0,02 - 0,06 - 0,06	- 26,23 - 26,00	261.21.48,5 260.19.43,3 261. 4. 4,4 249.33.13,8 294.19. 3,2 264. 5. 1,3 255.30.36,9 255.36.47,4	735,9 736,0	+11,8 +11,7 +11,7	+ 9,6 + 9,4 + 9,2 + 9,0	-1.58,8 -2. 4,5 -2. 0,5 -3.51,4 -35,0 -1.45,8 -2.39,0 -2.38,0	30,8 26,2
	3 Sculpteur Lacaille 9695 α Andromède y Pégase Saturne, centre	23.40.40,05 23.53.13,39 0. 0.12,56 0. 5. 4,86 0.14.53,53	- 0,09 - 0,09 + 0,23 + 0,13 + 0,05	- 26,05 - 26,16	251. 0.11,9 250.24.22,2 308.10.32,9	736,0	+11,4	+ 9,2	-3.28,9 -3.37,8 - 18,3	28,2
	Anonyme α Cassiopée α Petite Ourse S Uranus, centre α Petite Ourse I	0.24.36,12 0.31.36,86 1. 5.19,16 1.30.21,67	- 0,05 + 0,54 + 0,10	- 25,71	261. 0. 0,4 335.37. 5,0 8.24. 5,1 288.45.51,5 11.23. 4,7	736,1 736,4 736,7 738,2	+11,3 +11,5 +11,7 +13,0	+ 8,9 + 7,5 + 7,4 +11,9	-2. 1,2 + 9,5 + 51,7 - 43,4 + 56,6	25,3 28,1 30,1
18	Soleil, bord 1, inf  7 Grande Ourse  A Hercule  Ophiuchus  Petite Ourse S  A Lyre  Aigle  Aigle  Aigle  Capricorne  **Capricorne  **Capricorne	17.52.38,90	+ 0,01 + 0,44 + 0,13 + 0,12 + 0,46 + 0,31 + 0,11 + 0,10 + 0,09 - 0,01 - 0,01	- 26,44 - 26,68 - 26,43 - 26,71 - 26,82 - 26,83 - 26,83 - 26,91 - 26,85 - 26,84	269.58.56,9 329.58.28,1 294.29.14,9 292.35.43,1 331.25.21,4 6.29.56,0 318.33.46,4 290.10.27,4 288.23.56,2 285.57.35,9 266.58. 2,5	738,1 738,1 737,5 737,3 737,2 737,1 737,1	+13,0 +13,0 +13,3 +13,5 +13,4 +13,4 +13,4 +13,3	+12,2 +12,2 +14,1 +14,4 +14,3 +14,1 +14,0 +11,1	-1.23,2 + 3,8 - 34,2 - 36,8 + 5,2 + 47,3 - 7,4 - 40,7 - 43,4 - 47,4 -1.33,7	28,9 26,2 23,6 32,5 29,7 28,0 28,4 27,2 28,9 30,1
	Lalande 39106  p Capricorne  Lalande 39704  a Cygne  Lalande 40197  Piazzi, XX, 367  Anonyme  Anonyme 8+29°37'  Piazzi, XXI, 1	20.14. 0,57 20.19.50,00 20.26. 6,76 20.35.52,07 20.41.43,98 20.46. 6,22 20.51. 2,74 20.59. 1,31	- 0,08 - 0,04 + 0,36 + 0,37 - 0,02 - 0,02 + 0,26 + 0,24	- 26,55	252.44.52,9 261.38.10,5 321.17.10,9 324.39.36,5 263.52.22,5 264. 5.21,5 312.38.26,7	737,5	+12,9	+10,8 +10,6 + 9,7	-3. 5,6 -1.57,2 - 4,7 - 1,4 -1.46,8 -1.45,9 - 13,5	29,7
	Lalande 41276 & Céphée	21. 8.15,20	- 0,05	- 26,66	039.02. 3,0					a delication of the second

Le 17, Niveau-19,61.

I.e 18, Mire Sud-43P, 14. Mire Sud N.-9P,82. Mire Nord B-3P,30. Mire Nord C-25P,57. Mire Nord D-58P,55 d-4P,80.

85
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE		ouètre	RÉFRACTION	LIEU du
s.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TINE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	HON.	POLE.
	Lalande 41647	b. m. s. 21.17.43,12	s. - 0,02	s	264. 2.46,3	<sub>тт.</sub>	- + 1 2, I	+ 9,5	-1.46,1	"
	B Céphée	21.26.17,03	+ 1,01	- 26,51						
1	5 Pégase	21.30.16,98	+ 0,16		298.33.51,3	737,6	+11,9	+ 8,9	- 29,5	
ı	Lalande 42513	21.41. 1,22	- 0,05		258.46.16,7	2		, 0	-2.14,8	
	Anonyme	21.46.46,82	- 0,05	- 26,86	258.49. 2,9 278.52.46,5	737,7	+11,7	+ 8,7	-2.14,5	
1	α Verseau ζ Céphée	21.57.57,21	+ 0,05 + 0,56	- 20,00	337.22.23,0			+ 8,7	+ 11,3	29,9
	Anonyme	22.13.41,05	- 0,05		259. 1. 8,5			T 0,7	-2.13,3	
	Lalande 43828	22.19. 3,15	+ 0,07		281.14.16,9				- 56,4	
1	7 α Lézard	22.24.40,93	+ 0,43		329.25.25,3		,		+ 3,3	ĺ
	Lalande 44241	22.30.34,70	- 0,04		261.21.51,4				-1.59,6	
Н	g ' Verseau	22.35. 3,10	- 0,04		260.19.42,3				-2. 5,4	}
I.	Lalande 44560	22.39. 5,86	- 0,04		261. 4. 6,2	737,8	+11,4	+ 8,5	-2. 1,3	
1	2 Poisson austral	22.48.53,79	- 0,10	- 27,01	249.33.16,3	0 0	0	+ 8,4	-3.52,9	32,0
1	α Pégase	22.56.50,34	+ 0,13	- 26,95	294.19. 3,9	737,8	+11,3	+ 8,4	- 35,2	26,7
	Lalande 45260	23. 0.16,78	- 0,02		264. 5. 4,7	-2-0		+ 8,3	-1.46,5 -2.39,9	
	Lalande 46421 Lalande 46526	23.33.27,11	- 0,06 - 0,06	1	255.30.37,3 255.36.49,6	737,8	+11,0	+ 8,1	-2.39,9	
1	& Sculpteur	23.40.39,23	- 0,00		251. 0.14,9			+ 7,8	-3.30,5	
l.	Lacaille 9695	23.53.12,49	- 0,09		250.24.26.2	737,8	+10,8	+ 7,4	-3.39,6	
	α Andromède		+ 0,23	- 26,72	308.10.32,7	7-7,0	1 , .	1 1774	- 18,5	27,7
1	y Pégase		+ 0,13	- 27,04	294.16. 0,1				- 35,4	27,7
	Saturne, centre		+ 0,05		278.40.44,1	737,8	+10,3	+.6,9	-1. 2,1	
	Anonyme		- 0,04		261. 0. 5.9				-2 3,0	
	α Cassiopée	0.31.35,96	+ 0,54	- 26,59	335.37.10.7	737.7	+ 9,8	+ 6,8	+ _9,6	30,8
1	a Petite Ourse S	1. 5.19,52			8.24. 5,4	737.7	+10,2	+ 6,2	+ 52,0	28,4
1	Uranus, centre	1.30.11,66	+ 0,10		288.45. 4,8	737,6	+10,2	+ 6,0	- 43,7	28,5
	α Grande Ourse Jupiter, centre	10.53.53,51	+ 0,69	- 26,97	342.27.42,6 286.59. 7,0	736,6 736,6	+11,3	+ 8,4	+ 16,6	20,3
	Vénus, bord 2, centr.		+ 0,10		283.38.23,1	736,4	+11,5	+ 9.7	- 51.6	
	α Petite Ourse I	13. 5.44,80	1 0,00		11.23. 3,3	735,7	+12,2	+10,4	+ 56,7	29,2
		0.44,00			3,0	70017	, , -	, , , , ,	,,,	3,
10	Soleil, bord 1, sup.	13.34.46,82	+ 0,02		270. 9.20,7	735,3	+12,3	+11,0	-1.22,7	
13	n Grande Ourse	13.41. 6,41	+ 0,44	- 27,29	329.58 27,0				+ 3,8	28,1
	α Hercule	17. 7.19,04	+ 0,13	- 27,44	294.29.16,2	733,7	+13,6	+12,6	- 34,2	28,6
	α Ophinchus	17.27.29,00	+ 0,12	- 27,27	292.35.42,9	733,5	+13,4	+12,7	- 36,8	23,5
	y Dragon	17.52.38,06	+ 0,46	- 27,52	331.25.20,1	733,4	+13,5	+12,7	+ 5,2	31,3
	& Petite Ourse S	18.20.10,49	1 . 2	0 - 50	6.29.55,3	733,2	+13,4	+12,5	+ 47,3	29,1
	Δ Lyre	18.31.22,45	+ 0,31	- 27,53	318.33.47,1	733,2	+13,4	+12,3	- 714	
	y Aigle	19.38.38,90	+ 0,11	- 27,58 - 27,57	290.10.26,5 288.23.54,5				- 43,2	27,9
1	β Aigle			- 27,60		732.0	+13.0	+11.2		30,0
P	D Aigie	1 -9-4/-2/193	1 0,19	2/,00	200.0 7.00,0	10219	1 -010	1 - 2 9 4	1 1/2"	

Le 19, Nivcau-11,48.

86
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1849.

		Observations								
JOURS.	NOM .	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-	ECTION de	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BARONÈTRE	THERMO	Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE.
1			ment.	pendule.	pour le micau.		rieur.	rieur.		
	α Capricorne α Capricorne Lalande 3 q 1 0 6	10. m. s. 20. 8.51,04 20. 9.14,90 20.13.59,69	- 0,01 - 0,01 - 0,08	- 27,50 - 27,59	266.58. 1,7 252.44.51,0	732,9	+13,0	+10,8	-1.33,2 -3. 4,7	29,9
	ρ Capricorne Lalande 39704 α Cygne	20.19.49,28 20.27. 5,62 20.35.51,09	- 0.04 + 0.36 + 0.37	- 27,51	261.38, 8,0 321.17.13,7 324.39.36,9 263.52.23,4	732,9	+12,8	+10,4 +10,2 +10,0	-1.56,6 - 4,7 - 1,4 -1.46,0	30,1
	Lalande 40197 Piazzi, XX, 367 Anonyme Anonyme	20.41.43,16 20.46. 5,30 20.51. 1,98 20.59. 0,50	- 0,02 - 0,02 + 0,26 + 0,24		264. 5.19,9 312.38.25,9 309.32. 6,9	2	1	+ 9,8	-1.45,1 - 13,4 - 16,7	
	Piazzi, XXI, 1	21. 1.49,07 21.14.32,44 21.26.16,05 21.30.16,12	+ 0,24 + 0,67 + 1,01 + 0,16	- 27,76 - 27,44	298.33.53,7	732,7	+11,9	+ 9,7	- 16,7	
	α Verseau	21.57.36,19	+ 0,05	- 27,88	278.52.44,9	732,6	+11,6	+ 8,9	-1. 0,8	28,7
20	α Ophiuchus δ Petite Ourse S	17.27.28,08 18.20. 9,86	+ 0,12	- 28,18	292.35.43,2	728,1	+13,1	+13,0	- 36,5	24,2
	α Lyre γ Aigle	18.31.21,53 19.38.38,02 19.42.58,04	+ 0,31	- 28,43 - 28,44 - 28,53	318.33.48,6 290.10.28,1 288.23.56,3	728,1	+13,1	+12,3	- 7,3 - 40,2 - 42,9	30,5 29,7 27,8
	α Aigle β Aigle α Capricorne	19.47.27,13	+ 0,10	- 28,38 - 28,38 - 28,45	285.57.35,5 266.58. 1,0	728,1 728,2	+12,9 +12,6	+11,0 +10,5	- 46,8 -1.32,8	29,2
	Lalande 39106  p Capricorne Lalande 39704	20. 9.14,02 20.13.58,89 20.19.48,34 20.27. 5,14	- 0,01 - 0,08 - 0,04 + 0,36	- 20,43	252.44.49,8 261.38. 9,7 321.17.11,5	728,2	+12,5	+10,7	-3. 3,5 -1.55,8 - 4,7	
	α Gygne Lalande 40197 Piazzi, XX, 367	20.35.50,43	† 0,37 - 0,02 - 0,02	- 28,14	324.39.38,7 263.52.22,0 264. 5.20,6			+10,7	- 1,4 -1.45,1 -1.44,3	31,9
	Anonyme	20.51. 1,12 21. 1.48,29 21.14.31,94	+ 0,26 + 0,24 + 0,67	- 28,21	312.38,28,2 309.31.10,0	728,3	+12,1	+10,4	- 13,3   - 16,5	
	Lalande 41647 5 Pégase Anonyme	21.30.15,32	- 0,02 + 0,16 - 0,05		264. 2.45,4 298.33.50,9 258.49. 1,8	728,2	+12,0	+10,2 +10,0 + 9,8	-1.44,5 - 29,0 -2.12,3	
	α Verseau ζ Géphée Anonyme	21.57.35,71 22. 5.11,67 22.13.39,52	+ 0,05 + 0,56 - 0,04	- 28,31	278.52.45,0 337.22.18,0 259. 1. 7,8 281.14.16,7	728,1	+12,0	+ 9,8	-1. 0,2 + 11,1 -2.11,2 - 55,6	29,5
	Lalande 43828 7 α Lézard	22.19. 1,93	+ 0,07		329.25.24,5	728,0	+11,6	+ 8,4	+ 3,2	
El .			· ·	1	1		E .	•	1	1

Le 20, Mire Sud-42°,25. Mire Sud N.-9°,04.

87

Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1849.

10URS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÉTRE	Inté-	ONÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE.
<b> </b>  _			ment.	pendule.	pour le micau.	-	rieur.	rieur.		
1		h. m. s	9	6.	0 1 11	mm.		0	1 11	"
22	Lalande 39704	20.27. 3,28	+ 0,36		321.17. 8,6	734,7	+13,7	+12,9	- 4,7	
	α Cygne	20.35.48,75	+ 0,37	- 29,76	324.39.38,3	734,7	+13,7	+12,7	- 1,4	31,4
}	Lalande 40197	20.41.40,72	- 0,02		263.52.22,8				-1.45,3	
	Piazzi, XX, 367	20.46. 3,15	- 0,02		264. 5.18,3	-27.0	1.2	1 /	-1.44,4	
	Anonyme Piazzi, XXI, t	20.58.57.89	+ 0,24		309.32.11,6	734,8	+13,7	+12,4	- 16,6 - 16,6	
	Lalande 41276	21. 8.12,06	+ 0,24		259.48.49,5			+12,4	-2.6,1	
	α Céphée	21.14.30,10	+ 0,67	- 29,97	341.51.38,4			+12,4	+ 15,7	33,3
	Lalande 41647	21.17.39,90	- 0,02	- 29,9/	264. 2.44,2	734,8	+13,6	+12,3	-1.44,7	33,3
	3 Céphée	21.26.13,31	1,01	- 30,00	349.48.32,9	/54,5	, -0,0	+12,3	+ 24,5	31,4
	5 Pégase	21.30.13,68	+ 0,16		298.33.54,2			+12,2	- 29,1	
	Lalande 42513	21.40.57,86	- 0,05		258.46.17,2			' '	-2.12,8	
	Anonyme	21.46.43,62	- 0,05		258.49. 4,1				-2.12,6	
	α Verseau	21.57.33,99	+ 0,05	- 30,04	278.52.45,0	735,1	+13,5	+11,6	<b>-1.</b> 0,3	29,4
	Lalande 43517	22.10. 3,18	- 0,05		258.57.53,7			+11,4	-2.11,8	
	Anonyme	22.14.46,30	- 0,05		258.52.30,4				-2.12,5	
	Lalande 43828	22.18.59,91	+ 0,07		281.14.21,4			+11,0	- 55,7	
	Lalande 43942	22.22.11,61	+ 0,07		281.12. 6,6				- 55,8	
	Lalande 44113	22.27. 0,20	- 0,04		261.21.26,9				-1.58,3	
F3 8	Lalande 44241	22.30.31,60	- 0,04		261.21.53,3				-1.58,2	
1	g ' Verseau	22.34.59,98	- 0,04		260.19.41,7	.25	2 .	0	-2. 3,9	
	Lalande 44560  a Poisson austral	22.39. 2,72	- 0,04	2-22	261. 4. 8,2	735,2	+13,0	+10,8	-1.59,8 -3.50,1	35,2
4	α Pégase	22.48.50,41	- 0,10	- 30,33 - 30,11	249.33.16,2 294.19. 5,7	735,4	1,00	+10,6	-34.8	28,7
	Lalande 45260	23. 0.13,54	+ 0,13	4 30,11	264. 5. 4,9	733,4	+12,9	+10,5	-1.45,3	20,7
	Lalande 46421	23.33.23,97	- 0,02		255.30.34,9	735,6	+12,7	+10,2	-2.38,2	
	Lalande 46526	23.36.34,10	- 0,06		255.36.50,4	1001.5	1-27/	, _ 0, _	-2.37,2	
	& Sculpteur	23.40.36,07	- 0,00		251. 0.18,0			+10,2	-3.27,9	
	Lacaille 9695	23.53. 9,15	- 0,00		250.24.25,7	735,5	+12,0	+10,3	-3.36,7	
	α Andromède	0. 0. 8,69	+ 0,23	- 29,89	308.10.36,9				- 18,2	31,7
	γ Pégase	0. 5. 0,94	+ 0,13	- 30,06	294.16. 5,8	735,5	+12,0	+ 9,6	- 35,0	32,5
	Saturne, centre	0.13.34,44	+ 0,05		278.34.42,0			+ 9,5	-r. 1,5	
	Anonyme	0.24.31,90	- 0,04		261. 0. 7,2	735,5	+11,8	+ 9,4	-2. 1,5	
	α Cassiopée	0.31.32,76	+ 0,54	- 29,87	335.37.13,8	735,5	+11,8	+ 9,4	+ 9,4	32,6
	α Petite Ourse S	1. 5.16,41			8.24. 7,2	735,2	+11,9	+ 9,0	+ 51,3	27,9
	Uranus, centre	1.29.31,76	+ 0,11		288.41.31,0	735,5	+11,6	+ 9,0	- 43,2	
2	Carraina	-F		2.6/	-E2 E- E- C	-26.2	1.22	12/5	-2.51,4	. 0 .
	α Scorpion	16.19.40,05	- 0,07	- 30,64 - 30,79	253.51,51,6 294.29.14,8	736,3 736,1	+13,3	+14,0	-2.31,4 $-34,1$	28,7
5 1	α Hercule	17. 7.15,74	+ 0,13	- 30,79 - 30,64	294.29.14,0	736,2	+14,5	+14,3	- 36,7	27,8
	α Ophiuchus y Dragon	17.52.34,60	+ 0,12	- 30,86	331.25.19.8	736,2	+13,5	+14,2	+ 5,2	25,9
	Petite Ourse S		T 0,40	- 30,00	6.29.55,9	736,3	+13,7	+14,0	+ 47,2	30,0
	o reduce Ourses	10.20. 5,15	l		0.29.55,9	700,0	T.107/	714,0	T 4/22	30,0

Le 22, Mire Sud-439,78. Mire Sud N.-11P,89. Mire Nord B-3P,53. Mire Nord D-57P,83. Niveau-op,95.

88

## Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1849.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	DUÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	laté- rieur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
-		h. m. s.	s.	4	0 1 11	111.111.	o	0	1 /1	"
1	α Lyre	18.31.19,03	+ 0,31	- 30,86	318.33.46,0	736,3	+13,6	+13,8	- 7,4	28,1
	π Sagittaire	19. 0.18,02	- 0,05		258.41.22,0	736,4	+13,6	+13,3	-2.13,0	
	o' Sagittaire	19.12.25,90	- 0,04		261.49. 0,5	736,4	+13,6	+13,2	-1.55,1	
	Lune, bord 1, inf	19.39. 9,00	- 0,04		260.34. 0,8				-2. 2,0	
	α Aigle	19.42.55,70	+ 0,10	- 30,82	288.23.55,4	736,6	+13,5	+12,4	- 43,2	26,7
	3 Aigle	19.47.24,61	+ 0,09	- 30,85	285.57.36,9				- 47,1	30,4
	α · Capricorne	20. 8.47,54	- 0,01	- 30,93						
1	α Capricorne	20. 9.11,44	- 0,01	- 30,98	266.55.45,2	736,8	+13,4	+11,2	-1.33,7	30,1
1	Lalande 39116	20.13.59,39	- 0,04		261. 7.29,5				-1.59,6	
1	π Capricorne	20.18.11,68	- 0,04	2 00	261.14.33,3			+11,1	-1.59,0	33,8
	α Cygne	20.35.47,81	+ 0,37	- 30,68	324.39.40,8				- 1,4	33,8
H	Anonyme	20.43.15,26	- 0,04		260.38.28,6			12	-2. 2,1	
	Lalande 40386	20.46.41,00	- 0,04		260.47.35,5			+11,3	-2. 1,4	
1	Anonyme	20.52.23,56	- 0,04		260.26.29,4				-2. 3,4 - 16,2	
	Anonyme	21. 0.36,77	+ 0,24		309.58.47,0				/	
1	Piazzi, XXI, 22	21. 4.23,91	+ 0,22		308.51.37,0				- 19,6	
	Lalande 41276	21. 8.11,18	- 0,05	- 30,73	259.48.54,4				-2. 7,1 + 15,8	34,3
	α Céphée	21.14.29,30	+ 0,67	- 30,73	341.51.39,5 264. 2.45,2			+10,8	-1.45,5	34,5
1	Lalande 41647		- 0,02	- 30,87	349.48.36,8			710,0	+ 24,7	35,3
	3 Céphée	21.26.12,39	+ 1,01	- 30,07	300.17. 4,9	736,8	+12,7	+10,0	T 241/ → 27,3	00,0
	Anonyme	21.30.27,82	- 0,05		258.46.15,5	100,0	T1-9/	+ 9,7	-2.14,2	
li .	Lalande 42513	21.46.42,88	- 0,05		258.49. 4,5			T 91/	-2.13,9	
1	Anonyme	21.50.27,54	- 0,05		259.13.31,5				-2.11,3	
ł	x Verseau		+ 0,05	- 30,97	278.52.44,0				-1. 1,0	27,8
H	Lalande 43381	22. 6.18,24	- 0,05	- 30,97	259.18.22,8				-2.10,9	-/,-
1	Lalande 43517		- 0,05		258.57.55,4	736,8	+12,4	+ 9,6	-2.13,0	
1	Anonyme		- 0,05		258.52.31,7	7.0,0	1 7-4	, 3,3	-2.13,6	
	Lalande 43804	22.18.30,00	- 0,05		259.44.14,2				-2. 8,0	
	Lalande 43942	22.22.10,79	+ 0,07		281.12. 8,7				- 56,2	
	Lalande 44113		- 0,04		261.21.25,9				-1.59,1	
	Lalande 44241	22.30.30,60	- 0,04		261.21.52,7				-1.59,1	
	g' Verseau		- 0,04		260.19.41,5				-2. 4,8	
	Lalande 44560		- 0,04		261. 4.12,8	736,7	+12,1	+ 9,4	-2. 0,7	
	α Poisson austral		- 0,10	- 31,12	249.33.16,2	, ,		+ 9,5	-3.51,6	35,9
	α Pégase	22.56.46,38	+ 0,13	- 30,86	294.19. 2,9	736,8	+11,9	+ 9,7	- 35,0	30,1
	Lalande 45260	23. 0.12,66	- 0,02		264. 5. 4,6	736,8	+11,9	+ 9,6	-1.45,8	
	Lalande 46421	23.33.22,97	- 0,06		255.30.36,0	737,0	+11,9	+ 9,1	-2.39,1	
	Lalande 46525	23.36.29,71	- 0,06		253.28. 3,1				-2.59,0	
	& Sculpteur	23.40.34,97	- 0,09		251. 0.18,4			+ 8,6	-3.29,5	
	Lacaille 9695	23.53. 8,39	- 0,09		250.24.27,0	736,9	+11,2	+ 7,7	-3.39, r	
	α Andromède		+ 0,23	- 30,79	308.10.35,7		1	1	- 18,4	30,1

Le 23, Mire Sud-43P, 14. Mire Sud N.-10r, 41. Mire Nord B-3P, 48. Mire Nord C-26P, 79. Mire Nord D-58P, 79

Niveau-1P, 30. d-4P, 93.

89
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre et Novembre 1849.

10URS	NOM	PASSAGE CONCLU	CORI	RECTION de	MOYEXXE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	TOERM	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
s.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	y Pégase Saturne, centre α Petite Ourse S	6. 5. 0,04 0. 3.19,17 1. 5.15,91	+ 0,13	- 30,96	294.16. 5,9 278.33 20,3 8.24. 7,9	736,9 737,0 737,0	+11,2 +12,0 +11,4	+ 7,4 + 7,2 + 7,6	- 35,3 -1. 2,2 + 51,7	32,3
30	α Ophinchus γ Aigle α Aigle α Tapricorne α Capricorne Lalande 39116 π Capricorne	17.27.20,88 19.38.30,74 19.42.50,90 19.47.19,69 20. 8.42,76 20. 9. 6,60 20.13.54,48 20.18. 6,70	+ 0,11 + 0,10 + 0,09 + 0,01 + 0,01 - 0,05 - 0,05	- 35,26 - 35,56 - 35,51 - 35,66 - 35,57 - 35,68	292.35.41,3 290.10.26,0 288.23.55,2 285.57.34,4 266.58. 2,4 261. 7.29,8 261.14.33,1	730,6 729,9 729,9	+11,0 +11,0 +11,0	+ 8,7 + 8,4 + 8,1	- 37,0 - 40,7 - 43,4 - 47,3 -1.33,7 -1.59,8 -1.59,2	22,9 27,6 26,7 28,1 30,5
	a Cygne δ Petite Ourse S γ Aigle α Aigle β Aigle	20.35.42,89 18.19.57,43 19.38.30,10 19.42.50,22 19.47.19,13	+ 0,31	- 35,47 - 36,18 - 36,17 - 36,20	324.39.38,7 6.29.57,1 290.10.26,6 288.23.55,3 285.57.35,3	729,8	+10,9	+ 8,0 + 8,3 + 7,6	+ 47,2 - 40,4 - 43,0 - 46,9	31,6 32,4 28,6 27,3 29,4
	γ Dragon δ Petite Ourse S α Lyre α Aigle α * Capricorne α * Capricorne Lalande 39116	17.52.28,54 18.19.57,21 18.31.12,85 19.47.18,37 20. 8.41,54 20. 9. 5,30 20.13.53,14	+ 0,39   + 0,26   + 0,08   + 0,01   + 0,01   - 0,02	- 36,74 - 36,89 - 36,93 - 36,76 - 36,94	331.25.16,6 6.29.55,0 318.33.45,8 285.57.37,3 266.58. 4,7	721,7 721,8 721,9 722,2 722,3	+10,5 +10,4 +10,4 + 9,4 + 8,9	+ 8,7 + 8,0 + 7,8 + 6,4 + 5,5	+ 5,2 + 47,3 - 7,4 - 47,2 -1.33,7	30,1 30,5 29,1 31,2 33,0
	π Capricorne  α Cygne  Anonyme Lalande 40386  Anonyme Piazzi, XXI, 22 α Céphée	20.18. 5,46 20.35.41,63 20.43. 9,00 20.46.34,70 21. 0.30,65 21. 4.17,77 21.14.23,02	- 0,02 + 0,31 - 0,02 - 0,02 + 0,20 + 0,19	- 36,65 - 36,74	261.14.34,5 324.39.39,9 260.38.26,9 260.47.37,0 309.58.48,5 306.51.38,0	722,2 722,3 722,4	+ 8,1 + 8,1 + 7,7	+ 5,5 + 5,2 + 5,1 + 4,5 + 4,6	-1.59,1 -1.59,1 -1.4 -2. 2,5 -2. 1,7 -16,3 -19,7	32,9
	α Verseau α Pégase α Andromède α Cassiopée α Petite Ourse S	21.14.23,02 21.57.27,01 22.56.40,38 0. 0. 1,75 0.31.25,68 1. 5.12,27	+ 0,56 + 0,06 + 0,12 + 0,19 + 0,45	- 36,85 - 36,85 - 36,77 - 36,61 - 36,86	278.52.46,4 294.19. 4,5 308.10.34,5 335.37.14,9 8.24.11,2	722,6 722,8 723,2 723,2 723,2	+ 7,5 + 8,3 + 8,6 + 8,5 + 8,3	+ 4,4 + 3,7 + 3,4 + 3,5 + 4,0	-1. 0,7 - 35,1 - 18,4 + 9,5 + 51,4	30,8 27,0 28,0 31,3 28,4
3	y Grande Ourse Vénus, bord 2,centr.		+ 0,42	- 36,86	324.26. 3,3 276. 5.49,6	717,5	+ 9.7	+10,1	+ 8,0 -1. 4,8	30,8

Le 1, Mire Sud-420,71. Mire Sud N.-90,76.

## Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1849.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	MÉTRE	RÉFRACTION	LIEU
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÊTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
	α Petite Ourse I α Vierge Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup> η Grande Ourse	h. m. s. 13. 5.32,18 13.16.36,98 13.33.12,09 13.40.55,19	+ 0,02 + 0,03 + 0,37	- 38,5 <sub>7</sub> - 38, <sub>7</sub> 0	11.23. 0,2 269.23.27,5 272.14.50,9 329.58.22,6	717,7 717,8 717,8	+10,7	+12,6 +13,7 +15,0 +15,9	+ 54,9 -1.31,9 -1 13,7 + 3,6	30,2 26,7 28,7
4	Soleil, bord 1, inf. Piazzi, XXI, 22	14.36.19,14 21. 4.15,73 21.14.20,52 21.26. 3,59 21.57,24,93 22.56.38,20	0,00 + 0,19 + 0,56 + 0,80 + 0,06 + 0,12	- 39,11 - 39,16 - 38,89 - 38,92	264.13.34,1 306.51.32,5 341.51.39,7 349.48.37,4 278.52.42,7	717,3 715,8 715,7 715,6	+11,0 +11,0 +11,0 +11,0	+16,0 +11,1 +10,8 +10,7 +10,3	-1.40,2 - 19,0 + 15,4 + 24,0 - 59,1	33,2 33,9 28,8
	Lalande 45311 Andromede y Pégase	23. 1.16,22 23.59.59,55 0. 4.51,62	0,00 + 0,19 + 0,12	- 38,99 - 39,32	264.36.43,5 308.10.33,4 294.16. 1,5	715,5	+10,5	+ 8,0	-1.41,1 - 18,0 - 34,4	27,0 28,3
6	β Lion y Grande Ourse α Petite Ourse I	11.40.41,50 11.45.10,93 13. 5.27,58	+ 0,12	- 40,55 - 40,67	295.19.42,6 334.26. 1,6	736,2	+ 9,6	+ 6,9	- 33,9 + 8,4	23,5 30,4
	Vénus, bord 2, centr.	13. 5.47,93 13.16.34,94	+ 0,04	- 40,65	274.40.44,8 269.33.32,1	736,8 736,8	+10,2 +10,2	+10,4	-1.10,5 -1.24,9	28,6
7	Soleil, bord 1, sup. δ Petite Ourse S α Lyre γ Aigle α Aigle β Aigle α Capricorne α 2 Capricorne	14.48.13,38 18.19.49,87 18.31. 8,65 19.38.25,24 19.42.45,46 19.47.14,45 20. 8.37,48	0,00 + 0,26 + 0,10 + 0,09 + 0,08 + 0,01 + 0,01	- 40,96 - 40,94 - 40,83 - 40,78 - 40,73 - 40,76	263.51.38,4 6.29.53,8 318.33.44,7 290.10.25,3 288.23.55,3 285.57.33,8 266.58. 1,7	736,7 736,9 737,3 737,3	+10,7 +10,6 +10,6 +10,6	+10,2 +10,3 +10,3 + 9,8 + 9,7 + 9,2	-1.46,6 + 47,9 - 7,5 - 40,9 - 43,6 - 47,6 -1.34,4	31,0 28,8 27,3 27,1 27,7 29,5
	Lalande 39116 π Capricorne α Cygne Anonyme Lalande 40386 Anonyme.	20.13.49,20 20.18. 1,34 20.35.37,37 20.43. 4,94 20.46.30,56 20.52.12,90	- 0,02 - 0,02 + 0,31 - 0,02 - 0,02 - 0,02	- 40,78	261. 7.27,3 261.14.31,1 324.39.38,2 260.38.23,2 260.47.36,0 260.26.29,9	737,5 737,6	+10,4	+ 9,2 + 9,0 + 8,6	-2. 0,6 -2. 0,0 - 1,4 -2. 3,6 -2. 3,0 -2. 6,2	31,3
	Anonyme.  α Céphée  α Verseau.  Lalande 43381  Lalande 43517  Anonyme  Lalande 43804	21. 0.26,41 21.14.18,58 21.57.22,83 22. 6. 7,84 22. 9.51,81 22.14.26,26	+ 0,02 + 0,56 + 0,06 - 0,03 - 0,03 - 0,03 - 0,03	- 40,93 - 40,95	278.52.47,7 259.18.22,3 258.57.56,3 259. 1. 5,5 259.44.15,4	737,8 738,1	+ 9,8	+ 7,9 + 7,8 + 6,3 + 5,9	-1. 1,8 -2.12,9 -2.15,1 -2.14,7 -2.10,2	31,3

Le 7, Mire Sud-43°,60. Mire Sud N.-11P,10. Mire Nord B-2P,68. Mire Nord C-25P,22. Mire Nord D-57P,22.

Niveau-1P,90. d-8P,78.

94
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1849.

_										
JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	_	ONÈTRE	RÉFRACTION	LIEU da
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	RE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	10N.	POLE.
		h. m. s	å.	8.	a 1 11	mia.	0	0	1 11	"
	Lalande 43942	22.12. 0,53	+ 0,07		281.12. 4,5			+ 5,9	- 57,1	
	Lalande 44113	22.26.48,93	- 0,02		261.21.24,5				-2. 1,0	1
	Lalande 44241	22.30.20,30	- 0,02		261.21.50,2			1	-2, 1,0	
	g' Verseau	22.34.48,58	- 0,02		260.19.43,4	0			-2. 6,9	
	Lalande 44528	22.37.45,30	- 0,02		260.51.55,2	738,2	+ 8,6	+ 5,4	-2. 3,9	
	& Verseau	22.45.59,26	- 0,01		263.19.13,2				-1.51,2	000
	α Poisson austral	22.48.39,12	- 0,05	- 41,36	249.33.17,8			+ 5,2	-3.55,8	33,3
	α l'égase	22.56.36,08	+ 0,12	- 41,01	01.00 10.0	20 6			1 PP 30	
	Lalande 45311	23. 1.14,06	0,00		264.36.46,8	738,5	+ 8,4	+ 5,0	-1.45,5	
	Lalande 46421	23.33.12,57	- 0,03		255.30.35,1	738,5	+ 8,1	+ 4,6	-2.42,1	
	Lalande 46525	23.36.19,41	- 0,04		253.27.57,8			1/0	-3. 0,2	
	o Sculpteur	23.40.24,82	- 0,06		251. 0.17,4	738,5	1	+ 4,8	-3.33,0	
	Lacaille 9695	23.52.57,89 23.59.57,63	- 0,06	/ . 00	250.24.23,6 308.10,36,3	730,3	+ 7,9	+ 4,9	-3.42,0 - 18,7	200
	y Pégase	0. 4.49,74	+ 0,19	- 40,88 - 41,18	294.16. 4,0				- 10,7 - 35,8	29,0
	Saturne, centre	0.10. 3,74	+ 0,12	- 41,10	278.15.43,3	738,5	+ 7,6	+ 4,5	-1.3,6	2914
	Anonyme	0.24.21,04	- 0,03		261. 0. 4,8	738,5	+ 7,2	+ 3,7	-2. 3,9	
	α Cassiopée	0.31.21,86	+ 0,45	- 40,62	335.37.16,5	738,5	+ 7,2	+ 3,6	+ 9,7	31,7
	α Petite Ourse S	1. 5. 1,75	1 0440	- 40,02	8.24.12,7	738,7	+ 7,7	+ 4,2	+ 52,5	28,8
	Uranus, centre	1.26.59,60	+ 0,00		288.27.50,0	738,8	+ 7,9	+ 4,0	- 44,5	20,0
	54 φ Andromède	1.33.37,07	+ 0,38		329.50.14,7	100,0	פיז ו		+ 3,8	
1	¿ Sculpteur	1.37.55,97	- 0,04		254. 9. 2,5			+ 3,2	-2.56,1	
	3 Lion	11.40 40,76	+ 0,12	- 41,32	295.19.42,5	740,5	+ 8,2	+ 3,5	- 34,5	23,0
1	y Grande Ourse	11.45. 9,93	+ 0,42	- 41,71	334.26. 2,7			+ 3,7	+ 8,5	31,9
	A Petite Ourse I	13. 5.24,69			11.22.56,5	740,7	+ 8,8	+ 8,2	+ 57,6	30,7
	Vénus, bord 2, centr.	13.10.23,39	+ 0,04		274.12.31,5			+ 8,4	-1.12,6	
	α Vierge	13.16.34,12	+ 0.02	- 41,49	269.33.35,0	740,6	+ 8,9	+ 8,4	-1.26,1	30,4
	∝ Bouvier	14. 8. 5,16	+ 0,14	- 41,47	299.53. 1,5	740,4	+ 9,5	+ 8,4	- 28,1	23,6
R	Soleil, bord 1, inf.	14.52.13,20	- 0,01		263. 1.52,7	740,1	+ 9,8	+ 8,7	-1.51,5	
0	& Petite Ourse S	18.19.49,99	0,01		6.29.53,9	739,5	+10,1	+10,8	+ 48,0	31,5
	α Lyre	18.31. 7,91	+ 0,26	- 41,69	318.33.43,5	730,5	+10,2	+10,7	- 7,5	27,8
	π Sagittaire	19. 0. 6,84	- 0,03	4-159	258.41.23,2	739,4	+10,2	+10,6	-2.14,8	7,5
	y Aigle	19.38.24,42	+ 0,10	- 41,74	290.10.25,8	7-314	, , -	, , .	- 41,0	27,8
	α Aigle	19.42.44,62	+ 0,00	- 41,65	288.23.55,5	739,4	+10,3	+10,2	- 43,7	27,3
	3 Aigle	19.47.13,57	+ 0,08	- 41,64	285.57.34,0	1 311	,-	' '	- 47,7	27,9
	a' Capricorne	20. 8.36,55	+ 0,01	- 41,63	, ,,				-7-7	, .5
	2 Capricorne	20. 9. 0,50	+ 0,01	- 41,64	266.55.45,1	739,5	+10,3	+ 9,8	-1.34,6	29,8
	Lalande 39116	20.13.48,30	- 0,02		261. 7.30,2			0.	-2. 0,8	
H	π Capricorne	20.18. 0,60	- 0,02		261.14.32,2	739,5	+10,2	+ 9,2	-2. o,3	
	α Cygne	20.35.36,57	+ 0,31	- 41,56	324.39.35,8	739,5	+10,1	+ 9,6	- 1,4	30,0
Į.	Anonyme	20.43. 4,26	- 0,02		260.38.24,3			+ 9,2	-2. 3,6	
										,

92

## Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1849.

JOURS.		PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE des verniers	BAROMÈTRE	THERM	OHETRE	RÉFRACTION	LIEU da
1	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Lalande 40386	h. m. s. 20.46.29.88	s. - 0,02	\$	260.47.36,4	8000718.	υ	0	-2, 2,8	"
1	Lalande 40529	20.49.48,56	- 0,02		260.27.10,2				-2. 4,7	
	Anonyme	20.52.12,16	- 0,02		260.26.30,5	739,7	+10,1	+ 9,2	-2. 4.8	1
	Anonyme		+ 0,20		309.58.43,2	7591/	1.0,1	+ 9,2	- 16,4	
li .	Lalande 41180	21. 5. 2,67	+ 0,19		306.48.55,6			1 97-	- 19,9	
	α Céphée	21.14.17,80	+ 0,56	- 41,66	341.51.36,3	739,7	+10,0	+ 8,0	+ 16,1	30,3
	3 Céphée	21.26. 0,91	+ 0,80	- 41,60	349.48.33,5	739,7	+ 9.9	+ 8,5	+ 25,0	30,7
1	Lalande 42700	21.46.33,04	- 0,03	4.0,2.0	258. 6. 0,1	739,7	+ 9.7	+ 7.4	-2.20,5	'4
1	Piazzi, XXI, 343	21.49.38,50	- 0,03		258. 5.58,9	1 311	, 37	+ 7,4	-2.20,8	
1	α Verseau	21.57.22,01	+ 0,06	- 41,85	278.52.43,8	739,7	+ 9,5	+ 7,4	-1. 1,7	27,5
1	Lalande 43381		- 0,03		259.18.22,3	, 5.7		. , , .	-2-12,6	
1	Lalande 43517	22. 9.51.40	- 0,03		258.57.54,8				-2.14,9	
	Anonyme	22.14.34,38	- 0,03		258.52.32,3				-2.15,6	-
	Lalande 43804	22.18.19,12	- 0,03		259.44.18,6				-2.10,3	1
1	Lalande 43942	22.21.59,73	+ 0,07		281.12. 5,2			+ 6,1	- 57,2	
I	Lalande 44113	22.26.48,08	- 0,02		261.21.25,5			+ 6,0	-2. 1,2	1
1	Lalande 44241	22.30.19,86	- 0,02		261.21.54,2				-2. 1,2	
	g ' Verseau		- 0,02		260.19.40,7				-2. 7,0	ì
	Lalande 44528		- 0,02		260.51.56,8	739,7	+ 8,7	+ 5,8	-2. 3,9	
1	& Verseau	22.45.58,46	- 0,01		263.19.16,1			+ 5,7	-1.51,3	2
	α Poisson austral	22.48.38,55	- 0,06	- 41,92	249.33.17,3			. 10 10	-3.56,0	32,7
1	α Pégase	22.56.35,32	+ 0,12	41,75	294.19. 2,0	2 0	. 0	+ 5,5	35,7	33,8
1	Lalande 45311		0,00		264.36.49,8	739,6	+ 8,2	+ 5,3	-1.45,6	
Į.	Lalande 46421		- 0,03		255.30.36,1	739,7	+ 8,1	+ 5,0	-2.42,1	
	Lalande 46525		- 0,04		253.27.59,5	-2	1 = 0	1/2	-3. 1,5 -3.33,3	
1	& Sculpteur		- 0,06		251. 0.18,8	739,7	+ 7.9	+ 4.9	-3.42,6	
1	Lacaille 9695		- 0,06	/	250.24.25,8 308.10.36,0	739,7	+ 7,0	+ 4,0	- 18,7	28,6
1	y Pégase	9 . 7	+ 0,19	$\begin{vmatrix} -41,79 \\ -42,07 \end{vmatrix}$	294.16. 3,5				- 35,9	28,8
	Saturne, centre		+ 0,12	- 42,07	278.14.45,7	739,6	+ 7,3	+ 4,5	-1. 3,7	20,0
	Anonyme	0.24.20,16	- 0,03		261. 0. 6.2	739,5	+ 7,I	+ 4,2	-2. 3,8	
	α Cassiopée·····		+ 0,45	- 41,58	335.37.17,0	739,5	+ 7,1	+ 4,1	+ 9,7	32,0
	α Petite Ourse S		7 0,43	41,30	8.24.15,3	739,5	+ 7,6	+ 3,8	+ 52,6	31,1
	49 A Andromède	1.20.26,80	+ 0,32		326. 8.23,6	1-3,0	1 / / / /	, -,-	.0,0	
	Uranus, centre	1.26.50,43	+ 0,09		288.27- 7,7			+ 3,7	- 44,6	
	54 φ Andromède	1.33.36,43	+ 0,38		329.50.18,0				+ .3,8	
	E Sculpteur		- 0,04		254. 9. 3,7				-2.55,9	
	Lacaille 541		- 0.07		248.19.37,4	739,3	+ 7,0	+ 3,5	-4.21,5	
	Soleil, bord 1, sup.	14.56.13,80	- 0,01		263.17. 8,3	739,7	+ 9.9	+ 9.7	-1.49,9	
1 9	& Petite Ourse S	18.19.48,69	,,,,,,		6.29.53,4	738,6	+ 9.9	+ 9.4	+ 48,2	31,4
	a Lyre	1 " " " " "	+ 0,26	- 42,53	318.33.44,8		† † 9.9		- 7,5	29,3

Le 8, Mire Sud-140,03. Mire Sud N.-110,47. Mire Nord B-20,33. Mire Nord C-240,42. Mire Nord D-560,74. Niveau-20,26.

93
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1849.

10uns.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS COLLIGE pour le niveau.	BAROMÉTRE.	Inté- rieur.	OHÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLR.
	π Sagittaire  p¹ Sagittaire  y Aigle.  α Aigle.  β Aigle.  α² Capricorne.  α² Capricorne.  α Cygne.  Anonyme.  Lalande 40386.  Lalande 40529.  Anonyme.  Anonyme.  Lalande 41180.  α Céphée  Piazzi, XXI, 173  β Céphée  Lalande 42700.  Piazzi, XXI, 343  α Verseau.  Anonyme.  Lalande 43804.  Lalande 43942.	b. m. s. 19. o. 6,02 19.12.13,84 19.38.23,58 19.42.43,64 19.47.12,61 20. 8.35,74 20. 8.59,56 20.13.47,48 20.17.59,58 20.35.35,65 20.43. 3,40 20.46.29,00 20.49.47,62 20.52.11,33 21.024.71 21. 5. 1,93 21.14.16,90 21.22.40,93 21.46.32,04 21.49.37,52 21.57.21,29 22.14.33,52 22.18.18,34 22.21.58,89	s 0,03 - 0,02 + 0,10 + 0,09 + 0,01 + 0,01 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 + 0,19 + 0,56 + 0,80 - 0,03	- 42,57 - 42,62 - 42,59 - 42,44 - 42,57 - 42,45 - 42,45 - 42,66	258.41.24,8 261.48.59,3 290.10.25,3 288.23.54,0 285.57.35,0 266.55.48,5 261.7.31,3 261.14.33,0 324.39.36,7 260.47.35,3 260.27.11,2 260.26.29,2 309.58.41,6 306.48.57,5 341.51.35,0 349.48.36,8 258.5.59,4 258.5.5,9,4 278.52.45,4 258.52.31,3 259.44.18,3 281.12.6,1	738,6 738,5 738,4 738,3 738,3 738,3 738,3 738,4 738,5 738,4 738,3 738,3 738,3	+ 10,0 + 10,0 + 10,0 + 9,9 + 9,8 + 9,7 + 9,6 + 9,1 + 9,0 + 8,7 + 8,4 + 8,1 + 8,1	+ 9,3 + 9,2 + 8,8 + 8,6 + 8,5 + 7,4 + 6,8 + 6,5 + 6,2 + 5,2 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,6	-2.15,3 -1.57,1 -41,1 -43,9 -47,8 -1.34,9 -2.1,0 -2.0,4 -1.5,-2.4,5 -2.5,7 -2.5,8 -16,6 -20,0 +16,1 +25,1 +25,1 +25,2 -2.21,0 -2.21,5 -1.20,5 -2.10,5 -57,2	27,3 25,7 28,9 33,0 29,8
11	α Ophiuchus  y Dragon  δ Petite Ourse S  α Lyre  π Sagittaire  y Aigle  α Aigle  δ Aigle  δ Céphée  Piazzi, XXI, 173  δ Céphée  Lalande 42700  Piazzi, XXI, 343  α Verseau	17.27.11,74 17.52.20,62 18.19.46,66 18.31. 5,11 19. 0. 4,04 19.12.11,92 19.38.21,68 19.42.41,72 19.47.10,65 21.14.15,00 21.22.39,09 21.25.57,87 21.46.30,10 21.49.35,50 21.57.19,21	+ 0,11 + 0,39 + 0,26 - 0,03 - 0,02 + 0,10 + 0,09 + 0,08 + 0,56 + 0,80 + 0,80 - 0,03 - 0,03 - 0,06	- 44,30 - 44,43 - 44,44 - 44,51 - 44,52 - 44,33 - 44,45 - 44,51	292.35.42,8 331.25.14,8 6.29.53,7 318.33.44,7 258.41.24,3 261.49. 3,0 290.10.25,5 288.23.52,8 285.57,34,5 341.51.38,2 349.43.59,9 349.48.36,0 258. 5.59,0 258. 2.59,0 278.52.45,9	737,2 737,2 737,1 737,1 737,1 737,1 737,1 737,3 737,4 737,4 737,4	+ 9,1 + 9,4 + 9,4 + 9,4 + 9,4 + 9,1 + 8,5 + 8,5 + 8,4 + 8,2	+ 8,6 + 8,1 + 7,9 + 7,9 + 7,0 + 6,6 + 5,8 + 5,5 + 4,0 + 3,8 + 3,8 + 3,5 + 3,5	- 37,5 + 5,3 + 48,3 - 7,5 -2.16,2 -1.58,0 - 41,5 - 44,3 - 48,3 + 16,2 + 25,2 + 25,3 -2.22,1 -2.22,4 -1. 2,4	25,6 30,2 32,2 29,6 27,2 24,3 28,0 32,3 33,4

Le 9, Mire Sud-44P,31. Mire Sud N.-11P,61. Mire Nord C-24P,61. Le 11, Mire Sud-42P,08. Mire Sud N.-9P,92. Mire Nord B-3P40. Mire Nord D-57P,45.

94

Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Soleil, bord 1 α Pégase Lalande 45311 α Andromède γ Pégase Saturne, centre γ Aigle	h. m. s 15.16.29,38 22.56.29,84 23. 1. 7,83 23.59.51,57 o. 4.43,76 o. 8.54,46 19.38.15,22 19.42.35,44	- 0,02 + 0,12 0,00 + 0,19 + 0,12 + 0,05	- 47,16 - 46,86 - 47,11 - 50,83 - 50,72	264.36.44,0 308.10.36,6 294.16. 4,2 278.10.10,2 290.10.23,3 288.23.53,6	7 <sup>2</sup> 7,7 7 <sup>2</sup> 7,5 7 <sup>2</sup> 7,5	+ 8,5 + 8,6 + 8,5 + 5,6	+ 8,8 + 7,8 + 7,7 + 1,9	-1.42,6 - 18,2 - 34,9 -1. 2,1 - 41,6 - 44,4	29,4 30,4 25,8 25,7
	ß Aigle.  α¹ Capricorne  α² Capricorne  α Céphée  Piazzi, XXI, 173.  ß Céphée  γ Pégase  Saturne, centre  α Cassiopée  α Petite Ourse S  49 A Andromède  Uranus, centre	19.47. 4,35 20. 8.27,46 20. 8.51,18 21.14. 8,58 21.22.32,43 21.25.51,59 0. 4.39,78	+ 0,07 + 0,04 + 0,04 + 0,28 + 0,39 + 0,08 + 0,06 + 0,23 + 0,17 + 0,07	- 50,73 - 50,56 - 50,79 - 50,69 - 50,66 - 51,08 - 50,60	285.57.35,7 266.55.45,1 341.51.36,9 349.44. 1,7 349.48.37,3 294.16. 1,5 278. 7.37,2 335.37,15,0 8.24.14,0 326. 8.24,5 288.19. 2,8	729,1 729,2 729,2 729,5 729,5 729,4 729,3	+ 4,8 + 4,4 + 4,1 + 4,2 + 4,2 + 4,2 + 4,0 + 3,8	+ 1,5 + 0,5 + 0,8 - 0,3 - 0,4 - 1,0 - 2,3 - 2,6	- 48,4 -1.36,2 + 16,3 + 25,3 + 25,3 - 36,0 -1. 4,3 + 9.7 + 53,1 0,0 - 45,3	29,8 28,7 31,2 34,5 26,7 27,8 26,8
20	Soleil, bord 1, inf.  a Lyre.  y Aigle.  a Aigle.  a Aigle.  baigle.  carl Capricorne.  Lune, bord 1, inf.  Gapricorne.  Céphée.  Piazzi, XXI, 173.  B Céphée.  Lalande 42700.  Piazzi, XXI, 343.  a Verseau.  Lalande 43517.  Lalande 43741.  Lalande 43942.	15.41.16,98 18.30.58,15 19.38.14,54 19.42.34,60 19.47. 3,53 20. 8.26,58 20. 8.50,54 20.10.30,28 20.54.58,68 21.14. 8,32 21.22.32,13 21.25.51,33 21.46.23,00 21.49.28,56 21.57,12,09 22. 5.57,40 22. 9.41,38 22.16.43,16 22.21.49,71	+ 0,09 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,08 + 0,09 + 0,09 - 0,02 - 0,02 + 0,10 + 0,06 + 0,09 + 0,09 + 0,09 + 0,09 + 0,09	- 51,50 - 51,52 - 51,56 - 51,56 - 51,39 - 51,38 - 51,19 - 51,27	259.55.25,2 318.33.43,9 290.10.23,0 288.23.56,7 285.57.35,1 261.13.41,2 259.29.57,3 341.51.35,7 349.43.58,7 349.43.58,7 258. 5.59,9 258. 3. 1,2 278.52.47,1 259.18.20,3 258.57.53,7 258.56.49,7 281.12. 3,5	728,4 727,5 727,5 727,6 727,7 727,7 727,7 727,7 727,7	+ 4,7 + 4,5 + 4,3 + 4,0 + 4,0 + 3,3 + 2,7 + 2,7	- 0,1 + 1,7 + 1,6 + 1,6 + 0,8 + 0,6 - 0,3 - 0,2 - 0,4 - 0,2 + 0,4	-2.10,2 - 7,6 - 41,6 - 44,4 - 48,4 -2.2,0 -3.12,4 + 16,2 + 25,3 + 25,4 -2.22,2 -2.22,7 -1.2,5 -2.14,0 -2.16,0 -2.16,0 -2.16,1	30,6 25,6 28,9 29,3 29,3 33,8

95
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1849.

Lalande 44241  22.30. 9.90 Lalande 44241  22.30. 9.90 Lalande 44618  22.40. 0.26 + 0.08 Δ Poisson austral.  22.45.48.68 + 0.08 Δ Peisson austral.  22.45.48.68 + 0.08 Δ Peisson  22.45.48.68 + 0.08 Δ Peisson  22.55.25.46 + 0.04 Δ Peisson  23.31. 3.44 + 0.08 Lalande 45311  23. 1. 3.44 + 0.08 Lalande 45421  23.32. 2.12 + 0.10 Δ Sculpteur  23.40.13.83 + 0.11 Δ Andromède  23.59.47.99 + 0.03 Δ Peisson  23.59.47.99 + 0.05 Δ Peite Ourse S  1. 5. 0.05 Δ Partie Ourse S  1. 5. 0.05 Δ Partie Ourse S  1. 1.55. 4,59 Δ Partie Ourse S  1. 1.57,76.61 Δ Partie Ourse S  1. 1.57,52,36 Δ Poisson  1. 4.33.497 + 0.11 Δ Anonyme  1. 57.52,36 + 0.01 Δ Rallande 4089  2. 3.37,26 + 0.09 Δ Anigle  1. 1.57,52,36 + 0.05 Δ Anigle  1. 1.57,52,36 + 0.05 Δ Anigle  1. 1.54.33.497 + 0.12 Δ Anigle  1. 1.54.34.97 + 0.05 Δ Anigle  1. 1.54.57,70 + 0.05 Δ Anigle  1. 1.55.4,59 + 0.11 Δ Anigle  1. 1.57,70 + 0.05 Δ Anigle  1. 1.54.34.97 + 0.12 Δ Anigle  1. 1.55.4,59 + 0.11 Δ Anigle  1. 1.56	JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté-	DUÉTRE Exté- rieur.	REFRACTION.	LIEU da POLE,
2 Verseau 21.57.11,23 + 0,06 - 52,35 258.52.47,5 727,3 + 2,2 - 1,0 -1. 2,6 3 250.24,25,8 727,4 + 2,0 - 1,2 - 3.43,9 2 250.24,25,8 308.10.36,9 - 18,8 2	2.1	Lalande 44528. Lalande 44615  & Verseau  & Poisson austral  & Pégase Lalande 45311. Lalande 46421  & Sculpteur Lacaille 9695  & Andromède  & Pégase  & Petite Ourse S  & Andromède.  Uranus, centre  & Andromède. Uranus, centre  & Andromède.  Lacaille 541  Anonyme  & Bélier Lalande 4089  & Lyre  & Aigle  & Aigle  & Aigle  & Aigle  & Aigle  & Aigle  & Capricorne  Lune, bord t, inf  & Capricorne  & Céphée  & Capricorne  & Capricorne.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	+ 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,01 + 0,04 + 0,00 + 0,10 + 0,01 + 0,01 + 0,02 + 0,05 +	- 51,62 - 51,54 - 51,54 - 51,63 - 51,04 - 52,19 - 52,27 - 52,51 - 52,27 - 52,35 - 52,35 - 52,35	261.21.52,1 260.51.58,3 262. 9.11,8 263.19.14,8 249.33.18,9 294.19. 2,9 264.36.48,7 255.30.32,5 251. 0.20,0 250.24.25,4 308.10.33,6 294.16. 5,6 278. 7.19,9 335.37.17,7 8.24.13,2 26. 8.25,9 288.18.22,0 329.50.18,5 254. 9. 2,5 248.19.42,5 255.20.28,0 302.39.53,2 260.15.24,2 318.33.39,5 290.10.21,9 288.23.54,7 285.57.33,9 259.29.59,8 263.21.21,4 264. 8.50,3 341.51.38,6 349.48.35,2 262.36.10,8 263.8. 3,1 258.52.47,5 308.10.36,9 294.16. 3,9	727,8 727,8 727,8 727,8 727,8 728,0 728,0 728,0 728,0 727,6 727,6 727,6 727,1 727,1 727,1 727,1 727,1 727,1 727,1	- 0,1 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 2,7 - 2,4 - 2,7 - 2,4 - 2,7	- 0,4 + 0,4 + 0,1 - 0,3 - 0,6 - 2,2 - 2,4 - 2,2 - 2,2 - 2,2 - 3,0 - 3,6 - 3,6 - 3,9 + 0,6 0,0 - 0,8 - 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,2	-2. 1,7 -2. 1,7 -2. 4,6 -1.57,7 -1.52,0 -3.58,1 -35,9 -1.46,2 -2.44,1 -3.35,9 -48,9 -36,3 -1. 4,8 +9,7 +53,3 0,0 -45,3 +3,8 -2.57,9 -4.24,4 -2.46,5 -2.10,1 -7,6 -41,8 -44,6 -48,7 -2.13,1 -1.52,0 -1.48,4 +16,3 +25,4 +16,3 +25,4 -1.55,8 -1.55,8 -1.55,8 -1.53,2 -1.26,0 -3.43,9 -1.48,4 -2.57,9 -1.48,4 -2.13,1 -1.52,0 -1.48,4 -2.57,4 -1.55,8 -1.53,2 -1.53,2 -1.53,2 -1.88,0	25,4 30,5 30,4 25,8 27,6 26,4 24,4 26,8 28,0 33,0 32,6 31,1 28,7 29,1

96
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre et Décembre 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE.	THERMO	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da
	DES ASSAULS.	Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	æ	rieur.	rieur.	0N.	POLE.
	α Cassiopée α Petite Ourse S 49 A Andromède Uranus, centre 54 φ Andromède Piazzi, I, 152 α Bélier	h. m. s. 0.31.10,62 1. 5. 0,05 1.20.16,65 1.25. 1,09 1.33.26,09 1.33.35,03 1.57.51,34	5. + 0,01 + 0,02 + 0,05 + 0,02 + 0,02 + 0,04	52,07 - 52,57	335.37.18.2 8.24.16,6 326. 8.26,0 288.17.42,6 329.45 47.9 302.39.54,8	727,4 727,3 727,3 727,3	+ 1,4 + 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3	0 - 1,2 - 1,1 - 1,2 - 1,2 - 1,0	+ 9,7 + 52,7 0,0 - 45,0 + 3,7 - 25,1	30,7 28,3
28	Soleil, bord 1, sup.  γ Aigle  α Aigle.  δ Aigle  α Céphée  β Céphée  β Céphée  β Céphée	16.15. 4,86 19.38. 8,58 19.42.28,54 19.46.57,49 21.14. 2,00 21.22.26,31 21.25.45,25	+ 0,15 + 0,02 + 0,03 + 0,04 - 0,32 - 0,49 - 0,49	- 57,43 - 57,57 - 57,53 - 57,50	258.51.37,0 290.10.26,1 288.23.55,5 285.57.35,5 341.51.34,7 349.43.58,2	727,8	- 0,8 - 1,2 - 1,9	- 6,8 - 5,8 - 7,3	-2.20,5 - 42,8 - 45,6 - 49,8 + 16,8 + 26,0 + 26,1	28,4 27,4 29,2 30,0 33,2
	y Capricorne δ Capricorne Lalande 42700 Piazzi, XXI, 343 α Verseau Lalande 43381 Lalande 43517 Anonyme δ-21°4'.	21.30.47,28 21.37.46,26 21.46.16,70 21.49.22,28 21.57. 5,99 22. 5.51,14 22. 9.35,15 22.14.18,22	+ 0,13 + 0,13 + 0,17 + 0,17 + 0,06 + 0,15 + 0,15 + 0,15	- 57,51	262.36.12,7 263. 8. 3,5 258. 6. 5,0 258. 3. 6,5 278.52.49,1 259.18.21,8 258.57.55,6	7 <sup>2</sup> 7,9	- 2,3 - 2,7	- 7,5 - 7,5 - 7,6 - 7,7	-1.58,8 -1.56,1 -2.26,3 -2.26,7 -1. 4,3 -2.18,1 -2.20,4	31,5
	Lalande 43741 Lalande 44117 Lalande 44290 Lalande 44528 Lalande 44615	22.16.36,88 22.26.36,07 22.30.57,24 22.37.28,52 22.39.54,18 22.45.42,40 22.56.19,44 23. 0.57,22 1. 4.55,20	+ 0,15 + 0,14 + 0,15 + 0,14 + 0,13 0,00 + 0,13	- 5 <sub>7,49</sub>	258.56.54,8 261.32.42,1 259.58. 1,7 260.51.55,8 262. 9.11,0 263.19.13,7 294.19. 4,5 264.36.53,8 8.24.15,7	727,8 727,8 728,0 727,9	- 3,4 - 3,4 - 3,9 - 3,3	- 7,8 - 7,5 - 7,6 - 7,3 - 6,9	-2.20,5 -2. 4,5 -2.13,8 -2. 8,4 -2. 1,2 -1.55,2 - 36,9 -1.49,0 + 54,0	<b>25,</b> 7
29	α Pégase α Petite Ourse S	22.56.18,28 1. 4.58,07	0,00	- 58,64	294.19. 3,9 8.24.15,0	729,5 730,1	- 3,5 - 4,4	- 6,9 - 7,7	- 36,9 + 54,3	25,1 26,2
2	Soleil, bord 1, sup. Lalande 42700 Piazzi, XXI, 343	21.46.12,58 21.49.18,14 21.57. 1,89	+ 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,06 + 0,08	- 61,56	258.12.53,2 258. 6. 6,0 258. 3. 1,1 278.52.48,2 259.18.26,7	728,2 725,7 725,6 725,5	+ 3,2 + 2,7 + 2,8 + 2,7	+ 4,4 + 1,9 + 1,9 + 1,8 + 1,6	-2.19,1 -2.20,7 -2.21,1 -1 1,8 -2.12,8	33,4

97

Observations faites à la lunette méridienne en Décembre 1849.

Jours	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOVEANE DES VERNIERS	BAROMÉTRE	-	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	RE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	10X.	POLE.
	Lalande 43517  Anonyme  Lalande 43741  Lalande 44117  Lalande 44290  Lalande 44528  Lalande 44615  Verseau	h. m. s. 22. 9.30,88 22.14.14,08 22.16.32,66 22.26.31,98 22.30 52,96 22.37,24,35 22.39,49,88 22.45.38,20	s. + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,08	S.	258.57.58,4 258.52.37,2 258.56.49,7 261.32.46,9 259.58. 0,7 260.52. 2,9 262. 9.14,2 263.19.16,9	725,4	+ 2,6	+ 1,4	-2.15,0 -2.15,7 -2.15,2 -1.59,9 -2. 8,9 -2. 3,7 -1.56,9 -1.51,2	//
	α Poisson austral α Pégase Lalande 45311 Lalande 46421 Lalande 46525 δ Sculpteur Píazzi, XXIII, 249. 30 Poissons	22.48.18,09 22.56.15,22 23. 0.52,98 23.32.51,53 23.35.58,33 23.40. 3,65 23.50.56,72 23.53.13,68	+ 0,11 + 0,04 + 0,08 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,08 + 0,08	- 61,83 - 61,62	294.19.10,8 264.36.54,1 255.30.37,7 253.28. 5,2 251. 0.19,7 273.12.12,0 273. 4.55,7	724,9 724,8 724,7 724,5	+ 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,4	+ 0,2 0,0 - 0,1 - 0,4 - 0,7 - 0,8	- 35,7 -1.45,6 -2.42,1 -3. 2,3 -3 33,4 -1.16,2 -1.16,5	33,4
	α Andromède γ Pégase Saturne, centre Lalande 494 Piazzi, Ο, 100	23.59 36,69 0. 4.29,08 0. 7.18,89 0.16.12,51 0.23.29,40	+ 0,04 + 0,04 + 0,06 + 0,08 + 0,08	- 61,67 - 61,68	368.16.42,8 294.16.8,5 278.5.59,2 260.38.28,7 260.53.29,3	724,5	+ 1,4	- 0,9 - 1,0 - 1,0 - 0,7	- 18,7 - 35,9 -1. 4,1 -2. 5,8 -2. 4,3	34,5 34,1
	α Cassiopée 2 Petite Ourse S α Petite Ourse S Uranus, centre Piazzi, II, 155 Lalande 5146 Lalande 5286	0 31. 0,98 0.48.20,64 1. 4 44,08 1.23.44,68 2.32.54,76 2.37.25,00 2.41.51,54	+ 0,02 0,00 + 0,05 + 0,05 + 0,08 + 0,08	- 61,46	335.37.27,9 5.20.59,8 8.24.23,6 288.11.29,4 289 49.13,2 258.54.24,6 259. 4.24,7	724,3 724,2 724,0 724,0 723,4	+ 1,2 + 1,2 + 1,0 + 0,9 + 1,2	- 0,5 - 0,9 - 1,6 - 1,2 - 2,2	+ 9,6 + 47,1 + 52,6 - 45,0 - 42,5 -2.17,0 -2.15,9	38,7
	Lalande 5289  Betite Ourse I  Baleine	2.41.54,46 2.50. 4,70 2.53.24,99	+ 0,08	- 61,46 - 61,81	25. 6.48,7	723,1	+ 0,9	- 2,2	+1.36,1	31,5
	γ Aigle	19.38. 2,44 19.42.22,66 19.46.51,49 20.35.14,45 21.13.55,37 0.30.58,82 0.48.17,54 1. 4.36,14 1.23.32,54 1.26.57,56	† 0,07 † 0,07 † 0,07 † 0,07 † 0,16 † 0,28 † 0,23 † 1,77	- 63,47 - 63,36 - 63,46 - 63,22 - 63,30 - 63,37	290.10.24,8 288.23.54,2 285.57.35,6 324.39.36,5 341.51.37,7 335.37.27,0 5.21. 1,0 8.24.30,7 288.10.35,7 320.33.58,5	718,0 718,2 718,2 719,5 719,8 719,8	+ 4,2 + 4,1 + 3,8 + 3,4 + 3,2 + 3,1	+ 4,2 + 3,4 + 2,8 + 0,6 - 0,2 - 0,4 - 0,7	- 40.7 - 43.4 - 47.3 - 1,4 + 15.9 + 9.5 + 46.6 + 52.0 - 44.6 - 45.6	30,0 29,1 32,5 32,6 32,7 37,5 38,1

Le 4, Mire Sud-45,44. Mire Sud N.-12,50. Mire Nord C-24,37. Niveau-4,32.

98

## Observations faites à la lunette méridienne en Décembre 1849.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS correges pour le niveau.	BIRONÈTRE.	Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
		h. m. s.	ş.	s.	0 / /!	nim.	0	0	1 11	"
j)	54 φ Andromède	1.33.14,67	+ 0,18							
	Piazzi, I, 152	1.33.23,51	+ 0,18		329.45.56,3	719,8	+ 2,4	- 0,6	+ 3,7	
	Lalande 3342 Lalande 3642	1.40.37,61	+ 0,03		255.19.52,0		,	- 0,6	-2.42,8	
	Anonyme 8-24°43'	1.51.17,71	+ 0,03		255.13.19,0				-2.43,8	
	Anonyme	1.54.52,51	+ 0,03		255.20.27,5				-2.42,8	
	α Bélier	1.57.40,32	+ 0,10	- 63,50	302.39.58,1				- 24,9	32,6
	Lalande 4089	2. 3.25,28	+ 0,03		260.15.23,7	719,8	+ 1,9	- 0,8	-2. 7,2	
	Anonyme Lalande 4533	2. 9.13,63	+ 0,03		255.11.21,6			- 0,8	-2.44,2	
	Piazzi, II, 155	2.17.59,97 2.32.53,29	+ 0,03		255.25.44,5 289.49.13,5			- 1,0	-2.42,2 $-42,1$	
	Lalande 5146	2.37.23,20	+ 0,03		258.54.23,1				-2.15,6	
	Lalande 5286	2.41.49,96	+ 0,03		259. 4.23,2				-2.14,5	i
	Lalande 5289	2.41.52,74	+ 0,03		J . ,					
1	B Petite Ourse I	2.50. 3,28	- 0,52	- 63,47	25. 6.52,2			-	+1.35,1	32,8
H	α Baleine α Persée	2.53.23,23 3.12.36,01	+ 0,06	- 63,57	283.25.13,7	720,0	+ 1,6	- 0,5	$-5_{2},8$	36,4
	Z Persec	3.12.30,01	7 0,10	- 63,39	329.13.49,7	720,1	+ 1,4	- 0,7	+ 3,1	34,0
15	Soleil, bord 1, sup.	17.59. 4,71	+ 0,02		256.55.30,3	736,0	+ 3,4	+ 6,7	-2.28.8	
	γ Aigle	19.37.51,96	+ 0,07	- 73,90	299.10.22,8	735,6	+ 6,3	+ 6,8	- 41,3	29,1
	α Aigle	19.42.11,98	+ 0,07	- 73,99	288.23.56,7				- 44,0	32,5
	α Cygne	20.35. 3,53	+ 0,16	- 73,95	324.39.35,5	735,4	+ 5,2	+ 6,6	- 1,5	33,6
	α Céphée β Céphée	21.13.44,14	+ 0,28 + 0,3q	- 74,13 - 73,98	3/0/82-1	735,0	1/0	+ 6,6	1	38,4
	y Capricorne	21.30.30,76	+ 0,04	- 75,90	349.48.39,4 262.36. 8,7	733,0	+ 4,9	T 0,0	+ 25,0	30,4
	à Capricorne	21.37.29,74	+ 0,04		263. 8. 7.2	735,0	+ 4,8	+ 6,4	-1.51,3	
	α Verseau	21.56.49,23	+ 0,06	- 74,08	278.52.45,2	734,9	+ 4,8	+ 6,3	-r. r,6	31,6
	Lalande 44117	22.26.19,54	+ 0,03		261.32.44,0	734,7	+ 4,6	+ 6,2	-1.59,3	
	Lalande 44607	22.39.18,06	+ 0,03	m/ :	261.53.44,9	734,7	+ 4,6	+ 5,8	-1.57,6	10-1
	α Pégase	22.48. 5,72	+ 0,02	- 74,10 - 74,13	249.33.21,0 294.19. 5,5	734,7	+ 4,6	+ 5,6	-3.54,5 - 35,4	40,7
	Lalande 45260	22.59.28,88	+ 0,04	/4,10	264. 5. 7,5	734,7	+ 4,5	+ 5,4	-1.47,2	29,0
	Lalande 46526	23.35.49,41	+ 0,02		255.36.46,2	734,7	+ 4,4	+ 5,0	-2.40,2	
	Lalande 46829	23.45. 5,18	+ 0,05		269.48.24,5				-1.25,7	
	Piazzi, XXIII, 249.	23.50.44,07	+ 0,05		273.12. 9,1	.27.0		. ,	-1.15,7	1
	3ο Poissons α Andromède	23.52. 1,07 23.59.24,15	+ 0,05	- <sub>7</sub> 3,96	273. 4 48,4 308.10.44,0	734,8	+ 4,4	+ 4.7	-1.16,1	36,1
	y Pégase	0. 4.16.46	+ 0,08	- 75,90 - 74,11	294.16. 7,0			+ 4,6	- 18,6 - 35,7	33,4
	Saturne, centre	0. 7.26,54	+ 0,06	/+,* *	278.11.30,0	734,9	+ 4,3	+ 3,8	-1. 3,6	50,4
	Lalande 494	0.16. 0,14	+ 0,03		260.38.18,7	7 173	, ,,-	+ 3,5	-2. 5,5	
	Piazzi, O, 100	0.33.16,80	+ 0,03		260.53.28,7	734,9	+ 4,2	+ 3,2	-2. 4,3	
1 !	α Cassiopée	0.30.47,92	+ 0,23	- 73,99	335.37.27,1	734.9	+ 4,2	+ 3.0	+ 9,7	36,8

Le 15, Mire Sud-42P,58. Mire Sud N.-10P,79. Niveau-4P,10.

99
Observations faites à la lunette méridienne en Décembre 1849.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	CORF	RECTION de	MOYEME DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERM Inté-	OUÈTRE Exté-	néfraction	LIEU da POLE.
-			ment.	pendule.	pour le niveau.	- 54	rieur.	rieur.		
	2 Petite Ourse S α Petite Ourse S Uranus, centre 50 υ Andromède 54 φ Andromède	h. m. s 0.48. 4,36 1. 4.17,28 1.22.37,60 1.26.46,66 1.33. 3,67	+ 1,77 + 0,07 + 0,15 + 0,18	<b>3.</b>	5.20.59,0 8.24.29,9 288. 6.30,6 320.34. 0,9	734,8 734,9	+ 4,2	+ 3, <sub>2</sub> + 3, <sub>4</sub>	+ 47,0 + 52,4 - 45,0 - 5,6	35,4
	Piazzi, I, 152 Lalande 3342 Lalande 3642	1.33.12,57 1.40.27,11 1.49. 7,57	+ 0,18 + 0,03 + 0,03		329.45.59,7 255.19.51,5	735,0	+ 4,0	+ 3,0	+ 3,7	
	Anonyme. Anonyme.  Bélier. Lalande 4089. Anonyme. Lalande 4533. Piazzi, II. 155. Lalande 5146. Lalande 5286.	1.51. 7,11 1.54.41,91 1.57.29,59 2. 3.14,60 2. 9. 3,09 2.17.49,37 2.32.42,52 2.37.12,62	+ 0,03 + 0,03 + 0,00 + 0,03 + 0,03 + 0,07 + 0,03	- 74,17	255.14.29,8 255.20.27,4 302.40. 0,2 260.15.21,0 255.11.21,1 255.25.43,9 289.49.18,0 258.54.23,0	734,8 734,8	+ 3,6	+ 2,0 + 2,0 + 2,4 + 1,8	-2.45,0 -2.44,2 - 25,1 -2. 8,5 -2.45,9 -2.43,4 - 42,5 -2.17,1	34,3
	Anonyme.  2 Perisée.  3 Perisée.  3 Perisée.  3 Persée.  3 Persée.  3 Préc.  3 Struve { préc.  5 Suiv.  Lalande 6809  Lalande 6861	2.41.39,12 2.41.42,02 2.49.53,01 2.53.12,63 3. 1.28,62 3.12.25,37 3.20.18,41 3.20.20,61 3.32.16,30 3.33.26,50	+ 0,03 + 0,03 - 0,52 + 0,06 + 0,03 + 0,18 + 0,25 + 0,25 + 0,03 + 0,03	- 74,23 - 74,14 - 74,00	25g. 4.1g,3 25. 6.53,7 283.25.11,7 261.17.56,7 32g.13.54,5 338. g.30,0 25g.51.36,2	7 <sup>34,7</sup> 7 <sup>34,5</sup> 7 <sup>34,5</sup>	+ 3,0 + 2,7	+ 1,6 + 1,5 + 1,0 + 1,5	-2.16,1 +1.36,3 - 53,5 -2. 2,8 + 3,2 + 12,4 -2.11,1	31,7 34,6 3 <sub>7</sub> ,1
	α Cygne α Céphée β Céphée γ Capricorne	20.35. 2,51 21.13.43,12 21.25.25,51 21.30.29,74	+ 0,16 + 0,28 + 0,39 + 0,03	- 74,95 - 75,12 - 75,20	324.39.37,8 341.51.39,8 349.48.40,1 262.36. 7,3	7 <sup>32</sup> ,9 7 <sup>32</sup> ,7	+ 5,4 + 5,5	+10,6	- 1,4 + 15,8 + 24,6 -1.52,2	36, <sub>2</sub> 36,5 38,9
	ö Capricorne  α Verseau Lalande 44117 Lalande 44607 α Poisson austral	21.37.28,64 21.56.48,31 22.26.18,52 22.39.17,16 22.48. 4,63	+ 0,03 + 0,06 + 0,03 + 0,03 + 0,02	- 74,99 - 75,18	263. 8. 6,0 278.52.44,2 261.32.44,7 261.53.40,3 249.33.17,2	732,8 732,8 732,8	+ 6,0 + 6,2 + 5,9	+ 9,4 + 9,4 + 7,4 + 7,2 + 7,2	-1.49,7 -1 0,7 -1.58,5 -1.56,7 -3.52,4	39,0
	Lalande 45260 Lalande 46526 Lalande 46829		+ 0,08   + 0,04   + 0,02   + 0,05	- 75,20	294.19. 6,2 264. 5. 4,4 255.36.45,0 269.48.25,9	732,5 732,4	+ 5,9 + 5,8	+ 6,7 + 6,5	- 35,1 -1.46,4 -2.38,8 -1.25,0 -1.15,1	30,4
	Piazzi, XXIII, 249.	23.50.43,03 23.53. 0,07	+ 0,05		273.12. 9,4 273. 4.48,6	732,2	+ 5,6	+ 5,4.	-1.15,6	

Le 16, d-189,13. Nadir 146°6' 30",60. Le 17, Mire Sud-46°,39. Mire Sud N.-14°,31.

. 100
Observations faites à la lunette méridienne en Décembre 1849.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE		ONÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
S	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	α Andromède γ Pégase Saturne, centre Lalande 494 Piazzi, O, 100 α Cassiopée 2 Petite Ourse S α Petite Ourse S	1	5. + 0,11 + 0,08 + 0,06 + 0,03 + 0,03 + 0,23 + 1,77	- 75,21 - 75,22 - 75,22	308.10.39,7 294.16. 5,1 278.12.10,4 260.38.22,4 260.53.24,9 335.37.27,2 5.21. 0,3 8.24.29,4	732,2 732,1 732,1 731,9	+ 5,4	+ 5,4 + 5,3 + 5,0 + 4,0 + 3,9 + 4,0	- 18,5 - 35,4 -1. 3,0 -2. 4,2 -2. 2,9 + 9,4 + 46,7 + 52,1	31,9 31,8 36,6 34,4
18	Soleil { bord 1 bord 2 Lalande 46526 Lalande 46829 \( \tau \) Pégase \( \tau \) Petite Ourse S	17.42.19,67 17.44.42,29 23.35.46,29 23.45. 1,94 23.59.20,69 0. 4.13,02 1. 4. 6,55	+ 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,05 + 0,11 + 0,08	- 77,38 - 77,50	255.36.45,6 269.48.24,2 308.10.40,5 294.16. 6,7	730,0 729,8		+ 5,5 + 5,3 + 5,1	~2.38,9 -1.25,0 - 18,4 - 35,3	33,o 33,6
1	γ Aigle α Aigleα Cygne	19.42. 7,68	+ 0,07	- 78,34 - 78,29 - 78,27	290.10.22,8 288.23.52,9 324.39.33,9	727,4		+ 7,5	- 43,4	30,4 29,9 33,0
20	Soleil { bord 1 bord 2 a Aigle	17.53.33,05	+ 0,03 + 0,03 + 0,07	- <sub>79</sub> ,33	288.23.54,2	728,9	+ 6,1	+ 3,8	- 44, <b>r</b>	30,7
26	Soleil, bord I  a Cygne  a Céphée  3 Céphée  a Verseau	20.34.52,63	+ 0,03 + 0,16 + 0,28 + 0,39 + 0,06	- 84,70 - 84,57 - 84,44 - 85,12	324.39.32,6 341.51.37,1 349.48.37,3 278.52.48,1	728,5 728,5 728,4 728,1	- 0,8 - 1,0 - 1,1 - 1,3	- 2,8 - 3,9 - 3,4 - 3,7	- 1,5 + 16,5 + 25,7 -1. 3,3	33,3 33,6 36,0 33,5

101
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1849, ramenées au 1er Janvier de cette année.

	C	x Ar	VDROMÈD	E.	γ	Pég	ASE (sui	te).		A	NONYME		α CAS	SIOPÉ	E P. S.	(suite).	37 μ	Andi	ROMÈDE	(suite).
			,	-28015/			oh5m +				оь24т.					+550421				+37°40′
lan		7 15	35°,69	25",2	Janv.		273,94	31",3 35,1	Oct.	17	59 <sup>3</sup> ,23 59,30	45",5	Nov.	I	58°,36 58,66	31",3	Févr.	3	23 <sup>5</sup> ,22 23,36	47",6 52,1
		18	35,53	22,4		19 25	27,93 27,88	35,1		22	59,11	40,6		8	58,50	31,9		7	23,38	53,4
		19	35,48	23,4		27	27,93	34,8	Nov.	7	59,26	41,6		19	58,55	28,9		9	23,45	84,9
		25	35,57	19,4		36	27,93	36,2		8	59,18	40,0		20	58,61	31,4		14	23,25	49,3
		27 30	35,5 <sub>2</sub> 35,48	21,5	Févr.	3	27,91	36, <sub>2</sub> 33,3	Mov	enn.	e 59,22	41,9	Déc.	21	58,61 58,47	31,8 34,3	Mog	renne	23,33	51,0
ev		2	35,47	21,9		7	27,90 27,86	34,7			J,	. 73	Dec.	4	58,29		_			
1		3	35,41	22,6		9	27,91	32,8	α	CASS	BIOPÉE P	. S.	}	15	58,35	32,5	2 1	ETIT	e Ourse	P. S.
,		5	35,48	23,6		12	27,92	31,8			-h2-m	1550/-/		16	58,24	32,2			oh40m -	+85°26′
1		78	35,64 35,53	21,9	Avril	13	27,97	35,1			oh31m.		Moy	enne	58,32	30,7	Mai	3τ		41",1
		9	35,52	20,5	WAITT	30	27,92 27,88	35,6	Janv.	10	58 <sup>s</sup> ,41 58,38	29",8		Cic	iopée P	т	Juin	I	2,99	40,7
1		12	35,61	21,8	Mai	ī	27,96	35,3		25	58,40	28,9	α	CASS	HOPEE I	. 1.		2	2,53	37,9
ı		13	35,54	20,3		17	28,02	39,0		27	58,28	30,7			оь31т.	+550421		4 5	1,87	36,9 41,4
1.21	il	12 18	35,29 35,47	22,2		19	27,98	35,6		30	58,16	27,8	Juill.	7	58°,32	25",3	Déc.	2	2,50	43,4
,		21	35,52	22,3		26 31	27,84	36,1 35,6	Févr.	3	58,29 58,37	28,3 31,1		28	58,17	28,4		4	3,39	43,6
	:	25	35,33	***	Juin	2	28,05	35,4		4	58,23	30,8	Août	3	58,42 58,32	28,8		15	3,14	39,9
11		28	35,52		Juill.	6	27,70	31,7		5	58,10	30,7	Man	_	58,31			16	2,25	40,7
1		29 30	35,20 35,32		Oct.	9	28,00	33,4		7.	58,34	30,7	Moy	enne	30,31	28,0	Moy	renne	2,56	40,6
ai		1	35,50	20,8		17	27,96 27,87	35,0		8	58,21 58,19	29,8 33,2		16 B	BALEIN	E.	o D		. 0	n r
		2	35,34	23,7		22	28,05	38,7		9 13	58,32	25,7					1	ETIT	E OURSE	P. 1.
		3	35,46	22,2		23	27,98	38,5	Avril	-	58,19	30,4				-180481			ob49m .	+850261
		5	35,5 <sub>7</sub> 35,38		Nov.	4	27,68	36,1		21	58,17		Janv.	19 25	0,39	58",3	Mai	27		36",2
		17	35,43	19,8		7	27,83	$\frac{37,2}{36,6}$		24	58,31	33,2		27	0,47	61,5 59,7		31	3,10	38,1
		26	35,39	20,5		14	27,92	38,2		28	58,35 58,24	31,0 31,1	Févr.		0,51		Juin	I	3,28	35,6
iii		2	35,35	18,3		19	27,81	35,5		29	58,21	33,7		3	0,38	63,r		2	3,71	34,9
il		6	35,40	18,0		20	27,95	39,3		30	58,08	32,8		5	0,32		Moy	renne	3,58	36,2
j et.		9	35,5 <sub>7</sub> 35,5 <sub>2</sub>	24,8	Déc.	21	28,02 28,01	37,9 37,5	Mai	1	58,19	33,4		9.	0,52	59,9		2.	D	
		18	35,63	22,9	D.C.	15	27,95	36,8		3	58,29 58,44	34,5 34,4	Moy	renne	0,44	60,7		.11 77	BALEIN	P
91		22	35,64	24,7		16	27,96	35,2		5	58,43	30,9		70 C.	ASSIOPÉE	E.			1 h O m	-10°59′
п		23	35,59	23,2		18	27,90	37,0		17	58,15	31,0		., -			Jany.	27	59,72	3",4
31	•	4	35,59 35,46	22,7	Moy	enne	27,92	35,6		19	58,16	28,7			$0^h39^m$	+5700'	Févr.	2	59,75	τ,6
		7	35,58	23,6	r			,		23	58,18 58,08	28,1	Mai		593,89			3	59,57	2,4
		8	35,47	23,3	L		DE 49			25	58,32	30,5		3	60,08	47,6 44,5		5	59,72 59,92	3,5 3,7
		14	35,62	24,0			h17 <sup>m</sup> -1			26	58,14	31,4		17	59,96	45,7		9	59,69	3,7
		20	35,59 35,63	24,4	Déc.	2 15	11,89			29	58,29	34,8		23	60,17	46,0	Mos	٧.	59,73	3,0
		2	35,46	24,8		16	11,97	29,3		3 <sub>0</sub>	58,31 58,11	34,7		24	60,04				- 311"	-,-
		12	35,55	26,3	Mov		211,88	24,8	Juin	I	58,53	28,4		25	59.97	44,3		ô C	ASSIOPÉF	
		16	35,42	22,1						2	58,28	28,5	R.T.		59,97	46,0			. h . Kin	1500-6/
			35,49	23,1	1		a, O, 10			4	58,17	26,9	bioj	enne	60,02	43,3	E &			+59°26′
1	030	enne	35,49	22,1			oh24m -	-19°3′		5 30	58,20 58,55	<sup>29,7</sup> 30,8	3	7 μ. Δ	NDROM	ÈDE.	revr.		58s,89 58,89	
		א	PÉGASE.				281,83	18",6	Juill.		58,18	32,6					Mai	23	58,84	56,9
		1		,	Déc.		28,54	18,7		6	58,31	26,1				+37°40′		24	58,81	55,1
			0h5m +				28,51	18,1	Oct.		58,69	25,9	Janv.	19	23°,50	51",8		26	59,02	55,3
1,1	V.	7	27°,93 27,88	33.0	Mor	-	e 28,64			18	58,58 58,50	31,4			23,27 23,22			28 31	58,96 59,08	
		13	27,00	33,0	Mol	enne	20,04	19,0	1	22	30,30	31,1	•	2/	23,22	0492	1	O1	39,00	3410

& Gasstopée (suite).	¿ App. Sculpteur.	Anonyme.	LALANDE 4089 (suite).	LALANDE 5146 (suite).
ih15m +59°26′				
Juin 1 58 <sup>3</sup> ,89 54",2 2 58,88 56,8	3/ 30 33 7	Nov 20 53 (5 5/ 5	Déc. 4 25,98 23",1 15 25,95 25,4	Févr. 3 23,78 25",0 5 23,83 29,5
Moyenne 58,92 55,3	Nov. 7 34,09 33,2 8 34,28 31,6	Déc. 4 53,40 55,1	Moyenne 26,05 23,3	Déc. 2 23,87 30,8
49 A Andromède.	20 34.52 31.5		Anonyme.	4 23,83 30,5 15 23,89 30,1
h - m + / Co-2/	Moyenne 34,31 32,8		ah.om a/a/6/	Moyenne 23,87 28,7
Janv. 18 48,42 32",4	LALANDE 3342.	a Belier.	Déc. 4 14°,36 0″,7	LALANDE 5286.
19 4,64 33,2 27 4,92 33,8	1 <sup>h</sup> 41 <sup>m</sup> -24°37	1658m +22°44	15 14,47 1,0	2 <sup>1</sup> 42 <sup>m</sup> -20°5:
Nov. 8 4,55 34,2	Déc. 4 38',44 30",1 15 38,61 30,1		Moyenne 14,41 0,8	Janv. 27 505,49 33",9
19 4,30 33,9 20 4,42 35,5		19 40,40 41,3	LALANDE 4533.	Févr. 3 50,45 27,2 5 50,44 31,7
21 4,74 35,7	Moyenne 38,52 30,1	21 40,28 42,0 25 40,30 42,0	2h19m -24031'	Déc. 2 50,40 29,2
Moyenne 4,57 34,1	ε Cassiopée.	30 40,16 41,4 Févr. 4 40,07 41,8	Déc. 4 o',71 35",8 15 0,76 35.7	
49 BALEINE.	1h43m +62°55			Moyenne 50,46 30,4
	Févr. 13 35,29 24",5 14 35,47 23,1	14 40,27	ξ° Baleine.	LALANDE 5289.
19 10,20 0,0	Mai 24 35,52 24,9	Mars 15 40,29 38,6 19 40,14 40,3		
27 15,25 3,5	28 35,43 21,6	20 40,23 42,5	Janv. 27 8,14 51",8	Janv. 27 535,43
Moyenne 15,20 4,3	30 35,77 26,6 31 35,43 21,2	Mai 12 40,24 41,4	36 8,11 50,4 Févr. 3 7,97 51,1	30 53,3 <sub>7</sub> 31",0 Févr. 3 53,35
	Juin 1 35,48 24,2	23 40,13 41,4	Févr. 3 7,97 51,1 5 8,16 51,7 7 8,27 53,3	7 53,47 38,3 Déc. 2 53,32
1 <sup>h</sup> 27 <sup>m</sup> +40°38' Févr. 13 57°,34 60",0		25 40,22 41,5 26 40,21 41,0	Mayonno 8 +3 5+ +	4 53,37
14 57,38 58,0		28 40,08 40,6	D 11 -55	15 53,27 32,0 Movenne 53,37 34,0
Déc. 4 57,22 56,0 15 57,02 57,4	LACAILLE 541.	30 40,19 41,8 31 40,18 40,9	ah22m 100E2/	
Moyenne 57,24 57,8	Jany. 18 23°,82 19",9	Juin 1 40,11 44,0	Janv. 27 533,35 46",6	W. 2
54 φ Andromède.	19 23,85 20,3	20 40,11 41,2	Dec. 2 53,09 47,2	2h54m +3o2 Jany. 7 23',23 35",
1 <sup>h</sup> 34 <sup>m</sup> +49°55′	Nov. 8 23,80 22,5 20 23,90 16,7	28 40.31	15 53,30 51,6	21 23,39 37,
Févr. 13 13°,55 32",6 14 13,67 31,3	Moyenne 23,84 19,8	30 40,26 39,5 Juill. 1 40,19 39,4	Moyenne 53,30 48,1	27 23,46 38, 30 23,45 37,
Nov. 7 13,73 30,7 8 13,90 33,8	LALANDE 3642.	5 40,26 6 40,23	85 BALEINE.	Févr. 3 23,41 40, 5 23,36 36,
20 13,94 32,9	1 <sup>h</sup> 50 <sup>m</sup> -24°44	14 40,10	2h34m +10°5/	7 23,56 37,
21 13,84 Déc. 4 13,83	Nov. 4 195,31 4",6	21 40,14 45,8	Janv. 30 215,42 43",0 Févr. 5 21,55 42,0	8 23,46 9 23,47 34,
15 15,55	13 19,03	Déc. 4 40,34 43,8 15 40,24 45,1	7 21,65 42,7	12 23,36 35, 13 23,35 34,
Moyenne 13,75 32,3	Moyenne 19,17 4,6	Moyenne 40,22 41,8	9 21,46 43,5 Moyenne 21,52 42,8	Mars 15 23,39 39.
Piazzi, I, 152. 1634m +49051'	Anonyme.			19 23,37 37.
Nov. 21 223,78 2",0	1h52m -24042		LALANDE 5146.	21 23,42 41. 29 23,40 36.
Déc. 4 22,67 2,9 15 22,45 5,0	Déc. 4 185,59	21.4m -19°41'	21.38 <sup>m</sup> -21°2/	31 23.40 37.
Moyenne 22,63 3,3	Moyenne 18,58 52,3	Nov. 20 26,03 22,4	Janv. 27 234,97 29",9 30 23,90 25,2	Mai 24 23,24 35. 26 23,44 36

					_											_			
П																			
	z Bai	EINE (SU	ite).	α	PER	sée (sui	ite).	STRU	ve 3	96, préc	ÉDENTE.		$ au^6$	ERIDAN		I	ALAT	DE 763	32.
			+3029'			3h13m -				3h21m					-23°41′			3h58m	-20°47′
iin	17	23°,31 23,25	36",1	Janv.	27 30		7",4	Févr.		26°,59	40",5 40,3	Févr.			56",1 56,3	Janv.			47",9
ш	21	23,42	33,5	Févr.		34,45	8,8		7	26,51			9		PP (7)		25 27	2,58 2,56	52,8
	22	23,27	0.11		5	34,16	8,0		12				13	21,24	55,5	Févr.	3	2,72	
	24 26	23,49 23,46	35,o 35,8		7	34,32	7,4 8,9	Déc.	13	26,66		Moy	enn	21,16	56,4		5	2,55	51,6
	27	23,40	35,1		9	34,25	8,3			e 26,62		I	AT.A	NDE 70	08		7	2,51 2,63	52,3
	28	23,38	33,7		13	34,24	8,6	Mady	CHI	20,02	42,0	1					12	2,50	02,0
i 111	30	23,27 23,28	37,1	Mars		34,22		STR	UVE	396, sui	VANTE.				-21°22'		13	2,57	51,1
111	, I 2	23,40	3 <sub>7,7</sub> 36,6		19	33,97	7,4			3h21m	1680-//	Janv.	18	56,99	5",8	Moy	enne	2,60	51,1
1	3	23,22	37,0		21	34,06	10,5	Cidna		28°,84			27	56,95 56,90	6,0 6,5				
и	6	23,19	37,9		22	34,10	10,4	revr.	7	29,00		Févr.	3	56,84	3,3	]	LALA	NDE 766	66.
	7	23,27	37,9 37,3		29 31	33,97 34,08	4,6		9	28,83			5	56,96	6,0			36500	-20°55′
ш	9	23,32		Avril		34,25	6,2		12	29,17	52",4	Moy	enne	56,93	5,5	Janv.		յ°,6ւ	_20 33
ш	28	23,28		Mai	24	34,21	7,7 8,1	Déc.	13	28,80 28,78	55 r	T	ATA	wnr esi	l n	June	25		29",0
ic.	4	23,41	39,4		25 26	33,98 34,20	8,1 4,1			28,90					-220431		27	9,36	
и	15	23,47	39,4 $37,5$		28	34,02	6,1						3	1 <sup>h</sup> 46 <sup>m</sup> -	220431	Févr.	3 5	9,56 9,23	28,9
10	yenn	e 23,38		Juin	5	34,15	6,1	]	LAYA	NDE 680	9.	Janv.	18 25	16,27	49",3		7	9,41	31,6
		,			7	34,14	7,4			3h33m	-2005/		27	16,52			9	9,49	
	PIAZZ	1, II, 2	67.		17	34,35	5,9 7,4	Janv.	27		2",9		36	16,46	51,3		13	9,42	34,6
		341m -	-280241		22	34,15	9,5	Févr.	3	27,48	3,7	Févr.	3 5	16,37		7.5		9,63	
Jiv	. 27	231,68	49",4		24	34,21	9,2		5	27,59		31	_	16,41	,	Moy	enne	9,46	31,0
	30	23.84	47,5		25 26	34,27 34,30	5,9 6,6		7	27,51 27,65				16,45		ı	ATAR	DE 781	5
Fir	. 3	23,70	44,9 45,1		27	34,27	8,4		12	27,39			33 8	ERIDAN	₹.	•	JALIAN	DE 701	٠. ا
	7.	24,12	46,2		28	34,33	6,1		13	27,63				3h47m	-2503/			4h3m -	190241
1	9	23,87	44.9		29 30	34,31	7,4 5,7	Déc.			8,4	Févr.		175,17		Janv.	18	178,12	1",9
0	yenne	23,83	46,3	Juill.		34,36 34,42	5,9	Moy	enne	27,53	5,0		9	17,25	43,1			16,90	<i>c.c.</i>
	Α	ONYME.			2	34,39	6,9	I	JALA	NDE 68:	2Q.		12	17,17	44,3	Févr.	<sup>2</sup> 7	16,80	
	24.2		0.000		3	34,15	7,3							17,13	47,97			16,82	
1	-		-180381		6	34,27	8,2			3h33m -				17,18		Moy	enne	16,92	4,0
L).	15	39s,77	41",2		8	34,21	7,3	Fevr.	7	53°,93 54,05	53,5		Λz	ONYME.					
	12	ERIDAN.			9	34,24	6,3		13	54,01	51,5			3h48m	+44021		AN	ONYME.	
		3h5th -	20035/		13	34,35 34,35	6,4	Mov	enne	54,00	52.6	Févr.	16	528.74	36",9			/h/m	10000/
Jav	. 27	39°,53	8",5		28	34,18	5,4	_							8.				
	30	39,51	6,8		4	34,47	7,4	r	ALAI	NDE 686	1.	L					23	4 9 4	24. 0
F.r.		39,37	1,5		15	34,44	10,5			3b34m	-20041				240131		ALAN,	DE 787	3.
	5	39,45 39,62	5,0 5,6			34,23	7,4	Janv.	18	378,56	21//,7	Févr.			49",5				
	, 9	39,53	4,7	P	IAZZI	, III , 5	4.		27	37,72			9	6,95	506				200441
L		39,50	5.3	T/ /	2	54°,09	580201	Févr.	3 5		228		-			Févr.	3 ; 5	56,64 56,68	9",3
		D ,		revr.	7	53.80	56.4		7.	37,73	21,0	Moye	enne	7,05	52,3		7	56,55	14.5
		Persée.			9	53,89 54,20 54,11 53,88	57,1		0				An	ONTME.			9	56,65	-1,10
		3h13m 4	49°19′		12	54,11	57,0	Déc	12	37,71	22,3				/2.2.1		12	56,48	,
134	25	34,21	5",4	Morra	13	54,03	57,9	Mo-	iJ.	37,60		E.i.	.6	n52m +	430391	31	16	20,00	14,7
	20	34,29		Moye	me	34,03	57,2	moy	Hille	37,00	21,9	revr.	10	17-,77	57",1	MOY	enne	56,61	13,3

	lance des crottes sources			
T. 0-4	F 02 (-*-)	The same (auto)	ANONTHE	P1AZZ1, IV, 268.
LALANDE 7874.	LALANDE 8312 (suite).	α TAUREAU (suite).		
4h4m -200451				
Févr. 3 58°,50 5 58,34	Févr. 12 47 <sup>8</sup> ,03 48",3 13 47,11 48,3	Juill. 13 15,61 61",3	Janv. 18 383,18 60",3 25 37,82 64,5	Janv. 18 3,40 29",1 25 3,31 29,3
7 58,43	16 47,09 53,9	17 15,56 60,8	27 37,92 62,4	27 3,25 31,8
9 58,57 9",6	Moyenne 47,07 48,8	18 15,50 63,3	30 37,85 62,5 Févr. 2 37,74 58,6	30 3,09 27,5 Févr. 2 3,35 29,3
12 58,58 10,1		21 15,58 62,5	3 38,03	3 3,28 23,6
16 58,58	LALANDE 8474.	22 15,60 59,9 28 15,53 58,7	5 37,80 57,2	5 3,20 24,4
Moyenne 58,51 9,2	4h21m -21050	Août 11 15,48 57,1	Moyenne 37,91 60,9	Moyenne 3,26 27,9
y Taureau.	Janv. 25 25 <sup>s</sup> ,01 33",7 27 24,87 28,5	25 15,44 59,7	59 ERIDAN.	LALANDE 9603.
	30 24.77 25.8	Moyenne 15,57 60,8	4h41m -16036'	
4 <sup>h</sup> 11 <sup>m</sup> +15°15' Févr. 2 12 <sup>s</sup> ,22 29",7	Févr. 2 24,96 31,1 3 24,97 23,7	53 Eridan.	Févr. 7 448,74 3",2	4"37" -1003
Juill. 13 12,38 32,3	5 24,82 25,8	4631m -14036'	9 44,98 4,3	Janv. 25 56*,76 55",6 1
Août 11 12,30 28,0 25 12,32 25,6	Moyenne 24,90 28,1	Févr. 7 155,86	13 44,93 1,9	36 56,59
Moyenne 12,30 28,9	Anonyme.	9 16,08 14",7	16 44,87 6,5	Févr. 2 56,76 56,5, 3 56,64
Moyenne 12,30 20,9		13 15.00 10.2	Moyenne 44,89 4,0	5 56.57
LALANDE 8113.	4h22m -27°0		LALANDE 9106.	7 56,66 9 56,73
4h11 <sup>m</sup> -21°5′	9 1,31 14,6	Moyenne 15,96 12,4		12 56.61 50.2
Janv. 18 415,72 14",0	12 1,15 13,9	- 00	Janv. 18 2°,09 30",8	Moyenne 56,65 57,1
25 41,76 11,4	16 1,38 17,9	4h31m -1807	25 2,14 30,7	LALANDE 9606.
27 41,92 17,1 30 41,62 14,0	Moyenne 1,26 15,2	Janv. 18 213,43 15",3	27 2,01 28,5 30 1,83 32,8	
Févr. 3 41,53 13,9 5 41.56 15.0	α TAUREAU.	25 20,99 14,3	Fevr. 3 2,04 33,7	4 <sup>b</sup> 58 <sup>m</sup> -18°9
	4427m +16011	27 21,12 12,3 30 21,37 10,9		Janv. 25 05,22 27 0,31 16",5
Moyenne 41,68 14,2	Janv. 7 15°,70 61",1	Févr. 2 21,04 16,9	9 1,81 31,0	27 0,31 15",5 30 0,15 16,2
LALANDE 8130.	18 15,65 62,4	3 21,17 11,1 5 21,17 16,8	13 1,65 28,0	Févr. 3 0,11 13,7 5 0,13
4h12m -23020'	25 15,59 64,2 27 15,64 59,9	Moyenne 21,18 13,9	Moyenne 1,90 31,0	7 0,16
Févr. 7 105,37 32",5	30 15,56 61,4	Drigge IV . See	1,90 01,0	12 0,13
9 10,36 34,6	Févr. 2 15,65 60,8 3 15,54 62,4	PIAZZI, IV, 157.	Anonyme.	Moyenne 0,17 15,5
13 10,32 32,7	5 15,65 61,9	4 <sup>h</sup> 32 <sup>m</sup> -14 <sup>o</sup> 39' Févr. 7 23 <sup>s</sup> ,08 24",0	4"47 +43030	PIAZZI, 1V, 294.
16 10,34 34,6	7 15,64 63,2 9 15,61 60,3	0 23,12	revi. / 39,52 or 5/	
Moyenne 10,33 33,9	12 15,02 59,7	12 23,07 23,9	12 59,42 58,1	4 <sup>h</sup> 59 <sup>m</sup> Févr. 13 28 <sup>s</sup> ,80
LALANDE 8312.	13 15,49 62,3 16 15,63 61,2	13 23,03	13 59,34 57,3	14 28,96
4h16m -25°14'	Mars 17 15.50 61.7	Moveme 23.00 23.8	Morenno 50 37 50 3	16 29,10
Janv. 18 47°,30 47",4	21 15,56 58,9 22 15,60 59,4	LALANDE 8918.	Liegeniie ogio/ ogio	Moyenne 28,95
25 47,04 47,2	Avril 13 15,61 59,6	4h35m -23°28	ANONYME	PIAZZI, IV, 301.
27 47,06 48,3 30 47,00 47,1	19 15,54 59,6 25 15,57 58,3	Févr. 7 59,86 6",2	4h51m +43°46'	
Févr. 2 47,08 53,1	26 15,43	9 59,97 9,0	Févr. 12 203,33 46",1	5hom +46°4
3 46,98 48,6	Mai 1 15,43 57,9	12 59,93 4,2 13 59,89 7,4	13 20,11 41,9	Févr. 12 28',92 47",2 14 29,00 46,7
5 47,13 47,1 7 47,10 46,7	5 15,58 57,6	16 59,90 7,2	16 20,12 44,4	16 29,00 41,8
10 =	Juin 20 15,49 64,8	Moyenne 59,91 6,8	Moyenne 20,22 44,1	Moyenne 28,97 45,

105

Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1849, ramenées au 1et Janvier de cette année.

,								-									_		
1	α	Соснев.			B Or	ion (sni	te).	B	TAUI	REAU (SI	ite).		A	NONYME.			A	ONTME.	
F		r i. rm	1/505-1			€bm	-8°22'			i - Cm .	-001			Ch. 2m	-6°19'			MI	FAFCI
lanu	. 9	325,73	+45°5°		2	165,91				5116m + 44³,98	20020	Fávr	.3	4,15			_	5°,56	-5°56′
Janv.	25	32,73 $32,88$	18,6	l CvI.	3	16,93	52,3	revr.	3	45,10	27",2	L CVI.	14	4,30	60,8	Levi.	7	30,30	32 ,0
	27	32,83	17,2		5	16,85	51,7		5	44,93	29,4	Moy	enne	4,22			An	ONYME.	
Févr.	30	32,60 32,84	19,6		7	16,82	48,0 50,0		7	44,94	29,3							Sho-r	n -6°8′
revr.	3	32,81	16,0		9	16,85	48,7		9	44,85	24,4	L	ALAN	DE 103	89.	Edma	2	53°,09	-000
	5	32,67	18,2		1,3	16,98	51,0		13	44,88				$5^{h_2}3^{m}$	-60181	Levr.	J	55 ,0g	10.40
	7	32,56	21,1		14	16,93	55,8		14	44,97	24,8	Févr.	7	37°,89 38,04	38",2		ι (	ORION.	1
	9	32,58 32,79	16,6	Mars	16	16,94	48, <sub>7</sub> 51, <sub>2</sub>	Mars	16	44,95	26,7 27,2							Mh Om	
	13	32,69	18,4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	17	16,85	51,1	Mauro	18	44,90	27,1		12	37,86 38,01	39,2	Févr.	=	5h28m	
	14	32,56	19,4		18	16,93	55,1		20	44,77	25,6		14	38,18		revr.	7	2 <sup>8</sup> ,99 2,83	
Mars	16	32,46 32,38	16,2 16,2		19	16,83 16,74	54,3 51,9	Avril	21	44,77	24,4		15	37,90	38,5	Mov	,	2,91	- 1
Mars	20	32,50	22,0		21	16,87	49,3	ALVIII	25	44,94 44,94	25,3 26,0		16	37,90		INLOY	cunc	2,91	- 1
	21	32,43	22,4	Avril	13	17,01	49,1		26	44,84		Moy	enne	37,97	38,5	11	EISS	E, V, 7	34.
Avril		32,66	18,9		25	16,81		Mai	I	44,85	21,8		A 1	NONYME.				~:	m
	25	32,51 32,60	20,4	Mai	26 I	16,92 16,90	50,8 51,2		5	44,92 44,94	22,1 28,2						0	5h2	9"
Mai	ī	32,38	18,0	.,	5	16,93	47,6		13	45,02	23.3	- ·			a -6°6′	Janv.	10	13,03	
	3	32,52	20,6		01	16,88	48,5	Juin		44,88		Fevr.	9	25 <sup>3</sup> ,84 25,82	19",0	Févr.	9	13,21	
Juin	5	32,34		Juin	30	16,85 16,78	55,3 52,0	Juill.	6	44,98	23,4		13	25,72	18,8		- 1	13,14	.
Juin	30	32,78 32,77	20,9	Juill.	2	16,77	51,6		7	44,88	20,7	Mov		25,79		nigo y	CARIAC	10,14	
Juill.		32,81	18,4		7	16,88	54,3	-	8	44,95	24,0			1/3	,-	V	EISS	E, V, 7	56.
	6	32,67	16,7		8	16,87	53,9		9	45,01	28,4		$\Lambda$ 1	ONYME.				Kh2or	n -6°2'
¢1	7 8	32,61 32,54	20,4		9	16,89	53,3 53,1		12	45,07	23,1			5b27"	n -606'	Jany.	30	4°,13	-0.2
	9	32,68	18,3		13	16,52	53,0		18	44,89	24,5	Janv.	18	26°,26		Févr.	3	4,33	
5	12.	32,57	19,2		18	16,85	51,2		20	44,88	23,1		25	26,38			5	4,45	0",8
2	13	32,71	16,4		20	16,69	53,4		22	45,05	27,0	Févr.	27	26,47			7,	4,27	3,5
	18	32,60 32,56	15,9 18,5		21	16,75	$\frac{5_{2,1}}{5_{1,9}}$		26 28	44,98 44,92	22,3	revi.	12	26,08			14		
	21	32,57	18,2		28	16,62	54,1		31	44,94	24,0		13	26,10		Moy	enne	4,29	2,1
	22	32,39	18,2		31	16,75		Août	I	44,89	24,0		14	26,46	47,2 $43,9$		A		
.)	27 28	32,55 32,65	18,8	Août	1 2	16,67	52,5 52,8		2	44,82 44,83	23,5 21,5		15	26,23 26,34	42,2		AN	ONYME.	
	31	32,58	18,8		3	16,87	52,1		4 6	44,73	24,5	Mov		26,28	44,1			5530m	-60131
Août		32,61	16,7		4	16,84	49,4		7	44,81	23,5					Févr.	9	578,12	
	2,	32,60	17,0		6	16,75	55,1		9	44,83		,	Aı	NONYME.			12		37,0
	6	32,68 32,55	17,9		7	16,64	52,6 53,9		25	44,85 44,83	24,1 24,0			5h271	m -6∘5′		13 15	57,23 57,16	37,0
	7	32,49	15,5		25	16,73	50,2	78.87			25,2	Janv.	25	405,88			16	57,16	0,,0
	II	32,50	15,9	Moy	renné	16,83	51,8	moż	renne	e 44,93	25,2		27	40,77	18,1	Mov	enne	57,16	36,7
	25	32,82	15,2					1	AT.A?	NDE 103	66.		3c	40,80				-//	//
Mo	yenn	32,61	18,2		B 1	CAUREAU							enne	40,82	19,4		An	ONYME.	
	В	ORION.				5616m -	+28°28'			5h221			Aı	NONYME.				51,2 m	-6°15′
				Janv.	. 7	45°,03	2811,7	Janv.		53,49				5000	m -6°1′	¥7.4			-0-15
Innu	, 0	5"7" 16°,80	-80221		18	44,98	30,6		<sup>27</sup>	53,39 53,38	35,4			47°,84		revr.	13	12,41	28".2
Janv	25	16,81	53.8		26	45,10 45,03	25,2			53,34		Févr.	3	47,95	29 74		14	12,46	26,9
	27	16,86	49,4		27	45,05	27,2		5	53,37	31,2	1	5	47,96				12,36	23,6
	30	17,05	48,9		30	44,92		Mo	yenn	e 53,39	35,3	Moy	yenni	e 47,92	55,8	Moy	enne	12,40	26,2

WEISSE, V, 921.	a Orion.	Anonyme (suite).	GROOMBRIDGE 1127.	y GÉMEAUX.
5h35m -6°52	5h46m +7°22	5h52m +7°17'	6h6m +56°18'	6h28m +16o31'
Janv. 18 335,77	Janv. 18 595,83 23",2	Févr. 3 35,10 60",2	Févr. 16 44s,94 22",3	Avril 26 59,15 22",3 Août 15 59,02 20,5
25 33,90 27 33,93	25 59,88 24,5 26 59,84 22,4	5 35,07 59,9 7 34,97 60,8	ANONYME.	17 59,06 20,5
30 34,05 26",2	27 59,89 27,7	Moyenne 35,07 57,9		21 59,16 23,3
Févr. 3 34,00 25,5 5 33,92 29,0	30 59,84 27,2 Févr. 5 59,91 25,9		6h11m +51037'	2 5
7 33,80 29,7	7 59,85 26,4		Févr. 16 25°,97 14",2	
9 33,94 12 33,96	9 59,86 25,2	5h56m +49°57'	Arceland., Z. 163, no 190.	Moyenne 59,12 21,4
13 34,03	13 59,92 26,3	Févr. 7 495,23 15",9		ARGELAND., Z. 169, nº 17.
14 33,94 30,1 15 33,72 33,9	14 59,86 25,6 15 59,71 25,0	12 49,14 14,2	Janv. 18 316,40 22",1	
Moyenne 33,91 29,1	16 59,86 26,7	15 49,26 13,4	25 31,26 17,9 27 31,11 18,5	6\begin{aligned} 6\begin{aligned} 32^m +51\begin{aligned} 53.90 35'',3 \end{aligned}
Avoveur	Mars 20 59,61 24,5 21 59,73 25,9	16 49,22 14,5	30 31,00 18,6	25 6,85 37,5
Anontme. 5\(\dagger{0.48}'\)	Avril 24 59,75 25,6	Moyenne 49,20 14,2	Févr. 3 31,40 18,8 5 31,18 22,4	27 6,69 38,9 30 6,77 39,5
Févr. 9 425,27 21",6	Mai 1 59,75 22,4	ANONYME.	7 30,76 21,5	Févr. 3 6,71 41,5
12 42,14 20,9	5 59,89 23,8 10 59,57 25,3	KI KOM . K -		7 6,65 37,8
13 42,15 22,3	10 59,57 25,3 23 59,79 24,7	Janv. 25 115,61 38",9	Moyenne 31,10 19,9	Moyenne 6,73 38,1
Moyenne 42,23 21,9	25 59,67 26,5 26 59,75 28,5	27 11,87 40,0	µ Gемелик.	120,500000000000000000000000000000000000
LALANDE 10873.	31 59,79 24,3	30 11,88 42,1 Févr. 3 11,61 42,3	6h13m +22°35'	A NONYME.
5636m -6049	Juin 1 59,77 26,3 Juill. 16 59,73 21,4	Moyenne 11,74 40,8	Avril 26 495,27 7",4	6h34m +51°58'
Janv. 18 595,12 29",8	17 59.79 24,4	1203 (1110 121) 4 4230	Août 17 49,11 3,1	Janv. 18 18s,84 23",5
25 59,38 25,8	18 60,00 27,8 Août 1 59,67 24,5	GROOMBRIDGE 1103.	22 49,33 3,7	25 18,81 24,5 27 18,65 25,7
27 59,25 25,0 Févr. 9 59,27	2 59,73 24,2	6"1" +51°12	23 49,52 3,3	30 18,50 25,0
12 59,06 13 59,27	4 59,82 6 59,73 26,3	Janv. 27 513,07	23 49,5+ 0,4	Févr. 3 18,87 27,9 7 18,05 29,2
Moyenne 59,27 26,9	7 59,62 25,7	30 50,90 Févr. 3 51,02 13",5		13 18,24 24,4
Weisse, V, 964.	10 59,78 24,8 11 59,67 24,8	5 51,09	ANONYME.	Moyenne 18,57 25,7
5h37m -6°56	14 59,74 24,1	7 50,98	6h21m +51°5'	Anonyme.
Janv. 18 13 <sup>s</sup> ,32	17 59,83 25,3	13 50,71 13,9	Févr. 13 58°,64	6435m +51°56'
25 13,48 27 13,41	25 59,80 22,8	15 50,83 10,0 16 50,81	15 58,49 36",5 16 58,76 35,9	Janv. 18 385,10
30 13,28 6",7	Moyenne 59,78 25,1	Moyenne 50,91 13,2		Févr. 16 37,85 7",5
Févr. 3 13,26 0,3 5 13,35 2,6	PIAZZI, V, 280.			Moyenne 37,98 52,3
7 13,19 5,5	5h51m +49°53	GROOMERIDGE 1106.	ARGELAND., Z. 76, nº 105.	- CPAND CHIEF
9 13,32 8,3	Févr. 13 45,84 43",6 15 4,74 45,1	6h2m +51011	6h22m +51011'	
Moyenne 13,33 4,7	16 4,90 47,9	Janv. 27 283,01 44",3 30 28,24 46,7	Janv. 18 33,34 56",7 25 33,01 57,2	6 <sup>b</sup> 38 <sup>m</sup> -16°30' Janv. 25 29 <sup>3</sup> ,44 48",8
Anonyme.	Moyenne 4,83 45,5	Févr. 5 28,35 48,3	27 33,12 61,7	27 29,47 43,6
5 <sup>6</sup> 40 <sup>m</sup> -6 <sup>6</sup> 42 Févr. 13 60 <sup>s</sup> ,00 9",1	Anonyme.	7 27,92 51,0	30 33,00 57,7 Févr. 3 33,20 63,2	30 29,67 46,7 Févr. 3 29,56 44,4
Févr. 13 60°,00 9",1 15 59,77 8,7	5h52m +7°17	13 27,89	7 32,66 61,6	7 29,43 43,2
16 59,68 10,6	Jany. 27 35°,05 53".3	16 27,93 50,9	13 32,67 59,1 Moyenne 33,00 59,4	13 29,59 44,2 16 29,44 44,8
Moyenne 59.82 9,5	30 35,15 55,3	Moyenne 28,03 48,2	Moyenne 33,00 59,4	-9,77 771

-	_,					_			-				_							
α	GB	LANE	CHIEN	(suite).	1	Anor	NYME (St	ite).		A	NONYM	Ł.		α <sup>2</sup>	GÉMEAU	x.	αP	ETIT	CHIEN (	suite.)
							·										1			-
			-	-16°30	'		6h50m	-22027				-27014	4			+32012				+50361
Mai	rs	18		46",3			118,31		Févr		15°,51		Févr		57°,36	52",4	Juin		235,74	26",1
ł		19	29,56		Mars		11,78			13		5 52",3	1	15	57,42	50,5		5	23,60	29,3
		20 21	29,65 29,66	44,3			11,47		35000	16	10'0			16	57,49 57,38	50,6		7 8	23,73	30,7
		22	29,55	45,5	Mo	yenn	ne 11,40	6,7	Mars	21	NO DE C		Mar	20	57,59		Août		23,62 23,63	28,7
Avi	il		29,49			A	NONYME		Ma		15,48		-	21	57,45		1 Out	11	23,71	26,0
		25	29,56			23	MONTHE	•	1110	y CIII.	10,40	, 54,5		22	57,45			24	23,57	27,2
I		26	29,52				6150m	-22°26	1	A	NONYME		Avri		57,32	47.9		25	23,59	25,9
Mai		1	29,59		Févr.	. 7	12°,62	46",3						11	57,25	45,9		27	23,64	28,8
		24	29,63 29,53			13	12,60	48,8				n -27°5	/	18 24	57,52 $57,39$	50,7 48,6		28	23,71	
		25	29,53			16	12,37	45,5			05,64			25	57,39	47,5	27	29		26,4
		26	29,52		Moy	yenn	e 12,53	46,9	Mars		0,71			26	57,39	46,9	DIO.	yenn	e 23,67	28,3
		27	29,63						Mo	yenn	e 0,67	8,3	Mai	I	57,36	48,5		BC	GÉMEAUX	
		29	29,40			A	NONTME							10	57,26	, , ,				
Juin		31	29,65 29,50				$6^{\mathrm{h}53^{\mathrm{m}}}$	-22°30	/	Α	NONYME			24	57,32	47,4	61		7136m	-28°23′
Juli	1	2	29,75		Févr.	13	40°,11	46",9			716m	-27°13	/	26	57,34 57,25	48,1 49,2	Févr.	15	4°,16	8",9
		7	29,74			16	39,91	48,6	Févr.			23",8			57,34	49,5		16	4,14	7,3
		8	29,68				40,15		Mars		20,21		Juin	<sup>2</sup> 7 5	57,33	49,1	Mars		4,20	6,9
Juil.		6		43,9	Moy	venn	e 40,00	47.7		21	20,00			78	57,36	50,3		20	4,25	7,2
		28	29,49						Moy	renn	e 20,00	25,3			57,27	$5_{2,9}$		21	4,15	7,9 8,7
Aoù		14	29,55 29,33			A	NONTHE.						Août	24	57,26 57,35	45,0	A	23	4,20	8,7
		15	29,34	42,0			6h53m	-22°30	'	A:	NONTHE			25	57,48	45,4	Avril	11	3,88	5,5
		17	29,54	42,1	Févr.		46s,79				7h7m	-27031		26	57,35	46,0		18	4,17	7,3
		21	29,52	43,4		16	46,83	48,6	Févr.	7	313,45	•		27	57,37	46,5		24	4,11	7,6
		22	29,48	42,3			47,08			13	31,47	7",2		28	57,44	46,9		25	4,08	5,0
		23 25	29,44	45,4 44,9	Moy	enn	e 46,90	47,7		16	31,44	8,9		29	57,40	46,2	7.5	26	3,96	6,6
		23 27	29,60	44,9	Т		NDE 136	- =	Mars		31,54		Mo	yenne	57,38	48,7	Mai	I IO	4,03	6,6
RI.			29,55	44,4	L				1	21	31,52							24	3,93 3,98	6,8
CFA.C.	y	311110	29,55				5h54m -	-220261	Moy	enn	2 31,48	8,0		α Per	гіт Спі	EN.		25	4,08	7,7
	L	LAN	DE 132		Févr.			16",0		A	NONYME				1.73	W 0.01		26	3,91	8,4
			6h43m	-2100	Mars			16,7								+5°36′	(	27	4,01	9,8
řévi	٠.	16		41",8	Moy	enne	e 5,32	16,3			•	-23057	Févr.		23,62		Juin	1 5	4,00	8,0
lar			7,57	49.1		١.					225,27	1",3		15	23,73	29,3		7	4,10	7,3 9,1
	•	2.1	7,62	42,8		25 0	NONYME.		Mars		22,44	3,6	Mars		23,61	28,5		21	3,92	6,1
Mo	ye	nne	7,51	44,6			7bom .	-21047	3.6	21	22,39			20	23,81	24,9	Août	10	4,03	6,9
			DE 133	35	Févr.	7	88,71	6",9	Moy	enn	22,37	1,1		21	23,85	28,3		II	3,93	
	L	LUAN		,	Févr.	13	8,78	,5		Ar	ONYMB,			22	23,86	26,2		24	3,86	7,9
				-21°0'		16	8,91					-23°54′	Avril		23,69	29,1		25 26	4,06	9,2
GAI			125,67		Mars		9,00	10,9	Ráva			50",4		18	23,75	26,9 30,4		28	4,22	7,1
		15 16	12,67	14,2		21			I CVI.	13	31,00	30.,4			23,65				4,18	7.7
far			12,75		Bloy	enne	8,86	8,1	L	ALAN	DE 148	78.			23,68		Moy	-	4,06	7,7
			12,73			Α •	VONTME.				7 <b>h</b> 21 <sup>m</sup>	-22033/		26	23,56	29,7			• /	- ''
	2		- "	13,0		44.			Févr.	13	178,67	21//.2	Mai	A		28,8	L	ALAN	DE 1516	3.
1			ONYME.					-21°43′		16	17,79	22,6		10	23,76	28,2		7	h39m -	200161
		(	51.50m -	-22027	Févr.	13	125,88	47",I	Mars	20	17,98	26,8		26	23,61	28.3	Mars		17 <sup>8</sup> ,75 2	
évt		7	113,38				12,73			21	17,92			27	23,61			21	17,74	23,2
	1	13	11,38		Bloy	enne	12,80	45,3	Moy	enne	17,84	23,1		31	23,71		Moy	enne	17,74	24,3

1					
	Anonyme.	ANONYME.	LALANDE 17727.	α Hydre (suite).	Lalande 19338.
	7 <sup>h</sup> 39 <sup>m</sup> -21°10	8hpm -220/5/	8h5om -18u33'	9h20m -800'	9h44m -220181
Févr.		Mars 19 34 <sup>s</sup> ,21 9",9	Mars 19 445,48 38",6	Mai 10 93,89 27",0	Mars 19 55,51 48",4
	Anonyme.	Anonyme.	20 44,96 36,9	23 9,95 27,4 25 9,99 29,8	20 5,92 46,5
	7142m -20054		Moyenne 44,72 37,7	26 9,98 29,0	
Févr.	16 578,97 28",6	Wang to 85 56 18/18	ANONYME.	Juin 1 10,05 28,3	ANONYME.
Mars	17 58,17 32,3 20 58,34 33,5	20 8,94 21,6	8h56m -25°1'	19 9,88 27,6	
	21 58,21 32,6	Moyenne 8,75 20,2	Mars 20 23,28 47,4	21 9,95 27,2 22 9,93 25,4	9h46m -22014/
Moy	venne 58,17 31,7	LALANDE 16381.	21 23,02 38,9 Moyenne 23,15 43,1	27 9,69 28,6	Mars 19 35,61 7",3 20 36,02 4,5
	Anonyme.	8h13m		21 9,90 25,8	21 35,98 4,8 Moyenne 35,87 5,5
	7h46m -2101	Mars 19 328,50		3/ 1	
	16 4°,77 1″,1	20 32,56	8h56m -24o54'	Moyenne 9,93 27,5	ANONYME.
Mars	20 5,19 8,8	Hoyenne 32,33	Mars 19 318,97 37",1	Anonyme.	9h51m -24024'
	21 4,85 7,5		20 32,32	9h23m -210281	Mars 19 18,50 50",7
Moy	yenne 4,95 5,1	8h13m -22°53	Moyenne 32,12 37,1	Mars 19 85,20 59",3	21 18,49 44,5
P	1AZZI, VII, 266.	Mars 19 375,92 15",3	LALANDE 18250.	20 0,40 30,3	Avril 25 18,52 49,8
	7150m -22°28	20 38,30 11,3		Moyenne 8,33, 59,0	Moyenne 18,49 47,2
	. 16 21 <sup>8</sup> ,92 19 21,88	Moyenne 38,11 13,3	Mars 21 0,18 3",3		Anonyme.
212415	20 21,95	LALANDE 16649.	Avril 6 0,31 7,3	THORI ME.	9h55m -21°22'
Avril	21 22,12 6 21,92 47",7	8620m -22°45	Moyenne 0,24 5,3	9 <sup>h</sup> 27 <sup>m</sup> -21°51′	Mars 19 44,19 29",6
	yenne 21,96 47,7	1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	Anonyme.	Mars 19 345,34 13",1 20 34,35 13,9	20 44,58 25,4
	Anonyme.	Anonyme.	9 <sup>b</sup> 12 <sup>m</sup> -20 <sup>o</sup> 9	1 21 34.42 13.4	Avril 25 44,16 25,9
	7h50m -22025	Sha/m a30a5/	Mars 19 18,41 18",1	Moyenne 34,37 13,5	Moyenne 44,34 27,3
Févr.	. 16 27°,59 32",8	Mars 20 378,68 56",6	20 1,00 20,0	Anonyme.	a Lion.
Mars	5 19 27,64 35,4 20 27,95 38,1		Avril 6 1,68 22,7	9h31m -20014	10'0m +12°42
	21 27,84 33,8		Moyenne 1,60 20,2	Mars 19 328,44 60",2	
Mog	yenne 27,75 35,0		AWONVER	20' 32,74 52,8	20 19,45 10,6
	Anonyme.	Mars 20 51°,94 38",0		21 32,72 56,1	22 19,62 9,6
		LALANDE 17048.	Mars 21 15,78 25,8	Moyenne 32,63 56,4	Avril 6 19,53 9,4
Mars	5 17 9 <sup>5</sup> ,28 40",0	8h31m -23021	1	ANONYME.	25 19,44 10,9
	20 9,23 41,1	Mars 20 58,88 24",4	а Нудке.	9,54 -20,13	Mai 1 19,53 11,2 10 19,51 11,2
	21 9,33 41,8	ANONYME.	9h20m -800	Mars 19 595,38 55",9	12 19,26 8,1
Mo	oyenne 9,24 40,2	8h39m -23°14	Mars 17 95,91 25",1	ANONYME.	23 19,44 10,1
	Anonyme.	Mars 20 45,08 35",8	20 10,06 30,3	0h40m -24036	, 25 19,40 12,0
	7 <sup>h</sup> 59 <sup>m</sup> -22°4	5'	21 9,95 25,9	Mars 10 425,24 2011,0	20 19,00 9,2
Févr Mari	r. 16 34 <sup>8</sup> ,95 41",9 s 19 35,18 40,	8b/3m -2302	Avril 6 10,03 28,3	20 42,68 20,6	Juin 1 19,38 13,7
		Mars 20 21°,56 36",1	22 9,83 26,9 26 9,93 29,0	Moyenne 42,51 20,2	2 14,50
		' '	J.J J.		

109
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1849, ramenées au 1er Janvier de cette année.

_								1			2010,	7 001100	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	uu I	• ance	, ac	CCEEC	unnec.	
																1			
	~ L1	on (suit	e).			Lion.			5	6 Lion				Lucar			0.1		- \
	U. 834	.021 (01111	· /•				+10041		J	O LION.			(	TION.			D L	on (sui	(e.)
		$\mathbf{IO}^{i_1}\mathbf{O}^{\mathbf{m}}$	+12042	Mai						10h48n	+6.59	1		11h13m	+6.51	,		ıb/ım	+150241
Juin	19	191,35		mai	1.5	515,57 51,12		Mai						218,10				213,07	
	20	19,39	10,3		24	51,30			12	10,60	23,5		12				26	21,19	53,6
	21	19,40	11,3		25	51,39		Mos		e 10,90		-	24	, ,			31	21,21	54,6
	22	19,33	10,7		26	51,21		1		c 10,90	22,2		25	20,86	22,7	Juin	I	21,23	55,5
	24	19,48	9,9	Dia	WAR.	e 51,32	53,7	- α	GR.	ANDE O	URSE.		` 26	20,87	20,5		5	21,11	56,9
	26	19,44	7,9	MIO	yenn	c 31,32	33,7					Juin	I	20,92	25,6		21	21,08	
	27 28	19,48	7,2		. 40	Lion.			1	oh54m	+62033	Mo;	yenn	e 20,92	21,7		22	21,20	- 1
Juill.			9,3 8,4			,		Avril	6	218,82	50",7	1			_		24 26	21,20	52,8
1	3	19,36	10,4			10h27m	+9025	1	25	22,18	$5_{7},3$	15	у Нұ	DRE ET	COUPE.		28	21,11	52,6 53,3
	7	19,44	11,6	Avril					27	22,30				1 h 1 7 m	-605-1	Inill.		21,20	53,1
	7 8	19,51	13,2		26	6,77	45,1	Mai	I	21,84		ļ					8	21,23	57,0
	13	19,62	9,1		27	6,58	45,5		12	21,73				208,58			12	21,24	55,9
	17	19,46		Mai		6,58			24	21,81		Mai	I	20,80	19,0		14	21,15	54,5
	21	19,28	13,0		12	6,37	42,8		25	21,49			24		22,I 16,2		17	21,32	56,0
	23	19,52	10,7	Mo	venne	6,52	44,3		31	21,78			25		18,8		25	21,15	52,8
	25 26	19,45	0,13				,	Juin	I	21,74	56,0		26	13.3	15,3		26	21,22	54,5
3.5	-		7.7	1	40 Pi	rir Lic	N.		21	21,78	57,8	Mos	venn	e 20,60			<sup>2</sup> 7 28	21,22	53,2
Moy	enne	19,44	10,5					1	22	21,78	56,1	1,10	,	20,00		Λοût		21,31	51,3 54,1
	Aw	ONYME.				10h34m	+27061		27	22,02	51,7	l p	VEISS	e, XI, /	446.	Mout	3	21,35	53,6
1	28.29	ON 1 at E.		Avril		43s,74	58",4		28	22,00	55,5			,,			4	21,44	54,4
		IOh7m	-2205/		26	43,88	019,0	Juill.	7	21,92	54,7		:	11 <sup>h</sup> 25 <sup>m</sup>	+80481		6	21,24	51,7
Mars		36°,62	8",7		27	43,84	59,4		8	21,63	53,2	Avril	27	448,37	48",1		7	21,19	52,0
Avril	25	36,48	10,0	Mai	1	43,94	58,5		13	22,01	55, <sub>7</sub> 5 <sub>2,5</sub>	Mai	I	44,63	45,9		8	21,11	53,1
		36,55	9,3			43.68	57,2		17	22,00	53,0		12	44,50	47,4		15	21,18	53,3
21203	CHIIC	00,00	9,5	Moy	yenne	43,82	58,6		25	21,97	52,7	Moy	yenn	e 44,50	47,1	Non	16	21,09	55,7
	An	ONYME.							26	22,05	54,0					Nov.	0	21,26	51,7
					51 /	mª Lio	N.		27	21,64	54,2	1	EISS	E, XI, 5	23.	77	7		51,3
		top11 <sub>m</sub>	-22°0'			100		Août		21,80	53,7			L -	~ !		enne	21,22	54,4
Mars	19	164,62	8",9				+19°41′		3	21,79	54,4	7.		11h29			GRA	NDE OU	DSP
Avril	25	16,68	10,8	Avril	25	16°,06			6 8	21,89	51,0	Mai	1	57°,08	43",0	'	Ona	MDE OU	use.
Moy	enne	16,65	9,8			16,13		Oct.	-	21,80	52,8			Vannon			1	1h45m 4	540321
			_	Mai	12	15,85	7",2		-				Ιω	Vierge		Avril		518,90	1",1
30	fF	ETIT L	ion.	Moy	enne	16,01	7,2	Moy	enne	21,87	54,5			11h30m			26	52,17	5, o
		. m .	6/ 33/				•					Mai		40°,54	1000		27	51,85	3,1
		b17m +		I	ALAN	DE 207	So.		Ar	NONYME.		Z-Lat	12	40,56	11".0		29	52,12	1,7
Avril		14,57								oh 58m	L.OCECI		24	40,36	14,1	Mai	I	52,14	
	26	14,75	48,3				+19°45′				19056		25	40,30	11,1		12	52,36	
Mai	27	14,52	47,6	Avril	25	34°,38	25",7	Mai	1	47°,64	57",2		26	40,30	11,7		24 25	51,70 51,78	2,0
Mai	1 2	14,68	49,2		27	34.41	27,2		Ã			Moy	enne	40,41	12,0		26	51,74	0,5
1 37				Moy	enne	34,40	26,4		AN	ONYME.				• / ·			31	51,99	7,1
Moy	enne	14,57	47,7	J		.,.			I	oh5om	+10°26′		B	Lion.		Juin	1		6,6
a Po	MPR	PNEUMA	TIOUE	45	ωGr	ANDE O	URSE.	Avril		13°,71				L / m			5	51,68	4,5
4.0			1						-1	10 1/1	.,			1 h / 1 m -			21	51,91	4,0
	1	0 <sup>h</sup> 20 <sup>m</sup> -	-30°18′		L	oh45m	+43°59′	V	VEISS	se, XI,	61.	Avril		218,25	57",6		22	51,89	0,5
Avril	25	148,72	2",5			16°,16	,			, ,			26	21,40	57,4		24	52,00	4,0
	26	15,01	3,2		27	16,34	33",8		t	164m +	10041		27	21,29	54,3		26	52,05	1,9
75.		15,02	0,6	Mai	í	16,33	36,9	Avril	27	50s,96	11",1	Mai	29 1	21,13	55,1 55.8	Tuill	28	51,95 51,88	3,0 3,4
		14,81	3,7		I 2	16,06	32,6	Mai	ī	51,18	9,0	LIZAL	12	0.4	M	Juill.	8	51,88	5,0
Moy	enne	14,89	2,5	Moy	yenne	16,22	34,4	Moy	enne	51,07			24					51,92	5,6

	_						0010000	1	_										
										, .		5.57		3/111	, 00			0	
y GRA	NDE	Ourse	(suite).		A	NONYME.		α	VIE	RCE (sui	te).	W	EISSE	, XIII,	400.	n GRA	NDE	OURSE	(suite.)
	1.1	1 h 45 m +	540321		1	2 <sup>h</sup> 35 <sup>m</sup> .	121011			3h17m -				$3^{\rm h} 28^{\rm m}$				13h41m	+50041
Juill.		51°,91					1",4	Juin	25	14°,46	16",9	Avril	25	168,19	17",8	Juin	29	35,20	7",0
	17	51,91	2,5		26	21,73	2,2			14,60		Mai		16,07	15,9	Juill.	6	35,03 35,22	8,1 6,5
	25 26	52,04 51,96	2,1 4,7	Mai	29	21,79	1,7		<sup>2</sup> 7 <sub>2</sub> 8	14,59			10	16,05	20,2		14	35,33	
	27	51,93		111111	25		59,2	Juill.	2	14,63	15,4		12	15,98	14,3		16	35,35	6,6
	28	51,91	3,2			21,42	2,2		3	14,64		Mo	yenne	16,08	17,1			35,24	7,8
Août	3	51,93	4,6			21,46	2,3			14,58		7.7		27.53.5	r. E		21	35,15 35,29	10,6 8,5
	4	51,92 51,89	4,3 4,1	Moy	enn	e 21,62	1,6					1 YY	EISSE	, XIII,	313.	į			7,8
	6	51,97	59,6	W	EISSE	, XII,	1036.		13	14,52	13,3			13h3o	n +3°9′		27 28	35,22	
	78	51,82	5,1			12h59m				14,59		Mai	25		11 90	Août	1	35,19 35,14	9,0 8,7
	ξ0	51,92 52,04	2,9	A:1	٠.٢	58,06	2",5		17 25		17,1		20		11,7		3	35,03	7.6
	15		59,3	Avin	26	57,94	4.7			14.51	16.7		27 31	4,07 3,84	11,9		4	35,13	7,6
	16	51,72	5,8	Mai	1	57,91	2,1		27	14,52	15,3	Juin	I		15,0		7 15	35,10 35,24	7,8
Nov.	3 6		3,6 3,2		12	57,96	4,3	Août	28	14,47	14,7		2	3,91	7,9		23	35,03	5,1
		51,76			24	57,88 57,79	2,9	Louis	3	14,70		Mo	yenne	3,96	12,0		24	35,00	7,4
Mov		51,92			25	57,89	4,1		4	14,63							26	35,19	
ľ				1	20	57,85				14,59			Ar	IONYME.			27	35,22 34,99	1 6
23 C1					renn	e 57,91	3,1		7 8	14,50			13	3132m -	160341	Oct.	18	35,32	7,7
		2h27m -		w.		, XII,				14,59	20,7	Mai	I 2	245,18	3/11 0		19	35,25	6,4
Avril	22	19,21	38",5	1				h	12					23,98				35,21	
	24 25	19,39				13hom				14,52 14,43		Juin	27	24,18	35,5	Moy	renn	e 35,19	7,8
	26			Mai	27	3s,33	50",7		24	14,42	17,9	Ma		24,0/	33.9	· I	ALA	NDE 255	43.
	29	19,29	35,5	W	EISS	e, XIII,	, 56.			14,67		Mo	venne	3 24,10	33,0			3h45m	. 200 51
Mai	12	3, 3	11.6	1		13h4m			27	14,64 14,63			A	VONYME.		Avril		41°,41	_
	24 25	-19,39 -19,39				195,01		Nov.				1		353° -		Mai	1	41,61	
1		19,35		ZVIII	26	18,73				14,70	19,5	A					01	41,65	
Moy	enn	e <b>1</b> 9,39	37,8	Mai	12	18,78	4,7			14,64		AVE		315,20			12	41,23 41,08	17,8
					16	18,88 18,68				e 14,57		Mai				Inin	JI.	41,34	15,6
		NONYME.			25	18,82		w	EISS	e, XIII,	3or.		10		32,5		6	41,32	
		$2^{h}$ $O^{m}$			26	18,70	1,7			13h18m	+6°29'		26	31,06		Moy	yenn	e 41,35	17,4
Avril		43°,63	46",6	Moy	yenn	е 18,80	3,6	Avril	25	50,42	39",3		27	31,25				- + C	
	20	43,47 43,76	46,3							50,20	41,4	Juin	I	31,09		. '		NDE 256	
Mai	12	43,53	50,7			VIERGE		Mai	10			Moj	renne	31,16	36,4			3h48m.	
	24	43,50	46,0		1	3h17m	-10022		12	50,54 50,33 50,28 50,31 50,29	42,7			NDE OU		Avril Mai		12,57	
	25	43,40 43,36	46,8 44,9	Avril	30	14°,69	16",I		24	50,28	41,9	1					10	12,59	29,0 25,6
	27	43,38	45,6	Mai	27	14,40	17,1		25	50,31	40,5			13411m		'	12		27,9
Moy		43,50			31	14,000	19,6	May	anni	e 50,36	417	Mai	27	35,40	11",0	Juin	I	12,23	2 <sup>7</sup> / <sub>4</sub> ,8 26,7
ľ				Juin	I	14,67	19,9	Moy				Luia	31	35,46 35,35	7,2 8,7	Man		12,32	
	•	VIERGE.			5	14,71	16,9		h	VIERGE.		Juin	18	35,14	8,4	Moy	enn	e 12,42	27,7
		12h34m			6	14,51	14,3	Y .		13h25m	-9025		21	35,00	10,5	I	ALAI	NDE <b>2</b> 58	24.
Mai Juin	31	05,46	15",9		18	14,59	16,7	Juin	1 2	1,34	5",9 5,9		22	34,97	5,0	1		13'55m	
Juin	2	0,76	17.7		21	14,41	13,4		3	1,26	7,5		25 26	35,04 35,23	8,7	Avril		215,99	
Mor	enno	0,08	16,0		24	14,43	17,7	Moy	enn	e 1,27	6,4		27	35,31	10,2		26	22,01	13,8

П	ı										-		1							
L	LA	NDE	25824	(suite).	×	VIE	rge (sui	te.)	α	Bou	vier (su	ite).		A	NONYME.		A	NON.	YME (su	ite).
			13h56m	-4.39			14h4m	-9°34′	Ì		14h8m	+19°58′		1	4616m -	-110431		1	4 <sup>b</sup> 25 <sup>m</sup> -	130391
Avi	ril	27	225,04	13",4	Juin		505,78	2",0	Août		46s,39		Avril	25	218,26	56",2	Avril	30	225,02	56",9
16			21,73				50,94	4,5			46,58	18,1		26	21,32	54,8	Mai		1.3	53,6
Mai		10	22,01			19	50,90 50,57	3,1 4,2		30	46,29 46,48	14,7	7.5		20,96		Juin	1 2	, ,	
			21,97		7.5				Nov.		46,52		Moj	yenn	e 21,18	55,1				
м	ov		e 21,96		moi	enne	50,82	4,2			e 46,49			EISSI	x, XIV,	295.	Moy	enn	e 22,02	53,5
	ľ					αE	Bouvier.				Vierge.				4 <sup>h</sup> 16 <sup>m</sup> -		w	EISSI	E, XIV,	512,
	r I	AZZI	, XIII,	294.				. 501					Mai		28,78					
				-25057'			41.8m +		Inin		56 <sup>s</sup> ,78	21//		20	20,93	40,2	,		•	-13021
uii	2		445,42	7/	Avril	25	46°,76 46,55	12,7	3 4111	2	56,77	28,2		27	29,17		Avril	25	5,46	55",4 61,3
			44,43			27	1000	15,6		29	56,59	25,1		29 31				30	5,55	
M	oy	enn	e 44,42	13,0		30	46,49	12,6	Moy	yenne	56,71	24,9	Mos		e 29,01		Mai	£	5,66	55,4
		5 -	HYDRE.		Mai	ĭ		11,3	331	r	- 3/ x x z	. ,	1.20		- 29,02	50,4		10	5,57	
п						10	46,64 46,53	15,6	1 17		z, XIV,			A:	NONYME.			12	5,59	60,0
ш		1	3h57m	-25°57′		16	46,58				4h12m -				/h = -m		Moy	enn	e 5,57	57,9
ui	n	1	475,20	00		29	46,52	13,5	Avril	25	38 <sup>s</sup> ,20 38,29		Ma:		4 <sup>h</sup> 17 <sup>m</sup> - 58 <sup>s</sup> ,49					
и		6	47,28	8″,6		30	46,53 46,5 <sub>7</sub>	13,6		30	38,29	14,8	, viai	10	58,47	13",3	L	ALAI	NDE 266	62.
П		19	47,23 46,97	10,9	Juin		46,50	10,0	Mai		38,32	16,5		12	58,44	17,3		r	/h30m	-220391
		21	119	10,4	3 0111	2	46,44			26	38,25	16,4	Mox		58,47		Juin		195,04	0
: M	oy	enne	47,13				46,47	12,0		27	38, <sub>2</sub> 5 38, <sub>2</sub> 0						Juin	8	19,00	10 ,0
	ľ		•			8 18	46,43	10,7		29 31	38,32	16,1 16,5	W	EISSE	, XIV,	335.		18	19,08	17,0
1	VE	1SSE	, XIII,	1043.		19	46,51 46,40	14,9	Mos		38,26				4 <sup>հ</sup> 18¤ -	21		21	18,83	17,0
			13h58m	-40471			46,55	-413	LIAC	, С.1111	. 00,20	,	Juin						18,75	
, VI	il	25	528,30			21		11,2		A	NONYME.		Juin	- 3	43*,98	11.,0	Moy	enne	18,94	17,8
		26	52,17			26	46,40 46,48	16,6		1	(4h) 4m	-10031	Wı	EISSE	, XIV,	360.				
		30	52,20			27	101	9,9	Mai		51°,34				(h19 <sup>m</sup> -		L	ALA:	NDE 267	36.
La		10	52,51 52,46	34, <sub>7</sub> 32, <sub>7</sub>		29	46,35	16,1		10	51,31	33,6	Avril		34 <sup>s</sup> ,73				4h33m -	_220/6/
1			52,28	32.5	Juill.	7	46,54	13,9		12	51,20	39,3	22,000	26	34,79	41,1	Juin		448,98	
1 3.7	0.11		52,32			9	46,41	12,7	Juin	24	51,33 51,43	$3_{2,8}$ $3_{2,3}$		30	34,53	43,8	Juin	2	44,80	33,7
- 31	uy	enn	5 32,32	32,9		14	46,45	16,1	Juni		51,19	38,6	Juin		34,73	40,9		8	44,82	32,0
1	W	FISSI	e, XIV,	34.		17	46,52	14,3	Mov		51,30			78	34,66 34,50	40,0 38,6		18	44,98	38,6
N.						21		17,0			·	·	Mox		34,67			2 I 2 2	44,70	34,3 34,1
	٠,	-		-40441		25	46,54 46,46	14,9	W	EISSE	, XIV,	278.	l la l	CIAL	04,07	41,0				
1 VI	.11	25 26	38 <sup>s</sup> ,42 38,39	33,6		28	46,44	15,7		1	4h15m		W	EISSE	, XIV,	458.	Moye	ennę	44,88	34,1
		30	38,24		Août	2	46,59	13,7	Juin		335,07			τ	4h25m .	-13024				00
la	i	X	38,47	33,7			46,48	13,0		8	33,19		Mai		20°,85		₹¥1	EISST	z, XIV,	687.
1		10	38.48	28.9		6	46,46 46,46	14,3	3.5		33,01	-		12	20,66	31,3			r/b3=m	-6°33′
			38,44	32,9			46,43	14,5	Moy	enne	33,09				20,49	30,3	Avril		183,00	4",4
- 11	пy	enne	38,41	33,0		7 8	46,42	13,4	W	EISSE	, XIV,	283.	Moy	enne	20,67	31,0		30	17,98	6,4
		×	VIERCE.			10	46,34	15,2		1	4h15m -	-12°15′		An	ONYME.			1	18,16	5,3
1						14	46,51 -46,48	17,5 16,8	Juin	6	39,43	6",7						10	17,99	59,8
i				-9°34′			46,50	16,0		8	39,33	5,0			4 <sup>h</sup> 25 <sup>m</sup> -			25	18,02	6,3
i	n		50,89			16	46,30	17,0			3931		Avril	25	225,16	53",8				
		3	50,85	7,5		22	46,40	14,8	Moy	enne	39,36	6,3		26	22,10	54,0	Moy	enne	18,02	4,2

1					_								_			1			_
	α † <b>B</b>	BALANCE.		α <sup>2</sup>	BAL	ANCE (SI	rite).	3 Ptte	OUR	SE P. I.	(suite).		B. A	. C. 499	8.	1	LAKAN	DE 279	80.
1		/li/om	-15°21'			/h/om	-150241			/ L E . m	+74°46′			15h4m -	-30-61	1		5h13m.	
Avril		20°,51				32 <sup>5</sup> ,03	39,2	Marc		12 <sup>8</sup> ,27	,	Atai		28,56		Mai		56°,41	
1	26	20,59	53,7	Aout		31,94	37,0	Mai		12,55	22,7	Mai	25	28,45		Juin		56,11	20,4
	30	20,72	56,4		7 8	32,08	39,5		26	12,49	19,3		26	28,65	12,8		26	56,19	11,7
Mai	I	20,85	58,3			31,88	37,1		28	12,15	22,1	Y ?	29	28,60	917		27	56,09	13,6
	10	20,63	56,3 56,7		21	32,12	36,9		30	12,21	17,0	Juin	20	28,46 28,43	10,7		29	56,27	
	34	20,62	55,6		30	32,00		Juin	1	12,33	18,8		20	28,41	11,9	Moy	renne	56,21	14,7
	25	20,71	56,1	Moy	enne	32,00	38,2		2	12,27	22,4	Mor	venn.	e 28,51	11,4		Δ ×	ONYME.	
	34	20,61	58,8 53,3				,		4 5	12,71	21,8		,	20,01			41.0	ON IME.	
Juin	1	20,52	52,6	3 P	ETIT	E OURSE	P. S.		7	12,45	19,9		Α	NONYME.			1	5118m	-24038
	2	20,47	,0		,	4151m.	t=/o/6'		17	12,00	25,3					Mai		515,70	
1	8	20,51	55,0	Mai		12 <sup>8</sup> ,65			20	12,22	19,3			15h/m.			26	52,02	22,2
1	18	20,65	59,3	Mai	25	12,40	25,5		21	12,34	22,6	Juin		585,93	19",4	Juin	<sup>29</sup>	51,74	13,9
	21	20,75			26	12,39	23,0		24	12,10	21,5		21	58,72	16,1		31	51,98	16,4
	22	20,62	56,3		29	12,93			25	12,56	,		26	58,72	16,7		22	51,86	
1	25	20,65	56,5	Juin	8	12,54	24,3 25,6		26	12,18	23,8	Mov	venn	e 58,73	16.5		26	51,80	4/
	26 27	20,53	53,9 53,6		18	12,51			<sup>2</sup> 7 <sub>2</sub> 8	12,12			,		,-	Mog	yenne	51,84	18,1
	29	20,43	00,0		20	12,67	24,8		30	11,85			B. A	. C. 502	27.	B.	A. C	. 5111,	PRÉC.
Juill.	2	20,59			22	12,72		Juill.	2	12,03	20,3	1		<b></b>					_
Moy	enne	20,60	55,7		25 26	12,86	23,6		3	11,90				15h7m				5h24m	
	,	D			27	12,94			5 6	12,28		Mai	24	58 <sup>s</sup> ,27 58,35	54",4	Mai	24	13,37	19",7
		BALANCI			29	12,37	19,3		7	12,18			26	58,45	59,6		25 26	13,55	
	I	4142m	-150241	Juill.	<i>5</i>	12,43	21,8	}	9	12,47	22,6		29	58,24			29	13,41	
Avril	25	315,93			9	12,42		Déc.	14	11,97	23,8	Juin		58,38		Juin	21	13,40	22,5
	26 30	32,03 32,08	•		11	12,15	23,6	Dec.	4	12,59	22,3		20	58,46 58,31	53,3 52,0		26	13,38	
Mai	1	32,15	1		12	12,39			ı5	12,21	22,1	Ma		e 58,35		Juill.	3	13,36	
	10	32,03			14	12,62	,	Mo	yenn	12,29	21,5	li li	y emm	6 30,33	34,1			13,42	
	12	32,00		Août	3	12,03	,		D 4	0	_		B	BALANCI	R _				
	24 25	32,18 32,21			4	12,26			В. А	. C. 495	9.						Λ. C	. 5111,	SUIV.
	29	32,15			6	12,30				•	-25011'				-8049			5h24m	-2305
	31	31,93			8	11,98		Juin		55°,35		Juill.		53°,10	21",0	Mai		135,89	200
Juin	1	32,04	34",3		10	12,03	22,8			55,07		Août		53,27 53,13	22,1		25	14,17	26",0
	8	32,03	34,3		11	12,18		Moj	/enn€	55,21	53,6		78	53,23	18,0		26	14,02	_
	18	32,11			23 24	12,02			A	NONYME			10	53,12	22,9	Juin	29 21	13,96	
	20	31,82	,-	Mos		e 12,41	23,3			, Show	-25°5'		23	53,42 53,14		Jun	26	13,90	
	21	32,13 32,08		Moy	CIMI		20,0	Luin	22	28 <sup>s</sup> ,11			24				29	14,02	
	25	31,89		BP	ETIT	e Ours	E P. I.					MA		e 53,20		Juill.	. 3	13,80	23,
		31,88				/ b.E. m	1 - (0/0/	W	EISSE	, XIV,	1158.	MIG	yemn	6 33,20	21,7	Mo	yenn	e 14,co	25,
	27	31,94		Y			+74°46′			15hom	-0°23		LALA	NDE 279	)72.		~ C	OURONN	P.
Juill.	29	31,83		Janv.	27	12,61	19",2	Mai	24	578,22		1		, ,	•				_
	7	31,84	41,1	1	5	12,58	20,0		25	57,10	47,9			5h13m.				5h <sub>2</sub> 8m -	
	9	31,83	41,1	1	7	12,54	22,4		26	57,21	51,9	Mai	24	35°,37 35,41	56",1	Mai	24	175,82	30",
Août	12			Mars				Juin	29 8	57,06 57,06	48,9	Juin	29	35,57	53,0 52,8		25	17,83	33,
1100	4	31,98			19	12,50	, -			e 57,13				e 35,45			29		
		,	,5		-9	,	-0,2	,	1311	0/120	4/14	, 2120			00,9		3	175	

0	Cour	NONNE (SI	uite).	α	Seri	PENT (SU	ite).	LAL	ANDE	29016	(suite).		В. А.	. C. 536	58.	α	CORI	eion (si	aite).
	1	5h28m +		İ		15b36m		-			+17029				+17°27'				-26°51
luit	1 19	17,74	28″,8 34,3	Juill.		50,10	14",6	Juill.	7	49°,53 49,36	49",5	Juill.		16,37 16,16		Juill. Août		98,18	33",8 33,3
	21	17,91	35,4		9	49,97	11,0		11	49,32	48,7		7	200		Loui	3	9,42 $9,28$	33,6
	22	17,89	30,8		12	49,91	15,0		12	49.35	48,3		12	16,14			6	9,31	35,9
	25 25	17,87	31,3 34,9	ĺ	13	50,01 49,97	17,3	Mo	yenn	e 49,42	48,6			16,00			10	9:17	33,9
	29	17,78	28,8		17	49,88	13,5					Mo	yenne	16,13	აე,ს		14	9,39 $9,17$	29,5 28,7
uil	. 3	17,70	31,3		3'n	49,78	13,8	. 1	JALAT	VDE 291	47-	1	ALAN	DE 295	gr.		15	9,31	31,1
ш	4	17,76	31,2	Août	3	49,91	15,3 15,8		1	5h53m	+17°36′			CIC			26	9,41	30,9 32,3
ш	7	17,84	32,4		4	49,91	17,2	Juin	26	25°,31	31",7			16:6m			27 28	9,57 9,43	31,8
п	9	17,72	31,8		6	49,97	14,8		29	25,39	34,1	Juill.	7	19,11	34,6		29	9,38	34,3
	11	17,69	34,5		7	49,94	13,9	Jaill.		25,52 25,26	34,9			19,08		Oct.	16	9,52	34,0
	13	17,73	31,2		10	49,98 49,84	13,8		7	25,24	31,6		12	0, 1	33,7		23	9,52	33,9
ш	14	17,69	37,4		11	50,11	18,0		II	25,17	31,5			19,09		Moy	enne	9,38	32,8
ш	17	17.71	33,2		15 23	49,92	17,7		12		32,5	Moj	yenne	19,10					
ш	28 31	17,61	31,0		26	50,02	17,4	Moy	yenn	25,31	32,3		19 ]	HERCULE		Nouvi	ELLE	L'TOILE	(HIND).
οû	t 2	17,63	31,5		29	49.94	14,4		01.0					0.1			. с	h li . m	07.4
	3	17,64	33,5	Moy	enne	50,03	14,8			SCORPIO			I	6h12m.	+26°16′				12039
П	6	17,70	36,5 31,5			,			I	5156m.	-19°23′	Juill.	3	8*,50 8,40		Juin	20	2,55	27",4
1	7	17,59	29,1		Ar	ONYME.		Juill.	28	39,71	15",3		7	8,39			21	2,72	27,1
ш	8	17,64	34,6		15	642m +	230421	A 4-	31	39,75	16,1		11	8,39		Juill.		2,65	22,3
ш	10	17,68	33,0 32,3	Juin		225,76		Août	3	39,75 39,83	15,8 15,4		12	8,52			7	2,68 2,68	25,9
ш	15	17,70	32,3	Juill.	29	22,89	30,7		6	39,85	12,2	25.	14	8,54	-	i .	21	2,92	26,6
н	23	17,60		Juill.	3	22,79			7	39,75	13,5	Mo	yenne	8,46			26	2,73	29,1
ı	24	17,73 17,56	34,0 33,5		9	22,76	27,1		10	39,66 39,82	18,0 14,8	1	LALAI	NDE 297	<sub>7</sub> 5.	Moy	enne	2,70	26,3
ct.		17,60	33,1		I i	22,58	26,3	Ma			15,1			Ch 200	-Co1			.,	
Me	venn	e 17,73	32,5		12	22,74	30,2	14103	yemm	- 59,70	13,1	F318		6 <sup>h</sup> 13 <sup>m</sup> - 21 <sup>8</sup> ,47		L	ALANI	DE 311	57.
	•	- / //	,	Moy	enne	22,79	29,8		Ar	ONYME,		Julii.	9	21,47	61,1				
ı	a s	SERPENT.									0.4	İ	11	21,37	60,3				-15°6′
П		<b>#</b> • 0.0			A	ONYME.					170181		12	21,58	59,6 61,0	Juin Juill.	20	36,37 36,29	57",2
ı		15h36m			1	5h47m -	+17°26'	Juin Juill.	2.0	18,58	14",9	-	-			JUIII.	7	36,29	58,9
ai	24 25	508,10		Juin		198,20			11	18,51	11,4	Moy	renne	21,49	60,1		12	35,32	59,1
١	26	50,08	15,2	Juill.	<sup>29</sup>	19,20	25",8		12	18,76	11,2		a S	CORPION		Août	14	36,31	600
ı	29	50,01	17,4	Juni.	7	19,13			14					Ch		Aout		36,40	60,9 58,7
iii		50,06	13,6		9	19,18	28,5	Moy	venn	18,55	12,4	ν.		16h20m		36			
L	1 q	50,19	18,1		11	19,02				11		Juin Juill.		9,43	35″,8 34,1	Moye	enne	36,30	58,4
L	20	50,06	16,3		12	19,18			7 ×	HERCUI	Æ.		7	9,46	34,7	1		2 · · ·	c c
	21	50,18	13,4	Moy	enn	e 19,17	27,2		1	6h1m +	17°27'		9	9,47	33,6	L	ALAN	DE 3110	50.
	22 25	50,36	14,3	I	ALAN	DE 290	16.	Juill.	. 3	15,97			11	9.42 $9,35$	29,5 35,1			17bom .	-20°28'
	26	<b>50</b> ,00	15,3	•					7	15,84	8",8		13	9,35	33,4	Acût		59,70	
	29	50,14	11,9			5148m			11	15,59 15,66			14	9.50	34,0	74000	7	59,56	53,6
101	1. 3	50,04	14,4	Juin	20	49,46	46",0		14	15,62			27	9,44 9,25	31,7 30,1		8	59,80	56,1
1		50,14	****	Jnill.	3	49,52	50,7	Mo	yenn	e 15,74	8,8	1.	28	9,17	31,4	Moy	enne	59,73	56,4
						1.81-	- '/	•		// .	,			,		-		3.7	, ,

												1	_						
	D	37317	2			,		1.	m 1				_						
	PIAZZ	ı, XVI,	309.	α	' HE	RCULE (S	suite).	1	PIAZZ	ı, XVII	, 91.	α	Орні	uchus (	(suite).		3 S	AGITTAL	RE.
			-20027	1		1717m	+14033	1.	1	7 <sup>h</sup> 18 <sup>m</sup>	-14059	1 .		17127m	+12040	/	1	7 <sup>h</sup> 38m	-27°46
Aoi	it 7	65,87		Aoû	t 14	3,76°د 4	55",6	Aoû		73,54	28",2				22",3	1			
	15					45,81			6	7,78	31,8		23	55,57	21,8	1	16	3,63	6,7
7.7			. 18",1		21	45,69 45,65			7 8	7,68 7,69	30,6	Man	30				22		5,6
171	oyenn	e <b>0,9</b> 0	18,1	į .	26		56,9		10		31,4				24,1	1	29		
	A:	NONYME			27	45,67	56,q		14	7,44	28,8	Mo	yenn	e <b>5</b> 5,68	24,0	Mo	yenn	e 3,66	6,7
					28		57,6		15			D-		V 3711			LALA	NDE 325	ia3.
	0		-1501	Oct.	29 18		58,5 56,9	Mo	yenn	e 7,61	29,9	PL	AZZI,	AVII,	191.				
	1. 14	29 <sup>5</sup> ,74			19	45,85	58,3	р	[ A 7 7 ]	XVII,	117		1	7h33m	+24030			17h40m	
13	21	J'			23	45,87	55,3		. acce	25. 7 12,	117.	Juin		285,35	3",0	Juill,	٠,	428,22	41",3
	26	29,32	29,0	Mo	venn	e 45,87	57.7			17h22m	-2608	1	29	28,60		,	14	42,57 $42,55$	39,4
		29,55		1	•	. , ,	,,,	Aoû	6 1	228,22		Juill.	21	28,56 28,34			28	42,44	
Mo	oyenn	e 29,53	27,4	1	LACA	ILLE 315	506.		78	22,19		Août		28,33			31		36,9
Ι.	787	3/ 1/11	,					1	10	22,02			3	28,51	4,4	Août	3		40,5
		e, XVII	, .,			17 <sup>h</sup> 12 <sup>m</sup>			14		55,5		6	28,55			7	42,36 42,58	
		17h3m	-14058'	Août	6	535,64	50",6		15	22,16	54,4		7.8	28,49 28,44			8		
Juin		585,56			7	53,65 53,52	53,5 56,6	Mo	yenn	22,16	55,6	N7					11	42,33	
			30",8			53,35	49,5	1				Moy	enne	28,46	2,7	Mo	yenne	e 42,42	39,4
T:11	. 3	58,57	30,0		15	53,37	53,0		α Ο	PHIUCHU	3.		58 C	рвіцсн	***				,,
Juin	. 3	58,34 <b>58,</b> 39	24,4	Mo	rann.	e 53,51	50.6		11	7 <sup>h</sup> 27 <sup>m</sup>	LT 20/10		30 (	PBIUCH	03.	1	JALAD	NDE 325	48.
	12	58,36	27,7	MALO	усши	c 33,31	32,0	Juin		55,64			1	7434m	-210361		I	7h4im	+2401
	14	58,37			A	NONTHE.			2 I	55,66	24,5	Juill.	31	23,19	16",5	Jaill.		125,25	
Ann	31	58,34 58,32	29,3						22	55,93		Août		23,04	14,4		28	12,02	_
Aou	2	58,33	29,1		I	7h13m -	-140531		25	55,94 55,74	21,2		15	23,16	12,3		31	, -	-
	3	58,41		Juin	21	198,95	49",8	Juill.	29 6	55,69	22,7 26,6		21	22,99	18,2	Août	3	11,96	9"17
Mo	yenne	58,39	28,3	Juill.		19,86	49.7		7	55,69	24,9		22	23,25	17.4		-	12,12	8,7
1					14	19,88	51,8		21	53,80	,-		27_		18,4		7	12,30	8,6
	α'H	[ercule			17	19,78	50,4 50,0		27 28	55,8o 55,63	27,5 25,7	Moy	enne	23,11	15,7		8	12,09	715
	1	7 <sup>b</sup> 7 <sup>m</sup> +	140331		28	19,71	52,2		31	55,64	24,7						11	12,23	72
Juin		468,03		A A.	31	19,91		Août		55,64	22,6	P14	ZZI,	XVII,	200.	Moy	enne	12,13	8,
		45,84	- 410	Août	1 2	19,73	55,2 50,3		3	55,71	24,8			,63/m .	1240351	Pr	A 7.7.1 .	XVII.	245
Juill.		45,88 46,05	55,t   55,1		3	19,79	52,7		6	55,71 55,76	26,9 27,8	Inin			30",4		,		.40.
1		45,98	57,1	3.6					7	55,82	24,3		25	53,79	30,0			7"42m -	
	Į I	46,08	60,5	Moy	enne	19,82	51,4		8	55,71	20,5	Juill.	14	53,51	25,4	Août	22	108,02	8",
	14	45,84	54,7 58,2		Ass	ONTME.			10	55, <sub>77</sub> 55,58	- ,-	Août	3	53,31		D		XVII,	0/8
		45,95 45,91	59,0		A	ON UME.			14	55,64	24,6		_	53,33			. 221 ,	AVII,	240.
	21	46,00	60,9		1	7 <sup>b</sup> 17 <sup>m</sup>	-1507		15	55,76	24.9	Moye	enne	53,50	28,9		17	142m -	34021 :
	26	45,96	59,2	Juill.	7.	25,89	8",8		16	55,75	24,4	PIA	2.2.1.	xvII,	207.	Août	29	17*,85	16",
		46,03 45,8 <sub>2</sub>	58, <sub>2</sub> 55, <sub>7</sub>		14	3,15	13,7		21	55,56	26,6				1				
Août		45.98	58,4		17 21	3,14 3,26	8/			55,67 55,41	26,0			h34m 4			AN	ONYME.	# 3
	2	45,85	58,9		28	3,01	8,4		28	55,55	25,5	Juill.	28	578,34	57",4		17	143m -	3403
	3	45,90	56,9	Août	2	3,12	6,1	2		55,55	24,0	Août		57,43 57,60	59,6 55,2	Août			38",
	6	45,88 45.06	62,6		3	3,12	(			55,70	24,4		78	57,28				13,01	37,
1	8	45,80	57,4	Moye	enne	3,10	9,0				21,6	Moye			56,3	Moye	enne	13,11	
	7	45,96	60,5	Moye					18	55, <sub>7</sub> 4 55, <sub>6</sub> 7	21,7	Moye	8	57,28	53,0		16 _	13,01	3 <sub>7</sub> , 3 <sub>7</sub> ,

Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1849, ramenées au 1er Janvier de cette année.

-		Pos	itions 7	noyen	nes a	les étoi	les obse	rvėes	pen	dant l'	annėe	184	9, rai	nenė	es au	1er Ja	nvier	de d	cette an	nåc	
		Anon				ALANDE														_	
1		1764	9m +24	029		x7 <sup>h</sup> 5	6m -r	00/5/									1	WE	isse, X	VIII,	997-
	Juin	21 3 <sub>0</sub>	s,19 31 5,07 3	″,6	Loût	29 36	,95 3i	″,5	Λοûι	1 i 1 7 1	85.00	-19°5	1 []	1 2	18h31m	+380	38'		r8h3	9 <sup>m</sup> -	140521
		25 30	,28 21	4,0	11/	379					720		- 1	1. s	49,5	8 45	,5 J	Juill.	12 36	,16	4",6
4			,90 30 ,39 30	0,7		SSE, XV			Mo	yenne 1	8,12	58,		7	49,4	3 46	6,6		21 36	,07	6,9
	Juill.		,03 34	1		1757	m -140	12'		Ano	YME.			9					28 36 31 36	II.	2,9
И	Moy	enne 30.			Biil.	28 23° 31 24	,88 17	″ <sub>2</sub> 4		18	52m _	****	-/	21	49,7	3 44	9 A	oût	2. 35.	.08	4,5 3,4
	,	· C			oût	1 24	,08 1	),2	Loût	14 54	\$ 40	177.5		27	49,9	2 45	,2	7.5	3 36,		59,5
	• 4	SAGITT	TAIRE.			3 23,	80 1 93 1	7,7		15 5 16 5	4,22	16,4		28 31	ביני			Moye	enne 36,	09	3,3
1		17h50	n -2304	47' _		6 24,	12 18	3,1		22 5.	4,40	17,1	Aoûi	1	49,7	1 44,	2		ANONY	ME.	
	iill oùt	31 34°,	65 51". 51 45,	,6	loye	nne 23,	97 17	,9	Moy	enne 54		17,7		3	49,88 49,88				1854o	m - 1	0
		3 34,	51 45.	4 1	WEIS	se, XVI	1, 1213	3.		Anon	YME.			6	49,87	48,	I A	oût	6 34 <sup>s</sup> ,8	3r 45	5".0
П	-	6 34,6	51 48, 56 48,	,5		17 <sup>b</sup> 5				18h	/.m	00/6	,	8	49,97 49,90	46.	+ (		7 34,6 1 34,8	ia 5	0,2
12	Iove	nne 34,5			ût 2	8 313,	7" -14 35 21"	8 4	oût :	11 05	,08 3	5″,o		10	49,88 49,83	43,	r		ne 34,7		1,8
1								,		22 0	,05	38,0		14	49,46	47,5	5	- O j Ci	1116 54,7	9 4	9,3
1		y DRAGO	N.			Anonys					,15			16	49,98 49,86				Anonym	E.	
ı		17153m	+51°3	01/10	۸	17457"	-200	27/ 1	Moye	nne o	03	35,5		22 23	49,97	47,6			18h42m	-14	051/
ui	n 2				ut 7	7 <i>33</i> °,7 3 33,8	5 53", 4 5 <sub>7</sub> ,	$\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$		ANONY	ME.			29	49,78 50,01	45,5 $46,0$		ll. ra	475,7	7 20"	
П	2.		6 28,4 2 30,4		11	34, <sub>1</sub> 33,8	8 59,	3						17	49,50 49,48	44,8		21			1,9
l	2(	6,4	7 29,2	:	15	33,0	3 53	Ju	ill:	3 24°,	m +75	0°46′ 7″,1		19	49,54	44,3 45,1		28 31	4,78	21	17
aii	11.	, -,-				34,0	60,			6 24,		7,3		23	49,47 49,48	46,8	Λοῦ	it 2	47,64		
	7 9	6,68	- 77T	- 1	) yenr	ne 33,9:	2 56,6			7 24,0 9 24,0	3 3	5,4 5,5	Nov.	X	49,47	44,8		3	-1/7/	18	.7_
ш	17	6,61	29,6		A	NONYME			1	7 24,0	8	9.7		78	49,46 49,53	44,5	Mo	yenn	ie 47,77	21	,3
ш	28 31					1851m		M	loyen	ne 24,4	0	7,0	,	9	49,55	45,0		LALA	NDE 350	68.	
οů	t 2	6,06	31,9	- (	. 28	113,78	-1401:	2'	λ 5	SAGITTA	IRE.		2	20 2	49,48	45,3 47,3					
	6	6,33 6,5 <sub>2</sub>	7 5		31	12,03						1		-	9,61	43,1	Août		8544m 65,8x		
	7 8	6,3 <sub>7</sub> 6,63	30,2	1.00	2	11,80	51",8	Juil		18h18n 39*,1	4 594	7,9	Moyer	ane 4	9,70	45,1		7	6,63	12,	6
	EI	6,67	29,6		3 6	11,83		Aoi	it r	39,0	5 60	9,9		Anor	TYME.		Ma	I I	$\frac{6,87}{6,77}$		-
	15	6,46 6,53	28,3 3 <sub>2</sub> ,3	Mo	venne	11,88		-	3	39,2	5 57	27		18h	37 <sup>m</sup> -1	803.1		yenn	0,77	12,0	0
	16	6,45	20,9 32,5					Í		39,2	7 63	,2 1	oût	7 3	35,0g 5	9",2	]	LALAE	EDE 353	17.	
	27	$\begin{array}{c} 6,6_2 \\ 6,15 \end{array}$	33,7			ONYME.			yenn	ie 39,12	60.	,7	I.	E	3,29	54,1		τ 8	3h49m -	, 20/	2/
ct.	29 17	6,49	31,7	1211		18ptm .			а	LYRE.			Moyen	ne :	3,19	56,6	Juill.	12	378,99	43",6	3
	18	6,23	33,5		31	395,31				863 <sub>1</sub> m			LAL	ANDE	34849			17	3 <sub>7</sub> ,90 3 <sub>7</sub> ,98	47,3	
	23	6,19	32,3 30,5	Août	X	39,20	26,6	Janv	21	49°,50	48",			18h3	SQ <sup>m</sup>			28	38,03		
٥٧.	I	6,26	30,6		3	39,29 39,43			25	49,55	43		oût G	9	s,15	1	Août	2	38,02 37,92		
lov	еппе	6,44	31,1	7.0	6	39,56		Juin	22	49,82 49,68	40.	5	7		3,99 ,12			3	38,19 38,04		
J	24416	0,44	31,0	Moy	enne	39,35	24,4		29	49,59	44,		loyen				Move	_		15 /	-
																	,		20,01	45,4	•

LALANDE 35359.	ANONYME.	Anonyme.	Anonyme.	Weisse, XIX, 905 (suite).
18650m -18045'	19hom +57°13′	19h11m +55040'	19h26m -0014'	19h34m -8040
Juill. 12 36°,51	Juill. 12 598,57 47",5	Août 11 195,08 34",1	Juill. 27 48°,67 56",9	Août 6 54°,47 46″,6
17 36.82	17 59,04 48,4	15 10,04 34,0	Août 8 48,59 61,1	8 55,09
28 36,83	28 59,24 49,4	16 18,99 35,6	Moyenne 48,62 59,8	11 55,44
31 36 70 60",0	31 59,55 49,0 April 1 58 of 54.6	22 18,89 35,2		Moyenne 55,21 48,1
3 36,53 54,0	2 59,25 49,2	27 18.53 33,7	ANONYME.	y Aigle.
6 36,76 59,4	3 59,27 50,9	Moyenne 18,88 35,5	19h27m -00131	10h30m +10014
Moyenne 36,68 57,4	Moveme 50 31 50.8	o' SAGITTAIRE.	Juill. 28 108,50	Juill. 27 48,69 57",6
B. A. C. 6477.	Moyente 39,31 30,0	10 <sup>1</sup> 12 <sup>m</sup> -18 <sup>0</sup> 7'	6 10,41 0,6	28 4,85 56,5
oht m it-o-/	Anonyme.	Oct. 23 548,90 37",5	7 10,49	Août 1 4,93 55,7
18"51" +57"17"	19h7m -21012	Nov. 9 54,86 38,5	Moyenne 10,40 1,1	2 4,84 55,1
8 9,68	Août 29 65,29 49",6	Mayanga 5/87 32.2	WEISSE, XIX, 711.	6 4.80
LALANDE 35359.  1850° -18045'  Juill. 12 36°,51 17 36.82 21 36,84 28 36,83 31 36 70 60",0  Août 2 36,62 55,2 3 36,53 54,0 6 36,76 59,4  Moyenne 36,68 57,4  B. A. C. 6477.  1851° +57°17'  Août 7 9°,65 8 9,68 11 9,74 44",6  Moyenne 9,69 44,6  Anonyme.  1853° +57°27'  Août 7 18°,58 8 18,50 42",8 11 18,75 42,4  Moyenne 18,61 42,6  Anonyme.	ANONYME.	Moyenne 54,07 57,2	-1. Om - 2.	7 4,91 51,5
Moyenne 9,69 44,6	10hom +57°23	ANONYME.	19"28" -0"13"	8 4,73 53,4
ANONYME.	Juill. 12 25,99 51",8	19"16" +57°34"	28 16,60	11 5,03 53,9
-Qh53m 15=027	17 25,91 51,4	Août 6 9°,13	31 16,76	14 4,97 53,6 16 4,75 53,5
Août 7 185.58	21 20,20 54,7	8 9,40 52,5	2 16,64	16 4,75 53,5 21 4,90 54,9
8 18,50 42",8	31 25,80 52,8	9,01 53,8	3 16,55	22 4,97 54,0
11 18.75 42,4	Août 1 25,63 56,2	Moyenne 9,23 54,4	Movement 16 60 2/1	23 4,80 53,2 24 5,07 54,7
Moyenne 18,51 42,5	3 25,85	Weisse, NIX, 432.  19 <sup>h</sup> 17 <sup>m</sup> -0°13'  Juill. 28 47 <sup>s</sup> ,59 44",8 31 47,71 50,3  Août 1 47,77 45,5 2 47,48 45,7 3 47,58 43,7	14.0yenne 10,0g 24,1	25 4,98 54,0
Anonyme.	4 26,t3	19117m -0013	A NONYME.	27 4,77 55,2 29 4,98 53,7
18h57m +57°16'	7 25,97	Juill. 28 475,59 44",8	19h31m -009	Oct. 17 4,81 54,6
Août 6 56s,49 32",7	Moyenne 25,90 53,7	Août 1 $47,77$ $45,5$	Juill. 31 453,30 30",0	18 4,84 55,7
7 56,72 29 7	ANONYMU	2 47,48 45,7	Août 6 45,36 26,3	20 4,83 57,0
Moyenne 56,5h 29,8	Anonyme.	3 47,58 45,7	8 45,30 33,0	3c 4,86 54,3
moyenne 30,50 25,5	Août 20 108 20 45%	1 Moyenne 47,05 40,0	11 45,57 27,9	31 4,92 55,3 Nov. 7 4,85 53,0
ANONYME.	11000 29 19 120 40 11	2 47,48 45,7 3 47,58 43,7 Moyenne 47,63 46,0 Plazzi, XIX, 156.	Moyenne 45,39 29,5	8 4,83 54,7
rohom 15coro/	54 DRAGON.	19h23m +57°43	/ N/ VIV?	9 4,09 55,9
Août 6 43°,05 18",8	19h11m +57°,21	Août 6 3',25 30",7 7 3,42 31,2 8 3,22 30,5 11 3,28 26,3 Moyenne 3,28 29,7 Weisse, XIX, 594.	10h3/m _8x30	19 4,84 53,4
7 43,40 10,1 8 43,07 14,0	Juill, 12 135,68	8 3,22 30,5	Août 2 518,51	20 4,83 53,:
11 43,39 15,7	21 14,04	11 3,28 26,3	3 51,51 25",5	28 4,93 56,1
Moyenne 43,23 10,1	27 13,58 44",8	Moyenne 3,28 29,7	5 51,68	Déc. 4 4,79 52,1 15 4,87 51,
π SAGITTAIRE.	31 13,73	WEISSE, XIX, 594.	8 51,61	19 4,83 52,
19hom -21015	Nout 1 13,77		0-1,70 -017	_ Moyenne 4,88 54,
Août 29 465,98 32",0		Juill. 27 405,59 56",4		Anonyme.
Oct. 23 47,01 32,6	4 14,10 46,	31 40,73 60,0	1	
Nov. 8 46,96 31,2 9 47,02 30,1	0 4 1	Aoùt 1 40,44 5   2 40,41 57,5	10b34m -8040	19 <sup>h</sup> 42 <sup>m</sup> +49°? Juill. 27 23°,76 30″,
11 46,95 31,4	8 13,78 43,		Août 2 543,99 49",7	28 24,03 33,
Moyenne 40,58 31,5				31 23,86 31,

117
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1849, ramenées au 1er Janvier de cette année.

		I	osition	s moye	nnes c	tes e	iones oo	servees	рени	ine e	unnee	1849,	ramer	ievs (	(6 (6 A	Juniter	ac ce	iie u	muee.	
Ī																				
ı	Λ	NON	eme (su	ite).	ß	Aic	LE (suit	e).		AN	ONYME,		α2 (	CAPRI	CORNE (	suite).	LAKAT	IDE	39198 (	suite).
ı			`	·			`								,	·				
U				+49°38′			19147	- +6°11		T.	9 <sup>h</sup> 54 <sup>m</sup>	+47°39′			-	-13°0′			0h15m +	
Å	oùt		235,75		Août		53°,87		Août		25,25		Oct.	23	408,27	34",8			23,14	
		3	23,76 23,61	28,4		14	53,92 53,90	6211.16		14	2.16	26",4	Nov.	30	40,28			16 21	22,79 23,04	40,8 46,8
		7	23,69			21	53,77	59,6		21	τ,93	26,3	1.01.	7	40,57			-		
ı	Mov	enne	23,78			22	53,85	58,8	Moy	enno	2,04	26,3		Ś	40,48		Moy	enne	22,95	43,2
1			.,	J,		23	53,87	58,7				ŕ		9	40,44	30,5 33,6	π	C <sub>A</sub>	PRICORN	E.
l		α	AIGLE.			24 25	53,97 53,90	58,8 62,7		Λz	ONYME.			20	40,41	33,0				
1		,	9543m	±802 <b>8</b> 7		27	53,81	57,7		10	h56m 4	-470301	Mar		40,40	33,6			oh 18m -	
ŀ	anv.		2/3,90			29	53,81	57,6	Aoùt	-	010 01		Moy	y CHIII	3 40,40	30,0		23 30	403,42	8,6
	ars		24,72	23,8	Oct.	17	53,78 53,70	58,8 58,9		3	34,63	40,3		A	NONYME.		Nov.	I	40,25	7,0
1	oût.		24,95	21,6	Ì	10	53,78	60,0		7.	34,91	43,1				. /2.2 /			40,42	11,1
		10	25,05	24,3		20	53,83	59,2		8	34,74	37,9				+43°32′		78	40,48	10,3
		14	25,08 24,97	20,9		23	53,81	58,2		24	34,93 34,70	41,7 43,9	Juill. Aoùt		21,63	24,9		9	40,36	9,5
		16	24,98	18,5		30 31	53,69 53,78	57,4 58,8		27	34,37	43,3	Aout	7	21,03	26,7	Moye	nne	40,38	9,4
5		3 t	25,01	20,5	Nov.		53,70	60,5		29	34,84			14	21,90	29,9			2-2	.3
3		22	25,12	22,5		7	53,94	57,0	Mog	yenne	34,71	41,4		15	21,86	25,7	L	41 43	DE 393	93.
.9		23	24,99 25,05	20,3		8	53,87	57,2						16	21,75	24,6 25,8		2	0b20m -	+41°25'
3		25	25,18	23,1		9	53,8 t	58,2		α ' Ο.	APRICUR	NE			31,72		Juill.		8,43	8",9
.0		27	24,90	21,4		11	53, <sub>7</sub> 6 53, <sub>8</sub> 7	57,3		:	obom -	-120581	Moy	yenne	e 21,79	25,7		7	8,60	11,1
1		29	25,05	22,9		20	53,73	59,7	Août			15",6	1	LAT.AT	NDE 391	06.		10	8,37	15,7
2	ct.	17	24,87	21,4		21	53,59	58,3		25	16,72	15,6			_			14	8,50	14,5
77		19	24,91	20,5	D/-	28	53,76	59,5		27	16,62	13,5				-27°12'		16	8,51	12,5
**		20	24,77	22,6	Déc.	4	53,72	57,5	Oct.	29 9	16,53	16,2	Août		25,45			2 [	8,44	11,7
3,0		2.3	24,93	19,3	Moy	yenn	e 53,80	58,8		17	16,44	15,6	Oct.	29	25,28 25,05	53,0 55,6	Mov	enne	8,50	12,8
7		30 31	24,94 24,91	20,8		Α.				18	16,41	15,4	OCI.	18	25,06	52,1			,	, í
j.	lov.	7	24,99	21,3		A	NONYME.			19	16,53			19	24,96		,	CA	PRICORN	E.
1/2		8	24,96	21,5		1	19h49m	+48°50′		20	16,47	15,9		20	25,00	53,0	,			
1		9	24,87	19,9	Juill.		423,70			30	16,44	15,7	Mo	yenn	e 25,13	52,6				-18018/
		19	24,87 24,98	18,5	Août		42,63	55,9	Nov.	X	16,55	. *							14,84	
3		20	24,82			3	42,71	54,4		78	16,55		I	ALAR	NDE 391	16.	Oct.	17	14,40	34,3
*		21	24,92	21,9		7	42,51	53, <sub>7</sub> 5 <sub>7</sub> , <sub>0</sub>		9	16,62				Oh,/m	-18°49'		19	14,66	31,3
- 1	léc.	28	24,82		1	8	42,39	0/,0		19	16,70		Oct		285,13	47		20	14,57	28,7
	Pec.	15	24,92 24,81	18,8		10	42,55	50.9		20	16,56		Joet.	30	28,03	r2,5	Mov	enne	14,6x	31,0
1		19	24,91	49,7		I I	42,55		Mo	yenn	e 16,55	15,4	Nov.	I	28,04	8,6				
		20	24,92		Mo	yenn	e 42,59	54,3		1.0				7 8	28,27	15,5		A	ONYME.	
	Moy	renne	e 24,94	21,4		A				a" C	APRICOR			9	28,18 28,26	12,8			- alia/m	1/20-1
						Α	NONYME.				20h9m	-1300'	75	-			F.,(1)			+4107
		B	AIGLE.			1	19h51m	+48047	Août	2/	408,61		DEO.	yenn	e 28,15	12,0	Août		34°,89 35,05	42,0
			10h47	m +601	Août		35,28			25	40,43		1	, LT.A.P.	NDE 391	α8.		7	34,89	41,1
	uill.	31 -	534,92			14	35,57	,43,6		29	40,53					5		10	34,65	46,2
			53,83	,		16	35,12	44,1	Oct.	9	40,24	35",7			o <sup>և</sup> ւ5 <sup>™</sup> վ			14	35,20	46,2
		2	53,78			21	35,13 35,32	44,8 44,2		17	40,22		Juill.	12	22*,85	38",9		15	35,09	40,9 44,6
			53,67 53,82			29	35,33	46.5		18	40,37		Août		22,99	43,4		21	34,87	43,9
		7 8	53,71		Mo		e 35,29	44-4		19	40,39 40,35			12	21/6	47,I	Mov	enne	34,92	43,0
			17			2	1-9	1.41.1			,,,,,,		,						1,75	1-7-

			-	t	-						1040,								
I	ALAN	ов 3970	04.		LALAN	DE 401	97.	L	ALAN	ок 405	29.	LAL	ANDE	40817 (	suite).	Pı	AZZI	, XXI,	22.
	2	0h27m	41022			20142m	-16041		2	oh5om	-19°29'		2	oh56m .	+31024			21h/m .	+26°56′
Août		325,26				8°,56			8	288,27	37",2						21	53s,11	15",5
Oct	4.	32,12	4,7	Ì	18	8,52	8,2		9	28,23	37,1		2 I		14,0		22	53,11	15,1
	18	32,14	6,7		19	8,47	6,2 6,5	Moy	enne	28,25	37,1		22	56,5 <sub>7</sub> 56,5 <sub>4</sub>			23 24	53,21	17,7
	19	32,16	9,4 7,2		20	8,50	7,6	1	A -						,,,	Oct.		52,87	16,7
		31,94	2,1	2.7					A, N	ONYME.		Moy	yenne	56,49	14,2	Nov.	ĭ	52,88	20,4
Moy	enne	e 32,07	5,3	Mo	yenne	8,55	7,6				+320431		A					52,95	15,6
					Ar	ONYME.		Août	21	27°,88	13",6		AD	ONYME.		Moy	renn	e 53,o3	16,7
1	Az	NONYME.							22 23	28,02	15,8		2	oh59m	+29°36′		ATA	NDE 411	80
1		1 /100	,		20	о <sup>ь</sup> 43 <sup>т</sup> −	-190181		24			Oct.	т8	26,19		•	121.2	ADE 411	00.
		oh28m -		Oct.	23	43,87		Oct.			16,3			26,16				21h5m	+260531
		25,98	33",3	Nov		43,79 43,88	18,8 23,3		17				22	26,03	55,0	Août	6	435,36	40",4
Août	7	26,24	32,3 33,5	1	8	43,88	22,2		18	27,72		Mon	enne	26,13	53,7		7	43,27	36,9
	10	0'0	38,4		9	44,03	20,6		20	27,75 27,74	62 63	,					15	43,12	
	14	_ '	38,3	Mo	venn	e 43,91	20,7	Mov		27,84	<u> </u>	] ]	LALAD	DE 409	79.		16	43,07	
	15	- '	35,1 35,8		J	- 4013-	- 47	1.2-3		, ,			:	zībom.	+29°59′		21	42,99	
	21	26,27	37,6	]	Piazzi	, XX, 3	367.	I	ALAI	NDE 406	54.	Août		46°,55			22	43,07	
7.7		·					•			a oh E a m	+31031	1	7	46,53	24,6		23	43,10	
Mo	yenn	e 26,14	35,5			oh46m -							10	46,57	27,5	Nov.		42,77	
		CYGNE.		Oct.		308,79	, 8",9	Aout		28°,34 28,45			15	46,39 46,34	28,8		9	, .,	39,5
	ot	GYGNE.			18	30,76	8,3 8,8		10	28,28	49,1		21	46,26	29,0 27,3	Mor	yenn	e 43,08	39,6
	2.0	oh36 <sup>m</sup> +	1.1.01.1.1		20	30,86	7,1		15	28,18	47,1		2.3	46,41	28,9			. ,	Ť
Mars		175,06			22	30,93			16	28,21	48,9		23	46,49	26,1		s C.	APRICORI	YE.
Avri			$3_{7,6}$	Mo	venne	30,79	8,9	Mog	yenn	e 28 <b>,2</b> 9	48,5	Mo	venn	46,44	27.4			21h7m	-15047'
	7,	17,49	32,8	MA	yemme	. 00,79	0,9		Α.				<b>J</b>	. ,	* / *	Nov.		235,03	
1	14	17,56	36,2		LALAI	NDE 403	86.		A	NONYME.			A	NONYME.				,	` ′
	15	17,40	36,7 $34,3$						2	0h52m	-19030	1		1	. 2 -21		ALA	NDE 412	276.
	21	17,49	36,8			20h47m		Oct.	23	52°,15	19",1	ļ	,		+3003/			2 T h 8m	-2008/
	24	17,47	35,5	1	23	98,61		Nov.	7	51,81	19.0	Août Oct.	24	5,79	29",8	Oct.		0 . 2	
0.0	28	17,54	35,4	Nov	. I	9,50 9,50	7,9		8	51,88		Nov.		5,82	29,4 33,6	Oct.	18		
Oct.	9	17,00	35,5		8	9,62	9,9 9,3	77		51,94			78	5,76	32,3		22	39,70	6,8
	18	17,34	34,9		9	9,64	11,2	MO	yemm	e 51,94	10,0			5,82	28,3		23	39,70	
	19	17,15	35,2	Mo	venn	e 9,57	9,9		n Ca	PRICORI	Æ-		9	5,78	26,6	Моз	renn	e 39, <b>6</b> 4	5,1
	20	17,35	3 <sub>7</sub> ,0 34,3	310	Jemin	910/	919			I to to the		Mo	yenne	5,85	30,0		~	Céphée	
	23	17,26	36,8		A	NONYME.					-200261						α	OLUMEE	
	30	17,17	36,2							483,26		I	PIAZZI	, XXI,	Ι.	i	2	Ibx4m	461°56"
Nov.	I	17,26	37,4			oh48m				48,30				a cham	120035/	Août	24	585,69	48",1 46,6
	78	17,23	35,9 34,5	Aoù		56 <sup>s</sup> ,40	36",n 34,6	Moy	/enn	e 48,28	54,8	Aon	28	148,72	5/// =			58,67	
		17,23	34,3		7	56,20	37,8	I	ALA	NDE 408	17.	Oct.		14,75	51,7	Oct.	<sup>2</sup> 9	58,97 58,62	46,2
Déc.	9	17,25	32,7		15	56,03	40,8				·		17	14,71	52,5	1701.	17	58,55	
	15	17,05	33,9		16	56,12	40,9	}			+31024		18	14,79	52,t		18	58,51	
1	16	17,17	36,5 3 <b>3</b> ,3		22 23	56,10 56,02		Août	6	56°,61	13",3		20	14,73	54,0 55,8		19	58,18	
	26	17,45	33,4		24	56,12			7	56,61 56,54	16.0		22	14,69			20	58,55 58.30	40.8
Mo	yenn		35,3	Mo			38,0		15			Mo	yenne				23	58,49	50,9
Mo	26	17,45 e 17,29		Mo	24		38,0		10	56,54	16,0 14,4	Mo	22		54,8 53,7		2.3	58,39	49,8 50,9

Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1849, ramenées au 1er Janvier de cette année.

								The state of the s	-	-		-							
			•• \				/ 1. 3		,					27371	0/0		w.c	, , ,	
	αC	ÉPHÉE (SI	aite).	La			(suite).	1	A	NONYME	٠	Pi	IAZZI,	, XXI,	343.	21	ζ C:	е́рне́в (s	
No	**	21h14m 1 58 <sup>3</sup> ,49	+61°56′	1	it 10		49",0				+20°21'	1		1 <sup>h</sup> 50 <sup>m</sup> .	,	1	- 0		+57°27'
110		4 58,1	51",3	Aut	15	0,35	46,1	Aout	7	57,11	37,2	TAOA"	9	17,93	4",3 3,4	Oct.	20	3 <sub>7</sub> *,5 <sub>2</sub> 3 <sub>7</sub> ,4 <sub>9</sub>	29,3
1		7 58,3; 3 58,4;			16	0,14			10	56,96 56,92		1	1 I 20	17,83	5,6 2,1	Mo	yenn	e 37,62	32,4
		58,4	47,2		22	0,25	47,4	Oct.	16	56,86	38,2	D:	28	18,05	0,4	١,	LAT.AT	NDE 433	181
П	1	58,4	50,4	M	23 oyenn					56,54	47.4	Déc.		17,96	3,5				
	2	mes 1	48,5 5 52,2		,		,	1				210	yenne	17,99	3,3	Oct.		46°,55	-20°38′ 33″ o
	26	3 58,36	3 49,2			Сернее				PRICOR?			A:	NONYME.		Nov.	7	46,46	33,6
Dé	e. 4			A ort			+69053				-17020'			1 <sup>h</sup> 50 <sup>m</sup> .			20	46,58	
	1(				28	42°,19	57,9	Nov.	28	43,05	27",1 27,8	Oct.	23	55s,95	25",4	Déc.	28	46,83 46,30	
M		ne 58,40		Oct.	17	41,54	58,3	Déc.	15 16	43,05	31,5		α	VERSEAU	,			e 46,62	
	1.47	ANDE 41	647		19	41,65		Moy		43,10					n –1°3′				
L	2,30		-15°53′		22 23	41,50 41,50			2 (	PRICORI		Août	23	18,70		1	LALA	NDE 435	17.
Oct	. τ8	7,53	45",2	Nov	· 4	41,26	57,3 54,1						24 25	1,54· 1,41	6",8 7,4				-20°59′
	20	8 12	44,3		9	41,59	57,6	Nov.		1 <sup>5</sup> 38 <sup>m</sup> - 42 <sup>8</sup> ,17	-16°48′ 32″ /		26	1,53	5,6	Oct.	22	30°,60 30,58	4",0 3,2
	23	7,50	47,5		11	41,55	56,8 5 <sub>7</sub> ,9		28	42,00	34,5		28	1,71	8,0 7,9	Nov.	7 8	30,42	1,6
M	oyen.	ne 7,58	46,1		20	41,92	58, <sub>2</sub> 56, <sub>9</sub>	Déc.	15	42,05		Oct.	9	1,60 1,56	7,9 5,0		20	30,86	2,8 3,1
	LAL	ANDE 41	800.		28	41,66	57,6	Moy	enne	42,07			18	1,57	7,1 4,0	Déc.	28	30,81	31
		21 <sup>h</sup> 22 <sup>m</sup>	+210311	Déc	. 15	41,46	5 <sub>7</sub> ,5 5 <sub>7</sub> .9	T	AT.AN	DE 425	13		19	1,35	5, <sub>7</sub> 5, <sub>0</sub>			30,67	
Ao	ût 6 7	C 10	14",7		26	42,14	58,1						22	1,61	7,2 8,9			. ,	
П	10	6,11	17,5	1/1/4	yenn	e 41,65	57,0	Oct.		25°,49	-21°10′ 41″.8	Nov.		1,64	4,2		Aı	ONYME.	
П	18	'	12,3		LALAR	NDE 421	25.		22	25,38	41,2		4	1,65 1,60	6,1 3, <sub>7</sub>			14m -	
	21	per "					+1906'	Mov	_	25,57	44,2		8	1,59	7,4	Nov.	7	4*,86	52",0
	23			Aoù	t 21 22	1,83	38",8						9	1,57	6,1 5,9		Az	ONYME.	
M	oyeni	ie 5,98	14,7		23 24	1,95	37,1 34,0	Oct.		1h47 <sup>in</sup> 11 <sup>s</sup> ,07			20 21	1,60 1,58	3,3		2	2 <sup>h</sup> 14 <sup>m</sup> .	-20°55′
	PIAZ	zī, XXI,	173.		26	1,63	34,5		20	11,33	54,1	Déc.	28	1,62	2,6	Août		55,46	50",2
			+69°49′		28 29	1,92	35,1 36,7		22 23	11,14	54,t 54,9	Dec.	15	1,65 1,48	6,0 7,9		26 28	5,19 5,35	50,2 51,6
No	v. g	21°,41		Mo	yenno	1,85	35,9	Moy	enne	11,20	54,6		16	1,68	7,9 6,0	Oct.	17	5,20 5,23	50,5 48,8
	20				5	PÉGASE.		L	ALAN	DE 427	00.	Moy	enne	1,58	5,9		20	5,33	47,3
	2 1	21,41	18,7		2	ıh3om.	+180381		2	1 h 4 7 m .	-210511					Moy	enne	5,29	49,8
31		21,44 ne 21,40		Oct.	9	415,55	28",7	Nov.	8	125,55	2",8			, Céphér			An	ONYME.	
	_	,.				41,67	28,1 26,7			12,45	3,9 5,3	Long	. 8	37°,63	30" 0			22515m	-210//
	LAL	ANDE 41			19	41,51	29,2		20	12,58	2,9	Janv.	19	37,36	31,8	Août	29	148,26	29",8
Λο	ùt (	08,15	+20°2′ 50″,5		22		37,7	Déc.	2	12,47	1,5 0,1	Oct.	27	3 <sub>7</sub> ,46 3 <sub>7</sub> ,90	32,4	Oct.	22	13,71	<sup>27,9</sup> <sub>27,8</sub>
1	7	0,43	47,6	Mo	yenne					12,48	2,8		17	37,98	33,8	Nov.			26,1

Anonyme (suite.)	7 α LÉZARD.	LALANDE 44290.	Lalande 44560.	Poisson Austral (suite).
22h15m -21°4	22 <sup>h</sup> 25 <sup>m</sup> +49°30′	22h31m -19058'		22h49m -30°25'
Nov. 9 135,83 27",3	Janv. 18 4,93 26",7	Août 24 525,96 59",1 25 52,91 56,2	Oct. 17 305,04 41",1 18 30,00 40,0	Déc. 2 175,74 15 17,83 14",7
Déc. 2 13,80 24,1	27 4,83 26,3	26 52,98 55,6	22 30,10 38,4	16 17.87 16,4
Moyenne 13,86 27,2	Oct. 17 4,94 29,3 18 4,99 30,0	29 53,10 59,3 Nov. 28 52,84 55,2	23 30,04 34,6 Moyenne 30,04 38,5	Moyenne 17,73 17,6
LALANDE 43741.	20 5,33 28,8	Déc. 2 52,62 55,8		α Pégase.
22h17m -2100	Moyenne 5,01 27,8	Moyenne 52,90 56,9		2215710 +140231
Nov. 20 325,63 7",3 28 32,54 6,1	LALANDE 44113.	g4 Verseau.	Déc. 15 303,14 58",3	Janv. 18 143,46 35",9
Dec. 2 32,38 10,8	22h27m -18035	22h35m -19°37'	16 30,35 61,9	27 14,55 34,0 Avril 7 14,54 40,0
Moyenne 32,52 8,0	Oct. 22 274,65 18",2	Août 26 278,29 10",4	Moyenne 30,25 60,1	Juin 2 14,31 34,6
WEISSE, XXII, 399.	Nov. 7 27,49 20,3	Oct. 17 27,39 6.0	LATANDE 44615.	Oct. 9 14,55 36,0 17 14,66 35,7
22h18m +1°12	Nov. 7 27,49 20,3 8 27,45 19,4 20 27,83 18,2	18 27,25 7,8 22 27,36 8,8	22h40m -17°47'	18 14,48 36,1 22 14,50 38,1
Août 23 43°,23 9",4 24 43,06 6,4	Moyenne 27,59 19,2	23 27,26 9,8	Nov. 20 49,62 27,8 28 49,73 31,5	Nov. 1 14,71 35,8
25 43,15 7,3 26 43,07 6,4		Nov. 7 27,11 7,0 8 27,29 9,7	Déc. 2 49,50 29,1	4 14,61
28 43,25 7,8	Lalande 44117.	Moyenne 27,31 8,8	Moyenne 49,62 29,5	7 14,53 8 14,58 32,6
Moyenne 43,15 7,5	22h27m -18°23	LALANDE 44528.	За с Се́рне́е.	14 14,40
LALANDE 43804.	Nov. 28 3t <sup>3</sup> ,67 63",6 Déc. 2 31,64 59,4	1	22h44m +65024	28 14,64 35,5
22h18m -20°12	15 31,67 60,9	22"30" -19"4	Janv. 18 19",10 27",7	29 14,54 37,6 Déc. 2 14,58 37,9
Août 29 58',64 35",1 Oct. 23 58,27 40,0	19 31,78 59.4 Moyenne 31,69 61,3	8 24,08 50,7 20 24,16 48,7	27 19,13 27,6	15 14,44 33,7
Nov. 7 58,41 38,0 8 58,51 34,8		28 24,08 53,5	Moyenne 19,13 27,7	Moyenne 14,54 36.0
9 58,64 35,3	LALANDE 44152.	Déc. 2 23,97 46,9	d Verseau.	LALANDE 45260.
Moyenne 58,49 36,6	22b28m -19°	Moyenne 24,02 50,4	22h46m -16037	23hom -15°51'
LALANDE 43828.	Août 23 285,00 8",6			Oct. 17 401,93 30",4
22h19m +1018	23 2/1/0 2,9	2213gm +22046	20 38,01 19,5	18 40,90 27,7 22 40,89 28,4
Oct. 9 27,35 29",9	20 27.74 5,2			23 40,87 29,2 Déc. 15 40,90 25,6
18 27,46 31,9 20 27,85 32,5	P P	27 15,42 14,2		16 40,91 27,9
22 27,45 35,0	_	Oct. 9 15,82 19,2	_	Moyenne 40,90 28,2
Moyenne 27,53 32,5	LALANDE 44241.	Moyenne 15,63 16,7		LALANDE 45311.
LALANDE 43942.	22h3om -1803		Janv. 19 17,75 16,"1	25"1" -15"19"
22 <sup>h</sup> 22 <sup>m</sup> +1°1		22°39° -10°20	7 27 17,74 19,4	Nov. 4 52°,62 42",2 7 52,51 43,2
Oct. 22 39°,15 20",1 23 39,19 21,9	22 58,99 51,8	Août 23 185,84 46",4	18 17,76 18,5	8 52,52 40,2 14 52,40 42,7
Nov. 7 39,24 18,6 8 39,25 19,2	Nov. 7 58,85 54,0	25 18,72 44,8	23 17,52 17,4 23 17,56 18,8	20 52,71 40,1
9 39,31 20,2	F 2 F		Nov. 7 17,55 17,7 8 17,79 18,3	28 52,66 37,1 Déc. 2 52,50 38,5
Moyenne 39,21 19,8	_	Moyenne 18,71 44,7	20 17,85 16,6	Moyenne 52,56 40,6

121
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1849, ramenées au 1et Janvier de cette année.

	Fositions may	ennes des etoties observee	es pene	uant tannee	1049,	ramer	iees au 1° Janvi	er de cette année.
	35 у Серпее.	A Company (onits)	Titte	0 - 00 (		Totto (	D 0 / 1. )	PH. C. P. L. I.
	ээ ү Сернее.	APP. SCULPTEUR (Suite).	α	OURSE P. S. (	suite).	a Pite	JURSE P. S. (suite)	x Ptte Ourse P. I. (suite).
	23633m +76047	23641m -28057'		+88°30′			+88°30′	.00.2.4
Jany	. 19 11,95 26",3	Nov. 8 35,09 54",7		•			•	+88°3°
	25 11,77 21,4	20 3,04 53,5	Janv.	19 17",8		Juill.	6 14",4	Juill. 25 x6",4
	27 11,73 24,2	Déc. 2 3,13 55,3		25 15,2 26 15,8			17 15,2 18 15,4	26 15,1
Févr	. 3 11,93 23,1	Moyenne 3,14 55,9		27 18,7			22 12,7	27 13,8 28 13,6
	5 11,78 24,1	into jenne oja je oojg		30 14,8			23 τ3,4	31 16,4
	7 11,72 27,3 9 11,85 23,4	LATANDE 46829.	Févr.			Nov.		Août 1 10,5
				3 17,4			7 15,2	3 14,8
Mo	yenne 11,82 24,3	23h46m -1007'		4 17,4 5 16,2	-		8 17,6	4 13,7
		Déc. 15 16 <sup>3</sup> ,98 47",9		5 16,2 6 16,4			19 14,2	6 15,3
1	1. ALANDE 46421.	16 17,07 45,8		7 15,2	į		20 13,3 21 15,8	7 14,7
	01.00m /o.0/	18 1013 /03		8 19,0			28 14,3	8 14,8
	23h33m -24°26′			9 15,3			29 16,2	11 13,8
Oct.		Moyenne 17,06 47,0		12 19,0		Déc.	2 14,2	12 13,0
	18 51,13 46,5 22 51,21 48,8	Decem VVIII a/a	,	13 16,8			4 20,2	14 13,0
	23 51,07 48,5	P1AZZI, XXIII, 249.	36	14 16,0			15 17,4	15 15,0
Nov.	- 1	23h51m -6043'	Mars	15 18,6		,	16,4	24 14,6
	8 51,03 47,6	Déc. 2 55,89 53",0		20 19,5		Moye	nne 15,8	26 15,5
	20 51,32 50,7	15 55,74 54,3		31 18,0	1		*	27 15,2 29 17,8
Déc.	2 51,00 47.6	16 55,83 53,3	Avril			α PE	rite Ourse P. I.	Oct. 12 15,2
Mov	renne 51,09 48,1	Movenne 55,82 53,5		14 16,0			. 00-2	17 14,5
	, , ,	140 yenne 33,02 33,3		18 14,6			+88°3°′	18 15,0
I	JALANDE 46525.	LACAILLE 9695.		21 13,6			7 11",6	Nov. 3 14,6
		LACSILLE 9095.		24 15,3 25 13,4	Į		9 15,0	7 14,2
	23h36m -26°29'	23653m -29°33'		28 14,7			10 17,8 1 13,3	Moyenne 14,3
Oct.		Oct. 17 368,57 58",6		29 15,5			4 11,5	
Nov.	7 57,73 43,6	18 36,46 56,2		30 17,8	- 1		5 11,5	& Petite Ourse P. S.
D.	8 57,92 43,1	22 36,34 55,3	Mai	x 16,6		2	6 12,8	190-251
Déc.	2 57,80 39,6	23 36,43 56,5 Nov. 7 36,17 58,5		2 16,4			7 10,8	+86°35′
Mog	yenne 57,81 41,8	Nov. 7 36,17 58,5 8 36,36 56,7		3 14,4			13,6	Janv. 24 49",2
		20 36,56 56,7		5 16,9 12 13,8		Juin	2 12,1 5 16,8	Juin 21 50,7 22 48,4
1	LALANDE 46526.	21 36,39 55,2		17 16,0	1		6 13,6	22 48,4 25 51,3
	- 2h2 m /-	Moyenne 36,41 56,7		19 14,6			8 15,0	26 52,1
	23b37m -24°20'	arayenne ou,41 ou,7		23 17,1			1 15,6	27 47,9
Oct.		30 Poissons.		24 15,7		2	2 11,7	28 51,5
	18 1,51 33,3	JO 1 ()1550M5.		25 14,1			4 12,4	29 51,3
Déc.	22 1,43 32,3 15 1,35 36,2	23h54m -6051'		26 19,8	1		5 17,0	Juill. 3 50,1
Dec.		Janv. 18 128,74 14",1		28 14,0			6 14,3	6 49,9
	18 1,63 35,3	Déc. 2 12,85 9,6	,	29 15,8 30 15,5			7 15,1 8 14,1	7 49,1 9 49,7
7.5		15 12,74 15,4		31 15,0			9 13,2	
MIG	yenne 1,46 34,6	16 -12,87 14,6	Juin	1 13,4			2 14,2	11 47,1
	Ann Corre	Moyenne 12,80 13,4		2 14,7			3 12,4	14 43.9
0	APP. SCULPTEUR.			4 13,9			4 12,8	17 49,5
	23641m -28052	α PETITE OURSE P. S.	1				6 17,7	
1001					j		7 11,4	
001.	18 3.21 58 /	+88°30'						0'
	23 3,03 55,4	16 17,5		30 15,8			7 16,6	2 47,5
Nov.	7 3,11 55,9		Juill.				23 16,3	3 48, <sub>7</sub> 1
Oct.	17 3°,24 60″,0 18 3,21 58,4 22 3,28 54,3 23 3,03 55,4	488°30' Janv. 15 '15",6 16 17,5	Juill.	4 13,9 5 15,3 20 15,5 21 14,9 24 16,0 28 12,3 30 15,8		1 1 1	4 12,8 6 17,7 7 11,4 3 13,7 4 13,4 6 15,3 7 16,6	17 49,5 21 48,8 26 49,7 27 49,7 31 50,2 Août 1 47,5 2 47,5

122

Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1849, ramenées au 1er Janvier de cette année.

d Ptte Ourse P. S. (suite).	& Ptte Ourse P. S. (suite)	ô Petite Ourse P. I.	3 Pite Ourse P. I. suite)	? Pite Ourse P. I. (suite).
+86°35′	+86°35'	+86°35′	+86°35′	86°35′
Aoùt 4 51",6 6 45,7 7 49,8 8 48,2 10 49,6 11 49,0 14 46,2 15 51,0 16 49,2 21 50,0 22 45,2 23 45,3 26 49,0 27 48,8	Août 28 48",8 29 48,5 Oct. 17 46,2 18 48,2 19 47,6 23 46,2 31 50,3 Nov. 1 48,4 7 48,9 8 49,3 9 49,3 11 50,1 Moyenne 48,8	Janv. 18 45",0 25 49,6 27 45,8 30 44,0 Févr. 3 45,2 5 48,9 7 45.6 9 46,0 12 50,6 13 46,7 14 46,3 15 43,4 16 44,6 Mars 17 42,6	Mars 18 42",3 19 44,4 20 49,5 21 50,2 22 49,2 Avril 6 46,1 22 47,7 25 48,1 26 47,3 Mai 1 46,7 5 49,5 10 45,9 25 48,6	Mai 27 46",3 Juill. 6 48,8 Août 7 46,2 10 48,1 14 45,9 15 48,7 17 47,6 21 49,3 22 46,3 23 47,6 25 45,6  Moyenne 46,9

Comparaison des positions observées des étoiles fondamentales avec les positions tirées des Éphémérides de Berlin.

Comparenson des position						,
NOM DES ÉTOILES.	DÉCLINAISON OBS- — 1° Janvier 1849.	NOMBRE des OBSERVATIONS.	овѕ.—е́рн.	ASC. DROITE OBS.  — 1er Janvier 1849.	NOMBRE des observat	obs. — е́рн.
a Petite Ourse. { P. S	_	des OBSERVATIONS.  74 566 49 39 27 37 16 25 16 53 44 37 29 33 44 44 25 41 28 44 28 47 35 30 44 33 36 30	OBS.—ÉPH.  + 0,2 - 1,3 + 1,7 - 0,2 + 3,1 + 1,3 + 4,4 + 1,5 + 1,7 + 1,5 - 1,2 + 1,4 + 0,9 + 0,4 + 1,8 + 1,6 + 0,9 - 1,6 - 0,6 - 1,3 - 1,7 - 1,2 - 2,6 - 1,1 - 2,3 - 3,1 - 0,6	_	des	+ 0,18 + 0,06 + 0,07 + 0,12 + 0,15 + 0,09 + 0,08 - 0,15 + 0,23 0,00 + 0,01 + 0,10 + 0,21 + 0,15 + 0,16 - 0,08 + 0,01 + 0,06 + 0,03 - 0,04 + 0,04
α Pégase. γ Pégase. γ Pégase. α Lion α Ophiuchus (*). γ Aigle. α Aigle. α Orion. α Serpent. β Aigle. α Petit Chien α Baleine. α Verseau. α Hydre. β Orion α Vierge. α Capricorne. α Balance α Balance α Grand Chien. α Scorpion. α Poisson austral.	+ 14.23.36,0 + 14.20.35,6 + 12.42.10,5 + 12.40.24,0 + 10.14.54,3 + 8.29.21,4 + 7.22.25,1 + 6.54.14,8 + 6. 1.58,8 + 5.36.28,3 + 3.29.36,8 - 1. 3. 5,9 - 8. 0.27,5 - 8.22.51,8 - 10.22.16,5 - 12.58.15,4 - 13. 0.33,6 - 15.21.55,7 - 15.24.38,2 - 16.30.44,4 - 26. 5.32,8 - 30.25.17,6	18 35 35 36 36 33 38 35 26 29 35 21 47 45 11 5 17 16 26 25 11	- 2,0 - 1,4 - 0,1 - 2,7 - 1,6 - 1,9 - 0,4 + 0,4 + 0,2 + 3,1 + 0,2 - 0,1 - 1,8 - 1,0 + 2,3 + 1,6 + 0,5 + 3,0 + 1,4 + 4,3 - 1,0 + 4,2	22.57.14,54 0. 5.27,92 10. 0.19,44 17.27.55,68 19.39. 4,88 19.43.24,94 5.46.59,78 15.36.50,03 19.47.53,80 7.31.23,67 2.54.23,38 21.58. 1,58 9.20. 9,93 5. 7.16,83 13.17.14,57 20. 9.46,40 14.42.20,60 14.42.32,00 6.38.29,55 16.20. 9,38 22.49.17,73	21 38 36 34 37 33 39 36 33 30 26 21 47 45 17 17 22 34 38 25	0,00 - 0,06 0,00 + 0,20 - 0,01 + 0,02 - 0,01 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,00 + 0,04 - 0,10 - 0,08 + 0,08 - 0,01 - 0,01 - 0,03 + 0,04 - 0,06 - 0,18

<sup>(\*)</sup> Dans la série renfermant les observations de l'année 1848, la différence entre l'ascension droite observée de a Ophinchus et l'ascension droite des Ephémérides a été marquée par erreur - 0,09 au lieu de + 0,09.



125
Réduction des observations du Soleil faites à la lunette méridienne pendant l'année 1849.
Midi vrai de Genève.

						iut viai		0101					
1.		4.0		5/1					• •				
Date				Déclin, centre, 1	Erreur éph.	Bord obs.	Date		AR. centre	Erreur éph.	Déclin, centre.	Erreur éph.	Berd obs.
١.		h. m. s		0 , "	"	_		١	h. m. s.	\ S	0 , ,,	"	
Jany.		19.49. 2,00	-0,02	-21. 5.38,1	+ 4,2	S	Mai	29	4.24.34,16	+0,10			
	16	19.53.19,30	-0,07	2				30	4.28.38,82	-0,11	+21.47.43,5		I
	18	20. 1.51,98	-0,30	-20.30.20,1	- 0,7	S		31	4.32.43,55	+0,03	+21.56.34,7		S
	19	20. 6. 6,88	-0,04	-20.18, 1,4	+11,8	I	Juin	, I	4.36.48,62	+0,24	+22. 4.38,5		I
	2 (	20.14.34,81	+0,13					2	4.40.54,32	+0,20	+22.12.48,7		S
	22 25	20.18.48,03	-0,18					3 5	4.45. 0,55	0,00	+22.20. 8,0		I
	26		-0,13	-02-EC-	1 - 5	т .		- 6 - 6	4.53.13,53	+0,13	+22.34.12,6		S
		20.35.31,55	+0,05	-18.39.56,7	+ 7,5	I			4.57.20,79	-0,06	+22.40.28,9		I
	<sup>2</sup> 7 30	20.39.40,66 20.52. 2,38	-0,15 -0,13	-18.24.23,7 -17.38.22,2	-: 1,3	S		7	5. 1.27,99 5. 5.35,76	+0,12 +0,02	+22.46.38,0		S
Févr.	jo	21. 0.12,37	+0,16	-17.30.32,2	+ 7,5	S		17	5.42.55,55	-0,23	+22.52. 1,6 +23.23.51,1		I I
revr.	2	21. 4.16,39	+0,01	-16.45.26,3	+10,1	I		18	5.47. 4,89	+0,02	+23.25.24.8		S
	$\tilde{3}$	21. 8.19,50	-0,07	-16.27.39,2	- 2,0	S		19	5.51.14,45	+0,11	+23.26.32,0		I
	4	21.12.21,66	-0,03	-10.27.09,2	2,0	3		20	5.55,24,42	-0,19	T20.20.02,0	472	
1	5	21.16.22,48	+0,52	-15.51.37,5	- 3,r	S		21	5.59.33,87	+0,04	+23.27.29,0	- 63	s
	9	21.32.20,45	-0,13	-14.36.36,9	+ 9,3	I		22	6. 3.43,56	0,00	+23.27. 7,0		I
	12	21.44.10,02	+0,04:	-13.37.29,5	+ 1,6	S .		23	6. 7.52,92	+0,23	12012/. /,0	1 0,0	-
	13	21.48. 5,10	+0,04	. 9	+ 2,8	I		24	6.12. 2,83	-0,17	+23.25.36,1	+ 3,r	1
	14	21.51.59,45	+0,02	-12.57. 5,4	+ 5,0	S		25	6.16.12,21	-0,14	+23.24.19,9		Š
	16	21.59.45,88	+0,13		,-	ŭ		26	6.20.21,26	+0,07	+23.22.24,8		ĩ
Mars		23.40.55,68	+0,24	- 2. 3.58,3	+ 4,1	I		27	6.24.30,38	+0,07	+23.20.12,5		s
112	16	23.44.34,60	+0,40	- 1.40.10,3	- 3,0	s		28	6.28.39,49	-0,10	+23.17.39,2		S
	18	23.51:52,60	+0,26	-0.52.53,8	+ 4,3	I		29	6.32.48,15	-0,03	+23.14.36,6		S
	19	23.55.30,98	+0,52	- 0.29.10,6	+ 3,3	S		30	6.36.56,65	-0,04	+23.11. 4,7		I
	20	23.59. 9,93	+0,08	J	,-		Juill.	1	6.41. 4,90	-0,03	+23. 7.20,1		S
	21	0. 2.47,97	+0,42	+ 0.18.24,5	-8,5	S		2	6.45.12,87	0,02	+23. 2.55,3		I
1	22	0. 6.26,32	+0,36	+ 0.41.51,0	+ 5,3	I		3	6.49.20,56	-0,01	+22.58.23,4		S
1	23	0.10. 4,72	+0,17	+ 1. 5.38,2	- 3,r	S		4	6.53.28,27	-0,33	+22.53.13,3		I
	31	0.39. 9,36	+0,18	+ 4.13.16,2	- 6,2	'S		6	7. 1.41,75	+0,02	+22.41.56,6	- 1,0	S
Avril	7	1. 4.39,75	+0,07	+ 6.53.21,6	- 2,8	I		7	7. 5.48,11	+0,05	+22.35.41,8		S
1	7 8	1. 8.19,22	-0,08		, ,			7 8	7. 9.53,93	+0,26	+22.29.11,9	-10,1	S
	11	1.19.18,45	40,18	,				9	7.13.59,37	+0,47	+22.21.53,3	+ 6,3	I
1	13	1.26.39,63	+0,15	+ 9. 5.56,4	+ 8,6	S		10	7.18. 4,83	+0,27	+22.14.33,2	+ 1,5	I
	19	1.48.51,75	+0,15					II	7.22. 9,88	+0,06	+22. 6.52,6	- 6,1	S
	22	2. 0. 3,30	+0,21	+12.14.47,5	- 1,6	1		13	7.30.18,37	-0,04	+21.50.12,1		S
	25	2.11.19,13	+0,07	+13.14.23,3	- 7,7	S		14	7.34.21,51	+0,35	+21.41. 2,2		1
	26	2.15. 5,18	+0,19	+13.33 39,7	+ 0,1	I		ι5	7.38.24,75	+0,16	+21.31.51,0	- 3,5	S
	27	2.18.51,94	+0,08	+13.52.53,8	- 3,0	S		16	7.42.27,10	+0,37	+21.22. 2,6		I
	30	2.30.15,11	-0,15	+14.48.54,1	+ 5,7	I		17	7.46.29,27	+0,26	+21.12.10,7		S
Mai	J	2.34. 3,50						18	7.50.31,02	+0,06	+21. 1.40,7	+ 0,6	I
ľ	2	2.37.52,97	-0,15	+15.25.13,0	+ 0,1	I		19	7.54.32,01	+0,10		. ,	
	3	2.41.42,55	0,00	+15.43. 2,6	- 5,7	S		22	8. 6.31,84	+0,08	+20.16.32,6		I
	4 5	2.45.32,93		+16. 0.24,9	+ 0,2	1.		23	8.10.30,63	+0,07	+20. 4.34,8		S
1		2.49.23,86		+16.17.45,3	- 7.9	S		24	8.14.28,55	+0,34	+19.51.57,0		I
	10	3. 8.46,25						25	8.18.26,42	+0,06	+19.39.17,1		S
	11	3.12.40,30		+17.55. 1,2	- 1,0	S		26	8.22.23,50	-0,02	+19 25.58,9	+ 4,1	I
	13	3.20.30,89		1 - 2 E - E	12			27	8.26.19.85	10,01	+19.12.41,6	- 5,5	S
1	18	3.40.16,90		+19.35. 1,5	- 4,3	I .	1	28	8.30.15,53	+0,08	+18.58.54,9		S
	20	3.48.15,36		+20. 0.36,6	- 0,6	S	Ande	29	8.34.10,33 8.45.52,46	+0,42	+18.44.50,6	- 5,2 + 53	S
	23	4. 0.17,05		100/=//-	105	т	Août				+18. 0.36,	+ 5,3	, L
	24	4. 4.18,84		+20.47.44,1	+ 2,5 $- 8,2$	I S		3	8.49.44,89 8.53.37,01	+0,22	+17.29.46;7	+ 3,4	I
	25 26	4. 8.20,84		+20.58.49,5	- 0,2	3		4	8.57.28,51		+17.14. 5,0		S
	27	4.16.26,90						6	9. 5. 9,66		+16.41.25,7		1
	-/	4110120190	3,23				1		3. 5. 9,50	, 5,00	1.0.41.209/	1 0,0	

#### Réduction des observations du Soleil faites à la lunette méridienne pendant l'année 1849. Midi vrai de Genève.

$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Date Août	5. m. s. 9. 8.59,39 8. 9.12.48,29 10. 9.20.24,83 11. 9.24.12,13 12. 9.27.59,05 14. 9.35.31,42 15. 9.39.16,58	5. 0,00 + +0,19 + +0,15 + +0,26 + +0,21 + -0,02 + +0,10	+15.15.24,3 +14.57.23,2 +14.20.50,5 +14. 2.16,1	- 2,2 + 2,3 - 2,1 + 1,3 + 4,8 - 0,3 - 5,6	S I S I I		29 30 17 18 19 7 8	h. m., s., 10.31. 0,08 10.34.38,45 13.28.49,26 13.32.34,23 13.36.19,73 14.50. 1,74 14.54. 2,44 14.58. 4,03	s. -0,18 -0,05 -0,18 -0,09 +0,07 -0,17 -0,15 -0,16	- 9.40.42,5 -10. 2.28,9 -16.38. 9,8	+ 0,1 + 2,8 + 2,9 +11,1	S I S
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		10 9.20.24,83 11 9.24.12,13 12 9.27.59,05 14 9.35.31,42 15 9.39.16,58 16 9.43.1,23 17 9.46.45,80 18 9.50.29,44 21 10. 1.37,62 21 10. 5.19,49 23 10. 9. 0,63 24 10.12.41,74 25 10.16.22,02 26 10.20. 2,19 27 10.23.41,42 27 10.23.41,42	+0,15 +0,26 +0,21 +0,21 +0,10 +0,20 -0,13 -0,03 +0,05 -0,02 +0,18 -0,03 +0,15 +0,01 +0,41 -0,15	+15.33.10,4 +15.15.24,3 +14.57.23,2 +14.20.50,5 +14. 2.16,1 +13.43.14,8 +11.45.43,1 +11.45.43,1 +11.45.43,1 +11.45.43,1 +11.45.23,5 +10.44. 5,5 +10.23.22,8	- 2,1 + 1,3 + 4,8 - 0,3 - 5,6 + 2,5 - 9,1 0,0 - 5,9 + 1,5 - 5,4		Nov.	18 19 7 8 9 14 20 28 2 15 18 20	13.28.49,26 13.32.34,23 13.36.19,73 14.50. 1,74 14.54. 2,44 14.58. 4,03 15.18.24,56 15.43.17,54 16.17.12,31 16.34.26,94 17.44.48,05 17.44.48,05 17.53.41,18 17.53.41,18	-0,18 -0,09 +0,07 -0,17 -0,15 -0,16 +0,15 +0,11 -0,02 -0,24 -0,15 -0,16 -0,12 -0,36 -0,24 -0,17	- 9.40.42,5 -10. 2.28,9 -16.38. 9,8 -16.55.13,9 -19.44.52,2 -21.21.18,2 -22. 0. 6,5	+ 2,8 + 2,9 +11,1 - 1,2 + 2,5 - 0,7 + 5,9	I S I

## Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1849.

Mercure.									
Date.	Temps moy, de Genève.	AR. Centre.	Erreur éphém.	Déclinaison Centre.	Erreur éph.				
Avril 21	23.14.26,6 23.24.3,7	1.15.57,61 1.37.25,87	+ 0,42 + 0,47	+ 6. 6. 6, 6, 1 + 8 36.55,7 + 9.28.12,8	- 0,1 + 7,1				
25 Juin 2 7 8	23.27.30,8 1.40.24,6 1.39.43,7	1.44.50,16 6.23.58,25 6.42.59,98	+ 0,45 + 0,24 + 0,18	+ 9.20.12,6 + 25. 1.35,8 + 23.59.16,0 + 23.44.30,9	+ 1,1 - 3,4 - 3,3 - 3,2				
Août 6	1.38.41,6 23.27. 3,5 23.45. 0,2	6.45.54,30 8.30.28,00 9. 4.13,92	+ 0,16 + 0,85 + 0,54	+ 20.12.53,6 + 18.25. 6,4	+ 3,1 + 5,6				
Nov. 3	22.39.40,6	13.33.50,58	- 0,31	- 7.40.43,9	+ 6,0				
		Vénu	is.						
Févr. 3	2.59.26,6 2.59.48,2 3. 1.33,5	22.50.58,51 22.55,16,76 23.20.41,60 23.57,38,70	+ 0,03 - 0,02 + 0,05 + 0,14	- 8.33.31,5 - 8.3.44,0 - 5. 1.33,5 - 0.22. 0,7	+ 10,9 + 11,7 + 11,9 + 10,4				
Févr. 3 5 7 8	3. 3. 1,3 3. 3.10,8 3. 3.16,9 3. 3.18,4	o. 5.41,27 o.13.40,51 o.17.38,58	+ 0,14 + 0,04 - 0,12 + 0,09	+ 0.40.21,4 + 1.42.35,2 + 2.13.37,4	+ 10,2 + 11,5 + 12,6				
9 12 13	3, 3.19,4 3, 3.17,5 3, 3.15,4	0.21.36,13 0.33.23,89 0.37.18,30	+ 0,04 + 0,10 + 0,13	+ 2.44.39,1 + 4.17. 7,2 + 4.47.44,6	+ 10,4 + 11,5 + 11,8				

127

## Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1849.


		Vénus	(suite).		
Date.	Temps moy. de Genève.	AR.: Centre	Erreur éphém.	Déclinaison Centre.	Erreur éph
Févr. 14	3. 3.12,6	h. m. s. 0.41.12,10	s. + 0,01	+ 5.18.15,3	
Mars 15	2.55.29,3	2.27.47,54	+ 0,53	+ 18.23.48,1	+ 11, + 11,
	2.54.16,6	2.34.27,76	+ 0,55	+ 19. 7.33,5	+ 9.
17	2.52.55,2	2.40.59,27	+ 0,74	+ 19.49.28,8	+ 13,
19	2.51.24,5	2.47.21, 3	+ 0,76	+ 20.29.44,4	+ 7,
	2.43.21,8	3.10.49,81		+ 22.50.44,6	
29 31	2.40.43,5	3.16. 4,20	+ 0,90	+ 23.20.50,1	+ 10,
		3/2 863	+ 1,18	+ 25.35.52,9	+ 4,
Avril 13	2.14.37,1	3.41. 8,63	+ 1,51		+ 8,
Mai 24	22.38.28,4	2.49.59,86	+ 1,90	+ 16.48.43,5	- 7,
25	22.33.30,7	2.48.57,88	+ 2,15	+ 16.30.19,9	- 9, - 8,
26	22.28.42,1	2.48. 5,00	+ 2,27	+ 16.12.50,1	- 8,
28	22.19.32,2	2.46.46,71	+ 2,11	+ 15.40.52,5	- 7,
30	22.10.58,4	2.46. 4,59	+ 1,97	+ 15.13.11,1	- 10,
31	22. 6.54,8	2.45.56,88	+ 2,06	+ 15. 0.48,6	- 3,
Juin I	22. 3. 0,3	2.45.58.31	+ 1,86		
2	21.59.14,2	2.46. 8,16	+ 1,99	+ 14.39.37,3	- 7, - 3,
4	21.52. 7,9	2.46.53,81	+ 1,93	+ 14.22.37,0	- 3,
5	21.48.47,7	2.47.29,61	+ 1,40	+ 14.15.53,5	- 13,
7	21.41.30,0	2.49. 3,89	+ 1,54	. + 14. 5. 4,4	- 6,
17	21.18. 5,5	3. 4. 1,08	+ 1,53	+ 14. 4.42,6	- 0,
20	21.12.43,7	3.10.27,09	+ 0,97	+ 14.18,33,2	+ 2,
21	21.11, 5,3	3.12.45,97	+ 0,93	+ 14.24.21,9	- 2,
22	21. 9.32,6	3.15. 9,52	+ 1,02	+ 14.30.30,1	+ 3,0
24	21. 6.41,3	3.20.10,95	+ 0,72	+ 14.44.25,3	- 3,
26	21. 4. 7,2	3.25.29,53	+ 0,76	+ 14.59.44,3	+ 2,9
27	21. 2.56,5	3.28.15,11	+ 0,75	+ 15. 7.58,6	+ 2,0
28	21. 1.49,8	3.31. 4,79	+ 0,64	+ 15. 7.58,6 + 15.16.29,8	+ 4,0
	21. 0.47,1	3.33.58,49	+ 0,41		+ 0,4
29 30	20.59.47,6	3.36.55,45	+ 0,71	F 0 / 0	
	20.58.52,2	3.39.56,45			
		3.43. 1,23	+ 0,68	+ 15.43.47,6	
3	20.58. 0,6		+ 0,45	+ 15.53.18,8	- I,
	20.57.11,9	3.46. 8,92	+ 0,83	+ 16. 2.57,3	+ 1,
5	20.55.45,6	3.52.35,54	+ 0,53	+ 16.22.49,9	- 2,
6	20.55. 7,0	3.55.53,39	+ 0,76	+ 16.32.47,9	+ 3,
7 8	20.54.32,1	3.59.14,90	+ 0,52	+ 16.42.59,0	+ I,
	20.53.59,8	4. 2.39,25	+ 0,55	+ 16.53. 9,9	+ 3,0
9	20.53.30,9	4. 6. 6,69	+ 0,51	+ 17. 3.23,7	+ 3,4
	20.52. 3,4	4.20.25,20	+ 0,45	+ 17.44. 9.7	+ 8,7
16	20.51,26,1	4.31.37,43	+ 0,37	+ 18.14.10,0	+ 5,
17 18	20.51.18,4	4.35.26,33	+ 0,56	+ 18.23.54,6	+ 5,:
	20.51.13,7	4.39.18,15	+ 0,25	+ 18.33.31,4	+ 4,5
20	20.51.10,5	4.47. 8,08	+ 0,38	+ 18.52. 9,3	+ 6,
2 1	20.51.12,2	4.51. 6,28	1 0,60	+ 19. 1.12,8	+ 5,4
22	20.51.16,5	4.55. 7,20	+ 0,30	+ 19. 9.58,8	+ 8,7
26	20.51.53,4	5.11.30,34	+ 0,51	+ 19.42.48,1	+ 5,7
27	20.52. 7,6	5.15.41,13	+ 0,57	+ 19.50.15,2	+ 8,0
28	20.52.23,7	5.19.53,87	+ 0,54	+ 19.57.25,7	+ 8,3
31	20.53.23,1	5.32.43,06	+ 0,45		
Août 1	20.53.46,3	5.37. 2,93	+ 0,44	+ 20.22.47,3	+ 7,4
2	20.54.11,3	5.41.24,56	+ 0,35	+ 20.28. 8,7	+ 11,7
3	20.54.37,9	5.45.47,78	+ 0,30	+ 20.33.11,0	+ 12,0
4	20.55. 5,9	5.50.12,42	+ 0,40	+ 20.37.53,7	+ 7,9

### Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1849.

			Vénus	(suite).		
	Date.	Temps moy, de Genève.	AR. Centre.	Erreur éphém.	Déglinaison Centre.	Errenr éph.
Ac No		20.56. 6,6 20.56. 6,6 20.56.38,2 20.57.48,1 20.58.24,9 20.59. 2,4 21. 1. 2,0 21. 1.43,7 21. 3.10,4 21. 6.12.1 21. 6.59,3 21. 7.46,9 21. 8.34,8 21. 9.23,4 21.10.12,1 21.11. 1,3 21.11.50,9 21.12.40,6 21.49. 5,6 21.58.39,5 22. 0.35,0 22. 1.14,6	h. m. s. 5.59. 6,33 6. 3.35,66 6.12.37,86 6.12.37,86 6.17.11,23 6.21.45,39 6.35.34,98 6.40.13,42 6.49.33,42 7. 8.21,89 7.13. 5,68 7.17.50,02 7.22.34,55 7.27.19,87 7.32. 5,31 7.36.51,20 7.41.37,40 7.46.23,80 11.40. 2,42 12.52.42,73 13. 6.28,26 13.11. 4,50	** 0,49 + 0,43 + 0,52 + 0,25 + 0,41 + 0,40 + 0,50 + 0,27 + 0,42 + 0,37 + 0,49 + 0,32 + 0,41 + 0,36 + 0,29 - 0,40 - 0,31 - 0,32	+ 20.45.54",2 + 20.49.15,4 + 20.54.40,7 + 20.56.43,1 + 20.58.20,3 + 21. 0. 7,8 + 20.57.29,8 + 20.46.42,9 + 20.42.41,9 + 20.38. 8,7 + 20.33. 2,8 + 20.27.24,7 + 20.21.17,1 + 20.14.40,0 + 20.7.23,3 + 19.59.35,4 + 3.43. 7,2 - 3.49.39,8 - 5.14.50,2 - 5.43. 5,6	+ 10,2 + 11,9 + 12,5 + 12,1 + 8,9 + 10,0 + 10,6 + 8,4 + 9,9 + 10,6 + 11,8 + 13,0 + 11,2 + 6,6 + 9,0 + 10,1 + 5,4 + 6,0 + 3,9 + 3,6
	,		Mar		2.,2,2	, ,,,
Ju	in 30 ill. 3 5 6 14 28 oùt 11 25	19.26.15,4 19.22.34,1 19.20. 6,2 19.18.52,1 19. 8.57,7 18.51.16,7 18.32.50,3 18.13. 1,1	2. 3. 7,80 2.11.15,47 2.16.40,31 2.19.22,61 2.40.58,96 3.18.26,86 3.55. 9,25 4.30.28,53	- 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,28 - 0,47 - 0,38 - 0,72 - 0,75	+ 10.53.16,1 + 11.37.11,7 + 12. 5.51,9 + 12.20. 1,5 + 14. 8.13,2 + 16.54.55,6 + 19.10.23,6 + 20.53.50,4	- 0,8 + 0,2 0,0 - 1,2 + 2,0 + 0,8 - 0,8 + 7,0
		*	Palls	ıs.		
	in 20 21 22 25 26 27 29 ill. 6 7 12 14 17 28	11.49. 0,2 11.44.14,1 11.39.27,9 11.25.11,1 11.20.26,8 11.15.42,4 11. 6.15,0 10.33.30,9 10.28.52,8 10. 5.57,2 9.56.53,8 9.43.26,0 9.25.44,9 8.55.31,2	17.45.11,85 17.44.21,56 17.43.31,09 17.41.1,70 17.40.13,12 17.39.24,49 17.37.48,65 17.32.35,11 17.31.52,73 17.28.36,12 17.27.24,38 17.25.44,17 17.23.46,21 17.21. 3,49	- 0,26 - 0,54 - 0,39 - 0,14 - 0,50 - 0,35 + 0,02	+ 24.35.29,1 + 24.33.51,8 + 24.31.54,6 + 24.24.6,7 + 24.20.52,6 + 24.17.32,8 + 24.9.48,3 + 23.34.25,4 + 23.28.24,3 + 22.54.31,6 + 22.39.18,8 + 22.15.16,4 + 21.40.7,9 + 20.32.52,7	- 15,9 - 18,4 - 18,8 - 10,4 - 4,4 - 9,9 - 6,9

Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1849.

e se		Jupit	er.		
Date.	Temps moy, de Genève.	. AR. Centre.	Erreur éphém.	Déclinaison Centre.	Erreur éph.
Mars 17	9.22.46,3	9. 4. 1,24	- 0,67	+ 17.50.11,2	+ 2,4
19	9.14.23,5	9. 3.30,25	- 0,52	+ 17.52.15,7	+ 2,5
20	9.10.13,3	9. 3.15,86	- 0,50	+ 17.53. 9.8	+ 5,9
21	9. 6. 3,8 9. 1.55,0	9. 3. 2,22 9. 2.49,26	- 0,51 - 0,49	+ 17.54. 9,2 + 17.54.55,3	+ 0,8 + 5,7
Avril 6	8. 1.11,9	9. 1. 4,50	- 0,45	+ 18. 1. 1,9	+ 9,2
26	6.44.34,9	9. 3. 6,03	- 0,41	+ 17.50.30,8	+ 8,9
Juill. 7 Oct. 18	2.39.53,7	N 9.41.36,62	- 0,32	+ 14.46.34,3	+ 6,3
Oct. 18	• • • 21.13. 9,0	11. 3.59,82	- 0 <sub>1</sub> 51	+ 7. 3.53,3	+ 6,0
	• `	Saturi	ite:		
Oct. 17	10.30.11,1	0.15.19,73	- 1,59	- 1.13.16,4	+ 3,7
18	10.25.59,8	0.15. 4,32	- 1,58	- 1.14.45,9	- 0,9
22	10. 9.16,7	0.14. 4,62	- 1,54	- 1.20.49,6	+ 2,0
23	10. 5. 6,4	0.13.50,19	- 1,50	- 1,22.12,0	- 1,6
Nov. 7	9. 3. 2,9 8.58.5 <sub>7,0</sub>	0.10.44,83	1,48	- 1.39.48,7 - 1.40.46,5	- 1 <sub>1</sub> 8
14	8.34.28,5	0.10.34,74	- 1,42 - 1,50	- 1.40.46,5 - - 1.45.20,4	+ 2,7 + 6,2
19	8.14.14,2	0. 9. 6,79	- 1,45	- 1.47.54,6	+ 3,1
20	8.10.12,5	0. 9. 0,99	- 4,49	- 1.48.12,4	- 2,9
21	8. 6.11,2	o. 8.55,58	- 1,56	- 1.48.40,7	+ 4,2
Déc. 2	7.22.21,4	0. 8.20,66	- 1,5 <sub>2</sub>	- 1.49.37,8	- 0,8
15 16	6.31.34,5 6.27.42,8	o. 8.40,69 o. 8.44,94	- 1,49 - 4,42	- 1.44. 6,5 - 1.43.25,5	+ 3,2 + 6,1
	w			1.40.20,0	1 57.
		Uranu	ls.		
Janv. 15	5.28.57,2	1. g <sub>v</sub> 3,99	+ 9,19	+ 6.41. 1,3	+ 49,9
16	5.25. 5,1	t. g. 7,86	+ 9,05	+ 6.41.24,8	+ 51,6
18	5.17.21,5	1. 9.16,00	+ 8,95	+ 6.42.21,9	+ 48,4
Oct. 17	5.13.29,6 .11.45.27,0	1.30.47,97	+ 9,12 +10,18	+ 6.42.53,2 + 8.50.39,8	+ 45,8 + 59,6
18	11.41.21,9	1.30.38,73	+10,19	+ 8.50.39,8 + 8.49.52,8	+ 53,1
22	11.25. 1,7	1.30. 2,04	f10,10	+ 8.46.17,3	+ 55,3
Nov. 7	10.19.46,2	1.27.40,79	+10,04	+ 8.32.36,6	+ 60,3
	10.15.42,0	1.27.32,44	+10,10	+ 8.31.54,2	+ 55,1
19	9.31. 2,2	1.20. 7,40	+10,17	+ 8.23.49,6	+ 53,8
20	9.26.59,4 9.22.56,6	1.26. 0,47	+10,00 +10,00	+ 8.23. 8,8 + 8.22.29,7	+ 54,5 + 54,3
Déc. 2	8.38.34,7	1:24.46,50	+10,01	+ 8.16.11,1	+ 55,3
4	8.30.32,6	1.24.36,20	+10,05	+ 8.15.17,8	+ 51,6
15	7.46.33,3	1,23.51,82	+10,00	+, 811.12,3	+ 56,3
	•	Neptur	ie.		
Aoùt 23	12.14. 9,4	22.22.44,70	+ 1,74	- 10.54.46,6	+ 11,7
24	12.10. 6,9	22.22.38,22	+ 2,01	- 10.55.31,1	+ 20,0
25	12. 6. 5,0	22.22.32,14	+ 1,88	- 10.55.59,5	+ 12,1
28	11.53.58,8	22.22.13,60	+ 1,91	- 10.57.50,8	+ 15,4
29	11.49.56,7	22.22. 7,33	+ 2,02	- 10.58.26,4	+ 15,1
-					



### **OBSERVATIONS**

#### DE LA PLANÈTE MÉTIS

FAITES

#### A L'ÉQUATORIAL EN 1849.

DATE.	HEURE	DIFF. AR.	СО	RRECTIO	NS.	HEURE	DIFF. DÉCLIN.	CORREC	CTIONS.	ÉTOILE
37 IL Z E.	sidérale.	Métis-Étoile.	Micromètre.	Réfraction.	Parallaxe.	sidérale.	Métis-Étoile.	Réfract.	Parall.	de comp.
12 Juillet	h m s 19.19.28 19.24.31 19.29. 3 19.33. 2	- 2. 0,00 - 2. 0,57 - 2. 0,17 - 2. 0,40	- 0,10	~ 0,08	- 0,20	19.19.28 19.24.31 19.29. 3 19.33. 2	+ 5. 6,0 + 5. 6,7 + 5. 5,0 + 5. 5,7	+ 1,7	+ 4,3	Verseau.
13 Juillet	19. 7.29 19.12.34 19.17. 6 19.21.37	- 2. 5,26 - 2. 5,40 - 2. 5,43 - 2. 5,37	- 0,04	- 0,04	- 0,20	19.7°29 19.12.34 19.17. 6 19.21.37	+ 2. 5,2 + 2. 4,6 + 2. 5,0 + 2. 4,6	). - 4-0,9 	+ 4,2	Verseau.
28 Juillet	19.56.53 19.59.39 20. 2.32 20.11. 1	- 0.56,10 - 0.56,30 - 0.56,23 - 0.36,64	+ 0,08	+ 0,03	- 0,18	20. 6.16 20. 7. 1 20. 7.51 20.18.56	- 4. 2,5 - 4. 2,1 - 4. 3,9 + 7.13,2	-0,9	+ 4,8	a a a b
	20.13.14	- 0.36,97 - 0.36,70	- 0,14	- 0,05	- 0,17	20.19.56	+ 7.10,0 + 7.10,5	+ 1,4	+ 4,9	b b
31 Juillet	20. 3. 6 20.10.26 20.15. 7 20.21.43	- 2.17,14 - 2.17,46 - 2.17,80 - 2.17,60	+ 0,12	+ 0,04	- 0,17	20. 3.53 20.11.16 20.16.18 20.22.28	- 6. 9,1 - 6.10,7 - 6.20,7 - 6.26,3	- 1,3	+ 4,9	b b h
	20.26.17 20.33.36	- 1. 5,40 h	- o,13	- 0,04	- 0,15	20.29.28	+ 6.28,4 + 6.31,1	+ 1,2	+ 5,0	6
ier Août	20. 0.16 20. 4.46 20. 8.45 20.12.40	- 1.41,37 - 1.41,43 - 1.41,83 - 1.41,90	- 0,04	- 0,01	- 0,17	20. 1. 5 20. 5.29 20. 9.27 20.13.32	+ 1.56,8 + 1.56,3 + 1.52,0 + 1.55,6	+ 0,4	+ 5,0	c c c
2 Août	20. 8. 5 20.13. 9 20.18.16 20.22.44	- 2.19,63 - 2.19,93 - 2.19,84 - 2.20,26	+ 0,05	+ 0,02	- 0,16	20. 8.50 20.13.55 20.19. 0 20.23.30	- 2.45,9 - 2.45,5 - 2.46,4 - 2.44,8	- 0,5	+ 5,0	c : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
3 Août	20.11.23 20.17. 2 20.22.40 20.36.14	- 2.59,30 - 2.59,57 - 2.59,60 + 5.19,96	+ 0,15	+ 0,05	- 0,16	20.12. 7 20.17.48 20.23.24 20.37. 0	- 7.25,4 - 7.24,4 - 7.30,7 + 2.41,3	- 1,5	+ 5,0	c c d
	20.44. 8	+ 5.19.60 }	- 0,05	- 0,01	- 0,14	20.44.53	+ 2.44,0 }	+ 0,5	+ 5,1	d

132
Observations de la Planète Métis faites à l'équatorial en 1849.

	HEURE	DIFF. AR.	со	RRECTIO	NS.	HEURE	DIFF. DÉCLIN.	CORREC	TIONS.	ÉTOILE
DATE.	sidérale.	Métis-Étoile.	Micromètre.	Réfraction.	Parallaxe.	sidérale.	Métis-Étoile.	Réfract.	Parall.	de Compar-
6 Août	20. 9.44 20.18.17 20.26.13 20.33.34	- 4.10,46 - 4.10,87 - 4.11,06 - 4.11,13	s - 0,20	- 0,06	s - 0,16	h m s 20.27.30 20.35. o	t. p. +10.10,9 +10.8,9	+ 2,0	+ 5,1	e e e
	20. 9.44 20.18.17 20.26.13 20.33.34	- 5.16,83 - 5.17,13 - 5.17,20 - 5.17,33	- 0,03	- 0,01	- 0,16	20.10.30 20.19. 0	+ 1.26,6 + 1.23,8	+ 0,3	+ 5,1	f $f$ $f$
8 Août	20.12.16 20.30.20 20.17.23 20.32.37	+ 4.14,40 + 4.13,94 - 5.42,04 - 5.42,64	+ 0,01 - 0,01	0,00	- 0,15 - 0,15	20.13. 0 20.31. 5 20.18. 6 20.33.20	- 0.34,4 - 0.37,5 + 0.40,6 + 0.37,9	0,0	+ 5,2	g g e e
11 Août	20.12. 7 20.19.29 20.33.36 20.41.28	- 5. 9,90 - 5.10,03 - 5.10,03 - 5.10,80	0,19	- 0,05	– ο,τ5	20.12.50 20.20.10 20.34.20 20.42.10	+ 9.39,6 + 9.36,3 + 9.38,9 + 9.37,1	+ 1,9	+ 5,2	h h h
14 Λούι	21. 2.42 21. 8.17 21.18.23 21.25.10	- 4.12,55 - 4.12,50 - 4.12,87 - 4.13,34	0,21	- 0,03	- 0,09	21, 3,30 21, 9, 0 21,19,10 21,25,50	+10.55,5 +10.52,9 +10.51,8 +10.53,7	) } + 1,7	+ 5,4	i i i
15 Août	19.33.39 19.41.48 19.49.27 19.56.46	- 5. 2,87 - 5. 3,06 - 5. 3,30 - 5. 3,93	- 0,13	- 0,07	<b>~</b> 0,20	19.34.20 19.42.30 19.50.10 19.57.30	+ 6.30,3 + 6.25,0 + 6.27,6 + 6.22,5	+ 1,9	<b>†</b> 5,2	i i i i
22 Août	19.59.51 20.11.44 20.25.50 20.28.40	+ 1.14,37 + 1.13,90 + 1.13,50 + 1.13,33	+ 0,30	÷ 0,09	- 0,15	20.15.15 20.16. 2 20.16.52 20.17.32	-15.20,9 -15.16,0 -15.19,8 -15.16,6	-3,2	+ 5,4	k k k
23 Août	20. 6.26 20. 9.49 20.30. 7 20.33.31	+ 1.43,80 + 1.43,77 + 1.42,85 + 1.43,13	0,29	- 0,09	- 0,15	20.19. 4 20.19.49 20.20.34 20.21.47	+14.53,2 +14.50,9 +14.48,9 +14.51,5	+ 3,2	+ 5,4	<i>l l l l</i>
25 Août	21. 6.58 21.16. 0 21.18.17	- 0.15,90 - 0.15,83 - 0.16,13 - 0.16,30	0,13	- 0,02	- 0,08	21.10.42 21.11.37 21.12.28 21.12.57	+ 6.32,6 + 6.32,8 + 6.30,8 + 6.29,6	+ 1,1	+ 5,6	
	21.25.37	+ 3.10,10	} - 0,07	- 0,01	- 0,08	21.26.20	+ 3.25,2 + 3.20,0	+0,6	+ 5,6	in
26 Août	19.11.54 19.16.25 19.21.29 19.24.19	+ 2.16,77 + 2.16,64 + 2.16,44 - 1.10,60	0,00	0,00	- 0,21	19.12.40 19.17.10 19.22.10 19.25. c	- 0.10,1 - 0.15,5 - 0.11,5 + 2.49,9	0,0	+ 5,2	m m m
	19.27.42	- 1.10,87 - 1.10,86	- 0,05	- 0,04	- 0,21	19.28.25	+ 2.55,5 + 2.49,2	} + 1,1	+ 5,2	1

433
Observations de la Planète Métis faites à l'équatorial en 1849.

DATE.	HEURE	DIFF. AR.	CO	RRECTIO	NS.	HEURE	DIFF. DÉCLIN	CORREC	CTIONS	ÉTOILE
DATE.	sidérale.	Métis-Étoile.	Micromètre.	Réfraction.	Parallaxe.	sidérale.	Métis-Étoile.	Réfract.	Parall.	de comp.
29 Août	10 m s 20.40.46 20.49.13 20.54.17 20.58.48 20.58.48	- 2. 5,20 - 2. 5,57 - 1.52,06 - 1.52,33 - 4.11,00	9 - 0,15 + 0,11 + 0,17	- 0,03 + 0,02 + 0,03	- 0,11 - 0,11 - 0,11	20.41.30 20.50. 0 20.55. 0 20.59.30 20.59.30	+ 7.42,4 + 7.38,7 - 5.25,0 - 5.31,8 - 8.42,3	+ 1,4 - 1,0 - 1,5	+ 5,5 + 5,5 + 5,5	n n o
8 Septembre	21.29.36 21.33.49 21.36.23 21.41. 9 21.45.23	+ 1.23,10 + 1.23,00 - 1.54,90 - 1.55,17 - 1.55,24	+ 0,04	0,00	- o,o3 - o,o3	21.30.20 21.34.30 21.37.10 21.41.50 21.46.10	+ 4.11,5 + 4.10,6 - 2.15,6 - 2.18,4 - 2.18,3	+0,7	+ 5,6	P P Q Q
14 Septembre.	21.53.56 22. 0.43 22. 6.22 22.12.35	- 3.32,07 - 3.32,23 - 3.32,10 - 3.32,47	+ 0,13	0,00	0,00	21.54.40 22. 1.30 22. 7.10 22.13.20	- 6.27,1 - 6.31,4 - 6.32,3 - 6.32,9	-1,1	+ 5,5	P P P
3 Octobre	21. 7.57 21.14.10 21.26. 2 21.30.34 21. 7.57	+ 2.22,93 + 2.22,33 + 2.22,57 + 2.22,60 - 0.42,33	+ 0,19	+ 0,01	- 0,03	21. 8.40 21.14.55 21.26.50 21.31.20 21. 8.40	$ \begin{array}{c c} -9.24,8 \\ -9.22,4 \\ -9.24,9 \\ -9.25,2 \\ -7.15,5 \end{array} $	) - x, 5	<b>+</b> 5,1	r r r r
	21.14.10 21.26. 2 21.30.34	- 0.43,10 ( - 0.42,97 ) - 0.42,67	+ 0,15	+ 0,01	- 0,03	21.14.55 21.26.50 21.31.20	- 7.12,1 - 7.15,5 - 7.15,8	- I,2	+ 5,1	3. S
g Octobre	20. 3.37 20.19.26 20.23.57 20.27.20 20. 3.37 20.19.26 20.27.20	+ 1.35,87 + 1.35,60 + 1.35,93 + 1.35,54 - 1.29,53 - 1.29,70 - 1.30,06	- 0,03 - 0,08	- 0,01	- 0,10	20. 8.30 20. 9.30 20.10.30 20.11.30 20. 8.30 20. 9.30 20.10.30 20.11.30	+ 1.42,7 + 1.42,8 + 1.44,1 + 1.42,2 + 3.50,3 + 3.50,4 + 3.51,7 + 3.49,8	+0,4	+ 4,8	r r r s s

Les étoiles de comparaison ont toutes été observées au cercle méridien dans l'année 1849, sauf l'étoile n. Voici leurs positions moyennes ramenées au 1<sup>er</sup> Janvier 1849.

		h m s	0 , "
δ	Verseau	22.46.37,80	- 16.37.20,9
а	Lalande 44615	22.40.49,62	- 17.47.29,5
Ь	Lalaude 44607	22.40.30,25	- 18. 3. 0,1
	Lalande 44551	22.39.18,71	- 18.20.44,7
d	Lalande 44241	22.30.59,02	- 18.34.52,9
e	Lalande 44528	22.38.24,02	- 19. 4.50,4
f	Lalande 44560	22.39.30,04	- 18.52.38,5
∿ g	Lalande 44152	22.28.27,75	- 19. 3. 5,2
h	g' Verseau	22.35.27,31	- 19.37. 8,8
í	Lalande 44290	22.31.52,87	- 19.58.57,2
k	Lalande 43804	22.18.58,49	- 20.12.36,6
l	Lalande 43741	22.17.32,52	- 21. 0. 8,0


	h m s	0
m Anonyme	22.14. 5,29	- 20.55.49,8
n Lalande 43662	22.15.28,51	- 21.22.34,2
o Lalande 43651	22.15.13,86	- 21. 4.27.2
p Piazzi, XXI, 419	22. 2.39,27	- 21.58.18,1
q Piazzi, XXII, 22	22. 5.57,28	- 21.49.21.5
r Lalande 42700	21.47.12,48	- 21.51. 2,8
s Piazzi, XXI, 343	21.50.17,99	- 21.54. 3,5

On a déduit des observations précédentes les lieux géocentriques apparents de Métis; à côté de chaque lieu se trouve le résultat de la comparaison avec le lieu calculé d'après l'éphéméride de M. Graham (Astronomische Nachrichten, Nº 684).

#### OCCULTATIONS D'ÉTOILES PAR LA LUNE OBSERVÉES PENDANT L'ANNÉE 1849.


Les instants sont donnés en temps sidéral de Genève; l'erreur de la pendule a été calculée d'après les observations de M. Bruderer. Les initiales B et P désignent les observations faites par M. Bruderer et celles qui sont faites par moi.

Le 1er Mai	56 Lion	Immersion au bord obscur	14.57.20,35 B
Le 27 Juin	38 Vierge	Immersion au bord obscur	17. 5.48,70 P
)) ))	· » »	n n n	48,70 B
Le 12 Juillet	89 f Poissons	Immersion au bord éclairé	19.45. 4,90 P
		)) )) )) ))	7,10 B
» »	» » ,	Emersion au bord obscur	20.37. 2,63 P
		» » » » •	3,63 B
		Immersion au bord obscur	23.46.24,07 B
Le 29 Noveml	ore 54 y Taureau	Immersion au bord obscur	0.40.20,75 B









#### CONTENUES DANS LA PREMIÈRE PARTIE

DU TREIZIÈME VOLUME.

	Pages,
Résumé des observations thermométriques et barométriques faites à l'obser-	
vatoire de Genève et au grand StBernard, pendant les dix années 1841	
à 1850, suivi de tables hypsométriques calculées d'après la formule de	
Bessel, par M. E. Plantamour, prof	- 1
Description des mollusques fossiles qui se trouvent dans les grès verts des environs de Genève, par M. Pictet, prof., et M. le Dr W. Roux.	
(Troisième livraison : Acéphales orthoconques.)	75
Note relative aux apparences microscopiques des cheveux humains et des poils d'animaux, par M. A. Morin	175
Recherches sur la conductibilité des minéraux pour l'électricité voltaïque; par M. Élie Wartmann, prof	199
Observations astronomiques faites à l'observatoire de Genève dans l'année	
1849, par M. le prof. E. Plantamour.	





DE LA

# SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE

ET

### D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

Tome XIII, 2me Partie.

GENÈVE, joel cherbuliez, libraire, au haut de la cité.

PARIS,

MÊME MAISON, 10, RUE DE LA MONNAIE.

1854



### MÉMOIRES

DE

### LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

IMPRIMERIE DE JULES-Gme FICK, RUE DES BELLES-FILLES, 40.

# MÉMOIRES

DE

# LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE

ET

#### D'HISTOIRE NATURELLE

DE GENÈVE.

Tome XIII. - Seconde Partie.

#### GENÈVE,

LIBRAIRIE DE JOEL CHERBULIEZ, AU HAUT DE LA CITÉ.

#### PARIS,

MÊME MAISON, 40, RUE DE LA MONNAIE.

1854



#### DE L'ÉTIOLOGIE

DÜ

### GOÎTRE ET DU CRÉTINISME

1, (1)

M, LE DOCTEUR GOSSE.

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 20 Mai 1852.)

Les causes du Goître et du Crétinisme sont devenues, surtout dans ces derniers temps, le sujet d'interminables discussions qui n'ont amené que peu de résultats positifs.

Les uns ont attribué exclusivement ces maladies à la boisson d'eaux chargées de substances terreuses, magnésiennes ou calcaires, et cette opinion, généralement admise par les auteurs des siècles précédents, a été spécialement étudiée en France par MM. Grange et Bouchardat. — Le premier <sup>1</sup> trouve dans la distribution géographique des terrains magnésiens et dans la quantité proportionelle de magnésie contenue dans les eaux potables, la cause déterminante unique de la présence du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez ses mémoires lus à l'Académie des Sciences et à l'Académie de Médecine de Paris. Gazette médicale de Paris, t. IV, p. 972; t. V, p. 548; t. VI, p. 275.

goître ou même du crétinisme et de leur fréquence endémique. Il rejette par conséquent l'influence des causes météorologiques, de la pauvreté, de la malpropreté, et de l'hérédité. — Le second : fait jouer au sulfate de chaux, un rôle analogue à celui de la magnésie dans la production du goître.

Parmi les savants qui ont cru pouvoir rattacher l'existence du goître et du crétinisme endémiques, à la composition géologique de certains terrains, nous mentionnerons Monseigneur Billiet, Archevêque de Chambéry, qui a modestement appuyé ce système d'une statistique des goîtreux et des crétins dans son diocèse et dans celui de la Maurienne. 2 Il semblerait en résulter que les terrains jurassiques et néocomiens sont complétement exempts de ces infirmités, tandis que leur endémicité scrait constante dans les localités où dominent les formations de grès tertiaire ou de molasse, dans celles qui se composent de terrains diluviens, de schistes argilo-calcaires friables, et surtout dans le terrain métamorphique, dont le bas est occupé par le schiste argileux, le milieu par le schiste talqueux, et le sommet par le schiste micacé, ou qui sont mêlés entreux ou à d'autres espèces de grès, d'amphibole, de calcaire, de gyps, d'anthracite, etc. Mgr. Billiet, sans se prononcer sur la cause pathogénique, cite également des faits en faveur de l'action nuisible de certaines eaux de source, contenant en dissolution des principes calcaires ou magnésiens, auxquels il est disposé à attribuer une influence directe sur la production du goître et du crétinisme.

<sup>1</sup> Voyez Gazette médicale de Paris, t. IV, p. 89, Février 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez son mémoire intitulé: Observations sur le recensement des personnes atteintes de goître de crétinisme, br. 8° Chambéry 1847.

On a aussi signalé l'absence de l'iode dans la terre, l'air, les eaux et même les aliments, comme la cause presque absolue de ces infirmités endémiques. C'est la thèse qu'avait soutenue au congrès de Lyon, en 1841, le Dr Chapeau, et que soutient encore M. Chatin 1, l'appuyant de faits nombreux observés en France et en Piémont, et que M. Grange a cherché à rattacher à la sienne dans ses notes lues à l'Institut le 20 Février et le 2 Mars 1852.

D'autre part, nous trouvons des auteurs qui tout en rejetant l'action restreinte de certaines eaux, des eaux de glaciers en particulier, de certains aliments, ou l'abus des boissons spiritueuses, font prévaloir l'influence plus générale de la conformation des lieux, des phénomènes météorologiques, des vices d'habitation, etc., etc. — En tête se placent notre savant compatriote De Saussure <sup>2</sup> et le vénérable Professeur Fodéré. Ce dernier, né en Maurienne, étudia avec soin la topographie médicale de son pays natal et publia sur le sujet qui nous occupe un mémoire fort détaillé <sup>3</sup>. — Je citerai aussi l'article du D<sup>r</sup> Rullier, inséré dans le Dictionnaire des Sciences médicales, Paris 1817. Tom. 18, page 522, qui, après avoir discuté avec érudition les diverses opinions proposées, se rattache à celle de Fodéré.

Dans ces derniers temps nous voyons la Commission créée

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez ses mémoires lus à l'Académie de Médecine, insérés dans la Gazette des Hopitaux de Paris, Nos des 10 et 24 Janvier 1852 et dans la Gazette médicale du 28 Février 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyages dans les Alpes. Vol. IV, p. 270. Neuchâtel 1803.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez son Traité du Goître et du Crétinisme. Paris, Germinal. An VIII. 1 v. 8°.

par S. M. le Roi de Sardaigne pour étudier le crétinisme <sup>1</sup>, le D<sup>r</sup> Niepce, médecin des Eaux d'Allevard, dans le département de l'Isère <sup>2</sup>, et le D<sup>r</sup> Ferrus <sup>3</sup>, arriver à des conclusions analogues, plus éclairées et plus générales, mais sans se prononcer sur le rôle que chacune des causes est appelée à jouer, ni sur leur mode d'action. Se basant sur des faits bien constatés, ils ont fait justice de certaines assertions exclusives.

En opposition à M. Grange, le Dr Niepce dit avoir constaté que presque toutes les eaux des vallées des environs de Grenoble, où il existe beaucoup de goîtreux et de crétins, ne contiennent pas de magnésie, qu'il en est de même de plusieurs sources au centre de la vallée d'Aoste, où les goîtreux et les crétins pullulent, et qu'en revanche la magnésie existe dans les eaux que boivent des populations exemptes de crétinisme et même de goître. Ainsi que la Commission Sarde il démontre que le crétinisme est à peu près répandu sur toutes les espèces de terrain, dans les terrains calcaires compactes, jurassiques, néocomiens et crayeux, tout aussi bien que dans d'autres localités où le sol est exclusivement formé de roches cristallines, et que certaines vallées, telles que celles de Gressonay, de Cogne, de Cormayeur, dans la province d'Aoste, exemptes de crétinisme, présentent un terrain identique à celui d'autres vallées qui en sont infectées au plus haut degré.

En opposition à M. Chatin, le Dr Niepce cite l'analyse des eaux de la Doire Baltée, de la fontaine de Fontainebleau, de

<sup>1</sup> Voyez son Rapport. 1 vol. 4º Turin 1848.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Gazette médicale de Paris, t. VI, p. 88. 1851.

<sup>3</sup> Voyez Gazette médicale de Paris, t. V, p. 802. 1850.

l'hôpital de Saint-Maurice, de Naviglio, etc., etc., etc., qui contiennent parfois une grande quantié de iodures et de bromures, et qui servent de boisson à des populations gravement entachées de crétinisme et de goître. — De plus, il est évident que les conclusions de M. Chatin lui-même, sont en opposition directe avec certains faits qu'il cite, puisque de l'aveu de cet auteur les sommités des Alpes, où il n'existe ni goîtreux ni crétins, sont privées d'iode d'une manière toute spéciale. — Enfin, comme l'ont fait observer les rédacteurs de la Gazette médicale de Paris du 28 Février 1852, sa théorie n'est pas appuyée sur des bases bien fixes, l'ubiquité de l'iode et ses évaluations infinitésimales doivent inspirer quelque défiance, et dans tous les cas l'iode n'exerce ses qualités antigoîtreuses, qu'à titre d'agent médicamenteux propre à détruire les conséquences morbides des causes qui favorisent directement le goître ou le crétinisme.

Pour combattre l'idée trop exclusive du D<sup>r</sup> Bouchardat il suffit de citer, entr'autres, l'exemple des populations de la Bresse, qui n'ont pour boisson que des eaux de puits, chargées de principes calcaires et qui cependant ne présentent ni goîtreux, ni crétins.

Si des causes générales endémiques nous passons aux causes prochaines de ces maladies, l'incertitude qui règne sur ce point est encore plus frappante, et même plusieurs auteurs se sont vus forcés d'avouer, qu'un voile impénétrable semblait recouvrir le principe de l'aberration qui survient alors dans la nutrition des organes affectés et par suite dans leur composition organique.

Tous, plus ou moins, admettent l'influence d'une prédisposition héréditaire et quelques-uns ont été jusqu'à considérer cette cause comme la seule directe du crétinisme, tandis que des faits positifs prouvent le développement graduel de cette maladie indépendant de toute hérédité. Le rapport du Dr Guggenbuhl sur le traitement du crétinisme, publié à Zurich en 1846 en fournit des exemples frappants, et moi-même j'en ai recueilli de semblables en 1852 à Grezy dans la vallée de l'Isère.

Fodéré attribuait la cause prochaine du goître à un relachement du tissu de la glande thyroïde et à l'affaissement supposé de conduits mucifères, qui en réalité n'existent pas. Il cherchait à éloigner toute idée d'affinité entre le goître et les scrofules, tout en établissant des rapports intimes entre le goître et le crétinisme, tandis que les Docteurs Guggenbuhl et Ferrus ne voient dans le crétinisme que le résultat d'une diathèse scrofuleuse ou d'une cachexie lymphatique qui affaiblit les fonctions des organes sans les anéantir complétement, et qui en particulier comprime la masse cérébrale, d'une manière modérée, mais permanente.

L'isolement du goître et du crétinisme dans un grand nombre de cas et leur coincidence non moins fréquente dans d'autres, sont venus compliquer la question et, tantôt on a cru devoir séparer l'origine des deux maladies, tantôt on n'a vu dans la seconde que l'effet de l'exagération des causes qui avaient favorisé le développement de la première.

Dans cet état de choses, j'avais pensé depuis longtemps que le seul moyen d'éclaireir les doutes consistait, pour le goître, à examiner la structure anatomique de la thyroïde, ainsi que le mécanisme de la formation morbide qui constitue cette maladie, puis de procéder de la même manière pour les organes malades dans le crétinisme, afin de pouvoir comparer les résultats obtenus et d'en tirer des résultats moins vagues sur la nature de ces maladies, sur leurs connexions et sur leurs causes.

Déjà en 1826 j'avais publié une théorie sur la cause du goître en rapport avec ces données dans mon ouvrage sur les Maladies rhumatoïdes, et en 1841 je lus au Congrès scientifique de Lyon une note sur le goître, rédigée dans l'emême sens; mais comme on ne paraît pas m'avoir compris, ou que du moins personne depuis cette époque n'a étudié ce côté de la question, j'ai pensé qu'il y aurait avantage à reproduire les arguments dont je m'étais servi alors et que sont venus confirmer tous les travaux anatomiques, toutes les recherches physiologiques entreprises depuis. C'est ce qui fait le sujet de la première partie de ce mémoire.

I.

#### Causes du Goître.

La thyroïde, siége de l'infirmité connue sous le nom de goître, est un organe parenchymateux placé sur le col, au devant des cartilages thyroïde et crycoïde, des premiers anneaux de la trachée artère et recouvert en partie par les muscles peauciers, sterno-cleido-mastoïdien, sterno-hyoïdien

et sterno-thyroïdien. Il se retrouve chez tous les individus dans l'état de santé, plus développé chez l'enfant et la femme que chez l'adulte et chez l'homme. Ses fonctions sont restées toujours assez obscures. Les anciens physiologistes, à partir de Morgagni, supposaient qu'il était destiné à fournir un mucus lubréfiant au larynx et à la trachée artère. Ils pensaient aussi que, par le moyen de canaux très-subtils, l'air dans l'expiration pénétrait de la trachée artère dans le tissu de la glande. Sa structure générale, éminemment vasculaire, l'assimilait en effet aux glandes conglomérées, mais comme on donnait, pour caractère à ces glandes, l'existence de canaux excrétoires, et que l'on n'en avait découvert aucun dans la thyroïde, on avait fini par le classer à part sous le nom de Corps thyroïde.

Telle était l'opinion la plus généralement admise au commencement de ce siècle, lorsque des recherches ultérieures ont prouvé que les fonctions de la thyroïde étaient plus compliquées qu'on ne l'avait d'abord supposé. Je lui avais assigné la fonction subsidiaire de déversoir du sang porté à la tête; les travaux récents d'anatomie microscopique de M. Berres en Allemagne et de M. Arthur Hill-Hassals en Angleterre, ont remis en évidence sa qualité d'organe glandulaire.

On sait que la thyroïde se compose de deux grands lobes, un de chaque côté de la trachée artère, réunis par une bande ou isthme transversal; ces lobes se divisent et se subdivisent en lobules au nombre de plusieurs centaines de chaque côté.

Suivant M. Berres ', chaque lobule de la thyroïde se com-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mikroskopische Untersuchungen, p. 411.

pose de corpuscules qui présentent l'image des dispositions vasculaires d'un follicule. Ces corpuscules sont serrés les uns contre les autres; ils paraissent arrondis, oblongs, aplatis ou pleins et distendus. Leur cavité tapissée d'une membrane mince a un diamètre extrêmement petit (0,002 de pouce). Des follicules clos de ce genre sont groupés autour d'un vaisseau de calibre assez considérable.

Suivant M. Hill-Hassals 1, ces lobules qu'on avait décrit comme des cavités membraneuses de la thyroïde, se subdivisent eux-mêmes en plusieurs petites cavités vésiculaires comprimées et anguleuses. La cavité de chaque vésicule est entièrement close et ne communique point avec les vésicules voisines; mais le tissu fibreux qui forme évidemment leur parois, passe dans quelques endroits de l'une à l'autre. C'est à cette communication fibreuse qu'est due l'impossibilité d'isoler complétement une des vésicules, et c'est pour cela que quand on veut séparer les vésicules les uns des autres, et qu'on les déchire, à l'aide d'une aiguille, elles paraissent entièrement se réduire en un tissu fibreux. - Le contenu des vésicules consiste en un liquide albumineux qui renferme une assez grande quantité d'huile et dans lequel nage un grand nombre de noyaux granulaires de forme arrondie ou ovale et quelques cellules parfaites qui sont trois fois plus grosses que les granulations et renferment de gros grains en apparence huileux. Entre ces deux points extrêmes, on trouve

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mikroskopische Anatomie des menschlichen Kærpers, aus dem Englischen übersetzt von Otto Kohlschutter. Leipzig 1851. 1<sup>r</sup> vol., p. 568.

aussi des cellules de moyenne grandeur, les plus grosses sont évidemment des cellules mères. — Ainsi ces vésicules se distinguent des globules graisseux par leur plus gros volume, par la texture fibreuse de leurs parois et par la nature de leur contenu. Quand on comprime un morceau de thyroïde fraîchement coupé, on éprouve une sensation de viscosité savonneuse particulière qui provient évidemment du liquide qui y est contenu. Fromherz et Gugert 1 ont trouvé dans une thyroïde saine, de la graisse, des matières extractives, de la fibrine, de la matière caséeuse, beaucoup d'albumine, les sels ordinaires, et du mucus (globules en suspension).

Outre ces éléments du tissu propre, qui se retrouvent dans chaque vésicule close et qui font de cet organe une agglomération de plusieurs millions de vésicules et glandules, la thyroïde renferme un nombre très-considérable d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs, dont la disposition mérite d'être étudiée. Les artères thyroïdes se distinguent en supérieures et en inférieures. — Les supérieures au nombre d'une de chaque côté naissent de la carotide externe un peu au-dessus de son origine, quelquefois même à son niveau. Chacune d'elles se porte en devant et en avant sur le côté du larynx et se recourbe pour se diriger perpendiculairement en bas vers le sommet du lobe correspondant de la thyroïde, puis décrivant des flexuosités considérables, se divise en deux branches, dont l'une suit le bord externe du lobe et s'anastomose avec les rameaux de l'artère thyroï-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schweizer Journal, t. L, p. 190.

dienne inférieure; une seconde dirigée en dedans s'anastomose avec les ramuscules de l'artère thyroïdienne supérieure du côté opposé et la troisième s'enfonce entre la thyroïde et et les parois du larynx. Ces artères fournissent en outre des rameaux laryngés et cricothyroïdiens. Toutes les artérioles qui en proviennent plongent dans le corps de la thyroïde, se subdivisent dans le parenchyme et forment un réseau qui, partant de l'intérieur des ramuscules, recouvre complétement les vésicules glandulaires de vaisseaux sanguins, comme cela a lieu pour les globules graisseux. - Les artères thyroïdiennes inférieures, également doubles, une de chaque côté, sont plus volumineuses dans les enfants que chez les adultes. Elles naissent chacune de la partie supérieure de la sousclavière, presque au même niveau que la mammaire interne et un peu en dehors de la vertébrale, montent d'abord verticalement et parvenues au devant de la cinquième vertèbre, elles se recourbent tout à coup en dedans, passent transversalement derrière l'artère carotide primitive et arrivent en serpentant à la thyroïde. Dans ce trajet elles fournissent plusieurs branches, en particulier à la trachée artère et à l'œsophage; mais le rameau cervical ascendant, le seul qui soit propre à la thyroïde, s'anastomose avec les artères vertébrales, cervicales postérieures et l'occipitale, puis arrivé auprès de la thyroïde, il se partage en deux branches qui s'écartent et pénètrent l'organe par sa face postérieure et s'anastomosent soit avec l'artère thyroïdienne inférieure opposée, soit avec les deux thyroïdiennes supérieures.

Les veines thyroïdiennes se distinguent également en su-

périeures et inférieures. — Les veines thyroïdiennes supérieures, une de chaque côté, naissent de la jugulaire interne, tantôt isolément, tantôt par un tronc commun avec la linguale et la faciale. Après avoir fourni des rameaux laryngés, elles passent derrière les muscles sterno-thyroïdiens ou entre ces muscles et les sterno-hyoïdiens, suivent le bord supérieur de la thyroïde et se recourbent pour s'anastomoser entr'elles par arcades. Leurs rameaux communs se perdent dans la thyroïde et communiquent avec les veines thyroïdiennes inférieures, d'autres se répandent sur la partie correspondante du larynx et de la trachée artère. — La veine thyroïdienne inférieure gauche se déverse dans la partie postérieure et inférieure de la veine sousclavière, couverte par cette veine, elle remonte au milieu de la graisse au devant de l'artère carotide primitive et du nerf vague. Parvenue à la partie inférieure de la thyroïde, elle se recourbe en dedans, devient transversale et s'anastomose avec la veine thyroïdienne inférieure droite. Cette anastomose forme au devant de la trachée artère une arcade qui fournit de nombreux rameaux, lesquels en s'anastomosant ensemble, se répandent sur la thyroïde et sur les muscles qui la recouvrent et constituent ce qu'on appelle le plexus veineux thyroïdien. — La veine thyroïdienne inférieure droite, se déverse tantôt dans la veine cave supérieure, tantôt dans la veine sousclavière droite; dirigée en haut et en dedans, elle passe derrière les muscles sternohyoïdien, et sterno-thyroïdien en devant de l'artère innominée et du nerf vague et gagne le bas de la thyroïde, se recourbe à gauche et s'anastomose avec la veine thyroïdienne inférieure opposée.

En résumé, nous observons dans la thyroïde un systême de vaisseaux artériels remarquables par leur grand nombre, leur extrême division, leurs flexuosités multipliées et leurs anastomoses fréquentes entr'eux sur presque tous les points, et de plus un systême de vaisseaux veineux également trèsdivisés dont les anastomoses sont tellement fréquentes qu'elles forment un réseau ou plexus très-apparent. — On remarque aussi des connexions nombreuses des vaisseaux sanguins artériels et veineux de la thyroïde avec ceux des organes voisins, du cerveau, du larynx, de la trachée artère, de l'œsophage, de la langue, etc., etc.

Les nerfs thyroïdiens proviennent des nerfs pneumo-gastriques et des ganglions cervicaux.

Les vaisseaux lymphatiques sont très-nombreux, très-déliés. Partant des vésicules ils vont se perdre dans les ganglions jugulaires, dont les superficiels sont irrégulièrement disposés au-dessous du muscle peaucier sur le trajet de la veine jugulaire interne, l'artère carotide primitive et se prolongent en arrière entre le pharynx et la colonne vertébrale.

Il résulte de cette inspection anatomique que la thyroïde est une agglomération de véritables glandules, fournissant une sécrétion spéciale, quoique dépourvues d'un conduit excréteur apparent. Elle paraît jouer un rôle dans les opérations chimico-vitales de la nutrition et de l'hématose, quoiqu'elle n'influe pas d'une manière immédiate sur la vie animale, non plus que sur le larynx et la trachée artère, organes avec lesquels on n'a point découvert de communication directe; et ce qui le prouve, c'est qu'on peut l'extirper, qu'elle peut dégé-

nérer, sans que les sensations et les mouvements en éprouvent la moindre atteinte dans la plupart des cas.

L'origine des ners de cette glande, liée à celle du ners pneumo-gastrique, nous sait pressentir une connexion nerveuse intime entre les poumons, l'estomac et cet organe.

On conçoit aussi que les fonctions de ces vaisseaux lymphatiques absorbants soient facilement troublées : lorsqu'on considère, d'un côté, leur grand nombre, leur division extrême daus les membranes vésiculaires, et de l'autre, leurs rapports avec les ganglions lymphatiques du col qui, rapprochés soit de la peau soit du pharynx, doivent être facilement influencés par les variations de température.

D'autre part, il est évident que le nombre considérable de ses vaisseaux sanguins n'est pas en rapport avec des fonctions sécrétoires aussi bornées en apparence, et il paraît en résulter que ces vaisseaux ont une destination accessoire qui en est indépendante.

Or quoique ce système vasculaire n'appartienne pas à ce qu'on a nommé le tissu sanguin érectile, il n'en est pas moins vrai que, sa conformation remarquablement flexueuse et la facile dilatabilité de ses parois vasculaires, le disposent à recevoir temporairement une surabondance considérable de sang et cela sans qu'il s'opère de ruptures membraneuses.

En même temps les rapports de position qui existent entre plusieurs de ses vaisseaux et les muscles du col, doivent avoir fréquemment pour conséquence la gêne temporaire de leurs fonctions circulatoires.

Enfin les anastomoses nombreuses de ses ramuscules ar-

tériels et veineux déterminent nécessairement une stagnation dans les liquides circulants; aussi voit-on la congestion ne pas se dissiper promptement comme dans un tissu sanguin érectile, et le liquide sécreté dans les vésicules, s'y accumuler facilement et les distendre.

Et ce qui vient à l'appui de la disposition normale de cette glande à se prêter aux congestions accidentelles, c'est l'existence d'un tissu cellulaire très-abondant, très-lâche, très-onctueux, qui accompagne les vaisseaux jusque dans leurs derniers ramuscules et assez perméable pour qu'il puisse être insufflé facilement et devenir le siége d'un emphysème, ce qui avait fait supposer à tort à quelques médecins (voy. Fodéré Op. cit. p. 58) qu'il existe une communication directe de la thyroïde à la trachée artère.

Sous plusieurs rapports et jusque dans l'examen microscopique des lobules et des vésicules, cet organe présente beaucoup d'analogie avec la rate et je crois que c'est avec raison que Henlé <sup>1</sup> a placé ces glandes dans une classe à part sous le nom de Glandes vasculaires sanguines.

Ainsi donc, la glande thyroïde, indépendamment de ses fonctions sécrétoires dont nous ne connaissons pas bien la destination, me paraît jusqu'à un certain point servir de déversoir au trop plein du sang artériel et veineux, lorsqu'une congestion trop brusque ou trop abondante vers l'intérieur du crane pourrait troubler gravement les fonctions du centre

<sup>1</sup> Traité d'Anatomie générale ou histoire des tissus et de la composition du corps humain, traduit de l'Allemand par A. J. L. Jourdan. Paris 1845. T. II, p. 578.

nerveux céphalique, de même que la rate sert en partie de déversoir au sang du bas ventre dans certains cas de congestions fébriles.

Ce but est évident lorsqu'on étudie ce qui se passe chez l'homme sain dans diverses circonstances de sa vie.

Toutes les fois, en effet, que le sang est porté à la tête avec plus d'abondance que dans l'état ordinaire et que son retour au cœur est gêné, nous voyons le volume de la glande thyroïde temporairement augmenté d'une manière physiologique. — Toutes les passions violentes, l'amour physique, la colère, etc., etc., en accélérant la circulation et poussant fortement le sang à la tête, toutes les passions tristes, en gênant les fonctions du cœur, produisent, plus ou moins, cet effet; aussi le vulgaire le considère-t-il alors comme le résultat d'une influence nerveuse et dit-il que les nerfs du col sont gonflés. — Divers causes mécaniques agissent de la même manière; tels sont entre autres, les chants forts et soutenus, surtout ceux qui exigent une suspension prolongée de l'expiration, et qui par conséquent favorisent une gêne de la circulation pulmonaire; tel est aussi le port sur la tête d'objets pesants, qui exige un effort des muscles du corps ou la contraction prolongée des muscles intercostaux; le renversement violent de la tête en arrière; etc., etc., etc.

Les vents chauds du printemps, les chambres très-chaudes dont l'air n'est pas renouvelé, etc., etc., en faisant porter le sang à la tête, ont un effet temporaire analogue.

La différence de position du corps, entre le coucher et le lever, paraît même exercer une influence appréciable sur le volume de la thyroïde. — Il est facile de s'en assurer lorsqu'on oublie d'ôter le soir une cravate un peu serrée. — Fodéré (Op. cit. p. 63) dit avoir vu plusieurs femmes chez lesquelles le boursoufflement du col avait lieu tout à coup du soir au matin et chez lesquelles il se dissipait avec la même promptitude. — Des femmes atteintes de goître, se sont même plaintes à moi de l'augmentation du volume de la tumeur pendant la nuit et de la suffocation temporaire qui en était la suite.

Cette fonction physiologique explique assez naturellement la raison pour laquelle les enfants ont un développement habituel plus considérable de la glande thyroïde, indépendamment du plus grand relachement des tissus, et du volume plus considérable à cet âge des artères thyroïdiennes inférieures : c'est en effet aux époques de la vie qui se rapprochent de la naissance et de la dentition que la circulation cérébrale est la plus active. Elle donne aussi la clef des gonflements du col, si fréquents chez les jeunes filles, à l'époque de la puberté, et chez un grand nombre de femmes, à l'époque de la menstruation.

Mais si les phénomènes physiologiques nous fournissent quelques données satisfaisantes, la pathologie vient ajouter des raisons bien autrement concluantes en faveur de l'explication que je propose.

Dans le début, l'état maladif de la glande thyroïde connu sous le nom de Goître, Bronchocèle, Trachéocèle, Struma, et qu'Hippocrate désignait par celui de Gongrona, ne présente à la dissection d'autres changements, qu'une dilatation plus ou moins considérable et plus ou moins permanente des vaisseaux artériels et veineux, une injection d'un rouge brunâtre plus apparente, et un développement abnorme d'un certain nombre de vésicules glandulaires, aux dépens de la plupart des autres qui semblent s'oblitérer. Ce dernier symptôme est le résultat de l'accumulation du liquide sécrété dans les vésicules; n'étant plus absorbé, il les dilate, modifie leur forme d'anguleuse en arrondie, mais il ne change pas de nature. — Le parenchyme continue d'être mol et élastique, sans devenir œdémateux : une sorte de congestion sanguine simple, mais continue, caractérise cet état.

Plus tard les veines thyroïdiennes, dilatées outre mesure, deviennent souvent variqueuses et les capillaires de la thyroïde gorgés de sang laissent échapper ce fluide en abondance par la section de son tissu, qui paraît plus dense, quoique encore élastique. Le systême artériel, en s'associant à cette transformation passive, vient y ajouter de nouveaux éléments; la vitalité et l'activité sécrétoire des capillaires artériels paraissent augmentées à certaines époques et dépasser la mesure des fonctions absorbantes. Il s'établit alors un travail végétatif dont les effets persistent, les vaisseaux limphatiques et les nerfs eux-mêmes finissent par acquérir un volume plus considérable que celui qui leur est ordinaire. Cette variété de la maladie porte le nom de Goître hypertrophié, de Bronchocèle sarcome.

A la suite de nouveaux accidents congestifs, les tuniques vasculaires s'épaississent ou perdent leur élasticité et il peut survenir des hémorrhagies partielles, par suite de leur rupture, ou des kystes remplis d'une lymphe albumineuse. Et si, des réactions inflammatoires aiguës ou chroniques s'établissent accidentellement dans le tissu engorgé, on voit se former des abcès, se développer des tissus lardacés, fibreux, fibrocartilagineux, osseux ou même pierreux sous forme de noyaux irréguliers intérieurs ou de plaques extérieures sous l'enveloppe générale des lobes.

Les liaisons anatomiques, que nous avons vu exister entre la glande thyroïde et les organes voisins, suffisent pour expliquer les altérations fonctionnelles et même matérielles de ces organes, qu'on a vu s'établir à la suite du goître et qui ont été signalées par divers auteurs; telles que l'augmentation de sécrétion muqueuse dans l'arrière bouche, le changement dans le timbre de la voix, l'étranglement de la trachée artère, et la dyspnée consécutive, ou la compression des gros vaisseaux du crane, les vertiges, la tendance apoplectique, etc., etc. Il en est de même de l'aggravation du goître sous l'influence de digestions troublées par suite d'une réaction sympathique de l'estomac.

Or le mécanisme des altérations de la glande thyroïde qui caractérisent le goitre, est semblable à celui qui déterminait la tuméfaction temporaire de cette glande dans l'état de santé; seulement, dans le premier cas, les accidents congestifs sont plus violents, plus prolongés, souvent renouvelés et sont précédés ou s'accompagnent ordinairement d'une prédisposition héréditaire ou acquise sous l'influence d'agents extérieurs spéciaux : en outre il s'y joint constamment une lésion persistante des fonctions sécrétoires des vésicules. Ainsi

toutes les causes physiques ou morales qui déterminent des congestions sanguines actives ou passives vers la tête, ou qui troublent les fonctions glandulaires de la thyroïde, pourront amener la formation du goître, mais pour cela il faudra qu'elles soient plus ou moins brusques et violentes, ou prolongées, ou souvent renouvelées et qu'elles s'exercent sur des sujets dont l'âge ou le sexe favorisent un relâchement lymphatique, ou bien sur ceux qui apportent en naissant un tempérament de cette nature, ou bien enfin, sur des populations chez lesquelles ce tempérament est plus ou moins développé par leur séjour habituel dans de certaines localités et sous certaines conditions de climat, d'habitation, de nourriture, de boisson ou de mœurs.

Faisant une application de ces principes aux faits observés, on remarque que le Goître sporadique attaque plus souvent les femmes et les enfants que les hommes et les adultes, les individus faibles que les forts, les tempéraments naturellement lymphatiques que les tempéraments sanguins ou bilieux. Il est fréquemment déterminé par les mouvements qui comportent de grands efforts, les cris violents, certains chants fatiguants et prolongés, le travail pénible de l'accouchement, le transport habituel de fardeaux très-pesants sur la tête ou sur le col, et le renversement forcé en arrière de la tête sur le col. On le voit même se développer, dans la grossesse chez les femmes hystériques, ou chez les enfants en nourrice. Des habitudes colériques, des passions brutales violentes, des chagrins concentrés et durables amènent souvent un résultat semblable.

Toutes ces causes déterminantes acquièrent une influence bien autrement puissante lorsqu'il s'agit du Goître endémique, et d'autres, quoique moins évidentes, mais non moins actives, viennent s'y ajouter.

Les causes prédisposantes y jouent surtout un rôle assez important pour qu'il convienne de les rappeler avant d'aller plus loin, d'autant plus, qu'elles agissent souvent combinées entre elles et que quelques-unes même font l'office de causes déterminantes.

Je n'insisterai pas sur les causes prédisposantes individuelles, d'âge, de sexe, de tempérament et même d'hérédité, qui ne donnent lieu à aucune controverse et dont j'ai déjà indiqué le mécanisme physiologique. Toutefois je ne puis passer sous silence un fait tiré du rapport de la Commission Sarde et qui vient confirmer ma théorie sur le mode d'influence des âges. Une des colonnes du Tableau Nº 2 relate l'âge auquel a commencé le goître chez les crétins goîtreux des provinces de Savoie, d'Aoste, de Turin, de Coni, d'Alexandrie, de Novare et de Nice. Le nombre total des inscrits est de 3912. Sur ce nombre 2333 en ont été attaqués depuis la naissance jusqu'à 2 ans, 189 seulement de 2 à 5 ans, 449 de 5 à 12 ans, 157 de 12 à 20 ans, et 63 de 20 ans et au-dessus; 711 n'ont pas été spécifiés. Retranchant des 3912 les 711, il en reste 3201. La proportion serait donc de 75 pour 100 de 0 à 2 ans,

de 14 » 100 de 5 à 12 »

de 6 » 100 de 2 à 3

de 5½ » 100 de 12 à 20

de 2 » 100 de 20 ans et au-dessus.

Ainsi l'on voit que les âges où le goître a commencé le plus fréquemment à se manifester sont précisément ceux qui correspondent à la première et à la seconde dentition, époques de la vie où, comme je l'ai déjà fait observer, les congestions actives du sang à la tête sont le plus marquées, surtout chez les individus lymphatiques et faibles. 1

Ce document nous fournit en outre la preuve de l'influence considérable qu'exerce la prédisposition héréditaire sur la production du goître dans la première enfance. Dans ce cas, l'organe, siége du goître, étant lui-même prédisposé matériellement dès la naissance, on conçoit que les congestions sanguines ne jouent qu'un rôle secondaire, et cependant, même à cet âge peu avancé, l'influence des agents extérieurs se fait aussi apercevoir; c'est ce qui explique la proportion énorme des goîtreux en bas âge dans le cercle des endémies, et fait sentir la nécessité de combattre dès les premiers temps de la vie l'influence des causes endémiques.

Quant aux causes prédisposantes endémiques, la première et la plus influente d'entre elles sous le rapport de la tendance lymphatique, est *l'humidité* soit du terrain, soit de l'atmosphère. Tous les pays du globe où règne le goître endémique sont plus ou moins humides. C'est une loi qui ne souffre pas d'exceptions.

¹ A cette occasion plusieurs médecins du Valais m'ont dit avoir également observé que, chez les femmes de 40 à 50 ans, vers l'époque de la cessation des menstrues, le goître tendait souvent à se manifester ou à prendre de l'accroissement. Or personne n'ignore qu'alors les congestions à la tête sont trèsfréquentes.

La qualité physique du terrain superficiel, plus encore que la composition géologique ou chimique du sous-sol, dont elle est souvent indépendante, influe d'une manière spéciale sur cette condition. Plus le terrain est perméable et poreux, moins il permet à l'humidité de séjourner au niveau du sol; plus en revanche il est compact et dense, plus il empêche l'eau de s'écouler vers le bas. Aussi voit-on le goître endémique disparaître dans les terrains rocailleux et calcaires, facilement perméables et peu hygrométriques; c'est, par exemple le cas de la vallée des Bauges, quoiqu'il se manifeste dans d'autres terrains également calcaires mais plus compacts et où se trouvent des dépôts argileux non perméables. Mais il se développe le plus fréquemment dans les terrains schisteux et tufeux, dans les formations de molasse, sur les terrains d'alluvion, où se trouvent presque constamment des couches d'une terre argileuse compacte formée par les détritus de roches ardésiennes qui, non-seulement conserve longtemps l'humidité, mais qui nétant pas perméable, maintient l'eau à la surface du sol et alimente de nombreuses sources. C'est aussi dans ces localités que le tempérament lymphatique acquiert le plus de développement et prédispose à des maladies scrofuleuses ou au relachement des tissus. Plus la couche argileuse est près de la surface du sol, plus ses effets sont évidents, quelle que soit la hauteur du terrain où elle est placée. Ainsi p. ex. la ville de Carouge, batie en plaine, auprès de Genève, presque à niveau de l'Arve, sur une couche épaisse de gravier facilement perméable, est beaucoup moins humide et plus saine que le sommet des coteaux voisins de Pinchat et de Champel, quoique mieux aérés, mais où la terre glaise affleure la surface du sol. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, surtout dans les terrains d'alluvion, où les couches alternatives de glaise, de sable ou de cailloux sont très-irrégulières, c'est que les effets produits sont variables même à une très-petite distance, et qu'à quelques toises d'un terrain glaiseux très-humide, on rencontre souvent, à une assez grande profondeur, un sol graveleux et et très-sec.

La disposition du terrain modifie les effets de l'humidité, en permettant à l'eau de s'écouler facilement ou en l'accumulant sur certains points. Ainsi, les terrains en pente restant en général moins humides que les bas fonds, ou que certaines plaines et que certains plateaux, on remarque une immense différence entre l'état sanitaire des sommets escarpés ou des croupes de montagne, et du fond des vallées, malgré leur degré d'élévation au-dessus de la mer. C'est en particulier ce qu'on observe pour l'endémicité du goître dans quelques parties de nos Alpes. Toutefois, les habitations en partie enfoncées dans un terrain argileux, même en pente, ou sur la déclivité d'un banc de molasse, sont d'autant moins à l'abri de l'humidité passagère, qu'elles arrêtent sur place l'écoulement des eaux, qu'elles ne sont pas planchéiées et que le rez de chaussée est seul habité. Elles prédisposent par conséquent d'autant plus au goître qu'elles ne sont pas isolées du terrain. Fodéré en a cité des exemples dans la Maurienne et le fait se reproduit ailleurs de la même manière.

D'autrefois les habitations, construites au fond des ravins,

ou près du débouché des torrents dans les vallées, quelque perméable que soit la qualité du terrain, ne sont pas à l'abri de l'humidité du sol, parce que l'emplacement qu'elles occupent est constamment humecté par les eaux supérieures. Le village de Thuet, près de Bonneville, quoique bâti sur un terrain légèrement en pente, formé de débris calcaires trèsperméables, déposés par le torrent de Bronze, est très-humide et très-goîtreux, parce que le débouché de ce torrent, ainsi que d'autres ruisseaux qui sourdent du Mont Brezon, sont à un niveau plus élevé que les maisons du village.

L'humidité de l'atmosphère, conséquence soit de l'humidité du terrain, soit du défaut d'évaporation et du renouvellement de l'air, ajoute puissamment à la prédisposition débilitante qui entraîne souvent une véritable diathèse lymphatique. Aussi voit-on les localités qui présentent cette condition être particulièrement atteintes du goître endémique. Ce fait déjà signalé par De Saussure et sur lequel Fodéré avait attiré spécialement l'attention des gens de l'art, a été confirmé dès lors par l'expérience de toutes les localités, de manière à ne laisser aucun doute. L'encaissement profond des vallées; leur direction particulière qui empêche l'arrivée des vents secs ou favorise celle des vents humides; la hauteur des montagnes qui s'oppose à l'action évaporante du soleil; les rideaux épais d'arbres qui recouvrent les terrains et même les habitations; les haies et les treilles qui les cernent; les ruisseaux qui serpentent à la surface des prairies, toutes ces causes accessoires et d'autres entièrement locales qui agissent dans le même sens, entretiennent cet excès d'humidité atmosphérique, si nuisible à la santé, surtout auprès des hautes chaînes de montagnes, des Alpes, des Pyrénées, de l'Hymalaia, des Cordilières, etc. etc.

La chute de pluies plus ou moins abondantes en été, dans certains pays, sur certains revers de montagne, dans certaines localités bornées, augmente d'une manière notable l'humidité atmosphérique. C'est ce qui a lieu en particulier dans la chaîne de montagnes qui longe au sud la vallée de l'Arve, de Cluses à la Roche, et c'est à ses pieds que l'on trouve le plus de goîtreux.

Enfin l'humidité atmosphérique manifeste même souvent ses effets, dans l'intérieur des habitations, par des vices de construction, par des infiltrations d'égouts, par la tendance hygrométrique des matériaux qui composent les fondations, etc., etc. J'ai eu connaissance de goîtres qui ne pouvaient être attribués, en grande partie, qu'à cette cause prédisposante. Le cas cité par le Dr Stecker, de Berlin, à la section de médecine du congrès de Lyon, en 1841, rentre également dans cette catégorie. Il s'agissait d'une garnison prussienne, casernée sur un roc fort élevé, en Silésie, qui fut attaquée tout entière de goître, et n'en fut délivrée que par un changement d'habitation.

Parmi les causes secondaires qui prédisposent jusqu'à un certain point au goître, nous devons mentionner l'absence d'insolation dans certaines localités pendant une partie de l'année, causée en hiver par le voisinage immédiat, au sud, de très hautes montagnes, en été, par l'ombre épaisse qu'entretiennent

les arbres environnants et dans toute saison, par l'étroitesse et le petit nombre de fenêtres exposées au midi. L'étiolement général qui en résulte s'y fait sentir d'une manière puissante.

Le défaut de libre renouvellement de l'air peut produire des effets analogues, en communiquant à l'atmosphère respirable des qualités nuisibles qui tendent à affaiblir l'énergie vitale ou à faire prédominer la pléthore veineuse et lymphatique.

A cette question se rattache surtout l'influence modificatrice de l'électricité atmosphérique.

On ne saurait nier aussi que la mauvaise qualité de certains aliments, de certaines boissons, qui troublent lentement les digestions, ne viennent aggraver, dans certains cas, la prédisposition maladive au goître. L'expérience a prouvé que l'usage habituel de végétaux plus ou moins étiolés; de fruits acides; de mauvais cidre; de fécules qui ne contiennent pas de gluten et qui s'aigrissent facilement, telles que celles d'avoine, de châtaigne, de maïs, surtout lorsqu'on en prépare des pains mal cuits et non levés; l'absence de condiments aromatiques ou salés, etc., etc., etc., produisent sous certaines conditions générales des accidents gastriques et, par suite, des congestions cérébrales, l'hypochondrie et la cachexie lymphatique.

De même on ne saurait méconnaître que les habitudes de malpropreté et l'absence d'activité morale ou physique, deviennent parfois un élément de débilitation qui prédispose à la maladie qui nous occupe.

Ces diverses causes prédisposantes secondaires, se rattachant plus spécialement à l'étiologie du crétinisme, feront le sujet de mes investigations ultérieures. A l'appui de l'influence qu'exercent quelques-unes d'entre elles sur la production du goître, je me bornerai donc, pour le moment, à renvoyer aux observations du professeur Fordoré, consignées dans son traité, 1<sup>re</sup> section, chapitre 9 et 3<sup>me</sup> section, chapitre 2; et à transcrire le fait suivant que mentionne la Commission sarde dans son rapport, page 198:

» La vallée de Challant et celle de Gressonney commen-» cent toutes deux au pied du Mont-Rose et courent du nord » au midi; elles viennent déboucher parallèlement dans la » vallée principale d'Aoste, en finissant, l'une près de Verres, » l'autre près de Donnaz chefs-lieux de leur mandement res-» pectif. Toutes deux sont sillonnées par un torrent considérable dont les habitants des deux vallées boivent les eaux, » lesquelles prennent leur source commune dans les glaciers » et sont composées des mêmes éléments chimiques; la pro-» fondeur de ces vallées est à peu près la même; elles ont, » presque toujours, dans la partie plate une largeur d'un demi mille. La nature du sol dans ces deux vallées est la même; » elles sont, en outre, séparées par une montagne commune » dite la Ranzola. Les vents y soufflent également d'une manière périodique et avec la même force, tantôt dans la direction du nord, tantôt dans celle du sud. On y remarque » la même végétation, la même richesse de bétail, la même » durée de soleil, d'hiver, de froid, en un mot, toutes les circonstances inamovibles sont aussi identiques qu'elles peuvent l'être dans ces deux vallées. Or, le crétinisme et le goître sont très-communs dans la vallée de Challant et on en » retrouve des traces jusqu'à Ajaz, l'un des villages les plus

» élevés de cette vallée, tandis que dans la vallée de Gresson-» ney le goître et le crétinisme restent tout-à-fait inconnus. La » cause de cette différence est toute entière en ce que la po-» pulation de cette dernière vallée, quoiqu'ancienne colonie » du Valais, est très-industrielle, qu'elle habite des villages » spacieux, convenablement exposés, très-propres et nulle-» ment entourés d'arbres; leurs maisons à deux étages sont » fort commodes, bien distribuées et d'une propreté surpre-» nante, ont toutes une certaine élégance, de vastes fenêtres, » de larges portes; le petit nombre d'étables habitées pendant » l'hiver, même celles de gens moins aisés, comprennent deux » sections, l'une destinée au bétail, l'autre réservée à la fa-» mille; cette dernière section, généralement parquetée en » bois, est toujours bien éclairée et bien aérée. Il n'y a pas de » mendiants dans ce pays et les plus pauvres trouvent du » travail en toute saison; ils s'aident entre eux et se secourent » mutuellement. En sorte que cette vallée, si isolée, semble » peuplée par une seule famille. On y a le plus grand soin » des enfants, il est rare d'en trouver qui ne sachent pas lire. » Leur manière de s'habiller est propre et simple, les habits » sans être trop pesants les défendent très-bien des intem-» péries; ils changent souvent de linge; sans être intempé-» rants ils ne s'imposent pas de privations en fait d'aliments, » en un mot c'est un pays modèle pour l'étroite observance » des règles de l'hygiène.

» Au contraire les habitants de l'autre vallée (de Challant)
» vaquent en été aux seuls travaux de l'agriculture et ne soi» gnent en hiver que le bétail; leurs habitations et leurs vil-

» lages sont aussi malpropres que mal bâtis. Ils restent en» fouis six ou sept mois de l'année dans leurs étables, où ils
» passent la majeure partie du temps à dormir. Les femmes
» conçoivent le plus souvent sous l'influence de ces circon» stances pernicieuses; aussi la progéniture qui en résulte
» est en rapport avec la vigueur et la santé des parents. Il y a
» dans ce pays absence totale d'éducation; les lois de l'hy-

» giène sont tout à fait tombées en désuétude, si jamais elles

» y ont été florissantes »

Tel est le fait cité par la Commission sarde, elle n'en a pas, ce me semble, tiré tout le parti qu'on pouvait en espérer, mais si toutes les conditions en sont énoncées avec fidélité, je dirai volontiers avec elle : » Qu'il ne faut pas s'émerveiller de » ce qu'il y ait tant de diversité entre les habitants des deux » vallées. »

Examinons maintenant comment se comportent les causes déterminantes du goître, sous l'influence des causes prédisposantes endémiques que je viens d'exposer.

Ces causes, comme je l'ai fait pressentir, n'ont plus besoin d'être aussi énergiques que pour le goître sporadique, mais leur action quoique plus lente, moins appréciable, n'en est pas moins semblable quant au mécanisme.

Ainsi, parmi les causes déterminantes déjà énumérées, la menstruation, la grossesse, l'accouchement, le port de far-deaux sur la tête, les causes morales tristes, chez les femmes; les efforts violents exercés sur le col et les passions colériques pour les hommes; la dentition, les cris aigus et la position forcée du col en arrière pour les enfants, donnent lieu d'autant

plus facilement au goître endémique que les tissus de la glande thyroïde ont été plus relachés, et que ce défaut d'élasticité des solides transforme promptement l'engorgement physiologique temporaire en un état maladif permanent.

J'ai dit, que dans l'endémie, de nouvelles causes s'ajoutaient aux précédentes.

La principale me paraît être la combinaison de l'humidité et de la chaleur atmosphérique et je suis en cela d'accord avec Fodéré, qui en signalait l'importance dans la 5<sup>me</sup> section, chapitre 1<sup>er</sup> de son traité. L'observation des faits, ainsi que des expériences thermométriques et hygrométriques, entreprises à Aoste et en Maurienne, lui avaient en effet prouvé l'extrême fréquence du goître sous l'influence d'un air à la fois trèshumide et chaud. Il ne la considère, il est vrai, que comme cause relachante; mais il reconnaît (page 168) que sous cette condition atmosphérique « souvent l'esprit est aussi accablé que le corps, qu'on y éprouve souvent une lassitude, une paresse, une apathie pour le travail qui étaient inconnues » dans tout autre pays. »

Or, ces accidents se lient constamment à un état de congestion habituelle du sang à la tête, qui entraîne le développement abnorme de la glande thyroïde, et ce résultat a lieu non-seulement dans la vallée de Maurienne et d'Aoste, mais dans toutes les localités où le goître endémique prédomine.

Il se produit même toujours dans les saisons où des conditions atmosphériques semblables se rencontrent. Fodéré reconnaît (page 61) non-seulement qu'une température douce, uniforme, humide, rend les goîtres de la population plus mul-

tipliés et plus volumineux; mais aussi que dans les temps secs, quand la terre a soif, qu'en hiver, quand tout gèle, si le goître est petit, il disparaît; s'il est gros, il diminue; que quand les pluies du printemps s'approchent avec la chaleur, il reparaît, qu'il augmente avec les pluies d'automne; et que si l'hiver est doux et pluvieux, il reste stationnaire. Puis il ajoute: « On » peut être sûr que cette marche est constante et ne varie » pas. »

Et cependant, isolée, cette cause ne suffirait pas pour expliquer la formation du goître dans les localités montagneuses, puisqu'il existe une foule d'autres pays, dans les climats intertropicaux, dont l'atmosphère également saturée d'humidité et de chaleur ne produit point de goîtres ni de crétins. - Il faut donc en rechercher une autre accessoire, dans les variations de température, souvent brusques suivant les jours et les saisons, si fréquentes dans certaines localités, surtout dans les pays montagneux et humides; soit en Europe dans la zone tempérée, soit en Asie et en Amérique dans la zone intertropicale, et qui sont d'autant plus marquées et plus extrêmes qu'on est placé auprès des hautes chaînes de montagnes, ou dans des vallées profondément encaissées. Là, en été, on sent descendre, le matin et le soir, un courant d'air froid des sommités neigeuses. Ce courant condense les vapeurs des bas fonds en brouillards, surtout à la surface des terrains glaiseux, trouble les fonctions de la peau et impressionne désagréablement toute l'économie. En revanche, vers le milieu du jour, le soleil darde ses rayons perpendiculairement sur le sol, et les rochers du voisinage y concentrent la chaleur qui y est d'autant plus

32

étouffante que l'air n'est pas rafraichi par les vents du nord, et que les anfractuosités des montagnes y favorisent des remous ou un calme complet. D'autrefois, et dans d'autres saisons, un orage ou la chute subite de neige sur les hauteurs modifient brusquement la chaleur élevée des vallons.

C'est donc à cette alternative de froid et de chaleur humides que nous devons attribuer spécialement les congestions plus ou moins brusques du sang à la tête, cette lourdeur de tête, dont se plaignent les habitants et qui développent ou aggravent le goître endémique. Et ce qui le prouve, c'est que cette infirmité, comme l'avait pressenti Fodéré, ne tend, en général, à augmenter que dans les temps variables, au printemps et en automne; ou même en été dans certaines localités montagneuses; tandis qu'elle cesse de croître ou même diminue lorsque la température est plus ou moins égale ou sèche et abaissée. Cette thèse, je l'avais soutenue dans mon traité sur les Maladies rhumatoïdes (page 205), et chaque jour l'expérience vient lui donner un nouvel appui.

Ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer l'apparition épidémique du goître dans des lieux qui y sont prédisposés.

En février 1852, M. le Dr Guyton, d'Autun, lisait devant le conseil de salubrité de cette ville, un mémoire sur diverses épidémies de goître qu'il avait eu l'occasion d'observer dans sa longue carrière, principalement dans les deux séminaires. La Suivant lui, les allures de cette maladie étaient celles d'une affection catharrale, faisant partie de la classe nombreuse

Gazette médicale de Paris du 26 Juin 1852, t. VII, p. 409. Tome XIII, 2<sup>me</sup> Partie.

des angines parotidiennes, tonsillaires, pharyngiennes, laryngées et bronchiques. Elle n'avait duré guère qu'un ou deux septénaires, cédait toujours aux émollients et aux diaphorétiques, n'avait jamais été mortelle et n'avait jamais laissé après elle de goître définitif ou chronique. Or la ville d'Autun, chef-lieu du département de Saône-et-Loire, s'élève dans un pays très-accidenté, boisé et humide, et les variations de température y sont fréquentes.

Presque dans le même temps, M. Nivet, professeur-adjoint à l'école préparatoire de médecine de Clermont-Ferrant (département du Puy-de-Dome), communiquait à l'Académie des sciences de Paris : l'historique d'un Goître estival épidémique qui avait régné pendant l'été et l'automne dans cette partie montagneuse de la France, et qui s'était développé rapidement sans cependant altérer profondément la constitution.

C'est à une action analogue qu'il faut rattacher d'autres causes accidentelles indiquées comme ayant influé sur le développement du goître. Telle est l'habitude des paysannes et surtout des enfants, dans nos vallées montagneuses où règne l'endémie, de sortir pieds nuds, de grand matin par la rosée, dans les prés humides et froids, ou pendant la pluie, ou dans les marécages, puis d'exposer la tête nue à un soleil ardent; telle est la coutume, très-ordinaire, de se coucher la tête basse et fort couverte, tandis que les pieds sont à nud, exposés au froid.

On doit encore rapporter à cette influence nuisible du froid

<sup>1</sup> Gazette médicale de Paris du 28 Février 1852, t. VII, p. 144.

sur la circulation et sur les fonctions de la glande thyroïde, la recommandation du D<sup>r</sup> Nivet: De ne pas boire de l'eau froide dans la saison du goître épidémique ou de ne pas exposer le col à l'air extérieur frais lorsqu'on a chaud; « car, » ajoute-t-il, l'eau n'agit pas par ses qualités chimiques, mais » bien par sa température qui est relativement trop froide, » lorsque le corps est fortement échaussé par un exercice » violent. »

Les mêmes raisons faisaient que le Dr Valentin, à Nancy, <sup>1</sup> et le Dr Godelle, à Soissons, <sup>2</sup> attribuaient les goîtres, en quelque sorte endémiques, qui déparent les femmes de ces pays, à l'habitude de tenir le col trop découvert, attendu, disaientils, que la précaution de tenir le col au chaud paraît prévenir le développement de cette infirmité.

Ainsi l'opinion populaire que la boisson des eaux glaciales, soit des eaux très-fraîches qui proviennent des montagnes neigeuses, favorise le goître, ne me paraît point absurde et je suis d'autant plus disposé à l'adopter, dans de certaines limites, qu'indépendamment de l'action générale du froid, on ne peut s'empêcher de reconnaître que la suppression brusque du calorique peut exercer une perturbation locale sur les fonctions sécrétoires de la glande thyroïde, ou sur les vaisseaux et ganglions lymphatiques qui partent de cet organe.

Pourquoi donc la plupart des auteurs ont-ils rejeté l'idée, que les eaux de neige pouvaient agir comme cause du goître

<sup>1</sup> Dissertatio medico-chirurgica de Bronchocele. Nancy 1787.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Topographie médicale de l'arrondissement de Soissons. (Voyez Bibliothèque médicale, t. XXIX, p. 11.)

endémique? C'est que les uns, tels que De Saussure et Fodéré, n'ont eu égard qu'à l'innocuité de la boisson de ces eaux, en hiver, dans les climats septentrionaux et dans les vallées hautes de notre pays qui avoisinent les glaciers, dont les habitants n'étant jamais exposés à l'influence d'un air humide et chaud, sont moins sujets qu'ailleurs aux congestions cérébrales, et qu'ils n'ont point étudié l'action nuisible que peut exercer dans certains cas leur température basse sur les populations des vallées profondes, placées dans des conditions opposées; tandis que les autres, tels que MM. Grange et Chatin, n'ont consideré que la composition chimique de ces mêmes eaux et ont également négligé l'influence de leur température.

Ici se présente naturellement la question si controversée des eaux dites crues, séléniteuses ou tufeuses, tenant en dissolution des substances calcaires ou magnésiennes en forte proportion, comme cause déterminante du goître.

Tout en convenant qu'une théoric, partant de cette base exclusive, n'est point en harmonie avec les faits nombreux contradictoires récemment publiés et ceux que j'ai moi-même recueillis; i je ne pense pas qu'on puisse rejeter complètement l'influence de ces eaux sur le développement du goître dans certaines localités et sous certaines conditions prédisposantes

<sup>1</sup> Dernièrement encore M. Viguet, habite chimiste de notre ville, a bien voulu analyser toutes les eaux potables du village de Thuet, sortant de roches calcaires, et malgré le goître endémique qui y règne, j'ai été frappé de la pureté de la plupart d'entr'elles, avec absence presque totale de principes calcaires ou magnésiens.

endémiques, d'autant plus que de toute antiquité on n'a point contesté l'action fâcheuse de ces eaux sur les fonctions digestives et sur la disposition aux congestions cérébrales, que d'autre part les rapports nerveux entre l'estomac et la glande thyroïde sont très-positifs, et qu'il paraît probable que l'action des principes chimiques de ces eaux sur la glande thyroïde est plutôt indirecte et nerveuse, que directe et matérielle, puisque ce n'est que dans des cas rares et avancés qu'on retrouve quelques noyaux de substances terreuses dans le tissu altéré de la glande.

Et les réflexions, que vient de me suggérer l'action controversée des eaux crues, s'appliquent aux autres causes déterminantes du goître endémique. En effet, outre qu'elles se compliquent toujours de l'action plus ou moins énergique des causes prédisposantes individuelles, locales ou atmosphériques, il n'en est aucune qui jouisse de la propriété exclusive de produire le goître; mais elles se suppléent ou se remplacent fréquemment, ce qui, au reste, ne présente rien d'extraordinaire, lorsqu'on considère la tendance analogue du mode d'action que je leur ai assigné.

Ce qui précède nous permet-il de formuler, sur la cause prochaine du goître, une hypothèse moins vague que celles proposées jusqu'à ce jour? Je crois pouvoir l'essayer, en rappelant sommairement quelques-uns des faits signalés.

Les fonctions de la glande thyroïde me paraissent doubles, les unes servant à maintenir l'équilibre de la circulation cérébrale, les autres se rapportant à des sécrétions spéciales.

Sous le premier point de vue, toutes les fois que le sang

est porté à la tête plus que d'ordinaire, par des causes physiologiques ou pathogéniques, qu'il y a accumulation de ce sang dans le crâne et que son retour au cœur est gêné temporairement, le système vasculaire de la glande, en tout ou en partie, devient à son tour le siège d'une congestion artérielle et veineuse, les parois de ses vaisseaux se dilatent et le volume total ou partiel de la glande prend de l'accroissement. -Le mouvement ascensionnel du sang est-il modéré, cesseil promptement, le retour du sang au cœur redevient-il libre, les parois vasculaires ont-elles conservé leur élasticité, la glande thyroïde se dégorge et reprend son volume ordinaire. - Il n'en est pas de même, lorsque la congestion vers la tête est forte, qu'elle persiste ou se renouvelle, si le retour du sang au cœur continue d'être gêné plus ou moins longtemps, ou lorsque les parois des veines et des vaisseaux capillaires avant perdu leur élasticité, par une cause débilitante quelconque, ne réagissent plus sur le trop plein de leur cavité, tandis que les artères propres ont un accroissement d'activité; la glande, en tout ou en partie, reste engorgée et il s'établit dans son tissu une hypertrophie maladive.

Sous le rapport de ses fonctions sécrétoires, la thyroïde n'ayant point de conduit excréteur et chacune de ses vésicules glandulaires formant une cavité close, les vaisseaux lymphatiques, très-déliés, sont seuls chargés de l'absorption des liquides sécrétés. Si la congestion du sang dans la glande n'est que temporaire, les fonctions sécrétoires sont peu troublées. Mais si la congestion persiste ou se répète souvent, et que d'autre part, les fonctions des vaisseaux lymphatiques soient

entravées, les sécrétions vésiculaires continuent ou même s'activent partiellement, tandis que leur absorption n'a pas lieu dans la même proportion, il en résulte la dilatation passive d'un certain nombre de vésicules, favorisée par le relachement du tissu fibreux, et l'augmentation du volume anormal de la glande déjà gorgée de sang. Je suis donc disposé à considérer l'action plus ou moins combinée, plus ou moins prédominante, de ces deux ordres de symptômes morbides, comme la cause prochaine du goître simple, sporadique, endémique ou même épidémique.

Quant aux autres variétés de cette maladie et aux altérations de tissu qu'elles présentent, elles ne sont pour l'ordinaire, comme je l'ai dit précédemment, que le résultat de réactions inflammatoires accidentelles, aigües ou chroniques, lorsqu'elles ne proviennent pas de ruptures de vaisseaux, d'un relachement extraordinaire des tissus ou d'une accumulation anormale du liquide sécrété sur certains points. Le développement partiel d'un ou de plusieurs lobes de la thyroïde, pour le plus grand nombre de cas de goître, ne reconnaît pas d'autres causes.

Dans un second article j'examinerai les rapports et les dissemblances qui existent entre les causes du goître et celles du crétinisme.



## NOUVELLES EXPÉRIENCES

SUB

## LA PERMÉABILITÉ DES VASES POREUX

## ET DES MEMBRANES DESSÉCHÉES

PAR LES SUBSTANCES NUTRITIVES

PAT

MI. A. MOBIN, PHARMACIEN.

(Mémoire lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 21 Octobre 1852.)

## Première Partie.

Avant d'exposer les expériences qui font le sujet de cette note, je dois rappeler que les recherches entreprises en commun avec le Dr Prévost sur la digestion chez les herbivores, un nous avaient conduit à admettre que l'albumine et une substance que nous avons désignée sous le nom de matière gélatiniforme jouaient un rôle d'une grande importance dans cet acte, pendant lequel s'accomplissaient l'extraction et l'absorption sans changement notable de ces deux subtances. Leur présence dans le bol alimentaire et la plupart des fluides animaux, surtout dans le sang, nous paraissait donner une certaine force à cette assertion. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Journal de Pharmacie, 3º série, t. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Calloud d'Annecy a trouvé de la matière gélatiniforme dans une tumeur du genou.

Ces observations offraient une certaine coïncidence avec les résultats que nous avait fournis le liquide laiteux des cotylédons de vache. ¹ Nous y avions trouvé, en effet, de l'albumiue et de la matière gélatiniforme, mais en outre de la caseïne, une substance grasse, offrant une ressemblance frappante avec l'huile du jaune d'œuf, de l'osmazône, du sucre de lait et des phosphates; en un mot un liquide nutritif réunissant les propriétés du lait et du jaune d'œuf.

Enfin, en étudiant la nutrition dans l'œus lui-même, 2 nous avons retrouvé, à côté des substances albumineuses et du corps gras, cette même matière gélatinisorme qui paraît indispensable à la constitution des fluides animaux.

Ces observations sur les liquides alimentaires nous ont conduit à l'étude des forces qui produisent le passage des substances nutritives au travers des membranes et à l'examen de l'organisme du tube digestif.<sup>3</sup> Cet examen microscopique, exclusivement du au D<sup>r</sup> Prévost, a été résumé par lui-même dans ses notes et est compris sous forme d'appendice dans le même mémoire.

Les organes qui servent au passage des substances nutritives existent dans toute l'étendue du canal alimentaire. Un epithelion composé de feuillets est jeté comme un tapis sur le chorion muqueux auquel il adhère intimément. Celui-ci est un réseau formé de cordons arrondis, d'un blanc jaunâtre que les vaisseaux sanguins et lymphatiques ramifiés sur

<sup>1</sup> Mém. de la Société de Physique et d'Hist. nat., t. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal de Pharmacie et de Chimie, 5e série, t. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Journal de Pharmacie et de Chimie, 5° série, t. XXIII.

l'épithelion entourent et suivent dans leur parcours avant de s'isoler de la muqueuse.

Dans l'estomac des rongeurs, des carnivores et dans la caillette des ruminants, l'epithelion ne prend pas une forme papillaire prononcée. Les cordons du chorion sont parallèles entre eux, perpendiculaires à l'axe longitudinal du conduit alimentaire et réunis de distance en distance, par d'autres cordons très-courts, ce qui donne à la maille du réseau muqueux la figure d'un rectangle très-allongé.

Dans le Duodenum et dans la partie supérieure du canal intestinal les mailles du chorion sont circulaires et l'epithelion forme une projection rapplatie dans le sens transversal de l'intestin. Le bord libre de ces projections ou papilles, en nombre immense, est arrondi et fortifié par un cordon qui se détache du chorion muqueux. Les principaux vaisseaux sanguins suivent le bord et envoient à la surface de la papille des rameaux qui s'anastomosent entre eux et forment un lassis très-riche. Ils courent entre la couche de l'epithelion la plus éloignée de l'intérieur du canal et la seconde, tandis que le système des vaisseaux chylifères prend son origine entre la seconde et la troisième couche de cette membrane, c'est-àdire celle qui est immédiatement en contact avec le coutenu de l'intestin.

On peut rendre cette superposition apparente en liant le canal thoracique lorsque l'animal est en pleine digestion. Les dernières ramifications des vaisseaux chylifères se remplissent et l'on peut suivre sur la partie moyenne de la surface des papilles un réseau blanc dont les filets très-minces se jettent à la base dans des troncs plus gros. Par l'injection des vaisseaux sanguins on s'assure que le système chylifère leur est superposé, car on voit ses divisions croiser les capillaires sanguins dans toutes les directions et les recouvrir. On peut conclure de cette observation, que le chyle est absorbé par les lymphatiques et non par les vaisseaux sanguins qui sont plus profondément situés par rapport au contenu de l'intestin.

En détachant la membrane muqueuse de la cellule sousjacente on remarque que les papilles ne sont que des culs-desac formés par les plis de l'epithelion, entourés à leur base par les mailles du chorion. On peut s'en assurer en les fendant d'un bout à l'autre.

Quant au réservoir du chyle que plusieurs auteurs ont cru rencontrer à l'extrémité des papilles, quelque mmltipliées qu'aient été les observations de Prévost sur les rongeurs, les carnivores et les ruminants, il lui a été impossible d'en constater la présence.

L'injection des tissus depuis l'intérieur de l'intestin n'a pas fourni un résultat plus satisfaisant. En déchirant la membrane muqueuse, du liquide a passé dans quelques artérioles, il s'en est épanché dans le tissu cellulaire sous-jacent mais rien n'a ressemblé à une injection véritable et complette.

Dans la dernière partie de l'intestin grèle les plis papilliformes sont moins prononcés et moins nombreux.

Dans le gros intestin les papilles disparaissent tout-à-fait et l'epithelion est simplement étendu sur le chorion. On n'y distingue plus les vaisseaux chylifères, mais le lassis des vaisseaux sanguins est très-apparent et le chorion forme des polygones assez réguliers.

Quant au passage des substances nutritives au travers des membranes, nous avons d'abord essayé la baudruche, mais après nous être assurés que l'albumine ne la traversait pas sous l'influence de l'endosmose, ou du moins en quantité insifiante, nous avons opéré sur des organes frais. La membrane du placenta fœtal de la vache, de la brebis et celle du tube digestif de plusieurs animaux nous ont paru éminemment propres à l'étude des phénomènes d'absorption.

La première, dans les parties qui sont pourvues de cotyledons, joue à l'égard du fœtus un rôle comparable à celui des mamelles, tandis que dans les places qui n'en portent point son tissu est constitué de manière à faire obstacle aux transfusions des liquides. Cette membrane devait donc offrir les deux termes extrêmes de l'échelle d'absorption.

Le seconde est un appareil complétement doué de la faculté absorbante dans toutes ses parties.

Les substances dont nous avons cherché à provoquer le passage sont l'albumine, la gomme, la gélatine, le sucre, le lait et le jaune d'œuf émulsionné.

En employant l'endosmose à la température de 10 à 12° centigrades et en opérant sur la membrane du placenta, nous observâmes que les parties munies de cotyledons livraient à l'eau qui traversait ces organes de l'albumine et de la matière gélatiniforme; qu'elle laissait passer l'émulsion de jaune d'œuf, corps gras et albumine, tandis qu'elles excluaient le

corps gras et le caseum du lait, en admettant seulement le serum albumineux de ce liquide; enfin qu'elles livraient passage au sucre, à la bile étendue, mais repoussaient la gomme.

Les parties de la même membrane dépourvues de cotyledons acceptaient l'albumine du jaune d'œuf et écartaient le corps gras. Elles excluaient la gélatine et laissaient passer le sucre, comme si elles avaient la propriété de choisir entre les substances qui leur étaient présentées en solution.

Ces expériences préliminaires nous avaient conduit à penser que l'endosmose n'était pas la seule force qui provoquât le passage des substances nutritives au travers des membranes. La chaleur et les courants électriques développés par les actions chimiques des substances mises en contact avec ces organes ou résultant de leur vitalité, nous paraissaient devoir jouer un rôle important dans les phénomènes de la nutrition.

En conséquence nous reprimes ces expériences en examinant comparativement l'action de la simple pression, de l'endosmose seule, de cette force combinée avec l'élévation de température et enfin de l'endosmose et de la chaleur réunies à celle de la pile, en graduant l'énergie du courant et en en variant le sens.

Avec la membrane du placenta fœtal les résultats obtenus par la pression s'écatèrent peu de ceux fournis par l'endosmose.

Le courant électrique fit passer le corps gras du lait même au travers de la partie de cette membrane dépourvue de cotyledons, quel que fût le sens du courant, mais avec plus d'énergie lorsque le pôle — était plongé dans le lait et le pôle + dans l'eau extérieure. Nous remarquâmes que cet organe recouvrait sa répulsion pour le corps gras du lait dès que le courant de la pile était interrompu.

En opérant sur des parties de l'intestin prises dans le voisinage de l'estomac:

Par endosmose et à la température ordinaire le sucre était admis, mais il y avait exclusion de la gomme et des principes du lait;

En portant la température entre 25 et 55° centigrades le sucre passait et la membrane cédait ou admettait de la gélatine et de la matière gélatiniforme. Les corps gras, le caseum et la gomme étaient exclus;

En ajoutant à l'endosmose et à la chaleur l'action d'un courant électrique modéré il y avait passage du corps gras du lait et de la gélatine, mais cette dernière substance ne traversait la membrane que pour se rendre de — en +. Le caseum et la gomme étaient repoussés.

Pour apprécier avec plus d'exactitude le rôle de la membrane intestinale nous la soumîmes à un lavage par la potasse, puis par l'eau seule, jusqu'à ce qu'elle fût devenue parfaitement neutre.

Dans cet état l'action combinée de l'endosmose, de la pile et d'une température de 50° centigrades fit passer tous les principes du lait au travers de la membrane, quel que fût le sens du courant, mais avec plus de facilité de — en +.

Lorsque le liquide était légèrement alcalinisé le transport s'opérait au contraire plus facilement de + en -.

En ajoutant au lait une faible proportion d'acide phosphorique la membrane cédait de la gélatine.

Quant à la grosseur des globules qui avaient franchi la membrane, nous trouvâmes que leur diamètre variait entre de millimètre; qu'à la température ordinaire leur transport dans un temps donné augmentait avec l'intensité du courant; que le même résultat était obtenu en élevant la température et en diminuant le courant, ces deux forces se suppléant mutuellement; qu'en rendant la chaleur plus intense et en activant le courant électrique les globules du corps gras et les granules d'albumine coagulée étaient entrainés au travers de la membrane avant les substances dissoutes, comme si leur forme solide les eût rendus plus faciles à saisir, jusqu'au point où ils étaient brisés par la trop grande intensité du courant; qu'enfin la membrane qui avait admis au travers de son tissu des liqueurs émulsionnées et les granules qu'elles tenaient en suspension en interceptait de nouveau le passage lorsqu'elle n'était plus sous l'empire de ces deux forces, à moins qu'elle eût été usée, cas dans lequel l'endosmose seule ou la simple pression suffisait pour en provoquer la transmission.

Le liquide granuleux de l'intestin, avec ou sans addition de bile, traversa la membrane sous l'influence de la pile, quel que fût le sens du courant. La bile, décomposée par l'action de l'électricité et par le contenu du tube digestif, parut favoriser ce passage en fournissant des substances albumineuses transportables, tandis que les matières résineuses ou amères étaient exclues. On peut donc reproduire assez bien les phénomènes du passage des substances nutritives au travers des membranes fraîches du placenta fœtal et de l'intestin par le concours de l'endosmose, d'une température rapprochée de celle des animaux à sang chaud et d'un courant électrique très-modéré.

Les membranes desséchées ne se comportent pas de la même manière. Après avoir permis le passage de ces mêmes substances sous l'influence de ces mêmes forces, elles ne reviennent pas sur elles-mêmes, mais continuent à être perméables par l'action de l'endosmose ou de la pression. Elles n'ont pas, si l'on peut se servir de cette expression, la même dose de vitalité que les membranes fraîches.

Les résultats généraux obtenus dans ces différentes séries d'expériences peuvent se résumer de la manière suivante :

- 1° Les membranes ne se comportent pas d'une manière uniforme sous l'influence de l'endosmose. Celle du placenta fœtal dépourvue de cotyledons, se montre même rebelle à cette action.
- 2º L'albumine, par l'endosmose seule, est quelques fois admise, d'autres fois repoussée par les membranes.
- 5° Cette substance, de même que les autres matières nutritives solubles, la matière gélatiniforme, la gélatine, le sucre, le caseum et les corps gras, peut passer sans changement au travers des membranes, en associant l'action de la pile et de la chaleur à celle de l'endosmose.
- 4° Cependant toutes ces matières ne traversent pas les membranes avec la même facilité et elles peuvent être rangées à ce point de vue à peu près dans l'ordre suivant:

Sucre, Matière gélatiniforme,

Albumine,

Bile (sans emploi de la pile),

Gélatine associée à l'albamine et à la matière gélatiniforme,

Corps gras du jaune d'œuf,

Corps gras du lait,

Gélatine seule,

Caseum,

Gomme,

Résine, complètement exclue.

5° La décomposition des sels contenus dans l'intestin facilite le passage du caseum au travers de la membrane. En même temps l'alcali se dirige vers le pôle — et l'acide se porte en +.

6° L'albumine se rend indifféremment aux deux pôles, mais elle va de préférence en + sous l'influence d'un acide.

La matière gélatiniforme traverse la membrane quel que soit le sens du courant;

La gélatine, le caseum et les corps gras, sous l'influence d'un alcali, se portent de préférence au pôle +;

L'eau est entraînée indifféremment vers les deux pôles, mais elle ne reste point inerte et reçoit une impulsion.

7º Les globules graisseux et les granules de substances coagulées traversent d'autant plus facilement la membrane intestinale et sont d'autant plus gros que le courant voltaïque est plus fort et la température plus élevée. Ils sont même

entraînés avant les substances solubles si le courant est un peu énérgique.

8° La membrane intestinale, qui laisse passer tous les principes de la bile, lorsqu'ils sont associés, repousse ceux qui sont résineux ou doués d'une saveur amère, lorsqu'ils ont été séparés par l'action du contenu ordinaire de l'intestin ou de la pile. Elle se comporte comme si elle possédait la faculté de choisir entre les substances qui lui sont offertes, absorbant les unes et repoussant celles qui ne lui conviennent pas.

9° Enfin l'action combinée de l'endosmose, de la pile et de la chaleur opère une espèce d'analyse du lait, en transportant au travers de la membrane l'albumine, la matière gélatiniforme et le corps gras, ce dernier avec plus de difficulté, tandis que le passage du caseum doit être aidé par un alcali.

### Seconde Partie.

# VASES POREUX INORGANIQUES.

Les nouvelles expériences dont je vais rendre compte ont été provoquées par M. De la Rive, à l'occasion des recherches précédentes. Il y avait, en effet, de l'intérêt à savoir si les phénomènes attribués à la vitalité et à l'organisation des membranes ne se reproduiraient pas avec des corps poreux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Communiquées dans la séance du 18 Décembre 1851.

inorganiques, et s'ils ne pouvaient pas s'expliquer par ce simple fait que les membranes étaient des corps poreux.

Les essais ont été faits avec des godets perméables en terre, mis à ma disposition par M. De la Rive, les uns d'une pâte fine et homogène, fabriqués en Angleterre, les autres d'un grain plus grossier, provenant de l'usine de M. Burger, près de Genève. Elles ont eu pour but de provoquer le passage de diverses substances liquides au travers des parois de ces vases, en employant l'action isolée ou simultanée de l'endosmose, de l'électricité et de la chaleur.

#### ENDOSMOSE SEULE.

Des godets des deux qualités, facilement perméables par l'eau, ont été remplis de lait, d'émulsion de jaunc d'œuf, de solution de blanc d'œuf, de sucre dissous et de mucilage de gomme; puis plongés immédiatement dans un volume d'eau qui ne dépassait pas le double de celui du liquide intérieur. Les niveaux étaient les mêmes en dedans et au dehors des godets.

Après 26 heures l'eau qui entourait le lait était limpide et ne contenait pas de traces appréciables de caseum ou d'albumine.

L'émulsion de jaune d'œuf s'est comportée d'une manière identique pour le même espace de temps.

La solution de blanc d'œuf a séjourné cinq jours dans l'eau. Quoique celle-ci fût devenue légèrement opaline et eût une faible odeur de putréfaction elle ne contenait que des traces d'albumine.

La quantité de mucilage qui traversa les parois du godet dans le même temps fut aussi extrêmement faible.

En cinq jours une partie notable de la solution de sucre avait passé à l'extérieur; celle du godet s'était affaiblie.

Tous ces vases poreux retirés de l'eau laissèrent écouler sans changement apparent les liqueurs qu'ils contenaient et se vidèrent en quelques heures.

En conséquence, si les phénomènes ordinaires de l'endosmose ne se produisirent pas, cela ne provenait pas de ce que les parois interceptaient le passage. Les godets étant doués d'une porosité permanente et sans élasticité, c'était au contraire l'eau extérieure appliquée contre les orifices des canaux de communication qui s'opposait à l'écoulement des liqueurs intérieures.

Puisqu'il n'y a pas avec les vases poreux inorganiques d'endosmose proprement dite, les seules forces auxquelles on puisse attribuer les faibles transfusions et pénétrations observées dans ces expériences, sont les différences de densité et les degrês d'affinité de l'eau pour les substances qui y sont contenues. Le plus léger des deux liquides séparés par les parois d'un godet tend à se superposer à l'autre, ce qui produit la transusion. En même temps, l'eau attire avec d'autant plus de force la liqueur intérieure qu'elle a pour la substance qu'elle renferme une plus grande affinité, ce que l'expérience sur le sucre rend évident.

# Albumine de blauc d'œuf dissoute.

### ELECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE ORDINAIRE.

1<sup>re</sup> expérience: Godet anglais, solution de blanc d'œuf en dedans, eau au dehors. Deux couples, + en dedans, — en dehors. <sup>1</sup>

En 36 heures passage d'albumine bien caractérisée, mais en quantité si faible que le liquide extérieur formait à peine un coagulum par l'ébullition. Le conducteur qui y était plongé portait des traces d'albumine coagulée.

2<sup>me</sup> expérience. Mêmes conditions, sens du courant renversé:

En 45 heures passage d'albumine au dehors aussi faible que dans l'expérience précédente; légère ascension du liquide extérieur au pôle +.

3<sup>me</sup> et 4<sup>me</sup> expériences. 4 couples au lieu de 2. Dans l'un des appareils + intérieurement, et — à l'extérieur; l'inverse dans l'autre:

En 29 heures passage d'albumine dans les deux liquides extérieurs, mais en quantité aussi faible qu'avec 2 couples.

5<sup>me</sup> expérience. 4 couples pendant 12 heures:

Transport d'albumine au dehors mais en quantité extrêmement faible, le pôle + étant en communication avec la solution et le pôle — en dehors.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Électricité développée par une pîle de Daniell à force constante construite par M. Bonijol.

6<sup>me</sup> expérience. En renversant le sens du courant, émission un peu plus forte pendant le même temps

Il n'y avait eu d'albumine coagulée dans aucun des godets. L'ébullition et l'acide nitrique ont facilement constaté la présence d'albumine dans le liquide extérieur de cette dernière expérience. La quantité d'albumine, passée au dehors dans la précédente, était trop petite pour être indiquée par l'acide nitrique, mais elle était coagulée par l'ébullition.

L'alcool, réactif encore moins sensible que l'acide nitrique, ne séparait d'albumine du liquide extérieur dans aucune de ces expériences. L'absence de tout précipité par l'addition de ce corps prouve seulement que l'albumine dans son passage au travers de vases poreux inorganiques ne se transforme pas en albuminose.

électricité et température de 35 a 50° centigrades.

1<sup>re</sup> expérience. 4 couples pendant 9 heures:

Pas de coagulation dans les godets. Mêmes résultats et pas plus intenses qu'en opérant à la température ordinaire.

2<sup>me</sup> expérience. Avec 6 couples, le courant commençant à décomposer l'albumine au pôle —:

Le transport de cette substance au travers des parois ne paraît pas plus fort que dans les expériences précédentes.

Il résulte de ces divers essais:

Que le transport de l'albumine au travers des vases poreux inorganiques est très-faible sous l'influence de l'électricité, quelle que soit la température, et que ce corps est entraîné par le courant dans les deux sens, quoiqu'il aît une tendance plus prononcée à se rendre en +.

Qu'à l'exception de la seconde expérience, dans laquelle l'eau a été entraînée au pôle +, le niveau s'est, en général, élevé au pôle négatif. L'ascension a été plus marquée dans le même sens en opérant avec les godets anglais qu'avec ceux de Genève, ce qui s'explique par la largeur des porcs ou des canaux de ceux-ci qui permet à l'eau soulevée de se déverser à mesure. L'action du courant est cependant assez forte pour vaincre celle de la pesanteur et maintenir l'équilibre à une certaine hauteur.

### Lait.

#### ÉLECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE ORDINAIRE.

1<sup>re</sup> expérience. Avec 2 couples et en 15 heures il n'y a eu aucune émission de lait, quel que fût le sens du courant

2<sup>me</sup> expérience En employant 4 couples, + en dedans, — en dehors, l'eau extérieure est devenue laiteuse en demi heure avec un godet à pâte grossière et en 24 heures seulement avec un godet anglais.

Les liquides extérieurs devenus laiteux étaient privés de corps gras.

3<sup>me</sup> expérience. Avec 4 couples, — communiquant avec le lait et + en dehors, point de passage à l'extérieur, à l'exception d'un peu d'albumine dont la présence a été décelée par l'ébullition.

Le lait n'a été coagulé que dans l'un des godets employés dans ces trois expériences.

ÉLECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE DE 36 A 42° CENTIGRADES.

En employant un godet anglais le liquide extérieur est devenu plus laiteux en 4 heures qu'en 24 à la température ordinaire.

Outre le caseum il avait passé de l'albumine dissoute, mais le corps gras a été en grande partie retenu par les parois du vase.

Ces émissions n'ont eu lieu que lorsque le pôle + plongeait dans le lait, même en employant un godet du pays.

Après quelques opérations les pores se sont engorgés ce qui a empêché la sortie du lait, même lorsqu'il était en communication avec le pôle positif.

Il résulte de ces expériences:

Qu'en augmentant l'intensité du courant et en élevant la température on facilite un peu l'émission du lait.

Que le caseum ne traverse les parois des godets que pour se rendre en —;

Que l'albumine peut être séparée du caseum et du corps gras pour se porter en +;

Que le corps gras est en grande partie retenu, quel que soit le sens du courant.

# Emulsion de jaune d'œuf.

ÉLECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE ORDINAIRE.

1<sup>re</sup> expérience. Godet du pays, 2 couples, pôle + en communication avec l'émulsion:

Tome XIII, 2me Partie.

En 4 heures l'eau extérieure est devenue légèrement opaline. L'ébullition en a séparé un peu d'écume albumineuse.

2<sup>me</sup> expérience. En employant 4 couples les résultats pour 18 heures d'action ont été les mêmes, mais pas plus intenses.

3<sup>me</sup> expérience. En renversant le sens du courant et en faisant agir 4 couples pendant 18 heures, il n'y a pas eu de passage au dehors.

ÉLECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE DE 33° CENTIGRADES.

En employant 4 couples pendant 6 heures et demie, les résultats ont été les mêmes qu'à la température ordinaire. Il y a eu passage de + en — et point de — en +.

Dans les expériences où l'émulsion a été portée au dehors, les globules se sont déposés peu à peu au fond du liquide, sans qu'aucune partie du corps gras se maintînt à la surface.

Il résulte de ces essais:

Que l'émulsion de jaune d'œuf n'est portée au dehors que de +- en ---;

Que l'élévation de température n'active pas son passage d'une manière très-notable;

Que le corps gras est en grande partie arrêté par les parois du godet.

Gomme dissoute dans neuf fois son poids d'eau.

ÉLECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE ORDINAIRE.

1<sup>re</sup> expérience. 4 couples pendant 12 heures.

La solution de gomme en communication avec le pôle + a traversé les parois d'un godet anglais, en quantité très-petite,

mais cependant suffisante pour que l'eau extérieure fût louchie par le mélange avec de l'alcool.

2<sup>me</sup> expérience. 4 couples pendant 24 heures. Deux godets, l'un en communication avec —, l'autre avec +.

La gomme a traversé les parois du premier pour se rendre au pôle + et n'est pas sortie du second pour se porter en —. Son mouvement a donc été opposé à celui qu'elle avait eu dans l'expérience précédente.

# ÉLECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE DE 40 A 47° CENTIGRADES.

Expérience double. 4 couples pendant 9 heures.

La gomme traversa les parois de deux godets anglais en se rendant indifféremment aux deux pôles, mais en quantité si faible que six volumes d'alcool à 42 degrés furent nécessaires pour rendre légèrement opalin un volume de liquide extérieur. Le passage ne fut guère plus actif que dans les expériences à la température ordinaire ou par simple pénétration sans le concours de l'électricité.

L'ascension d'eau dans les godets à pâte serrée eut lieu d'une manière marquée, mais au pôle — seulement.

Sucre dissous dans deux fois son poids deau.

# ÉLECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE ORDINAIRE.

Expérience double. 6 couples pendant 16 heures, godets anglais.

Emission de sucre au travers des parois, quel que fût le sens du courant, mais en quantite très-faible. Saveur des liquides extérieurs à peine sensible. Ascension d'eau, déversement par dessus les bords et écume dans le godet en communication avec le pôle —.

ÉLECTRICITÉ ET TEMPÉRATURE DE 50° CENTIGRADES.

1re expérience. 6 couples pendant 15 heures.

Forte émission de sucre du vase en communication avec +, saveur de l'eau extérieure très-marquée, abaissement du niveau intérieur.

2<sup>me</sup> expérience. Elévation du niveau dans le vase où plonge le pôle —, saveur de l'eau extérieure moins prononcée que dans l'expérience précédente.

Le sucre est la seule substance essayée dont le passage ait été augmenté d'une manière notable par l'action de la chaleur.

Il s'est porté aux deux pôles comme l'albumine et la gomme. mais avec plus de force de + en — que dans le sens contraire, ce qui s'explique facilement par le concours du mouvement de l'eau qui s'est en général élevée au pôle — dans les expériences sur ces trois substances:

Les résultats généraux de cette série d'observations se résument de la manière suivante :

1º Il n'y a pas d'endosmose proprement dite avec les vases poreux formés de matières inorganiques.

2º Les solutions de diverses substances organiques et les liquides émulsionnés qui se mèlent à l'eau en passant au travers des parois de ces vases ne doivent ce mouvement qu'à des différences de densité ou à l'action de l'affinité. C'est une pénétration par contact aux orifices des parois.

5° Il est probable que les vases poreux formés de matières inorganiques ne possèdent pas la propriété de produire les phénomènes d'endosmose parce que leur porosité est permanente et qu'ils sont dépourvus d'élasticité.

Les membranes fraîches sont, au contraire, des corps élastiques dont les fibres peuvent être écartées ou les pores élargis sans déchirure. Ces organes se resserrent ou se contractent après le passage des solutions ou des liquides émulsionnés et s'opposent à leur retour.

- 4° Cette différence entre les vases poreux inorganiques et les membranes est encore plus marquée lorsqu'on soumet celles-ci à l'action modérée du courant de la pile, puisque les membranes qui livrent passage à certaines substances, sous son influence, reprennent leur premier état et resserrent leurs ouvertures lorsque le courant est interrompu.
- 5° Les liqueurs émulsionnées et les solutions qui sont soumises à l'action de la pile dans des vases porcux inorganiques sont la plupart entraînées par le courant électrique d'une manière analogue à ce qui a été observé avec les membranes fraîches.

Ainsi l'albumine, la gomme et le sucre se rendent indifféremment aux deux pôles.

Mais le caseum du lait se porte au pôle — tandis qu'avec les membranes fraîches il se rend, de préférence, au pôle + sous l'influence d'un alcali.

L'émulsion de jaune d'œuf se comporte en général comme le lait.

Les corps gras du lait et du jaune d'œuf sont arrêtés dans l'intérieur des pores.

6° L'albumine en passant au travers des parois ne se transforme pas en matière gélatiniforme.

7. L'adjonction de la chaleur au courant électrique n'augmente pas très-sensiblement le passage de ces diverses substances, à l'exception du sucre, au travers des vases poreux formés de matières inorganiques, tandis qu'elle exerce une influence marquée sur leur transmission au travers des membranes fraîches.

8° Il y a rupture de niveau par l'accumulation d'eau à l'un des pôles. Sauf une seule exception elle a toujours eu lieu au pôle —. On pourrait croire que ce liquide est luimême électrisé positivement.

9° Ce courant continuel de l'eau, de + en -, n'est pas sans influence sur la manière dont se comportent les solutions de diverses substances soumises à l'action de la pile dans les vases poreux inorganiques.

En effet, la substance dissoute est elle-même positive, négative ou neutre:

Qu'elle soit positive et en communication avec le pôle +, sa sortie du vase poreux sera facilitée par le courant d'eau qui chemine dans le même sens.

Si le pôle — y est plongé, elle sera retenue dans le godet par son attraction pour ce même pôle et par le courant d'eau affluent.

Qu'elle soit négative et en communication avec le pôle +, elle sera sollicitée par deux forces opposées, l'attraction pour le pôle + et le courant d'eau qui tend à l'entraîner en -.

Si le pôle négatif y est plongé elle sera portée au dehors en luttant contre le courant d'eau. Qu'elle soit neutre, elle n'aura plus à subir que l'influence des courants d'eau et de la pénétration. Elle sortira des vases poreux avec plus de facilité lorsque le pôle — sera placé en dehors, parce qu'elle recevra l'impulsion directe du courant; tandis que si ce pôle communique avec le dedans elle ne sera portée au dehors que par le déversement de l'eau qui se répartit sur toute la circonférence du godet et est en conséquence doué d'un mouvement moins rapide que le courant direct.

Il résulte de ces données:

Qu'une substance en solution dans l'eau qui se rend exclusivement au pôle — au travers des parois d'un vase poreux inorganique peut être considérée comme positive. Le caseum est dans ce cas.

Qu'une substance est à plus forte raison douée de l'électricité négative lorsqu'elle se rend au pôle + en surmontant l'opposition que lui fait le courant d'eau. Il n'y a pas de substance absolument négative parmi celles qui ont été mises en expérience.

Qu'une substance est neutre lorsqu'elle se rend aux deux pôles mais en plus grande abondance ou plus rapidement en —. L'émulsion de jaune d'œuf et le sucre se comportent de cette manière. La gomme est un peu plus indifférente.

Qu'une substance est neutre avec forte tendance négative lorsqu'elle peut se rendre aux deux pôles, mais avec plus d'abondance ou de rapidité au pôle +. L'albumine est dans ce cas et se distingue par ce caractère du caseum dont l'électricité positive est prononcée.

Quelle que soit la valeur de ces considérations il est difficile

d'expliquer le transport d'une substance en sens contraire du mouvement de l'eau sans recourir à l'hypothèse des deux courants.

# MEMBRANES DESSÉCHÉES.

Les essais suivants ont eu pour but d'étudier la transformation de l'albumine en albuminose ou en matière gélatiniforme que M. Mialhe a signalée comme le résultat du passage de l'albumine au travers des membranes.

Comme ce fait ne s'était pas vérifié avec les membranes fraîches et comme les expériences sur les vases poreux inorganiques montrent que l'albumine en franchit les parois sans changer d'état, il y avait de l'intérêt à examiner comparativement l'action des membranes desséchées.

Celles qui ont été employées dans cette seconde série de recherches étaient des baudruches éminemment propres, par leur peu d'épaisseur, aux expériences d'endosmose.

# Endosmose seule.

1<sup>re</sup> expérience. Sac de baudruche bien lavé, contenant du blanc d'œuf étendu d'eau et passé sans expression au travers d'un linge fin.

Plongé pendant 12 heures dans de l'eau, le niveau intérieur ne s'est élevé que de deux lignes. Le liquide extérieur ne formait pas de coagulum par l'ébullition.

L'expérience prolongée pendant 12 heures a fourni les mêmes résultats, cependant l'alcool a précipité de la liqueur extérieure des traces de matière gélatiniforme.

2<sup>me</sup> expérience. Pour activer l'endosmose la solution de blanc d'œuf a été mêlée avec son volume de solution concentrée de sucre.

En 12 heures la presque totalité du liquide extérieur avait pénétré dans le sac.

A l'extérieur il y avait du sucre, de l'albumine et de la matière gélatiniforme, ces deux dernières substances en trèspetite quantité.

3<sup>me</sup> expérience. Afin de forcer l'albumine à traverser la membrane un autre sac contenant une solution de blanc d'œuf a été placé dans une solution de sucre.

Après 24 heures il n'y avait eu ni changement de niveau ni passage d'albumine.

En prolongeant l'expérience, l'émission de liquide fut enfin provoquée par le sucre, en même temps qu'une partie de cette substance passa à l'intérieur de la membrane.

Le liquide extérieur ne contenait point d'albumine, mais bien des traces de matière gélatiniforme.

4<sup>me</sup> expérience. Dans la supposition que le sucre, en agissant sur la surface extérieure de la membrane, pouvait ne pas produire le passage de l'albumine aussi facilement que s'il était plongé dans l'intérieur, une nouvelle expérience fut commencée en intervertissant l'ordre des solutions.

En 48 heures il y eut introduction de liquide dans le sac, mais sans albumine. L'alcool concentré y décela la présence de matière gélatiniforme en quantité extrêmement faible.

5<sup>me</sup> expérience. Afin de reconnaître si la membrane pouvait fournir de la matière gélatiniforme, l'endosmose fut pro-

Tome xiii, 2me Partie.

duite en introduisant dans un nouveau sac une solution de sucre et en le plongeant dans de l'eau pure.

De la matière gélatiniforme bien caractérisée fut trouvée dans le liquide intérieur, en quantité au moins aussi forte que dans les essais destinés à provoquer le passage d'albumine.

Il résulte de ces expériences:

Que la baudruehe ne possède pas pour l'endosmose de l'albumine de blanc d'œuf les propriétés des membranes fraîches;

Qu'elle la laisse passer encore plus difficilement que les vases poreux inorganiques à pâte serrée;

Qu'elle peut fournir de la matière gélatiniforme à l'eau pure qui la traverse sous l'influence du sucre.

### Electricité et Endosmose.

Expérience double. Action de 6 couples pendant 24 heures.

Albumine en communication avec le pôle —, placée dans l'un des appareils en dedans, dans l'autre en dehors de la membrane tandis que la paroi opposée était baignée par une solution de sucre. Les sacs de baudruche avaient été déjà employés à des expériences d'endosmose.

Il n'y eut de passage d'albumine dans aucun sens.

Les traces de matière gélatiniforme contenues dans les liquides opposés à la solution d'albumine parurent plus faibles que dans les expériences d'endosmose.

L'eau fut portée de — en +, avec peu d'intensité, mais en sens contraire pour les deux sacs.

Chaleur de 45 à 50° cent., Electricité et Endosmose.

Expérience double. Semblable à la précédente, avec les mêmes sacs et soutenue pendant 12 heures.

Il n'y eut aucune introduction d'albumine dans le sac en dehors duquel la solution de cette substance était placée.

Il n'y eut pas trace de matière gélatiniforme dans ce même sac, la membrane paraissant épuisée par les expériences précédentes.

Une très-petite quantité d'albumine bien caractérisée traversa de dedans en dehors les parois du sac qui contenait la solution de cette substance, cheminant de — en +, quoique, d'après les expériences sur les godets, ce sens du courant soit le moins favorable au transport de l'albumine.

L'eau s'éleva constamment au pôle +.

L'ensemble de ces expériences sur les membranes desséchées montre:

1° Qu'en employant séparément ou simultanément l'action de l'endosmose, de la pile et de la chaleur, de la matière gélatiniforme, en quantité appréciable et bien caractérisée, n'a été trouvée dans les liquides qui ont traversé la baudruche que dans un seul cas, celui où l'endosmose a été produite avec des liquides exempts d'albumine; sucre en dedans, eau en dehors.

2° Que, sous l'influence de ces forces isolées ou réunies, il n'y a eu que rarement passage d'albumine au travers de la membrane; qu'il ne s'est effectué qu'en proportion très-faible et que dans ce cas l'albumine a conservé ses caractères distinctifs.

Les résultats de ces recherches ne s'accordent donc pas

avec ceux obtenus par M. Mialhe. Ils montrent que les membranes desséchées ne reprennent pas dans l'eau la faculté de laisser passer des substances auxquelles elles donnaient passage lorsqu'elles étaient fraîches. Leur rôle se rapproche de celui des vases poreux inorganiques, quoique dans ceux-ci, sous l'influence de la pile, l'eau aît été presque constamment entraînée de + en -, tandis qu'elle s'est en général accumulée au pôle positif dans les expériences sur la baudruche. Avec les membranes douées de vitalité l'eau s'est rendue indifféremment aux deux pôles.

Les points suivants paraissent mis hors de doute:

Les phénomènes observés dans le passage des substances nutritives au travers des membranes fraîches ne peuvent pas être expliqués par une porosité analogue à celle des corps inorganiques.

Les membranes desséchées ne reprennent pas l'espèce de vitalité que ces organes possèdent lorsqu'ils sont frais.

L'albumine peut, quoiqu'avec difficulté, traverser la baudruche sans éprouver de transformation.

La matière gélatiniforme qui se trouve dans l'eau qui a traversé la baudruche sous l'influence de l'endosmose provient de cette membrane elle-même.

<sup>1</sup> M. Matteuci a donné, dans les Ann. de Chimie et de Physique, 5° série, t. XIII, les résultats d'expériences variées et précises qui prouvent que la nature des membranes, leur état et leurs surfaces exercent une influence marquée sur les phénomènes d'endosmose.

# DESCRIPTION

DES

# MOLLUSQUES FOSSILES

qui se trouvent dans

#### LES GRÈS VERTS DES ENVIRONS DE GENÈVE

PAR

#### F.-J. PICTET

PROFESSEUR DE ZOOLOGIE ET D'ANATOMIE COMPARÉE

#### WILLIAM ROUX

DOCTEUR EN MEDECINE.

SUITE ET FIN.

# 242. LIMA MONTANA, Pictet et Roux.

Pl. 43, fig. 1, a et b.

L. testà crassà, oblongà, obliquà, compressà, concentricè inæqualiter plicatà; latere buccali truncato; latere anali elongato, rotundato; auriculà anali distinctà.

#### DIMENSIONS.

Longueur	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	80 millim.
Par rapport à la longueur :	Largeur	0,75
	Epaisseur	0,35
Angle anicial		880

Coquille oblongue, transverse, comprimée, fort épaisse surtout vers la charnière et le long du bord cardinal au côté buccal. Elle est ornée de plis concentriques très-marqués, irrégulièrement espacés. Région buccale tronquée, droite; région anale, arrondie, prolongée, formant une oreillette saillante qui est séparée par un sillon du reste de la coquille.

Tome XIII, 2me Partie.

Le test se décompose en feuillets et les diverses couches ne reproduisent pas les mêmes ornements. En dessous de la couche superficielle on en trouve une qui a les mêmes plis concentriques, et qui est ornée en outre, de stries saillantes rayonnantes, irrégulières. Les couches suivantes sont plus lisses.

Le moule est parfaitement lisse, sauf quelques lignes rayonnantes peu marquées au côté anal qui est tout-à-fait droit et comme tronqué, ne reproduisant pas des traces de l'oreillette. Les crochets sont très-grands, et vu l'épaisseur du bord cardinal de la coquille, ils sont très-séparés l'un de l'autre.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce ressemble un peu à la Lima Saxoneti; elle en diffère par son oreillette anale séparée par un sillon du reste de la coquille, par son angle apicial et par les ornements de son test.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 43, fig. 1 a, moule de la Lima montana avec quelques débris de test, de grandeur naturelle; fig. 1 b, le même, vu de profil.

LOCALITÉS. Cette espèce a été trouvée au Saxonet et au Grand-Bornand; elle n'est pas commune. Collections du Musée Académique, de M. le professeur Favre, de M. Roux.

#### SECOND ORDRE.

# PLEUROCONQUES, d'Orbigny.

Cet ordre comprend les mollusques lamellibranches dont la station n'est pas verticale, et dont une des valves est inférieure et l'autre supérieure. L'animal n'est pas symétrique non plus que la coquille; cette dernière se distingue de celles de l'ordre des Orthoconques par l'inégalité constante de ses valves. Cet ordre contient six familles. Celles des Ethérides et des Anomides ne paraissent pas représentées dans nos grès verts; les quatre autres peuvent être distinguées comme suit:

Les Camides ont une coquille à crochets saillants, une charnière armée de dents, et deux impressions musculaires égales ou presque égales.

Les autres familles n'ont qu'une seule impression musculaire, ou une grande et une très-petite.

Les Malléacés ont une coquille irrégulière, un test feuilleté et un ligament large quelquesois multiple. L'animal est muni d'un pied.

Les Pectinides ont une coquille régulière (qui peut, mais rarement, être modifiée en devenant adhérente), un test non feuilleté et un ligament étroit, toujours simple. L'animal est également muni d'un pied.

Les Ostracés ont une coquille irrégulière, un test feuilleté et un ligament étroit toujours simple. L'animal est dépourvu de pied.

# 1re Famille : CAMIDES.

Caractères. Coquille inéquivalve, fermée, peu régulière, à crochets arrondis et recourbés. Charnière formée de dents assez fortes. Deux impressions musculaires sur chaque valve.

### GENRE DICERAS Lamarck.

CARACTÈRES. Crochets des deux valves enroulés et saillants. Charnière très-forte. Impression musculaire anale très-saillante.

Nous conservons ici le genre Diceras, en le distinguant des Cames par la force de sa charnière, par la présence d'un crochet saillant sur la valve supérieure qui n'est pas operculiforme, et par son impression musculaire anale très-marquée; mais nous reconnaissons avec MM. Deshayes et d'Orbigny que ces caractères sont peu précis et présentent des transitions nombreuses. La nature du test qui est composé de trois couches dans les Diceras, fournirait peut-être un meilleur signe distinctif, mais nous n'avons pas pu le vérifier dans le cas actuel.

Nous devons faire remarquer aussi que les espèces des terrains crétacés forment une sorte de transition entre les Diceras et les Cames et qu'elles fournissent ainsi un nouvel argument en faveur de la convenance de leur réunion. Les espèces décrites par M. d'Orbigny ont comme les Diceras, la valve supérieure saillante et non operculiforme, et paraissent avoir eu le test simple des Cames. La nôtre appartient probablement au même type, et présente d'une manière plus marquée encore le caractère d'une impression musculaire anale très-saillante.

Les Camides auraient donc apparu sous la forme de Diceras pendant l'époque jurassique, auraient passé dans l'époque crétacée par des formes intermédiaires et auraient vécu à l'époque tertiaire sous la forme de Cames.

### 243. DICERAS GAULTINA Pictet et Roux.

(Pl. 41, fig. 1 a, b, c.)

D. testà inflatà; valvà superiore convexà, rotundatà, sub-contortà; valvà inferiore elongatà, obliquè contortà.

Coquille renslée, peu irrégulière ; formée de valves inégales dont la supérieure est plus petite, mais assez renslée, convexe, et terminée par un sommet obtus un peu coutourné. La valve inférieure est plus grande, allongée, et son sommet est fortement et obliquement contourné. Nous ignorons si le labre était crénelé. Le moule est lisse; il montre sous les crochets, l'empreinte des dents cardinales bilobées, et sur le côté anal de chaque valve, l'impression musculaire sous la forme d'un sillon allongé et très-marqué; cette impression est peu visible sur le côté buccal.

Des fragments très-incomplets du test semblent indiquer que la coquille était ornée de côtes rayonnantes très-petites, un peu rugueuses, et de stries concentriques très-fines, mais nous ne saurions pas affirmer que ces fragments appartiennent bien à la couche superficielle.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce nous paraît très-voisine de forme de la Chama cornucopiæ d'Orb. de l'étage turonien de Rouen; cependant les valves de cette dernière sont plus inégales et moins contournées. Dans la nôtre en outre la valve droite est la plus grande; l'inverse a lieu dans la Ch. cornucopiæ.

LOCALITÉS. Le Saxonet et la perte du Rhône; collection du Musée Académique; espèce très-rare.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 41, fig. 4 a, D. gaultina de grandeur naturelle, vue par sa face buccale; fig. 1 b, la même vue par sa face anale; fig. 1 c, la même, la petite valve en avant.

# 2<sup>me</sup> Famille: MALLÉACÉS.

(Aviculides d'Orbigny.)

CARACTÈRES. Coquille plus ou moins irrégulière, sub-inéquivalve, très-inéquilatérale, mince, à test feuilleté. Valve su-

périeure plus bombée que l'inférieure. Ligament large, simple ou divisé par des crénélures ou des dents. Une grande impression musculaire médiane, ordinairement accompagnée d'une petite buccale sous les crochets. Impression palléale entière.

Ces mollusques se tiennent horizontalement couchés sur le côté, la valve bombée en dessus, souvent fixés par un byssus. Leurs coquilles se distinguent facilement de celles de la famille des Pectinides par leur forme irrégulière très-inéquilatérale, par leur test feuilleté, et par leur ligament large.

#### GENRE AVICULA Klein.

Caractères. Charnière linéaire, munie d'une ou de plusieurs dents calleuses, souvent très-effacées. Ligament externe, unique, linéaire, se prolongeaut du côté anal. Coquille inéquilatérale, souvent prolongée en aile du côté anal; valve inférieure échancrée pour le passage d'un byssus.

Les avicules, qui ont paru sur le globe avec les terrains paléozoïques, habitent encore les mers actuelles; elles adhèrent aux corps sous-marins par un byssus et sont habituellement couchées sur le côté.

# 244. AVICULA RHODANI Pictet et Roux.

(Pl. 41, fig. 2.)

A. testà dilatato-transversà, inflatà, lævigatà et concentricè plicatà, unisulcatà; latere anali dilatato, aliformi; latere buccali brevi, obtuso.

#### DIMENSIONS.

Largeur	75 millim.
Epaisseur de la valve supérieure par rapport à la largeur	

Coquille plus large que longue, transverse, assez épaisse, renflée, lisse, marquée de lignes d'accroissement concentriques; sa partie bombée, prolongée et arrondie sur la région palléale, est séparée par une dépression transverse de l'expansion aliforme du côté anal; cette expansion parât avoir été assez grande; nous ne la connaissons qu'en partie; le côté buccal présente aussi une expansion, mais elle est étroite, courte et obtuse, séparée de la partie bombée des valves par une légère dépression. La valve inférieure est moins bombée que la valve supérieure. Les crochets sont pointus.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est très-voisine de l'A. Moutoniana d'Orb. de l'étage cénomanien; elle nous paraît en différer par son expansion anale plus oblique, par son côté buccal plus grand, séparé de la région apiciale par un sillon plus prononcé, et enfin par ses plis d'accroissement moins nombreux et plus marqués.

M. E. Forbes cite dans le lower greensand d'Angleterre, la Perna alæformis, décrite par Sowerby (Min. Conch. pl. 231) sous le nom de Modiola aliformis, du terrain Portlandien. La figure de Sowerby rappelle un peu notre espèce; mais dans celle-ci, la charnière, que nous ne connaissons, il est vrai, qu'en partie, paraît avoir eu un ligament simple, et lui assigne sa place dans le genre des Avicules, et non dans celui des Pernes.

LOCALITÉ. Les grès inférieurs de la perte du Rhône; espèce rare. Collection du Musée Académique de Genève.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 41, fig. 2. Avicula Rhodani de grandeur naturelle.

#### GENRE GERVILIA Defrance.

CARACTÈRES. Charnière linéaire, formée d'un nombre variable de dents obliques ou longitudinales placées en dedans de la fossette du ligament. Ligament externe, multiple, divisé par segments dont chacun est logé dans une fossette. Coquille transverse inéquilatérale, souvent prolongée en ailes comme celle des avicules.

Ce genre se rapproche de celui des Pernes par son liga-

ment multiple, mais il s'en distingue par une charnière fortement inclinée par rapport à l'axe de la coquille, et par des dents allongées et obliques. Il diffère de celui des Avicules par son ligament multiple.

Les Gervilies, assez nombreuses dans les terrains jurassiques et crétacés, n'ont été retrouvées ni dans les terrains tertiaires, ni dans les mers actuelles.

### 245. Gervilia Alpina Pictet et Roux.

(Pl. 41, fig. 3 a, b, c.)

G. testà elongatà, lanceolatà, lævigatà, concentricè lineatà, inflatà; latere anali elongato, dilatato; latere buccali....; valvis convexis.

Coquille à test très-épais, renflée, allongée, lancéolée, presque équivalve, lisse, marquée de lignes d'accroissement; le côté anal est élargi, son expansion trèsgrande est séparée du corps des valves par une dépression; le côté buccal paraît avoir été un peu arqué; il ne portait pas d'expansion, sauf peut-être trèsprès du sommet qui est cassé sur nos échantillons.

Son moule, dont nous possédons un fragment, montre une série de granulations qui longent le bord buccal à partir du sommet; la charnière nous manque.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche surtout de la G. anceps Deshayes, du terrain néocomien (Leymerie Mém. Soc. Géol., tom. 5, pl. 10, fig. 5); mais elle est beaucoup moins inéquivalve. Elle est plus large que la G. difficilis d'Orbigny, la seule espèce connue du gault.

Localité. Elle a été trouvée dans le gault du Saxonet; collection du Musée Académique.

Nous possédons des fragments d'une espèce à peu près semblable, trouvés dans les grès inférieurs de la perte du Rhône; ils sont trop incomplets pour permettre une comparaison rigoureuse.

Explication des figures. Pl. 41, fig. 5 a, Gervilia alpina, de grandeur naturelle, vue par sa face anale, — fig. 5 b, moule de la même espèce, vu de profil, — fig. 5 c, le même, vu du côté de la charnière.

### GENRE PERNA Bruguière.

CARACTÈRES. Coquille transverse, irrégulière, à test fibreux. Charnière linéaire, dépourvue des dents obliques qui caractérisent les Gervilies. Ligament externe, multiple, divisé en segments dont chacun est logé dans une fossette profonde et régulière de la facette articulaire qui est oblique par rapport à la ligne de séparation des valves. Deux impressions musculaires dont l'anale est virgulaire, médiane et très-grande, et la buccale petite et située sous le crochet.

Les Pernes ont vécu à toutes les époques géologiques. Nous n'avons trouvé qu'une seule espèce, déjà décrite par M. d'Orbigny.

# 246. PERNA RAULINIANA d'Orbigny.

(Pl. 41, fig. 4 a, b.)

P. testà oblongo-cuneiformi, compressà, transversà, levigatà, concentricè lineatà, subæquivalvi; latere anali rotundato; latere buccali acuminato; umbonibus approximatis.

P. Rauliniana, d'Orbigny, 1845, Pal. fr., ter. crét., t. 3, p. 497, pl. 401, fig. 4 et 5.
Ead. id. Prod., 1850, t. 2, p. 138.

#### DIMENSIONS.

#### (Moules.)

Largeur 60 millim.
Par rapport à la largeur : Longueur
— — Epaisseur 0,35
Angle apicial 70° variab.
Coquille oblongue, transverse, comprimée, à peu près équivalve, lisse, ornée
de lignes d'accroissement. Extrémité anale arrondie; extrémité buccale acu-
minée et anguleuse ; la région du byssus légèrement échancrée.

Tome XIII, 2me PARTIE.

Moule lisse; la facette du ligament montre de petites crénelures carrées, également espacées, séparées par des sillons étroits.

Localités. La perte du Rhône ou elle n'est pas rare. M. Tollot l'a trouvée aux Fis.

Explication des figures. Pl. 41, fig. 4 a, moule intérieur de la Perna Rauliniana de grandeur naturelle, vu de côté, — fig. 4 b, le même vu par la face anale.

# GENBE INOCERAMUS Sowerby.

(Inoceramus, Mytiloïdes et Catillus Brongniart.)

CARACTERES. Coquille bombée, inéquivalve, inéquilatérale, souvent gryphoïde, à petite valve non échancrée. Charnière courte, linéaire, munie d'une seule dent. Ligament externe, recouvrant probablement toute la facette articulaire, mais divisé en segments nombreux dont chacun est logé dans une petite fossette. Une grande impression musculaire ovale, médiane.

Les coquilles de ce genre sont très-voisines de celles des Pernes; elles s'en distinguent surtout par leur forme générale et par la dent de la charnière, si toutefois ce dernier caractère est constant.

Les Inocérames ont été depuis long-temps signalés dans le gault. Nous en avons trouvé trois espèces, sur les quatre qui étaient connues dans cet étage. Ce genre, assez ancien à la surface du globe, ne se retrouve pas au-dessus des terrains crétacés.

### 247. INOCERAMUS SULCATUS Parkinson.

( Pl. 42, fig. 1 a-f.)

I. testà ovato-transversà, inflatà, inæquivalvi, concentricè undulato-striatà, radiatim 7-10 costatà; costis elevatis, acutis, inæqualiter proeminentibus; latere buccali truncato, excavato, non costato; latere anali dilatato; umbonibus incurvatis, oppositis, Nucleo radiatim costato, concentricè striato.

Inoceramus sulcatus, Parkinson, 1820, Trans. of the Geol. Soc., vol. 5, p. 59, pl. 1, fig. 5.

- Id. Sowerby, 1821, Miner. Conch., pl. 306, fig. 1-5 et 8, (exclus. fig. 7),
- Id. Mantell, 1822, Geol. of Sussex, p. 95, pl. 19, fig. 16.
- Id. Brongniart, dans Cuv. Oss. foss., 4e édition, pl. N., fig. 12.
- Id. Nilsson, Petrif. Suecana, p. 18.
- 1d. Deshayes, 1831, Coq. caractérist., p. 62, pl. 12, fig. 7.
- 1d. Goldfuss, 1836, Petref. Germaniæ, p. 112, nº 16, pl. 110, fig. 1.
- Id. d'Orbigny, 1845, Pal. fr., terr. crét., t. 3, p. 504, pl. 403, fig. 3-5.
- Id. id. Prod., 1850, t. 2, p. 139.

#### DIMENSIONS.

Largeur	43 millim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,68 à 75
Epaisseur	0,65 à 70
Angle apicial	70°

Coquille ovale, transverse, renflée, plus ou moins inéquivalve, ornée de lignes d'accroissement concentriques, ondulées, et de 7 à 10 côtes rayonnantes, inégalement élevées, anguleuses, séparées par des sillons d'égale largeur. Côté buccal court, tronqué, excavé, dépourvu de côtes; côté anal plus large. Crochets pointus et contournés; facette du ligament assez longue.

Moule reproduisant l'empreinte des côtes et même celle des stries concentriques.

OBSERVATIONS. Nous rapportons à cette espèce quelques échantillons, dont les côtes rayonnantes moins nombreuses, plus ou moins déformées et très-inégales entre elles, ne sont souvent apparentes que dans le voisinage du bord palléal. Les stries concentriques sont les mêmes que sur les échantillons bien caractérisés.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Elle se distingue de toutes celles du gault par ses côtes rayonnantes.

LOCALITÉS. Elle est extrêmement commune à la perte du Rhône; on ne la trouve que rarement dans le gault du Faucigny; nous la possédons aussi de Bossetang au pied de la dent du Midi.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 42, fig. 1 a, Inoceramus sulcatus, de la perte du Rhône, de grandeur naturelle (un grand échantillon), vu par sa grande valve; — fig. 1 b, le même, vu par sa petite valve; — fig. 1 c, le même; vu de côté; — fig. 1 d, 1 e et 1 f, variétés diverses consistant dans la diminution du nombre des côtes.

### 248. Inoceramus concentricus Parkinson.

(Pl. 42, fig. 2 a, b, c.)

I. testà ovato-transversà, inflatà, inæquivalvi, concentricè sulcatà; latere buccali subexcavato, latere anali subdilatato; valvà unà convexà, umbone incurvato, alterà convexiusculà, umbone parvo, sub-incurvato. Nucleo concentricè sulcato.

I. concentricus, Parkinson, 1820, Trans. of the Geol. Soc., vol. 5, p. 58, pl. 1, fig. 4.

Id. Sowerby, 1821, Miner. Conch., pl. 305.

1d. Mantell, 1822, Geol. of. Sussex, p. 95, pl. 19, fig. 15, 19, 20.

Catillus pyriformis, Michelin, 1834, Mag. Zool., Guérin, 1833, classe 5, pl. 32. I. concentricus, Goldfuss, 1836, Petref. German., p. 11, nº 14, pl. 109, fig. 8.

Id. d'Orbigny, 1845, Pal. fr., terr crét., t. 3, p. 506, pl. 404.

Id. id. Prod. 1850, t. 2, p. 138.

#### DIMENSIONS.

#### ( Moules.)

Largeur	57	millim,
Par rapport à la largeur : Longueur		0,65
Epaisseur		0,55
Angle apicial	55°	

Coquille ovale, transverse, lisse, ornée de sillons concentriques, marqués surtout dans le jeune âge. Des deux valves l'une est grande, très-convexe et a son sommet contourné, l'autre est plus petite, peu convexe et son sommet n'est que peu ou point contourné. Côté buccal tronqué et excavé; côté anal élargi par l'expansion de la facette du ligament.

Moule montrant des côtes et des sillons concentriques plus marqués que sur la coquille.

OBSERVATIONS. Cette espèce varie beaucoup de convexité suivant l'âge; jeuue elle est très-convexe et courte; en avançant en âge, elle s'allonge et diminue proportionnellement d'épaisseur.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Elle est voisine de forme de l'I. Coquandianus du même étage, mais elle en dissère par ses côtes et ses sillons concentriques.

LOCALITÉS. La perte du Rhône où elle est très-commune ; on ne la trouve que rarement dans les Alpes du Faucigny.

Explication des figures. Pl. 42, fig. 2 a, Inoceramus concentricus, de grandeur naturelle, vu par sa grande valve; — fig. 2 b, le même vu par sa petite valve; — fig. 2 c, le même vu de côté.

# 249. Inoceramus Salomoni d'Orbigny.

(Pl. 42, fig. 3 a, b.)

- I. testă ovato-transversă, inflată, concentrice sulcată, transversim sulco lato bipartită; latere buccali truncato, excavato; latere anali dilatato. Apicibus incurvatis.
  - I. Salomoni, d'Orb., 1850, Prodr., t. 2, p. 139.

#### DIMENSIONS.

Largeur	54 mi	illim.
Par rapport à la largeur : Longueur		0,77
Angle apicial	70°	

Nous ne connaissons que le moule.

Espèce ovale, transverse, très-renslée, ornée de sillons concentriques et pourvue d'un sinus large et transverse, sur le milieu des valves; côté buccal tronqué et excavé; côté anal dilaté. Crochets récourbés.

OBSERVATIONS. Lorsque le sinus transverse est bien marqué, la distinction entre cette espèce et la précédente est facile; mais il nous a paru qu'il existait des transitions entre elles, et qu'on ne pouvait séparer de l'Inoceramus concentricus certains échantillons sur lesquels la partie médiane des valves est aplatie ou même légèrement creusée, montrant ainsi un commencement de sinus. Les stries con-

centriques sont les mêmes sur les deux espèces. Nous n'avons trouvé que des valves isolées et mutilées de l'I. Salomoni, de sorte que nous n'avons pu l'étudier qu'incomplétement.

LOCALITÉS. La perte du Rhône, le Saxonet, le Criou, le Reposoir, Tanneverges, le Grand Bornand. Collections du Musée Académique, de M. Roux et de M. le Prof. Favre.

Explication des figures. Pl. 42, fig. 5 a, Inoceramus Salomoni, de grandeur naturelle, vu par sa grande valve; — fig. 5 b, la même valve vue de côté.

### 3me Famille: PECTINIDES.

CARACTÈRES. Coquille inéquivalve, peu inéquilatérale, régulière ou à peu près régulière, à test compact et non feuilleté, ordinairement pourvue sur la région cardinale de deux oreillettes, dont les buccales sont échancrées sur la valve inférieure. Impression palléale entière. Une impression musculaire ovale sur chaque valve. Ligament interne, court, placé dans une fossette de la région cardinale.

Les Pectinides sont fixés par un byssus ou par la coquille même. L'animal est muni d'un pied, caractère qui le distingue de ceux de la famille des Ostracés.

Les trois genres principaux qui composent cette famille sont les Pecten, les Spondylus et les Plicatula. Le premier offre quelques modifications dont l'importance a été diversement appréciée. Nous admettons ici, plutôt à titre de sousgenres que de genres, les divisions connues sous le nom de Hinnites, Janira, et Pecten proprement dit. Les caractères qui

les distinguent sont d'un emploi commode, quoique d'une importance médiocre, et le nombre des espèces est si considérable qu'il nous a paru avantageux de les conserver.

### GENRE HINNITES Defrance.

CARACTÈRES. Coquille inéquivalve, subéquilatérale, pourvue d'oreillettes et régulière dans le jeune âge seulement; plus tard l'adhérence de l'une des valves modifie sa croissance et la rend irrégulière. Charnière et ligament semblables à ceux des peignes. Impression musculaire très-grande et entourée par une impression palléale peu distante.

Lorsque les Hinnites sont complétement conservés, leurs caractères sont suffisamment clairs; dans le cas contraire, et surtout si le crochet manque, la disposition de l'impression palléale qui entoure de près l'attache du muscle, peut servir à les caractériser et en particulier à différencier ce genre de celui des Ostrea.

# 250. Hinnites Favrinus Pictet et Roux.

(Pl. 43, fig. 2, et pl. 44.)

H. testà crassà ovato orbiculatà, depressà; valvis concentricè squamosis et subplicatis, radiatim undulato-costatis; costis inæqualibus, squamosis, echinatis; valvà inferiore convexà; valvà superiore complanatà.

#### DIMENSIONS.

Un peu plus large que longue.

Coquille épaisse, irrégulièrement ovale; valve inférieure convexe, déformée sur la région cardinale par son adhérence; valve supérieure presque plane; toutes deux sont squammeuses, ornées de côtes rayonnantes, inégales, souvent bifur-

quées, pourvues de saillies imbriquées, surtout vers le bord palléal. Les oreillettes et la charnière manquent sur nos échantillons. L'intérieur des valves montre une impression musculaire grande et arrondie; l'empreinte palléale en est fort rapprochée.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. L'Himites Favrinus appartient évidemment au même type que l'H. Cortesii des terrains subapennins. Il a de grands rapports avec l'H. Leymerii, Deshayes, du terrain néocomien du département de l'Aube, mais il en diffère par ses côtes moins nombreuses et surtout par sa valve supérieure plane, caractères que nous avons observés sur tous nos échantillons. L'H. Leymerii a, suivant M. d'Orbigny, des valves peu inégales en convexité.

LOCALITÉ. Cette espèce a été trouvée dans les grès inférieurs de la perte du Rhône; collections de MM. Favre, Tollot et du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 45, fig. 2, Hinnites Favrinus, valve bombée, de grandeur naturelle, avec sa surface d'adhérence; — pl. 44, un autre échantillon de la même valve, vu par sa face interne, avec le sommet cassé. Les dimensions des fragments représentés dans les deux planches montrent à-peu-près les limites de variations dont l'espèce est susceptible en longueur et en largeur.

# 251. HINNITES STUDERI Pictet et Roux.

(Pl. 45, fig. 1, a, b, e, d.)

H. testâ tenui, suborbiculatâ; valvis radiatim costatis, costis inæqualibus, subundulatis, longitudinaliter interstriatis; valvâ inferiore convexâ, valvâ superiore planâ.

#### DIMENSIONS.

Largeur 45	millim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,95
- Fnaisseur	0.25

Coquille mince, irrégulièrement arrondie. Valve inférieure convexe, à oreillettes peu détachées, ornée de 20 à 25 côtes principales rayonnantes, un peu ondulées, rendant ainsi la surface légèrement bosselée. Entre ces côtes il en existe d'autres plus courtes, atteignant des hauteurs diverses et n'égalant pas en général le nombre des longues côtes. Leurs intervalles sont striés par des lignes très-fines, longitudinales (4-5 entre chaque côte). Sur le moule, les côtes sont seules visibles et les stries ne laissent pas d'empreinte. La valve supérieure est plane et ornée de côtes rayonnantes beaucoup plus nombreuses et plus sines que celles de la valve inférieure.

Rapports et différences. Cette espèce appartient à un tout autre groupe que la précédente et se rapproche surtout de quelques espèces jurassiques qui ont été d'abord décrites comme des Spondyles (Hinnites inæquistriatus, velatus, etc.). Elle est facile à distinguer de toutes les autres. Des fragments de la valve inférieure pourraient cependant paraître appartenir au Pecten Rhodani, nobis, si les côtes de ce dernier n'étaient pas plus épâtées et moins nombreuses. Les valves supérieures de ces deux espèces n'ont aucun rapport.

LOCALITÉS. Le *H. Studeri* se trouve dans le gault de la perte du Rhône, au Saxonet et au Grand Bornand. Collections du Musée Académique, du Musée de Berne, et de M. le Prof. Favre. Il n'est pas commun.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 45, fig. 1 a, moule d'une valve inférieure, fracturé, de grandeur naturelle; — fig. 1 b, moule d'une valve supérieure; — fig. 1 c, valve inférieure ayant des fragments de test sur son bord; — fig. 1 d, grossissement des stries intercostales.

#### GENRE JANIRA Schumacher.

(Pandora Megerle, non Bruguière; Neithea Drouot.)

CARACTÈRES. Coquille semblable à celle des Peignes pour tous les caractères essentiels. Valve inférieure très-convexe; valve supérieure plane ou même concave.

# 252. Janira faucignyana Pictet et Roux.

(Pl. 45, fig 2 a, b.)

J. testà convexà, trigonà; valvà inferiore convexissimà, incurvatà, concentricè striatà, radiatim 6-costatà; costis elevatis, rotundatis; intermediis sulcis latis, parum excavatis, 3-costatis, costis inæqualibus; auriculis magnis, lævigatis.

Tome XIII, 2me Partie.

#### MOLLUSQUES FOSSILES

#### DIMENSIONS.

Largeur	74 n	nillim.
Par rapport à la largeur : Longueur		0,100
— — Epaisseur (mesure approximative)		0,35
Angle apicial?	85°	

Coquille trigone, aussi longue que large; nous n'en connaissons pas la valve supérieure. Valve inférieure très-bombée, à sommet très-contourné, ornée partout de stries fines, concentriques, et pourvue de six côtes rayonnantes principales, arrondies et saillantes; les intervalles compris entre ces grosses côtes sont larges, peu excavés, presque plans et ornés chacun de trois côtes arrondies, saillantes, de moitié moins fortes que les précédentes, plus larges que les sillons qui les séparent; la côte médiane est plus grosse dans chaque intervalle que les deux latérales. Oreillettes lisses, triangulaires et enroulées.

Le moule porte l'empreinte en relief des côtes de la coquille. Les six côtes principales sont marquées sur toute leur longueur de même que la côte médiane de chaque intervalle; les côtes latérales ne sont bien visibles qu'à leur terminaison vers le bord palléal. Le bord cardinal de la facette des oreillettes est strié en travers.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est très voisine par ses ornements de la J. quadricostata d'Orb., du terrain sénonien, mais elle a un angle apicial plus ouvert et des oreillettes plus grandes.

Localités. Cette belle espèce a été trouvée au Saxonet; elle n'y est pas commune; elle a été découverte aussi à la perte du Rhône. Collections du Musée Académique et de M. Roux.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 45, fig. 2 a, Janira Faucignyana, de grandeur naturelle; — fig 2 b, moule de la même espèce.

# 253. Janira quinquecostata d'Orbigny.

(Pl. 45, fig. 3 a, b, c.)

Janira testa ovato-trigona, transversa, concentrice striata; valva inferiore convexa, radiatim 6 - costata; interstitiis sulcis complanatis, 4-costatis; costulis inæqualibus, auriculis magnis.

Pecten quinquecostat	us, Sowerby, 1814, Min. Conch., p. 121, pl. 56, fig. 48.
Pecten versicostatus,	Lamarck, 1819, Animanx sans vert., VI, p. 181, nº 14.
Pecten quinquecostat	us, Brongniart, dans Cuvier, Oss. foss., pl. L, fig. 1.
1d.	Nilsson, Petref. Suecana, pl. 9, fig. 8, pl. 10, fig. 7, p. 19.
Id.	Goldfuss, 1836, Petref. Germ., pl. 93, fig. 1.
Id.	Geinitz, 1839, Character. Kreid., p. 22.
Id.	Leymerie, 1842, Mém. Soc. Géol., t. 5, p. 27.
Id.	Forbes, 1844. Quart. Journ. of the Geol. Soc., p. 249. nº 86
	Want Dalan Vanidad to 2 20

Pecten versicostatus, Reuss, Verst. Bæhm. Kreidef., t. 2, p. 32.

Janira quinquecostata, d'Orbigny, 1846, Pal. fr., terr. crét., t. 3, p. 632, pl. 444, fig. 1-5.

Ead. d'Orb., 1850, Prodr., t. 2, p. 169.

#### DIMENSIONS.

Largeur	27	millim.
Par rapport à la largeur : Longueur		0,93
— — Epaisseur		0,40
Angle anicial sans les oreillettes	720	

Coquille ovale, trigone, transverse, couverte partout de stries concentriques très-sines. Valve inférieure très-convexe, à sommet recourbé, ornée de six côtes rayounantes principales, saillantes, arrondies, entre lesquelles sont des sillons très-larges, plans, uniformément excavés, munis chacun de quatre petites côtes inégales, les latérales toujours plus petites que les médianes. Les sillons qui les séparent sont un peu plus étroits que les côtes; nous n'avons pas la valve supérieure assez bien conservée pour la décrire.

Le moule reproduit les ornements de la coquille; les côtes y sont plus minces, elles disparaissent quelquefois en approchant du sommet.

Observation. Le nombre des côtes intermédiaires est sujet, mais rarement, à quelques variations; la région où il est le plus fixe est la partie médiane de la coquille, où l'on peut presque toujours constater l'existence de quatre côtes.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se différencie de la précédente par son angle apicial plus aigu, par sa longueur moindre et par le nombre de ses côtes intermédiaires.

HISTOIRE. Cette coquille a été souvent confondue avec ses congénères, et M. d'Orbigny a relevé avec raison à son égard, quelques erreurs de synonimie. Nous ne nous trouvons cependant pas tout-à-sait d'accord avec ce savant paléon-

tologisite sur la distribution géologique de cette espèce. M. d'Orbigny n'admet pas que la Janira quinquecostata puisse se trouver au-dessous de son étage cénomanien, et partant delà, il nie qu'on puisse lui appliquer les citations de M. Leymerie et de M. Forbes, et pense que ces auteurs se sont trompés et ont confondu avec elle la J. atava.

Il est très-difficile de discuter sur des citations non accompagnées de planches ou de descriptions. Nous devons seulement dire ici que la plus minutieuse comparaison de notre espèce avec des J. quinquecostata du cénomanien ne nous a pas offre d'autre différence que celle que cite M. E. Forbes (Quart. Journ. of the Geol. Soc., 1847, tome 5, p. 295). Cette différence consiste en ce que l'espace compris entre les bords et les côtes principales externes est plus lisse dans les échantillons du lower greensand d'Angleterre que dans ceux des étages supérieurs. Nos échantillons proviennent du gault et du terrain aptien et peu d'entre cux sont assez bien conservés pour permettre d'apprécier ce caractère avec une parfaite certitude. L'échantillon figuré qui provient du terrain aptien a ce bord lisse. Nous en avons d'autres du gault du Saxonet qui l'ont évidemment strié, et si ce caractère est suffisant pour faire admettre l'existence de deux espèces, il n'empêchera pas que la J. quinquecostata n'existe dans nos terrains, mais seulement alors peut-être dans le gault.

LOCALITÉS. La Janira quinquecostata se trouve à la perte du Rhône dans les grès inférieurs et aussi dans les couches supérieures du gault; elle n'est pas très-rare au Saxonet.

Explication des figures. Pl. 45, fig. 5 a, valve inférieure de la Janira quinquecostata, de grandeur naturelle; — fig. 5 b, la même vue de côté; — fig. 5 c, moule de la même valve.

## 254. Janira albensis d'Orbigny.

Janira albensis, d'Orbigny 1850, Prodr., t. 2, p. 139.

M. d'Orbigny indique sous le nom de J. albensis, une espèce trouvée en France dans divers gisements du gault, et à Cluse (Savoie). Il la caractérise par l'existence de cinq côtes intermédiaires (au lieu de 4), entre les côtes principales qui sont plus petites que dans la J. quinquecostata.

Nous n'avons pas trouvé cette espèce et ne la connaissons pas. Peut-être n'estelle qu'une variété de la précédente.

### GENRE PECTEN Gualtieri.

Caractères. Coquille régulière, auriculée, composé de deux valves inégales, mais toutes deux bombées, le plus souvent ornées de stries ou de côtes rayonnantes. Ligament formé de deux parties, l'une interne placée dans une fossette triangulaire, l'autre externe, linéaire, bordant l'extérieur de la région cardinale.

Les Pecten sont très-anciens sur le globe; ils sont encore nombreux aujourd'hui.

### 255. Pecter Rhodani Pictet et Roux.

(Pl. 46, fig. 1 a, b.)

P. testà depressà, subtrigonà, radiatim 12-15 costatà; costis lævigatis, rotundatis; valvà superiore subcomplanatà; valvà inferiore convexà.

### DIMENSIONS.

Largeur		85	millim.
Par rapport à la largeur :	Longueur		0,100
	Epaisseur		0,25
Angle apicial, sans les oreil	lettes	950	

Coquille très-déprimée, subtrigone, aussi longue que large; lesdeux valves ornées de stries rayonnantes et de côtes arrondies un peu déprimées, au nombre de douze environ, égales entre elles et plus larges que leurs interstices sur la valve supérieure, inégales et plus étroites que les sillons qui les séparent sur la valve inférieure; celle-ci est convexe, l'autre l'est très-peu.

A l'état de moule, les côtes sont relativement plus étroites sur les deux valves.

LOCALITÉ. La perte du Rhône, où elle est rare. Collections de M. le Professeur Favre, de M. Roux et du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 46, fig. 1 a, moule de la valve inférieure du Pecten Rhodani, de grandeur naturelle; — fig. 1 b, valve supérieure.

# 256. Pecten Raulinianus d'Orbigny.

(Pl. 42, fig. 2 a, b.)

P. testà ovato-oblongà, depressà, subæquivalvi; valvis radiatim 40-costatis; costis inæqualibus; his magnis, illis minimis, alternantibus, elevatis, transversim imbricatis, squamosis; auriculis inæqualibus, radiatim costatis, squamosis.

Pecten Raulinianus, d'Orbigny, 1846, Pal. fr., ter. crét., t. 3, p. 595, pl. 433 fig. 6-9.

Id. id. 1850, Prod., t. 2, p. 139.

#### DIMENSIONS.

Largeur	34 millim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,84
Angle apicial	840 (1)

Coquille ovale, transverse, déprimée, les deux valves presque également bombées, ornées d'une quarantaine de côtes saillantes, alternativement grandes et petites, arrondies et couvertes de lamelles transverses, relevées et imbriquées; l'alternance des côtes n'est pas très-régulière sur nos échantillons. Les sillons qui les séparent sont profonds et lisses. L'oreillette buccale supérieure, d'après M. d'Orbigny, est saillante, fortement marquée de côtes rayonnantes, égales, couvertes d'écailles imbriquées.

LOCALITÉS. Cette espèce a été recueillie à la perte du Rhône, où elle est trèsrare; on la trouve aussi au Saxonet. Collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 46, lig. 2 a, Pecten Raulinianus, de grandeur naturelle. L'échantillon qui a servi pour cette figure a moins de côtes que la plupart des autres, et il ne représente pas sous ce point de vue les échantillons moyens. — Fig. 2 b, moule de la même espèce.

<sup>(1)</sup> Le texte de la Paléontologie française indique 90°, mais la fig. 6 pl. 433 ne porte que  $84^{\circ}$  comme nos échantillons.

# 257. Pecten aptiensis d'Orbigny.

(Pl. 46, fig. 3 a, b.)

(Sous le nom de Pecten interstriatus.)

P. testà ovato oblongà, depressà, valvis radiatim costatis; costis angustatis, distantibus, tuberculis transversis, imbricatis, squamosis, brevibus ornatis; interstitiis obliquè striatis; auriculis magnis inæqualibus, rugosis.

Pecten interstiatus, Leymerie, 1842, Mém. Soc. géol., t. 5, p. 10, pl. 13.

Id. d'Orbigny, Pal. fr., terr. crét., t. 3, p. 594, pl. 433, fig. 1-5.

Pecten obliquus, Forbes, Quart. Journ. of the Geol. Soc., t. 1, p. 249 (non Sow.).

Pecten aptiensis, d'Orbigny, 1850, Prod., t. 2, p. 119.

#### DIMENSIONS.

Largeur	55	millim.
Par rapport à la largeur : Longueur		0,80
— — Longueur de la facette des oreillettes		0,45
Angle apicial, sans les oreillettes	76°	

Coquille ovale, subtriangulaire, transverse, très-déprimée, ornée de côtes rayonnantes étroites, à peu près égales, distantes, ornées de parties saillantes, imbriquées, courtes, qui deviennent plus apparentes sur les côtés. Les intervalles sont deux ou trois fois aussi larges que les côtes et marqués de stries obliques très-prononcées. Les oreilles sont grandes et striées.

M. d'Orbigny donne 20 à 25 côtes à la valve inférieure et 46 à la supérieure; nous ne connaissons bien que la première et nos échantillons ont 55 à 58 côtes. Cette différence ne nous paraît pas suffisante pour rendre douteuse la réunion de notre espèce à celle de MM. Leymerie et d'Orbigny, d'autant plus que l'exemplaire figuré par M. Leymerie a plus de côtes que celui de M. d'Orbigny.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche de quelques autres peignes des terrains crétacés qui ont aussi des stries obliques dans les intervalles des côtes; elle se distingue de toutes par ses côtes plus indépendantes, presque égales, séparées par des intervalles larges, marqués de stries distinctes et simples.

HISTOIRE. M. Leymerie, en 1842, a le premier fait connaître cette espèce sous le nom de Pecten interstriatus; ce nom a été adopté par M. d'Orbigny dans sa

Paléontologie française, et changé plus tard par ce dernier auteur contre celui de Pecten aptiensis, car le nom de interstriatus avait été donné en 1841 par le Comte de Münster à une espèce de St. Cassian. M. Forbes paraît avoir trouvé la même espèce dans le lower green sand avec l'Ostrea aquila, la Trigonia aliformis, etc., mais il l'a confondu à tort avec le Pecten obliquus de Sowerby, qui est fort dissérent. M. d'Orbigny croit que l'espèce trouvée par M. Forbes est le P. Robinal-dinus; c'est ce qu'il est impossible de décider sans description.

LOCALITÉ. Le P. aptiensis se trouve dans les grès inférieurs de la perte du Rhône; il est rare. Collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 46, sig. 3 a Pecten aptiensis, valve inférieure, de grandeur naturelle; — sig. 3 b, grossissement du test.

# 258. Pecten Dutemplei d'Orbigny.

(Pl. 46, fig. 4, a, b.)

P. testà ovato-oblongà, transversà, subæquivalvi; valvà superiore radiatim 40-50 costatà; costis rotundatis, approximatis, transversim squamis imbricatis ornatis; intermediis costis angustatis, simplicibus; sulcis transversim et obliquè striatis.

Pecten Dutemplei, d'Orb., 1845, Pal. fr., terr. crét., t. 3, p. 596, pl. 433, fig. 10-13.

1d. id. 1850, Prod., t. 2, p. 139.

### DIMENSIONS.

### (Moules.)

Largeur	24 millim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,82
Angle apicial	870

Coquille ovale, transverse, déprimée; les deux valves assez également bombées. Valve supérieure ornée de quarante à cinquante côtes rayonnantes assez saillantes, à lames imbriquées. Entre ces côtes, mais non régulièrement, on voit une autre petite côte, simple, linéaire. L'intervalle des côtes est orné de stries, les unes transversales, les autres obliques.

Le moule est lisse, sauf le bord palléal qui est strié vers la terminaison des côtes.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par ses côtes inégales, simples, et par ses sillons intercostaux plus étroits que dans l'espèce précédente, et plus irrégulièrement striés.

Localité. Le Saxonet; collection du Musée Académique.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 46, fig. 4 a, moule du Pecten Dutemplei, de grandeur naturelle, avec un fragment du test; — fig. 4 b, grossissement du test.

### 259. Pecten Saxoneti Pictet et Roux.

( Pl. 46 fig. 5.)

P. testá ovato-oblongâ, transversá, depressâ, subæquivalvi; valvâ inferiore concentricè costatâ, radiatim 42-45 decussatim costatâ; costis tenuibus, approximatis.

### DIMENSIONS

### (Moules.)

Largeur	32	millim.
Par rapport à la largeur : Longueur.		0,88
— — Epaisseur		0,30
Angle apicial		

Coquille ovale, transverse, déprimée, les deux valves à peu près également convexes. Valve inférieure ornée de 42 à 45 côtes rayonnantes, petites, égales entre elles, et de côtes concentriques de même apparence, formant de petites saillies lamelleuses à leurs points d'entrecroisement avec les premières. Nous ne connaissons pas le test de la valve supérieure, et nos échantillons ont les oreillettes cassées.

Moule lisse, ou marqué de très-faibles traces des côtes rayonnantes.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce ne saurait se confondre avec les deux précédentes; elle en diffère par l'absence de stries obliques entre les côtes, qui sont en outre plus fines.

Localité. Elle a été trouvée au Saxonet; collection du Musée Académique. Explication des figures. Pl. 46, fig. 5, P. Saxoneti, de grandeur naturelle. Tome XIII, 2<sup>me</sup> Partie.

### GENRE SPONDYLUS Gessner.

Caractères. Coquille épaisse, fixée au sol par sa valve inférieure qui est la plus convexe, et pourvue d'un talon en arrière de la charnière. Oreillettes égales et sans échancrure. Charnière composée sur chaque valve de deux grosses dents et de deux fossettes, les dents étant externes à la valve supérieure et internes à l'autre. Ligament interne placé dans une fossette médiane de la région cardinale et se prolongeant quelquefois sur le talon. Une seule impression musculaire, ovale, transverse.

Ces coquilles, souvent ornées d'épines et d'expansions foliacées, se distinguent facilement des peignes par leur épaisseur, par leur irrégularité, et surtout par leur charnière. La présence des oreillettes les sépare des plicatules.

Assez nombreux dans les terrains crétacés, les Spondyles le sont encore plus dans les mers actuelles.

## 260. Spondylus Brunneri Pictet et Roux.

(Pl. 47, fig. 1 a, b et 2 a, b.)

S. testâ crassâ, depressâ; valvâ superiore suborbiculari, convexâ, radiatim costis numerosis, inæqualibus ornatâ; costis majoribus 13-14 sparsè spiniferis, imbricatis; alteris simplicibus, ad marginem imbricatis; auriculis lævigatis; valvâ inferiore ovato-oblongâ, depressâ, lamellis foliaceis, concentricis, erectis, ornatâ.

### DIMENSIONS.

Largeur	70 millim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,90
Angle apicial	100°

Coquille épaisse, déprimée ; valve supérieure convexe, arrondie, aussi longue que large, ornée de côtes rayonnantes nombreuses, inégales, dont les principales, quoique peu saillantes, au nombre de treize environ, sont pourvues d'épines imbriquées. Leurs intervalles contiennent chacun deux ou trois côtes plus petites sans épines, mais légèrement imbriquées vers leur terminaison de même que leurs sillons. Oreillettes lisses. La valve inférieure, déprimée et pourvue d'un talon prolongé, est ornée partout de lames foliacées concentriques, redressées, et encroûtée de corps marins étrangers. Le labre est crénelé sur les deux valves.

OBSERVATIONS. Dans le jeune âge, la valve inférieure est marquée de lignes rayonnantes, simples, sans tubercules ni épines, à peu près aussi larges que les sillons qui les séparent. La valve supérieure est épineuse comme dans l'adulte, et même sur un plus grand nombre de côtes à proportion. La coquille est aussi plus gibbeuse, et elle s'accroît de manière à devenir plus déprimée; cette circonstance se remarque surtout sur la valve supérieure.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Ce Spondyle ressemble à quelques autres espèces des terrains crétacés et en particulier au S. Royanus d'Orbigny, et au S. hippuritarum Id. Il se distingue de ce dernier par les épines qui ne recouvrent qu'une partie des côtes, et du premier par sa forme plus déprimée et par ses épines plus longues.

Variété. Nous réunissons à cette espèce, qui se trouve constamment dans les grès inférieurs aptiens, une variété que nous n'avons pu observer que dans le jeune âge, et que nous n'avons vue que dans le gault (Pl. 42, fig. 2). Elle est un peu plus gibbeuse et ses côtes sont toutes plus ou moins épineuses. Ces caractères se retrouvant dans le jeune âge du Spondylus Brunneri, nous n'avons pas pu les admettre comme caractéristiques, et il nous a été impossible de trouver des modifications organiques de quelque précision pour y distinguer deux espèces. Des échantillons plus nombreux pourront résoudre plus tard cette question.

LOCALITÉ. Le S. Brunneri se trouve à la perte du Rhône, le type de l'espèce dans les grès inférieurs, et la variété dans le gault. Collections du Musée Académique, du Musée de Berne, de M. Renevier, etc.

Explication des figures. Pl. 47, fig. 1 a, b, Spondylus Brunneri, état normal de l'âge adulte, de grandeur naturelle; — fig. 2 a, b, la variété du gault, jeune, de grandeur double.

# 261. Spondylus gibbosus d'Orbigny.

M. d'Orbigny indique comme trouvé à Cluse (Savoie) un Spondyle du gault qu'il nomme S. gibbosus, et qu'il caractérise par une valve supérieure très-bombée, ornée de côtes rayonnantes simples, sans épines ni tubercules.

La figure et la description de M. d'Orbigny conviendraient fort bien à la variété du gault du Spondylus Brunneri, si ce n'était l'absence des épines sur les côtes. Il serait bien possible que les échantillons de Cluse étudiés par ce savant paléontologiste n'aient pas eu leur test complet, et que par conséquent l'espèce de Savoie dut être associée à la précédente et non à ce S. gibbosus que M. d'Orbigny a principalement observé dans le gault du département de la Meuse et des Ardennes.

### GENRE PLICATULA Lamarck.

CARACTÈRES. Coquille fixée au sol, très-déprimée. Valve inférieure convexe, la supérieure plus plane, ordinairement dépourvue d'oreillettes et non prolongée en talon. Charnière composée de deux dents divergentes en V, souvent prolongées dans l'intérieur des valves. Ligament interne situé dans une fossette médiane de la région cardinale.

Les plicatules diffèrent des spondyles par leur forme plus déprimée, par le manque d'oreillettes et par la forme des dents de la charnière.

Elles ont paru avec les terrains jurassiques et habitent encore les mers actuelles.

## 262. PLICATULA RADIOLA Lamarck.

(Pl. 47, fig. 3 a, b.)

P. testà obliquè ovali, subtrigonà, concentricè striatà et lamellosà, supernè plano-concavà, infernè convexà; costis 7-8 radiantibus, elevatis, spinosis.

#### SYNONIMIE.

P. radiola, Lamarck. 1819, Anim. sans vert., t. 6. p. 185, nº 7.

Ead. 1d. 2e édition, t. 7, p. 177, no 7.

P. pectinoïdes, Sowerby, 1823, Min. Conch., pl. 409.

P. inflata, Sowerby, 1823, Min. Conch., pl. 409,

P. pectinoïdes, Leymerie, 1842, Mém. Soc. Géol., t. 5, p. 27.

P. radiola, d'Orbigny, 1847, Pal. fr., terr. crét., tome 3, p. 683, pl. 463, fig. 1-7.
 Ead. Id. 1850, Prod., p. 139.

Coquille ovale, très-oblique, parfois triangulaire, très-inéquivalve; la valve supérieure concave, ornée de 8 à 9 côtes rayonnantes arrondies, peu élevées. faiblement épineuses, aussi larges que les sillons qui les séparent; valve inférieure convexe, ornée de 7-8 côtes rayonnantes, anguleuses, épineuses, qui partent du sommet et entre quelques-unes desquelles s'intercalent souvent 1 ou 2 autres côtes avant leur terminaison. Les deux valves sont striées en travers et concentriquement lamelleuses.

LOCALITÉ. La perte du Rhône; elle n'y est pas commune. Le Musée de Berne en possède un exemplaire du Reposoir.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 47, fig. 5 a, b, Plicatula radiola, de grandeur naturelle.

## 263. PLICATULA GURGITIS Pictet et Roux.

(Pl. 47, fig. 4 a, b.)

P. testà obliquè ovali, supernè plano-concavâ, infernè convexâ, radiatim in utrâque facie costis spinulosis ornatâ, concentricè striatâ et lamellosâ.

Coquille ovale, oblique, parfois très-inéquivalve; la valve supérieure plane ou concave, la valve inférieure convexe; toutes deux sont ornées de côtes rayonnantes épineuses, rapprochées, au nombre de dix à onze vers le sommet des valves et de vingt à vingt-deux vers le bord palléal par suite de l'intercalation assez régulière d'une côte intermédiaire entre chacune de celles qui partent du crochet; toutes deux sont pourvues de stries transverses et concentriquement lamelleuses.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, très-voisine de la P. radiola, nous paraît devoir en être distinguée par sa forme moins oblique, par ses côtes plus

nombreuses, plus faiblement épineuses, plus également distribuées, et par ses lamelles concentriques plus rapprochées entre elles. Ces différences sont surtout appréciables sur la valve supérieure où les côtes sont beaucoup plus étroites.

LOCALITÉ. La perte du Rhône où elle n'est pas rare; toutes les collections.

Explication des figures. Pl. 47, fig. 4 a, b, Plicatula gurgitis, de grandeur naturelle.

# 264. PLICATULA PLACUNEA Lamarck.

(Pl. 47, fig. 5 a, b.)

(Sous le nom de P. strigilis.)

P. testà obliquè ovali vel suborbiculari, costis radiantibus, spinosis, ornatà; interstitiis spinosulo costatis; valvà superiore plano-concavà; valvà inferiore convexà.

Plicatula placunea, Lamarck, 1819, Anim. sans vertèbres, t. 6, p. 186, n° 8.

Spondylus strigilis, Alex. Brong., 1822, dans Cavier Oss. foss., 4° éd., pl. Q, fig. 6.

Plicatula placunea, Leymerie, Mém. Soc. Géol., t. 5, p. 27, pl. 13, fig. 2.

Ead. Matheron, Catal., p. 189.

Ead. Forbes, 1844, Quart. Journ. of the Geol. Soc., t. 1, p. 249.

Ead. d'Orb., 1847, Pal. fr., terr. crét., t. 3, p. 682, pl. 462, fig. 11-18.

Ead. 1d. 1850, Prod., t. 2, p. 119.

### DIMENSIONS.

Coquille obliquement ovale ou suborbiculaire, la valve supérieure un peu concave, la valve inférieure convexe, toutes deux ornées d'environ huit côtes principales pourvues d'épines imbriquées; entre ces côtes et à moitié chemin il en naît le plus souvent d'autres de même grandeur à peu près et de même contexture; les intervalles qui séparent ces deux ordres de côtes, en présentent encore d'autres beaucoup plus petites, également pourvues d'épines imbriquées, s'étendant sur toute la largeur de la coquille, mais plus nombreuses au pourtour qu'au sommet. Les deux valves présentent quelques plis concentriques lamelleux. La valve inférieure était adhérente aux corps sousmarins par son sommet qui est toujours plus ou moins déformé.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se différencie facilement des P. radiola et gurgitis par les petites côtes qui ornent les intervalles des côtes principales dans toute leur longueur.

HISTOIRE. La première indication dans laquelle on puisse reconnaître cette espèce, est celle de Bronguiart dans sa description des environs de Paris. Ce savant géologue lui a il est vrai, ajouté d'un côté une petite oreillette qui pourrait à la rigueur faire contester son identité, si les ornements de la coquille n'étaient pas assez précis pour ôter toute espèce de doute. Les auteurs qui ont écrit depuis, ont rapporté à l'espèce qui nous occupe une description de Lamarck, appliquée avec doute à une plicatule fossile des environs de Paris. Suivant nous, cette description est trop brève pour caractériser une espèce avec quelque certitude; mais MM. Leymerie, Forbes et d'Orbigny étant d'accord pour accepter ce rapprochement, et dans ce cas le nom de Lamarck devant prendre son rang d'ancienneté, nous n'avons aucune objection à nons ranger à la même manière de voir.

LOCALITÉ. La Plicatula placunea n'est pas rare dans les grès inférieurs de la perte du Rhône.

Explication des figures. Pl. 47, fig. 5 a, b, Plicatula placunea, de grandeur naturelle.

# 4me Famille: OSTRACIDES.

Caractères. Coquille inéquivalve, plus ou moins irrégulière, à test lamelleux, fixée par la valve inférieure qui est la plus profonde, et dont le sommet est plus ou moins contourné. Charnière sans dents. Une grande impression musculaire sur la région anale et une seconde en dedans audessous de la fossette du ligament.

Les mollusques de cette famille sont caractérisés par l'absence complète de pied. Nous n'avons trouvé dans les grès verts que le genre des Huîtres (Ostrea), auquel nous réunissons les Gryphées et les Exogyres qui n'en diffèrent que par des caractères tout-à-fait artificiels.

### GENRE OSTREA Linné.

# (Ostrea et Gryphæa Lamarck, Exogyra Say.)

Ce genre qui renferme des espèces très-nombreuses, et que leur irrégularité rend souvent difficiles à déterminer, a paru avec les terrains triasiques et paraît avoir augmenté de nombre jusqu'à l'époque actuelle.

# 265. OSTREA AQUILA d'Orbigny.

(Pl. 48)

O. testà crassà, ponderosà, arcuatà vel triangulari, concentricè lamelloso-plicatà; valvà superiore complanatà, valva inferiore convexà, obtusè carinatà; umbone contorto.

### SYNONIMIE.

Gryphæa sinuata, Sowerby, 1822, Min. Conch., pl. 336 (non Ostrea sinuata Lam. 1819), du lower greensand d'Angleterre.

*Gryphæa aquila*, Brongniart, 1822, dans Cuvier Ossem. foss.,  $4^e$  ed., pl. Q., fig. 11 a,b,c, de la perte du Rhône.

Exogyra aquila, Goldíuss, 1834, Petref. Germ., t. 2, p. 36, pl. 87, fig. 3, du grès vert de Westphalie.

Exogyra sinuata, Roëmer, 1841, Nord-Deutsch. Kreideg., p. 47, de l'Hilsthon et de l'Hilsconglomerat.

Gryphæa sinuata, E. Forbes, 1844, Quart Journ. of the Geol. Soc., t. 1, p. 250, du lower greensand.

Ostrea aquila, d'Orbigny, 1846, Pal. fr., terr. crét., tome 3, p. 706, pl. 470, de l'étage aptien.

Ostrea aquila, Id. 1850, Prodrôme, t. 2, p. 120, du même étage.

#### DIMENSIONS.

Variété	oblongue	: Diamètre 18	50 millim.
_	<del></del> ,	- Longueur	20 —
		Epaisseur	55 —
Variété	triangulai	re: Diamètre 9	)5 —
e toronto	_	Lougueur	27 —
<del></del> ·		Epaisseur	34 —

Coquille épaisse, arquée, oblongue, ou triangulaire et large, ornée en dessus et en dessous de rides lamelleuses concentriques (anguleuses dans le jeune âge, arrondies plus tard, d'Orb.). Valve supérieure plane, arrondie sur le labre; valve inférieure très-épaisse, profonde, arrondie ou obtusément carénée. Crochets fortement contournés, séparés et distants.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce ne ressemble à aucune autre du même terrain. Voisine par sa forme de l'O. Couloni du terrain néocomien, elle en diffère principalement par le manque de nodosités et de côtes.

HISTOIRE. M. Alex. Brongniart a le premier mentionné et figuré cette espèce sous le nom de *Gryphæa aquila*; nous avons eu sous les yeux les deux échantillons de la collection de M. De Luc qui lui avaient été communiqués et qui sont encore étiquetés de sa main; il proviennent du grès vert inférieur de la perte du Rhône et les nôtres leur sont identiques

Localité. La perte du Rhône où elle n'est pas rare; toutes les collections.

Explication des figures. Pl. 48, fig. 1 a, valve inférieure de l'Ostrea aquila; fig. 1 b, un exemplaire, variété allongée, vu par sa valve supérieure.

# 266. OSTREA RAULINIANA d'Orbigny.

(Pl. 50, fig. 1 a, b, c.)

O. testà depressà, auriculatà; valvà superiore ovali, complanatà, subexcavatà, concentricè substriatà, externè incrassatà longitudinaliterque plicatà; valvà inferiore in latere buccali elevatà, non carinatà, concentricè obtusè plicatà; margine interiori valvarum externè crenulato; umbonibus involutis, obtusis.

TOME XIII, 2me PARTIE.

Ostrea Rauliniana, d'Orbigny, 1846, Pal. fr., Terr. crét., t. 3, p. 708, pl. 471, fig. 1—3.

Ead. d'Orb., 1850, Prod., t. 2, p. 139.

Coquille déprimée, arquée, auriforme. Valve supérieure plane et même excavée, marquée de stries concentriques peu apparentes; son bord buccal est épaissi et pourvu de plis lamelleux qui en suivent le contour. Valve inférieure ornée de lignes d'accroissement, relevée à la région buccale, de manière à former un côté presque vertical s'unissant à la région anale par un contour arrondi. Les deux valves sont crénelées en dedans sur leur bord externe. Les crochets sont obtus et contournés en spirale.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère de l'O. haliotidea du terrain cénomanien, par sa forme plus arquée, par l'absence de carène sur la valve inférieure et par son sommet situé en dehors du retour du labre.

OBSERVATIONS. Le Musée Académique possède quelques moules recueillis au Saxonet, qui nous paraissent se rapporter à l'O. Rauliniana; il en possède encore un autre de la même localité, de forme auriculaire également et ayant appartenu à une espèce extrêmement semblable à l'O. haliotidea, sinon identique. Le côté buccal relevé de la valve inférieure s'unit à angle presque droit à l'autre côté de la valve, de façon que la coquille était carénée en dessous; son bord externe est crénelé comme celui de l'O. Rauliniana.

LOCALITÉS. La perte du Rhône, dans les grès inférieurs; espèce très-rare. Collection de M. Tollot; ce n'est qu'avec doute que nous citerions le Saxonet.

Explication des Figures. Pl. 50, fig. 1 a, Ostrea Rauliniana, vue par sa face supérieure; — fig. 1 b, la même, vue par sa face inférieure; — fig. 1 c, la même, vue de côté.

## 267. Ostrea canaliculata d'Orbigny.

(Pl. 50, fig. 2 a, b, c.)

O. testâ inflatâ, irregulari; valvâ superiore subovali, complanatâ, lamellis concentricis, erectis, distantibus ornatâ; valvâ inferiore convexâ, globulosâ; concentricè lamellosâ; umbone involuto.

Chama canaliculata, Sowerby, 1813.

Gryphæa canaliculata, Sowerby, 1816, Min. conch., pl. 26, fig. 1 a, b, du grès vert. Ostrea lateralis, Goldfuss, 1834, Petref. German., tome 2, p. 24, pl. 82, fig. 1, du grès vert de Westphalie.

Ostrea lateralis, Roemer, 1841, Nord-Deutsch. Kreidegeb., p. 46, de l'Hils conglomerat. Ostrea canaliculata, d'Orbigny, 1847, Paléont., t. 3, p. 709, pl. 471, fig. 4-8.

Ead. d'Orb., 1850, Prod., t, 2, p. 139.

Coquille irrégulière, arrondie ou ovale. Valve supérieure operculiforme, plane ou concave, arquée, à sommet contourné, ornée de lames concentriques saillantes, espacées; valve inférieure irrégulière, variable de forme, le plus souvent semiglobuleuse, déformée et tronquée sur la partie adhérente, lisse, pourvue de lignes d'accroissement lamelleuses, espacées, formant un angle assez marqué et d'une expansion du côté anal; son sommet, quelquefois libre, est adhérent et contourné sur presque tous nos échantillons.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par les lames redressées de sa valve supérieure, par sa valve inférieure semiglobuleuse et profonde, et par l'angle que forment les stries d'accroissement.

LOCALITÉ. La perte du Rhône; collections des Musées de Genève et de Berne; espèce rare.

Explication des figures. Pl. 50, fig. 2 a, Ostrea canaliculata, vue par sa face inférieure; — fig. 2 b, la même, vue par sa face supérieure; — fig. 2 c, valve inférieure de la même avec une surface d'adhérence.

# 268. Ostrea arduennensis d'Orbigny.

(Pl. 47, fig. 6, a-f.)

O. testà arcuatà, angulosà; valvà superiore semilunari, planà, sublævigatà, externè plicatà; latere palleali acutè angulato; valvà inferiore convexà, angulosà, subcarinatà; labro producto, elongato; umbone involuto.

Ostrea arduennensis, d'Orbigny, 1846, Paléont. fr., terr. crét., t. 3, p. 711, pl. 472, fig. 1—4.

Ead. Id. Prod., 1850, t. 2, p. 139.

Diamètre	23	${\it millim}.$
Longueur	13	_

Espèce régulièrement arquée, anguleuse. Valve supérieure de forme sémilunaire, plane, ornée en dehors de plis longitudinaux. Valve inférieure assez convexe en dessous, divisée en deux parties presque égales par une saillie anguleuse; elle est marquée de ligne d'accroissement.

Moule lisse.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par sa petite taille et par sa forme arquée et régulièrement anguleuse en dessous.

LOCALITÉS. La perte du Rhône, collection du Musée Académique; le Saxonet, collection de M. le Prof. Favre.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 47, fig. 6 a, b. c, O. arduennensis, de grandeur naturelle; — fig. 6 d, un échantillon de la même espèce plus grand; — fig. 6 e, f. moule de la même espèce.

### 269. Ostrea allobrogensis Pictet et Roux.

(Pl. 49, fig. 1 a, b, c.)

O. testâ crassâ, transversâ, ovatâ; valvâ inferiore ponderosâ, profundâ, subtùs angulatâ, carinatâ, costatâ; costis 25, arcuatis, obliquis, angulatis, obtusis, crenulatis, transversim striatis. Umbone angustato, subrecto.

Coquille épaisse, transverse, ovale, rétrécie et anguleuse vers son sommet, élargie vers son milieu; valve supérieure inconnue; vave inférieure profonde, anguleuse et carénée en dessous; de chaque côté de la carène, qui n'occupe que la partie postérieure du dos de cette valve, partent sept à huit côtes, dont quelques-unes se bifurquent ou même se trifurquent; ces côtes dont le nombre total est ainsi porté à vingt-cinq environ sont arquées, pourvues de pointes épineuses, striées en travers et dirigées obliquement en avant et en dehors des deux côtés de l'arête dorsale; à leur terminaison elles forment des dentelures aigues et fortes, longues sur le bord palléal, courtes partout ailleurs. Crochet droit et pointu. Empreinte musculaire ovale et saillante; intérieur de la valve lisse, un peu boursoufflé.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue de l'O. Milletiana, avec laquelle elle a des rapports d'ornements, par sa coquille très-épaisse, par sa forme

très-convexe, dilatée dans le milieu et rétrécie vers le sommet, et par ses côtes quelquesois bisurquées, bien plus longues, et ayant un point de départ différent. Elle nous paraît assez voisine de l'O. santonensis d'Orbigny, du terrain sénonien, si, comme il est à présumer, la valve supérieure que nous ne connaissons pas, présente la même conformation que la valve inférieure; elle en disfère cependant par sa forme moins oblongue, plus large au centre et plus convexe.

LOCALITÉ. Grès inférieurs de la perte du Rhône; nous n'en connaissons qu'une valve faisant partie de la collection de M. Roux.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 49, fig. 1 a. b, c, valve inférieure de l'O. allobrogensis, de grandeur naturelle.

# 270. Ostrea Milletiana d'Orbigny.

(Pl. 49, fig. 3 a, b.)

O. testà oblongà, arcuatà, inflatà; valvis convexis, subtùs bifuriàm costatis; costis latis, obliquis, obtusis, crenulatis, transversim striatis.

Ostrea Milletiana, d'Orbigny, 1846, Pal. fr., terr. crét., t. 3, p. 712, pl. 472, fig. 5-7.

Ead. Id. 1850, Prod., t. 2, p. 139.

Coquille oblongue, arquée, presque aussi large que haute, d'une égale largeur partout, et pourvue d'une légère expansion des deux côtés de la région cardinale. Les deux valves sont également bombées en dehors sans dépression aucune, et ornées de côtes qui partent alternativement de chaque côté de leur partie médiane, d'une manière irrégulière. Ces côtes sont au nombre de dix à seize chez les adultes, obliques, à angle obtus, fortement striées en travers et pourvues de distance en distance de pointes saillantes. Elles forment sur le bord des valves des dents longues et aigués. Le crochet est un peu latéral ainsi que la fossette du ligament. L'intérieur des valves est légèrement boursoufflé.

Rapports et différences. Cette espèce est parfaitement caractérisée par ses côtes anguleuses formant sur les bords des valves des dents longues et aiguës, et par sa largeur égale sur toute sa longueur.

LOCALITÉ. La perte du Rhône où elle est rare. Collections de M. Tollot, de M. Roux, des Musées de Genève et de Berne.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 49, fig. 5 a, b, O. Milletiana, de grandeur naturelle, échantillon appartenant à M. Tollot.

### 271. OSTREA HARPA Goldfuss.

(Pl. 49, fig. 2 a, b, c.)

O. testà ovato-oblongà, subarcuatà; valvà superiore concavà, radiatim striatocostatà, externè incrassatà et longitudinaliter undato-lamellosà; valvà inferiore convexiusculà, subcarinatà, concentricè striatà, costis inequalibus, rotundatis, subradiantibus
ornatà; umbone laterali, involuto.

Ostrea harpa, Goldfuss, 1834, Petref. Germaniæ, pl. 87, fig. 7.

1d. Roemer, 1841, Kreidegeb., p. 48, nº 10.

Id. Forbes, 1844, Quart. Jour. of the Geol. Soc., t. 1, p. 250, pl. 3, fig. 12,

Id. Leymerie, 1842, Mém. Soc. Géol. de France, t. 5, p. 28.

Coquille ovale, allongée, un peu arquée. Valve supérieure ornée de rides et de petites côtes, confusément rayonnantes, concave au milieu, amincie sur le bord anal, relevée et épaissie du côté buccal où son bord est marqué de rides lamelleuses ondulées. Valve inférieure excavée, mince, divisée en dessous par une carène mousse en deux parties inégales; elle est pourvue de rides concentriques et de côtes inégales arrondies dont quelques-unes se bifurquent ou se trifurquent près de leur terminaison; ces côtes partent du voisinage du crochet et de là divergent: quelques-unes restent sur le côté anal, la plupart passent sur la carène et vont orner le côté buccal. L'extrémité palléale est un peu anguleuse; le sommet est adhérent et fortement contourné.

Rapports et différences. Très-voisine de l'O. flabella d'Orbigny, de l'étage cénomanien, elle ne s'en distingue que par sa forme un peu moins arquée, plus étroite et par la profondeur rélative plus grande de sa valve inférieure qui est ornée de plis plus réguliers. Elle est également voisine des jeunes individus de l'O. Boussingaultii de l'étage néocomien; elle en diffère toujours cependant par sa forme moins arquée, par les côtes plus nombreuses et moins grosses de sa valve inférieure, et par sa valve supérieure plus operculiforme. L'O. harpa paraît d'ailleurs rester toujours plus petite.

HISTOIRE. L'espèce que nous décrivons ici est certainement celle que MM. Leymerie et Forbes ont désignée sous le nom de O. harpa et rapportée à l'O. harpa de Goldfuss. M. d'Orbigny nie l'existence de cette espèce, et rapporte les citations de MM. Forbes, Roemer et Leymerie à l'O. Boussingaultii. Il considère la figure de Goldfuss comme ne représentant qu'une jeune de l'O. flabella du même auteur, association qui paraît peu probable, car ces deux coquilles n'ont pas été trouvées dans le même terrain. Le résultat de l'opinion de M. d'Orbigny serait que l'espèce qui nous occupe se trouverait depuis le terrain néocomien inférieur jusqu'au terrain aptien. Nous avons donné ci-dessus les motifs qui nous empêchent d'admettre la réunion de l'O. harpa et de l'O. Boussingaultii; nous reconnaissons cependant que nous n'avons pas eu une série suffisante de cette dernière espèce à ses diverses âges pour arriver par la comparaison à une certitude complète.

LOCALITÉ. Les grès inférieurs de la perte du Rhône. Collections du Musée de Berne et du Musée de Genève.

Explication des figures. Pl. 49, fig. 2 a, b, c, Ostrea harpa, de grandeur naturelle.

### **QUATRIÈME CLASSE.**

# BRACHIOPODES.

Les Brachiopodes ont de nombreux points de contact avec les Lamellibranches, dans leur coquille bivalve, dans leurs lobes du manteau disposés de même et dans l'imperfection générale de leur organisme. Ils en diffèrent : 1° par leur bouche qui est située sur la ligne médiane de manière à partager leur corps en deux parties symétriques à droite et à gauche, tandis que dans les Lamellibranches la bouche est d'un côté de cette ligne et l'anus de l'autre. 2° par leur coquille équilatérale, conséquence de l'organisation précédente. 3° par l'absence de pied et par la présence au contraire fréquente de bras charnus, ciliés, plus ou moins rétractiles. L'animal est tantôt libre, tantôt fixé par un pédicule musculeux, tantôt adhérent par sa coquille.

M. d'Orbigny divise les Brachiopodes en deux ordres, les Brachidés qui ont des bras et qui sont toujours réguliers et les Cirrhidés qui n'ont pas de bras et qui sont le plus souvent irréguliers. Nous n'avons trouvé aucun représentant de cette seconde division. Les espèces que nous avons observées appartiennent toutes à l'ordre des Brachiopodes Brachidés.

Parmi les nombreuses familles qui ont été établies dans ces dernières années, deux seulement sont représentées dans nos grès verts. Celle des Rhynchonellides est caractérisée par ses bras très-extensibles, soutenus par des apophyses brachiales internes; dans l'étude des fossiles, ses caractères les plus apparents sont la structure fibreuse et non perforée de la coquille, sa surface souvent couverte de côtes rayonnantes, et son crochet percé par une ouverture pour le passage du muscle.

Celle des Térébratulides se distingue par ses bras fixes, coudés, soutenus par une charpente osseuse en anse. Leur coquille a une structure perforée, une surface souvent lisse et plus rarement pourvue de côtes. Leur crochet est également percé par une ouverture.

## 1re Famille: RHYNCHONELLIDES.

Caractères. Coquille libre, bombée, de contexture fibreuse; grande valve percée par une ouverture avec ou sans area.

Les espèces que nous avons trouvées se rapportent toutes au genre des Rhynchonelles.

GENRE RHYNCHONELLA Fischer.

(Hypothiris Phillips, Cyclothiris M. Coy.)

CARACTÈRES. Coquille bombée, sans area; ouverture de la grande valve bordée d'un bourrelet et séparée de la char-Tome XIII, 2<sup>me</sup> Partie. 42 nière par un deltidium double. Cette coquille est ordinairement ornée de côtes rayonnantes.

Les Rhynchonelles paraissent dater de l'époque dévonienne et avoir duré jusqu'à la fin de la période crétacée. Elles manquent aux terrains tertiaires et aux mers actuelles.

# 272. RHYNCHONELLA LATA d'Orbigny.

(Pl. 50, fig. 3, 4.)

R. testá transverso-triangulari, subdepressâ, radiatim 32-48 costatâ; costis obtusè acutis, rectis; latere palleali sinuato, sinu 8-11 costato; umbone acuto, subtùs lævigato.

Terebratula gallina, Al. Brongniart, 1822, dans Cuv. Oss. foss., 4e édition, p. 174 (non T. gallina id., p. 149, pl. Q., fig. 2).

- T. lata, Sowerby, 1825, Miner. Conch., pl. 502, fig. 1.
- T. latissima, Morris, 1843, Catalogue, p. 134.
- T. latissima? Roemer, 1840, Kreidegeb., p. 37, pl. 7, fig. 4.
- T. gallina 1d. id. p. 37.
- Rhynchonella lata, d'Orbigny, 1847, Pal. fr., terr. crét., t. 4, p. 21, pl. 491, fig. 8-17.

  Ead. Id. 1850, Prod. t. 2, p. 108.

### DIMENSIONS. 1

Largeur 30 m	nillim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,80
— — Epaisseur	0,50
Angle apicial 90°-	-98°

Coquille plus large que longue, triangulaire, fortement élargie sur la région palléale qui est ordinairement tronquée et ornée de 52 à 48 côtes rayonnantes, droites, assez égales, anguleuses. Le crochet est court, aigu, peu arqué, lisse sur la dépression qui environne le deltidium. La grande valve est peu convexe et pré-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour les Brachiopodes, la largeur est la distance du bord droit au bord gauche de la coquille et la longueur se mesure du crochet au bord palléal.

sente une forte dépression tantôt médiane, tantôt plus ou moins déviée qui comprend 8 à 11 côtes. La petite valve est bombée et pourvue d'une saillie correspondant à la dépression de la valve opposée, en sorte que la commissure palléale est sinueuse. L'ouverture est tubuleuse. La commissure latérale est presque droite jusqu'à la région palléale où elle se contourne brusquement.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est caractérisée par sa forme large, par son crochet court et aigu, lisse sur la surface excavée qui entoure l'ouverture, et par ses côtes anguleuses, tranchantes.

Histoire. Cette espèce a été indiquée par M. Alex. Brongniart parmi les fossiles de la glauconie crayeuse de la perte du Rhône, sous le nom de Terebratula gallina, et assimilée par cet auteur à la T. gallina de la craie chloritée du Hâvre, espèce que M. d'Orbigny réunit à sa Rhynchonella compressa. Cette assimilation de M. Brongniart était inexacte, et les échantillons dont il s'est servi pour la faire et qui sont étiquetés de sa main dans la collection de M. DeLuc, sont des Rhynchonella lata de l'étage néocomien supérieur de la perte du Rhône. Elle a été décrite en 1825 par Sowerby sous le nom de T. lata; mais cet auteur ayant déjà donné ce nom à une Térébratule de l'oolithe (Min. Conch., pl. 100, fig. 2), les auteurs Anglais ont été généralement d'accord pour changer ce nom en celui de T. latissima. Elle est désignée ainsi par MM. Morris, Ed. Forbes, etc., et paraît caractéristique du lower greensand. Ce changement n'est plus nécessaire, la T. lata restant dans le genre des Térébratules et celle-ci passant dans celui des Rhynchonelles.

M. Roëmer indique dans le Hilsconglomérat des environs de Essen deux espèces voisines. Il nomme l'une T. gallina, et sa courte description convient bien à celle de la perte du Rhône. Il désigne l'autre sous le nom de T. latissima, et si ce n'était qu'elle a les plis arrondis, la description et la figure semblent se rapporter à la même.

M. d'Orbigny réunit à cette espèce les T. elegans et plicatilis de Leymerie. Ces espèces n'étant pas décrites dans le mémoire cité, il nous est impossible d'apprécier la justesse de ces rapprochements.

Observations. Cette espèce est sujette à quelques variations; on voit en particulier des individus beaucoup plus déprimés que le type normal. Nous avons fréquemment trouvé au Saxonet à l'état de moule une variété plus distincte (pl. 50, fig. 4 a, b, c. d) dont les côtes un peu noucuses semblent indiquer que sur le test

ces parties étaient squammeuses et ornées d'imbrications disposées en lignes concentriques. Ces moules ont aussi la dépression palléale plus large, moins profonde et souvent très-déviée.

LOCALITÉS. La R. lata se trouve dans les grès verts inférieurs et dans le néocomien supérieur de la perte du Rhône. Au Saxonet, au grand Bornand, au Reposoir, etc., elle est associée aux fossiles du gault.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 50, fig. 3 a, b, c. d, R. lata, des grès inférieurs de la perte du Rhône, de grandeur naturelle; — fig. 4 a, b, c, d, variété provenant du Saxonet.

# 273. RHYNCHONELLA SULCATA d'Orbigny.

T. sulcata, Parkinson, Trans. of the Geol. Soc., vol. 5, p. 59.
 R. sulcata, d'Orbigny, 1847, Pal. fr., ter. crét., t. 4, p. 26, pl. 495, fig. 1-7.
 Ead. Id 1850, Prod., t. 2, p. 140.

M. d'Orbigny rapporte à cette espèce la T. Gibbsiana Sow. des grès inférieurs au gault des environs de Folkestone. M. Forbes la considère comme une espèce distincte.

Cette espèce est citée de la perte du Rhône dans la paléontologie française. Nous n'en connaissons que des moules qui ne nous ont pas permis une détermination positive. L'on peut constater sur ces moules, la présence de côtes nombreuses, mais on ne peut pas reconnaître la forme arrondie et non anguleuse de ces côtes, et surtout on ne peut pas discerner si les crochets étaient recouverts sur toute leur surface de petites côtes et manquaient de la partie latérale lisse excavée qui entoure l'ouverture de la R. lata.

Nous considérons toutefois comme probable que la R. sulcata se trouve dans le gault de la perte du Rhône et des Alpes de la Savoie, et quelques-uns des moules de Rhynchonelles que nous y avons recueillis, sans pouvoir se distinguer suffisamment de ceux de la R. lata, correspondent à la description de la R. sulcata par une partie de leurs caractères.

# 274. RHYNCHONELLA EMERICI d'Orbigny.

(Pl. 50, fig. 6 a-d.)

R. testà rotundato triangulari, depressà, radiatim 13-costatà, costis regularibus, obtusis, valvà superiore subconvexà, in medio depressà.

Rhynchonella Emerici, d'Orbigny, 1847, Pal. fr., terr. crét., t. 4, p. 28, pl. 495, fig. 13—17.

Ead. Id. 1850, Prodr., t. 2, p. 140.

Largeur	19 mil	lim.
Par rapport à la largeur : Longueur	(	0,92
— — Epaisseur	•	0,50
Angle apicial	100°	

Coquille arrondie un peu triangulaire, très-déprimée, ornée de 15 côtes rayonnantes, simples, assez égales, formées de deux faces planes se rencontrant sous un angle obtus, et formant une arête régulière. Valves également bombées, la supérieure marquée près du bord palléal d'une dépression renfermant quatre côtes.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce ne peut être confondue avec aucune de celles que nous avons trouvées. M. d'Orbigny la compare à la R. paucicosta et la différencie par le nombre et par la forme de ses côtes.

Localité. La R. Emerici a été trouvée au Saxonet. Collections du Musée Académique et de M. le Prof. Favre.

Explication des figures. Pl. 50, fig. 6 a, Rhynchonella Emerici, de grandeur naturelle, vue par sa face inférieure; — fig. 6 b, la même, vue par sa face supérieure; — fig. 6 c, la même, vue de profil; — fig. 6 d, la même, vue par sa région palléale.

# 275. RHYNCHONELLA POLYGOVA d'Orbigny.

(Pl. 50, fig. 7, a-d.)

R. testâ subpentagonâ, inflatâ, radiatim 36-40 costatâ; costis subangulatis, regularibus; valvâ superiore convexiusculâ, valvâ inferiore maximè convexâ; sinu lato 44-costato.

Rhynchonella polygona, d'Orbigny, 1847, Pal. fr., terr. crét., t. 4, p. 30, pl. 496, fig. 1-4.

> Ead. Id. 1850, Prod., t. 2, p. 140.

### DIMENSIONS.

Largeur	26 millim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,100
— — Epaisseur	0,70
Angle apicial	80° à 90°

Coquille très-renflée, subpentagone, ornée de 36 à 40 côtes rayonnantes, régulières, un peu anguleuses. Valve supérieure peu convexe, aplatie et même excavée dans le sens de la largeur. Valve inférieure très-bombée. Commissure palléale présentant un large sinus anguleux, droit au milieu, relevé sur les côtés, pourvu de 11 côtes environ; ce sinus est quelquefois arrondi sur sa partie médiane au lieu d'être droit.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. La forme pentagone de cette espèce suffit pour la faire reconnaître facilement.

Localités. Le Saxonet et le grand Bornand; elle s'y trouve fréquemment; il en existe dans la collection de M. Tollot un jeune individu recueilli à la perte du Rhône.

Explication des figures. Pl. 50, fig. 7 a, b, c, d, Rhynchonella polygona, de grandeur naturelle.

# 276. RHYNCHONELLA ANTIDICHOTOMA d'Orbigny.

(Pl. 50, fig. 5 a-q.)

R. testà depressà, transversà, radiatim inequaliter costatà; latere cardinali costis 30-40, latere palleali 15-18 ornatâ; valvâ superiore convexiusculâ, in medio depressâ; sinu 3-6 costato.

Terebratula antidichotoma, Buvignier, 1843, Mém. de la Soc. phil. de Verdun, t. 2, p. 13, pl. 5, fig. 7 (teste d'Orbigny).

Géol des Ardennes, p. 533, pl. 4, fig. 8. Ead. 1d. Rhynchonella antidichotoma, d'Orbigny, 1847, Pal. fr., terr. crét., t. 4, p. 31, pl.

500, fig. 1-4. Ead. 1850, Prodr., t. 2, p. 140. Id.

### DES GRÈS VERTS.

#### DIMENSIONS.

Largeur	31 millim.
Par rapport à la largeur : Longueur	0,75 à 80
— — Epaisseur	0,50 à 55
Angle apicial	105° à 110°

Coquille transverse, déprimée, triangulaire, figurant un angle obtus à son sommet, élargie et plus ou moins tronquée sur la région palléale. Elle est ornée sur la région cardinale, de côtes petites nombreuses et rapprochées entre elles, qui vers le milieu de la longueur de la coquille se réunissent le plus souvent par deux, quelquefois par trois ou quatre, pour former de grosses côtes anguleuses au nombre de 15 ou 18 s'étendant jusqu'à la circonférence. La valve supérieure, très-peu convexe, est plus ou moins abaissée sur la région palléale et le sinus qu'elle présente contient 5-6 côtes. La petite valve est plus bombée.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Les côtes anastomosées qui caractérisent cette espèce la différencient complétement des autres Rhynchonelles du gault.

Localités. Le Reposoir et le Saxonet, elle n'est pas rare.

Explication des figures. Pl. 50, fig. 5 a, R, antidichotoma, de grandeur naturelle; — fig. 5 b-e, moule de la même espèce, vu sous différents aspects; — fig. 5 f, g, moule d'un jeune individu.

Nous possédons encore, soit de la perte du Rhône, soit des Alpes de la Savoic, d'autres espèces de Rhynchonelles; ces échantillons étant à l'état de moules, nous préférons les passer sous silence, plutôt que d'en faire des espèces dont les descriptions seraient nécessairement incomplètes.

# 2<sup>me</sup> Famille: TÉRÉBRATULIDES.

Caractères. Coquille libre, bombée, à test perforé; grande valve percée par une ouverture; area souvent très-développée. Charnière formée par deux dents latérales. Nous réunissons ici les Magasides et les Térébratulides de M. d'Orbigny, qui ne diffèrent que par la présence ou l'absence du deltidium.

## GENRE TEREBRATULA Bruguière.

CARACTÈRES. Valve supérieure sans area distincte, et ayant un deltidium. Crochet tronqué transversalement, plus ou moins recourbé. Valve inférieure plus petite, ayant son sommet caché sous le deltidium de l'autre valve. Ouverture ronde, médiane, terminale, toujours séparée de la valve inférieure par une distance assez grande.

Les Térébratules se trouvent dans tous les étages géologiques et dans les mers actuelles.

# 277. TEREBRATULA DUTEMPLEANA d'Orbigny.

(Pl. 51, fig.  $1 \rightarrow 4.$ )

T. testà ovato-oblongà, depressà, lævigatà; valvà superiore majore, convexà, umbone recurvo; latere palleali truncato, in medio sinuato; valvà inferiore subcomplanatà; latere palleali biplicato.

Terebratula biplicata, Sow., 1815, Miner. Conch., pl. 90, fig. 1, (non Brocchi, 1814).

T. subundata, Phillips, 1829, Geol. of. Yorcks., pl. 2, fig. 25, 26? (non Sow. 1813).

T. Dutempleana, d'Orbigny, 1847, Pal. fr., terr. crét., t. 4, p. 93, pl. 511, fig. 1-8.

Ead.

Id. 1850. Prodr., t. 2, p. 140.

### DIMENSIONS.

Longueur	37 millim.
Par rapport à la longueur : Largeur	0,70 à 75
— — Epaisseur	0,60 à 65
Angle apicial	80°

Coquille ovale, oblongue, peu déprimée, quelquefois assez renflée, courte sur la région cardinale, dilatée et tronquée sur la région palléale, lisse ou ornée, surtout sur les bords, de lignes concentriques d'accroissement. Valve supérieure la plus renflée, à sommet recourbé, arrondi et tronqué, percé d'une grande ouverture et montrant un deltidium très-étroit; la région palléale de cette valve présente un pli médian, accompagné de dépressions latérales. Valve inférieure peu convexe, déprimée sur les côtés et surtout au milieu de la région palléale; la dépression médiane est séparée des dépressions latérales par deux plis intermédiaires plus ou moins prononcés. Commissure latérale des valves presque droite; commissure palléale figurant un M très-large, renversé.

Observations. Cette espèce est sujette à de grandes variations; nous en avons figuré les principales. Les figures 4a, b, c de la planche 50 représentent une variété déprimée, large, arrondie; les figures 5a, b, représentent au contraire une variété bombée dont la sinuosité palléale est très-prononcée, et la figure 2 montre une variété très-allongée, rappelant un peu la T. prælonga des terrains néocomiens. Des coquilles aussi diverses pourraient faire croire à des espèces différentes; mais comme elles sont liées au type par des transitions nombreuses et insensibles, nous les considérons, provisoirement du moins, comme se rapportant à la T. Dutempleana.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette térébratule fait partie d'un groupe dont les espèces ont été souvent confondues sous le nom de *T. biplicata*; elle se distingue de toutes celles du gault par la présence de deux plis sur la région palléale.

HISTOIRE. Elle a été décrite en 1815 par Sowerby sous le nom de T. biplicata, désignation qui ne peut lui être conservée, parce que Brocchi avait donné antérieurement le nom d'Anomya biplicata à une térébratule de l'étage tertiaire. M. Philipps, suivant M. d'Orbigny, car nous n'avons pas pu vérifier cette synonimie, la donne sous le nom de T. subundata, propre à une autre espèce de l'étage turonien.

Localités. Toutes celles des Alpes de la Savoie où le gault a été constaté, et la perte du Rhône; dans ce dernier gisement elle se trouve soit dans le gault soit surtout dans les grès inférieurs.

Explication des figures. Pl. 51, fig. 1 a - d, T. Dutempleana, de grandeur naturelle, du grès inférieur de la perte du Rhône; fig. 2, 3 et 4, variétés de cette espèce.

TOME XIII, 2me PARTIE.

### 278. Terebratula Lemaniensis Pictet et Roux.

(Pl. 51, fig. 5-7.)

T. testà oblongà, subpentagonà, subdepressà, concentricè plicatà; valvis inæqualibus; valvà superiore majore, arcuatà, inflatà; umbone brevi, recurvo, lateribus subcarinato; valvà inferiore subcomplanatà; latere palleali recto, truncato.

### DIMENSIONS.

Longueur	25 mill	im.
Par rapport à la longueur : Largeur	. 0	,72
— — Epaisseur	0	,60
Angle apicial	90°	

Coquille oblongue, de forme pentagonale, les côtes latéraux les plus longs, plus ou moins déprimée ou renflée, ornée de plis d'accroissement concentriques et de ponctuations en quinconce très-prononcées. Valve supérieure bombée, régulièrement arquée du crochet à la région palléale, légèrement carénée aux côtés du crochet qui est fortement recourbé; l'ouverture qui est plutôt grande est séparée de la charnière par un deltidium très-court; valve inférieure peu convexe, aplaite. Région palléale tronquée sur les deux valves, surtout à son extrémité qui est tantôt légèrement arrondie, tantôt et le plus souvent droite et coupée carrément. Commissures latérales presque droites; commissure palléale droite.

Le moule reproduit les ponctuations du test.

Observations. Cette espèce est presque ronde dans le très-jeune âge.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Elle a de grands rapports avec la T. tamarindus de l'étage néocomien, mais elle nous paraît devoir en être séparée à cause de sa forme plus allongée, sa longueur étant toujours plus grande que sa largeur.

Localités. Le Reposoir, le Saxonet, la perte du Rhône; elle n'est pas rare.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 51, fig. 5 a, b, c, d, T. lemaniensis, de grandeur naturelle, vue sous différents aspects; — fig. 6, a, b, c, moule d'un individu plus grand; — fig. 7 a, b, moule d'un jeune individu, ayant déjà acquis la forme pentagonale.

## GENRE TEREBRATELLA d'Orbigny.

Caractères. Valve supérieure ayant une area distincte et un deltidium; crochet droit un peu arqué, tronqué obliquement; ouverture échancrant fortement le deltidium qui est formé de deux pièces souvent réunies. Valve inférieure plus petite, à sommet presque toujours apparent.

Les Térébratelles se distinguent donc des Térébratules par leur area bien marquée et aplatie et par l'échancrure du deltidium. Les espèces se trouvent dans les terrains jurassiques et crétacés et sont particulièrement abondantes dans ces derniers.

### 279. Terebratella Rhodani Pictet et Roux.

(Pl. 51, fig. 9 a-d.)

T. testá oblongà, inflatà, costis dichotomis, radiantibus, ornatà; latere cardinali angulato; latere palleali truncato; umbone brevi, incurvo, lateraliter subcarinato; aperturà magnà.

#### DIMENSIONS.

Longueur	16 millim,
Par rapport à la longueur : Largeur	0,72
— — Epaisseur	0,73
Angle apicial	55°

Coquille oblongue, rensiée, allongée, non anguleuse sur la région cardinale, élargie sur la région palléale, ornée de côtes rayonnantes, divergentes, dichotomes à la circonférence, principalement sur les régions latérales. Valve supérieure plus longue et un peu plus rensiée que l'autre, formée en quelque sorte de trois plans, dont un médian figurant un triangle allongé et deux latéraux se

réunissant au précédent sous un angle obtus. Crochet pourvu latéralement de deux . légères carènes qui entourent une area un peu excavée; ouverture circulaire grande, séparée de la charnière par un deltidium double. Commissures latérales et palléale droites.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, assez voisine par ses ornements de la Terebratula oblonga de Sowerby, Min. Conch., pl. 555, fig. 10-15, appartient comme elle au lower greensand; elle en diffère cependant par sa région cardinale plus anguleuse et plus allongée, caractère qui a été malheureusement atténué sur notre planche. Peut-être que des échantillons plus nombreux nous auraient fourni des passages d'une espèce à l'autre.

M. d'Orbigny identifie à la Terebratula oblonga de Sowerby, une espèce trouvée dans les couches inférieures de l'étage néocomien de France.

Localité. Les grès inférieurs de la perte du Rhône.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 51, fig. 9 a, b, c, d, T. Rhodani, sous divers aspects, grossie d'un tiers.

## GENRE TEREBRATULINA d'Orbigny.

Caractères. Valve supérieure sans area distincte et dépourvue de deltidium, à crochet saillant, tronquée obliquement; ouverture se continuant jusqu'à la charnière. Valve inférieure plus petite, bombée, à sommet toujours apparent, montrant de chaque côté du crochet une petite oreillette qui rappelle celles des Peignes.

Les Térébratulines ont apparu pour la première fois pendant l'époque crétacée, et ce genre s'est continué jusque dans nos mers.

## 280. Terebratulina Saxoneti Pictet et Roux.

(Pl. 51, fig. 8, a-c.)

T. testà ovato-subpentagona, inflata; valvis inæqualibus, radiatim multicostulatis; costulis rotundatis, integris; nonnullis brevioribus ad marginem in instertitiis dispositis; latere cardinali obtuso, crasso, brevi; latere palleali subrecto; umbone incurvo; auriculis minimis.

#### DIMENSIONS.

Longueur	9 millim.
Par rapport à la longueur : Largeur.	0,80
Epaisseur	0,70
Angle apicial	90°

Coquille ovale, subpentagone, renflée, principalement sur sa grande valve et sur la région cardinale, ornée de quelques lignes d'accroissement, et de petites côtes rayonnantes, nombreuses, arrondies, entières, dans les intervalles desquelles s'intercalent à la circonférence quelques côtes plus courtes, mais de même grosseur, et qui ne dérangent point la symétrie générale. Côté cardinal court, formant un angle assez ouvert; côté palléal presque droit, s'amincissant brusquement à son extrémité. Crochet de la grande valve très-infléchi. Ouverture assez grande. Sommet de la petite valve très-distinct et remarquablement bombé. Oreillettes petites, peu marquées. Commissures latérales et palléale droites.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette jolie espèce est caractérisée par ses petites côtes simples, nombreuses et régulièrement distribuées, par sa forme bombée, pentagone, par la brièveté de sa région cardinale, etc.

Localités. Elle a été trouvée au Saxonet et au grand Bornand. Collection de M. le Prof. Fayre.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 51, fig. 8 a, b, c, T. Saxoneti, grossie environ deux fois et demie.

## GENRE TEREBRIROSTRA d'Orbigny.

Caractères. Valve supérieure prolongée en un très-long rostre, déprimé, légèrement arqué, sur lequel est une longue area aplatie, lisse. Deltidium unique, médian, très-allongé. Valve inférieure ovale, plus courte.

Ce genre paraît spécial aux terrains crétacés.

# 281. Terebrirostra arduennensis d'Orbigny.

(Pl. 51, fig. 10, a, b, c, d.)

T. testà elongatà, depressà, radiatim costatà; costis dichotomis, subundulatis; valvis inæqualibus, superiore majore, elongatissimà, rostratà, inferiore convexà; areà longitudinaliter excavatà, externè obtusà.

### DIMENSIONS.

Longueur de la petite valve	19 millim.
Par rapport à cette longueur : Largeur	0,70
Enaisseur des deux valves	0.55

Coquille allongée, déprimée, prolongée en un long rostre sur la région cardinale, élargie et arrondie à la région palléale, ornée de côtes dichotomes, légèrement ondulées, et de quelques plis d'accroissement imbriqués. Valve supérieure de beaucoup plus longue que l'autre par suite du rostre dont elle est pourvue, et aussi plus convexe. Valve inférieure peu déprimée, surtout près de la charnière. Area assez large, excavée sur toute la longueur du deltidium. Commissures latérales et palléale presque droites.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce ne pourrait être confondue qu'avec la *T. neocomiensis*; elle s'en distingue surtout par son bord palléal non échancré et par son ensemble plus allongé.

Localités. Le Saxonet et le Reposoir; elle se trouve aussi à la perte du Rhône dans le gault et dans les grès inférieurs; cette espèce n'est commune nulle part. Toutes les collections.

EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 51, fig. 10 a - d, T. arduennensis, vue sous ses différentes faces.

# APPENDICE.

## § 1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 1

Lorsque j'ai commencé la description des fossiles des grès verts, j'ai pris pour point de départ en ce qui concernait la perte du Rhône, la coupe géologique universellement admise alors. Tous les géologues qui avaient étudié cette localité célèbre, étaient d'accord, pour rapporter au gault ou terrain albien la totalité des dépôts compris entre la couche à orbitolites et les sables supérieurs sans fossiles. La seule divergence entre les travaux de ces divers savants était relative à la couche même à orbitolites, considérée par les uns comme le terme supérieur de la série néocomienne et par les autres comme le commencement du gault.

Toutefois, en acceptant ce point de départ, que je n'avais alors aucun motif pour contester, j'avais averti que ces dépôts de la perte du Rhône peuvent se subdiviser en couches où les fossiles ne sont pas distribués exactement de la même

¹ Ces observations concernent surtout la première partie de ce mémoire, publiée avant la collaboration de M. le Dr Roux. Je les présente en conséquence en mon nom personnel. F.-J. Pictet.

manière. J'avais annoncé que je donnerais à la fin de cet ouvrage un tableau complet de distribution des espèces, tableau impossible à faire avant qu'elles fussent nommées avec précision.

La rédaction de la première livraison et celle de la seconde où j'ai eu le plaisir de m'associer pour la première fois avec M. le Dr Roux, n'ont pas fourni d'arguments qui fussent de nature à modifier mon opinion. Mais l'étude des Mollusques acéphales, entreprise pour les deux dernières livraisons, démontra bientôt qu'il y a une différence constante et importante entre la population zoologique des couches supérieures arénacées, riches en fossiles, et celle des grès verts inférieurs, durs et compacts, superposés aux orbitolites, et qu'un trèspetit nombre d'espèces sont communes à ces deux dépôts.

Je ne tardai pas à reconnaître au contraire que quelques espèces très-caractéristiques se trouvent à la fois dans les grès inférieurs et dans les marnes situées sous les orbitolites. Ces marnes, décrites pour la première fois par M. Rochat dans un mémoire inédit, ont été rapportées par ce jeune géologue au terrain aptien et les faits, qui ont été recueillis plus récemment, confirmeront très-probablement cette opinion.

M. E. Renevier de Lausanne, venu à Genève pour continuer ses études à l'Académie, s'est occupé avec zèle de ces questions. Il s'est proposé de donner une coupe et une description géologique de la perte du Rhône plus précise et plus détaillée que celles que l'on possédait, et d'indiquer avec exactitude la répartition des espèces dans les diverses couches. Il a réuni pendant un séjour de quelques semaines à

Bellegarde, une série importante de fossiles de ces marnes, série dont la comparaison avec les matériaux que M. Roux et moi avions eu à notre disposition, a fourni des résultats intéressants qui confirment les observations indiquées ci-dessus.

La conclusion principale que l'on en peut tirer est que le gault proprement dit occupe à la perte du Rhône une épaisseur bien moindre qu'on ne le croyait, et que les grès inférieurs qu'on lui associait autrefois ont au moins autant de rapports avec le terrain qui contient les orbitolites et avec les marnes situées entre ce dépôt et le terrain néocomien supérieur.

M. Renevier vient de rédiger dans un mémoire spécial le résultat de ses recherches. Voici un extrait du profil des terrains contenu dans ce mémoire.

```
Gault { Grès et sables jaunâtres, verdâtres et rougeâtres, très-riches en fossiles. } 6 m, 60.
             Grès vert inférieur, sable vert sans fossiles,
                et grès verdâtre formant le terrain aptien \ 5 m, 50.
                supérieur.
             Grès marneux, grès verdâtre, pauvre en fos-
                siles . . . . . . . . . . . . . . 7 <sup>m</sup>, 95.
 APTIEN
              Couche à orbitolites . . . . . . . 0 m, 50.
              Argiles jaunes, rouges, blanches, etc. 5 m, 50.
             Marne jaune et bleue, riche en foss. 1 m, 95.
              Ces couches forment ensemble le terrain ap-
                tien inférieur.
URGONIEN
              Calcaire à Pterocera pelagi.
                                                                 2 m.
    ou
                                                                Estimé par M. Itier
Néocomien / Calcaire à Caprotina ammonia.
                                                                à 80 m dans le dé-
supérieur
                                                                 partement de l'Ain.
     Tome XIII, 2me Partie.
                                                                         44
```

La description des Mollusques fossiles des grès verts des environs de Genève, commencée comme je l'ai dit dans l'hypothèse, d'une profil différent et en supposant que le gault s'étendait jusqu'aux orbitolites, se trouve donc en ce qui concerne la perte du Rhône, renfermer des fossiles d'une époque plus ancienne. Nous donnerons plus tard avec un supplément, la répartition exacte des espèces de ces terrains à la perte du Rhône et dans le bassin du Léman, et un jour aussi, nous l'espérons, dans toute la Suisse. En attendant que ce travail puisse être complété, et pour éviter toute erreur, nous prévenons nos lecteurs que les espèces qui font partie de la liste suivante n'ont pas été trouvées dans le gault. mais bien dans les grès durs qui dépendent probablement du terrain aptien supérieur. 1 Ceux donc qui voudront extraire de cet ouvrage une liste des Mollusques du Gault de la perte du Rhône devront en retrancher toutes les espèces indiquées ci-dessous. Nous n'avons pour le moment aucune rectification analogue à proposer en ce qui concerne les Alpes.

Liste des espèces trouvées à la perte du Rhône et qui, dans cette localité, appartiennent exclusivement aux grès aptiens.

NAUTILUS NECKERIANUS	Pictet.	CARDIUM SPHÆROÏDUM Forbes.
Ammonites Cornuelianus	d'Orbigny.	(Neckerianum Pictet et Roux.)
PANOPÆA RHODANI	Pictet et Roux.	» DUPINIANUM d'Orbigny.
» PLICATA	d'Orbigny,	ASTARTE BRUNNERI Pictet et Roux.
PHOLADOMYA FAVRINA	Agassiz.	» GURGITIS Id.
ANATINA RHODANI	Pictet et Roux.	CYPRINA ERVYENSIS d'Orbigny.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les espèces qui se trouvent à la fois dans le gault et dans l'aptien de la perte du Rhône ne figurent pas sur cette liste. Ce sont les : Ammonites Beudanti, Natica gaultina, Solarium granosum, Arca fibrosa, Mytilus Orbignyanus, Janira quinque-costata, Spondylus Brunneri, Plicatula placunea. Ostrea Milletiana, Terebratula Dutempleana et Terebrirostra arduennensis.

CYPRINA RHODANI Pictet et Rou	x.   Pecten aptiensis d'Orbigny.
TRIGONIA ALIFORMIS Sowerby.	OSTREA AQUILA Brongniart.
» ARCHIACIANA d'Orbigny.	» RAULINIANA d'Orbigny.
» NODOSA Sowerby.	» ALLOBROGENSIS Pictet et Roux
MYTILUS SIMPLEX d'Orbigny.	» HARPA Goldfuss.
(gurgitis Pictet et Roux.)	RHYNCHONELLA LATA Sowerby.
AVICULA RHODANI Pictet et Rou	x.   TEREBRATELLA RHODANI Pictet et Roux.
HINNITES FAVRINUS Id.	

### § 2. ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

#### GENRE NAUTILUS.

Depuis la publication des Céphalopodes, nous avons constaté dans le gault proprement dit de la perte du Rhône, l'existence de trois autres espèces, savoir le N. albensis, d'Orbigny, le N. Bouchardianus, Id., et le N. Clementinus, Id.; le N. Bouchardianus se trouve aussi au Saxonet. Nous avons reconnu encore que le N. Saussureanus, qui est fréquent au Saxonet, et qui n'avait été indiqué qu'avec doute de la perte du Rhône, s'y trouve dans le gault.

- Le N. Neckerianus appartient à l'étage des grès inférieurs (aptien supérieur).
- Le N. Rhodani a été trouvé aux Gorges, près de Bellegarde, dans le gault.

#### GENRE AMMONITES.

- A. Gossianus. Une comparaison directe des échantillons a prouvé que cette espèce est la même que l'A. quercifolius d'Orbigny, malgré les différences que semblent indiquer les figures de cet auteur.
- A. Brongniartianus. Il a été dit déjà p. 287 que cette Ammonite ne pouvait pas conserver ce nom, donné antérieurement à une autre espèce, et celui de

Alexandrinus, Pictet, lui a été substitué. M. d'Orbigny la considère comme la jeune de l'A. Bonnetianus Pictet; c'est une question qui sera reprise dans le supplément.

Nous discuterons aussi alors les associations que le célèbre paléontologiste français a faites, entre quelques-unes des espèces nouvelles contenues dans la première livraison de cette ouvrage et d'autres déjà connues; nous pensons qu'un grand nombre de ces associations ne sont pas fondées.

#### GENRE CRIOCERAS.

C. VAUCHERIANUS. Des échantillons plus complets ont démontré que cette espèce, rapportée avec doute à ce genre, lui appartient définitivement.

#### GENRE NATICA.

N. RAULINIANA. L'étude des échantillons types de cette Natice conservés dans la collection de M. d'Archiac, a fait reconnaître à l'un de nous, que nous avions assimilé à tort à cette espèce, celle qui est figurée pl. 17, fig. 6; cette dernière doit probablement être réunie à la N. gaultina. L'existence de la N. Rauliniana dans nos environs, ne repose donc plus que sur l'assertion de M. d'Orbigny que nous n'avons pu vérifier.

#### GENRE PLEUROTOMARIA.

P. CORONATA. M. d'Orbigny a changé le nom de notre P. coronata contre celui de P. Pictetiana d'Orbigny, le premier de ces noms appartenant déjà à une espèce de S<sup>t</sup> Cassian.

P. Fittoni. Le même auteur n'admet pas que cette espèce se trouve dans le gault, et a donné le nom de P. Rouxii d'Orbigny, à la pleurotomaire que nous avons rapportée à celle de Roemer. Cette difficulté ne pourrait recevoir une solution positive que par la comparaison directe des échantillons.

#### GENRE PTERODONTA.

P. GAULTINA et P. CARINELLA. M. d'Orbigny a transporté ces deux espèces dans le genre des Ptérocères, parce qu'elles ont un canal. Dans la première description que cet auteur a donnée de ce genre (Paléont. franç., t. II, p. 515), il indiquait parmi ses caractères, au moins dans quelques espèces, « un canal court et oblique » et le plaçait par cela même dans la famille des Strombides; depuis lors, il l'a rapproché de la famille des Actéonides, et ne leur reconnaît plus qu'un simple sinus. Nos espèces appartenaient aux Ptérodontes, suivant leur première description; elles ne peuvent plus maintenant rester dans ce genre.

#### GENBE ROSTELLARIA.

R. Orbignyana et R. Parkinsoni. M. d'Orbigny a reconnu exacte la rectification que nous avons faite au sujet de ces deux espèces; mais sans motifs légitimes, il a substitué au premier de ces noms celui de R. costata Michelin. Ce nom, donné en 1856 par M. Michelin à l'espèce que nous avons plus tard appelée Orbignyana, ne peut évidemment pas être conservé, car il est le résultat d'une assimilation fautive faite par cet auteur, avec une espèce de Gosau, décrite par Sowerby en 1851, qui n'a aucun rapport avec celle qui nous occupe. Nous pensons que cette dernière doit garder le nom que nous lui avons donné, et que la R. costata de Sowerby dont M. d'Orbigny a fait sa R. subcostata, Prod., t. 2, p. 227, doit de même conserver le sien.

R. SUBULATA. M. d'Orbigny l'appelle subsubulata, n'admettant pas que la R. subulata de Reuss se trouve dans le gault; de même que pour la Pleurotomaria Fittoni, la comparaison directe des échantillons originaux pourrait seule éclairer la question.

R. MARGINATA. M. d'Orbigny a également changé ce nom et en a fait sa R. sub-marginata; nous persistons à regarder notre espèce comme identique avec celle de Sowerby dans Fitton, et nous n'admettons pas que l'espèce de Sowerby puisse être la même que celle que le même auteur dans le même mémoire nomme R. Parkinsoni.

#### GENRE PTEROCERA.

P. RETUSA. Nous demeurons également dans l'opinion que notre espèce est la même que celle de Sowerby, et nous croyons le nom de subretusa d'Orbigny, inutile.

#### GENRE MUREX.

M. Genevensis. Voir p. 287 la rectification que nous avons faite, au sujet de son angle spiral.

#### GENRE FUSUS.

F. BILINEATUS et DECUSSATUS. Les noms de F. subbilineatus Orb. et subdecussatus d'Orb. doivent remplacer les premiers qui avaient été donnés antérieurement à d'autres espèces.

#### GENRE DENTALIUM.

D. SERRATUM. C'est une serpule.

#### GENRE PANOPÆA.

P. ACUTISULCATA. La figure 1 de la planche 28 ne représente pas cette panopée, l'échantillon figuré appartenant à une espèce des grès inférieurs; la P. acutisulcata se trouve cependant à la perte du Rhône, mais dans le gault seulement; nous renvoyons provisoirement aux figures très-exactes qui en ont été données par M. d'Orbigny.

#### GENRE CARDIUM.

C. Neckerianum. L'espèce que nous avons appelée ainsi, ayant été antérieurement décrite et figurée par M. Ed. Forbes (Quart. journ. of the Geol. Soc., 1845) sous le nom de C. sphæroideum, ce dernier nom doit lui être conservé.

#### GENRE ARCA.

A. SUBNANA. Le dessinateur a oublié de figurer sur le moule les sillons concentriques dont il est fait mention dans le texte.

#### GENRE MYTILUS.

M. GURGITIS. Nous avons reconnu par l'étude de meilleurs échantillons que notre M. gurgitis n'est qu'une compression accidentelle du M. simplex, d'Orb. Il se trouve dans le terrain aptien.

#### GENRE LIMA.

L. SABAUDIANA et L. SAXONETI. Aux deux premières lignes des dimensions de chacune de ces espèces, il faut lire largeur là où est écrit longueur et vice-versâ.

Lorsque nous aurons un nombre suffisant de nouveaux matériaux, nous ferons paraître le supplément annoncé plus haut; nous reviendrons alors sur les questions douteuses et nous publierons quelques espèces nouvelles.

FIN.






Fig. 1. Diceras gaultina. Fig. 2. Avicula Rhodani. Fig. 3. Gervilia alpina. Fig. 4. Perna Rauliniana.






Fig. 1. Inoceramus Sulcatus. \_\_\_ Fig. 2.1. Concentricus. Fig. 3.1. Salomoni.







Fig. 1. Lima montana. \_\_\_\_Fig. 2. Hinnites Favrinus.





Hinnites Favrinus.






Fig. 1. Hinnites Studeri. — Fig. 2. Janira Faucignyana. Fig. 3. Janira 5 costata.






Fig. 1. Pecten Rhodani. Fig. 2. P. Raulinianus . Fig. 3. P. Interstriatus.

Fig. 4. P. Dutemplei. . Fig. 5. P. Saxoneti.







Fig. 1 et 2. Spondylus Brunneri. \_ Fig. 3. Plicatula radiola. Fig. 4. P. gurgitis. \_ Fig. 5. P. Strigilis. \_ Fig. 6. Ostrea arduennensis.










Fig. 1 Ostrea Allobrogensis. — Fig. 2. 0. Harpa. — Fig. 5. 0. Milletiana.






Fig. 1. Ostrea Rauliniana. — Fig. 2. O. canaliculata — Fig. 5. & 4. Rhynchonella lata Fig. 5. R. antidichotoma.—Fig. 6. R. Emerici. — Fig. 7. R. polygona .






Fig. 1. 4. Terebratula Dutempleana.—Fig. 5. 7. T. Lemaniensis.—Fig. 8. Terebratulma Saxoneti.—Fig. 9. Terebratella Rhodani.—Fig. 10. Terebrivostra Arduennensis.



# NOTE

SUR

# LA MESURE DES HAUTEURS

# PAR LE BAROMÈTRE

PAR

M. ELIE RETTER.

Lue à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 19 Mai 1853.

J'ai présenté à la Société il y a quatorze aus une note sur la mesure des hauteurs par le baromètre. Dans cette note, je me proposais d'obtenir une formule dans laquelle on eût égard à la présence des vapeurs aqueuses dans l'air, et à la distribution normale de la température dans les différentes parties de la colonne atmosphérique. La formule à laquelle j'étais conduit avait le grave défaut d'exiger un calcul plus pénible et plus long que les formules habituellement employées. — Plus tard je cherchai, tout en maintenant la même analyse, à obtenir un résultat final moins compliqué et je parvins assez facilement à ce but; mais le résultat de mon travail ne reçut alors aucune publicité et je ne fis aucun calcul pour m'assurer de l'espèce de perfectionnement que son introduction pourrait amener dans la mesure des hauteurs par le baromètre.

Tome XIII, 2me PARTIE.

344 NOTE

Quelque temps auparavant Bessel avait proposé une formule nouvelle dans laquelle il avait égard à l'état hygrométrique actuel de la colonne d'air. Son travail m'était inconnu à l'époque où je m'occupais pour la première fois de ce sujet; je me suis assuré depuis que, quoique par une marche différente du calcul, les deux méthodes conduisent, pour la correction due à la présence de la vapeur d'eau, à des résultats ou identiques ou extrèmement peu différents. La formule de Bessel a été récemment l'objet d'un mémoire présenté à la Société par M. le professeur Plantamour, et imprimé dans le tome XIII de notre collection. Dans ce mémoire M. Plantamour, tout en conservant la formule et la marche du calcul de Bessel, a profité des données numériques dues aux belles recherches de M. Regnault pour donner aux constantes que l'on emprunte à l'expérience toute l'exactitude dont elles sont susceptibles. — La lecture du mémoire de M. Plantamour a de nouveau reporté mes préoccupations sur ce sujet et j'ai voulu m'assurer si la formule à laquelle j'étais parvenu pouvait entrer en lice avec les nouvelles tables soit pour la simplicité des moyens, soit pour l'exactitude des résultats.

Le mémoire de M. Plantamour sur les observations barométriques et thermométriques faites à Genève et au St.-Bernard de 1841 à 1850, mémoire qui est imprimé en tête du volume cité plus haut, fournit des données qui offrent un moyen facile de juger du mérite d'une formule hypsométrique par la comparaison des hauteurs calculées aux différentes époques de l'année et aux différentes heures du jour. Ce moyen, que M. Plantamour a employé dans le mémoire pour

comparer les résultats fournis par les tables nouvelles à ceux auxquelles conduisent les tables fondées sur la formule de Laplace, a témoigné en faveur des premières et a manifesté en elles un progrès indubitable. J'ai fait avec la formule que je propose les mêmes calculs et je suis arrivé à des résultats un peu plus satisfaisants, mais en réalité peu différents de ceux auxquels les nouvelles tables de M. Plantamour l'avaient conduit. Je croyais parvenir à une uniformité plus complète d'après les essais que j'avais tentés autrefois et d'après la marche même des inégalités signalées. Entre la moyenne de Juin et celle de Décembre la formule de Laplace présente pour les hauteurs du St.-Bernard au-dessus de Genève un écart de  $28^{m}$ ,7; les tables de M. Plantamour réduisent cet écart à  $25^{m}$ ,1, les miennes à  $24^{m}$ ,74.

Comme la formule à laquelle j'ai été conduit donne des résultats différents de ceux des formules anciennes, surtout lorsque la différence des températures aux deux stations est considérable, j'ai cherché des observations qui offrissent ce caractère, et pour obtenir une sanction analogue à celle que fournit le moyen précédent, j'ai déterminé la même hauteur par deux voies différentes. J'ai pris dans ce but les observations faites par MM. Barral et Bixio dans leur voyage aéronautique, le 2 Juillet 1850 (Comptes rendus de l'Ac. des sc., t. XXXI, p. 122). On sait qu'en dépassant dans leur ascension la hauteur de 6500m environ, ils ont éprouvé un abaissement subit de la température tel, qu'une élevation de 200m seulement a fait baisser leur thermomètre de 25° C. — Pour n'appliquer les formules qu'à celles des observations qui signa-

346 NOTE

laient un état normal des couches atmosphériques, j'ai pris les quatre observations suivantes:

He	eure. Paris.	Baromètre à 0°,	thermomètre C.	Ballon- Barométre à 0°	Thermomètre C.
4h	$9'^{1}/_{2}$	0 <sup>m</sup> ,75346	+ 170,7	0m,65557	+ 13°
4	13'	0, 75348	17, 7	0, 59773	+ 90
4	20'	0, 75352	17, 7	0, 36699	<del></del> 9°
4	23'	0, 75551	17, 8	0, 34775	- 10°,5

Ces observations sont celles dans lesquelles la marche du thermomètre indique le décroissement le plus uniforme de la température. Elles ont été faites pendant le mouvement ascensionnel du ballon. Malheureusement les observations hygrométriques n'ont pas été faites ou du moins ne sont pas consignées dans le journal du voyage. Une circonstance permet cependant de suppléer à ce défaut. On lit dans le Journal: « Le ciel qui avait été pur jusqu'à midi se couvrit de nuages et bientôt une pluie torrentielle s'abattit sur Paris. La pluie ne cessa qu'à trois heures. » On peut donc supposer que l'état hygrométrique de l'air était encore vers 4 heures voisin de la saturation; j'ai supposé une tension de 0,95; l'erreur qui peut résulter de cette supposition n'a d'ailleurs d'influence que sur la hauteur absolue du ballon aux différentes stations et n'en exerce aucune sur la discussion à laquelle nous devons soumettre ces observations. — La hauteur de la station la plus élevée peut s'obtenir soit en la calculant directement, au moven de l'observation correspondante faite à l'observatoire de Paris, soit en additionnant les hauteurs successives de la première station au-dessus de Paris, de la seconde au-dessus de la première et ainsi de suite. J'ai obtenu de cette manière :

Par le	s tables de M. Mathieu,	Par les tables de M. Plantamour,	Par la nouvelle
	formule Laplace.	formule Bessel-	formule.
Par les stations	1179=,7	1186 <sup>m</sup> ,0	4485 <sup>m</sup> ,3
	768, 0	774, 3	774, 2
	3897, 1	3926, 1	3923, 8
	413, 7	417, 4	417, 4
_	6238 <sup>m</sup> ,5	6303 <sup>m</sup> ,8	6300°,7
Directement	6266, 5	6309, 4	6303, 3
Différences	+ 8m,0	+ 5 <sup>m</sup> ,6	+ 2 <sup>m</sup> ,6

Pour déterminer la part d'influence de chacune des corrections sur ces différences j'ai calculé la hauteur en tenant compte séparément des différents éléments. J'ai trouvé ainsi :

#### 1º Par la formule de Laplace:

Pression 1408m,7 Température et 
$$68^m$$
,4 Correction dépen- $2^m$ ,9

 734, 4 humidité de 31, 2 dant de la hauteur 2, 4

 3882, 7 l'air. 0, 0 des stations. 14, 4

 428, 6 — 16, 7 . 1, 8

 6154m,4 82m,6 82m,6 21m,5

 Directement 6154, 9 89, 9 21, 7

 Différences  $+ 0^m$ ,5  $+ 7^m$ ,3  $+ 0^m$ ,2 total  $+ 8^m$ ,0

#### 2º Par les tables de M. Plantamour :

348 NOTE

#### 3º Par la nouvelle formule:

Pressions	1114m,5	Températ.	62m,8	Humidité. 7m,8	Hauteur.	$0^{m}, 2$
	739, 6		29, 9	4, 3		0, 4
	3906, 7	_	1, 4	13, 6		4; 9
	431, 1		15, 4	0, 9		0, 8
	6191 <sup>m</sup> ,9	+	75 <sup>m</sup> ,9	25 <sup>m</sup> ,6		6 <sup>m</sup> ,3
Directement	6192, 6		77, 3	27, 2		6, 2
Différences	0m,7	+	4m,4	+ 0",6		- 0 <sup>m</sup> ,1

La formule à laquelle j'ai été conduit donne le logarithme de la différence de niveau des deux stations par la somme de 8 logarithmes. Celle de Bessel n'en exige que 4, mais elle nécessite deux corrections dues à la hauteur des stations audessus du niveau des mers; j'ai effectué ces deux corrections par deux logarithmes, ce qui rend je pense la marche du calcul plus uniforme. Je n'emploie donc en réalité que deux logarithmes de plus. Le premier représente le facteur nécessité par l'hypothèse sur la distribution de la température; le second provient de ce que la correction due à la présence des vapeurs d'eau s'effectue par deux facteurs dans la nouvelle formule, tandis que dans la formule de Bessel elle n'exige qu'un seul facteur. Les tables sont disposées de manière à rendre tous les logarithmes positifs; un seul peut devenir négatif dans des cas exceptionnels.

La correction due à la différence des températures est au fond, ce que la formule que je présente offre de nouveau. Cette correction, qui est proportionnelle au carré de la différence des températures, me semble indispensable pour de grandes

hauteurs, si l'on admet que la température varie d'une station à l'autre proportionnellement à la hauteur. Elle est peu considérable si les températures sont, aux deux stations, à peu près les mêmes, mais elle devient très-sensible lorsque cette différence atteint 15 ou 20°.

La correction due à la présence des vapeurs aqueuses s'effectue, dans la nouvelle formule, en supposant que le rapport entre la pression exercée par la vapeur d'eau et celle qu'exerce l'air sec, varie, le long de la colonne, en suivant une loi continue. Le plus simple était de supposer que ce rapport, habituellement décroissant à mesure qu'on s'élève, diminuait proportionnellement à la hauteur. Quelques essais que j'ai faits sur une colonne fictive d'air humide, en calculant pour cette colonne une constitution conforme au petit nombre de données que nous possédons sur ce sujet, m'ont montré que la progression était un peu plus rapide et j'ai admis, pour la loi qui exprime les variations du rapport des deux pressions, celle qui se rapprochait le plus des faits auxquels le calcul m'avait conduit.

Quant aux constantes de la formule, j'ai pris pour la correction relative à la variation de la pesanteur suivant la latitude, celle qui résulte du travail de Schmidt, qui a repris le calcul de toutes les observations faites sur la longueur du pendule et qui en a déduit le coefficient correspondant par la méthode des moindres carrés.

J'ai pris pour densité de la vapeur d'eau la densité théorique 0,6219; pour celle de l'air sec j'ai admis celle qui résulte des expériences de M. Regnault, en corrigeant une

350 NOTE

petite erreur de calcul signalée récemment dans un journal allemand et qui porte de  $1^{\rm gm}$ ,295187 à  $1^{\rm gm}$ ,295223 le poids du litre d'air sec à  $0^{\circ}$  et  $0^{\rm m}$ ,76 à la latitude de Paris. J'ai de plus augmenté un peu cette densité pour tenir compte de la présence de l'acide carbonique dans l'air en supposant que ce gaz forme en volume  $4_{10000}$  de celui de l'air. Il résulte de ces deux corrections une petite différence absolue entre les tables que je propose et celles de M. Plantamour; cette différence est d'environ  $1_{4000}$  dont les hauteurs sont plus faibles par les nouvelles tables.

La pression de l'air est mesurée aux deux stations par la hauteur de la colonne de mercure que cette pression soutient dans le baromètre; comme la pesanteur diminue à mesure qu'on s'élève on doit avoir égard à cette diminution. On en tient compte habituellement en supposant que la pesanteur varie en raison inverse du carré de la distance au centre de la terre. Cette hypothèse n'est vraie que si l'on fait abstraction des couches de terrain qui s'élèvent au-dessus des mers jusqu'au niveau de la station supérieure. En l'adoptant lorsqu'il ne s'agit pas d'ascensions en ballon, on obtient une correction trop forte d'environ 3/3 de sa valeur. Dans la formule et dans les tables, j'ai eu égard à cette circonstance en supposant que la station supérieure est sur le sol. Lorsqu'il s'agira de mesurer la hauteur dans une ascension en ballon on devra modifier le calcul, ce qui exige seulement que l'on ajoute 0,00041 au logarithme de la hauteur trouvée.

## Analyse.

1. Considérons une colonne verticale d'air qui s'élève depuis le niveau des mers jusqu'aux limites de l'atmosphère et dont la section par un plan horizontal soit constante et égale à  $\omega$ . — A une distance r du centre des couches atmosphériques, faisons passer un plan horizontal qui détermine dans cette colonne une section  $\omega$ ; faisons passer à une distance dr audessus de cette section un nouveau plan horizontal. Ces deux plans intercepteront dans la colonne d'air un cylindre dont le volume sera  $\omega dr$  et la masse  $\omega_{\ell} dr$ ,  $\ell$  étant la densité.

Soit p la pression qui mesure l'élasticité de l'air à la distance r, cette pression étant rapportée à l'unité de surface. Le cylindre d'air sera pressé de bas en haut par la force  $p\omega$  et de haut en bas par la force  $(p+dp)\omega$ ; la première fera équilibre à la seconde, augmentée du poids du cylindre d'air ou de  $g\omega_\ell dr$ , en désignant par g la gravité à la distance r; nous aurons donc :

$$(p + dp + g_{\ell} dr) \omega = p\omega$$
 ou  $dp = -g_{\ell} dr \dots (1)$ 

2. Pour intégrer cette équation qui renferme 4 variables, il faut connaître d'autres relations entre ces quantités. La pesanteur g varie en raison inverse du carré des distances au centre de la terre supposée sphérique; si donc on désigne Tome XIII, 2<sup>me</sup> Partie.

352 NOTE

par a le rayon de la terre et par (g) la valeur de g au niveau des mers, l'on a :

 $g = (g) \frac{a^2}{r^2}$ 

En substituant cette valeur dans l'équation (1) et en posant :

$$s = 1 - \frac{a}{r} \dots (2$$

cette équation devient :

$$dp = -(g) a_{\ell} ds \dots (3)$$

La valeur de (g) dépend de la latitude du lieu de l'observation et l'on sait que si l'on désigne par  $\phi$  la latitude, par G la valeur de (g) au pôle et par  $\alpha$  un coefficient constant, l'on a :

$$(g) = G (1 - \alpha \cos^2 \varphi) \dots (4)$$

3. La pression p mesure l'élasticité de l'air, elle est par conséquent une fonction de la densité et de la température de l'atmosphère à la distance r du centre des couches atmosphériques. Cette pression s'évalue par la hauteur h de la colonne de mercure qu'elle soutient dans le baromètre, en sorte que, si l'on appelle D la densité du mercure, on a:

$$p = g D h \dots \dots \dots (5)$$

Désignons par  $\ell_1$  la densité de l'air sec à 0° sous la pression de  $0^{m}$ ,760 dans un lieu où gravité est égale à  $\gamma$ , et par  $\ell_2$  la densité de l'air sec à la température t, mais sous la même pression; nous aurons en appelant  $\beta$  le coefficient de dilatation de l'air:

$$\mathfrak{g}_2 = \frac{\mathfrak{g}_1}{1 + \mathfrak{G}t}$$

Mais par la loi de Mariotte les densités sont proportionnelles aux pressions lorsque la température reste la même; si donc nous représentons par  $p_0$  la pression qui à la température t produit la densité  $g_0$ , comme à la même température la pression  $g_0$   $g_0$   $g_0$   $g_0$   $g_0$  produit la densité  $g_0$ , nous aurons:

$$p_{\circ} = \frac{\gamma. D. 0^{\text{m}},760 \, \text{go}}{\text{go}} = \frac{\gamma. D. 0^{\text{m}},760}{\text{go}} \, \text{go} \, (1 + Bt)$$

Posons de plus:

$$l = \frac{\gamma}{(g)} \cdot \frac{D}{\ell_1} \cdot 0^m, 760 \cdot \dots \cdot (6)$$

et l'équation précédente deviendra:

$$p_0 = l(g) \, \rho_0 \, (1 + \beta t) \, \dots \, (7)$$

Jusqu'ici nous avons supposé l'air sec; s'il est mélangé de vapeurs aqueuses, l'équation (7) se modifie. Désignons par p,  $\ell$ , t la pression, la densité et la température du mélange; appelons  $\ell$ , la densité de la vapeur et  $p\varpi$  la pression qu'elle exerce;  $\ell$ , la densité de l'air sec et p, sa pression. Nous obtiendrons p, par l'équation (7). Nous aurons de même en supposant que la vapeur d'eau, dans les circonstances où elle se trouve dans l'atmosphère, obéisse aux mêmes lois que l'air sec:

$$p\pi = (g) \lambda \, g_{o}' \, (1 + \beta \, t)$$

a étant égal à *l* divisé par le rapport des densités de la vapeur et de l'air sec sous la même pression et à la même température. Nous appellerons δ ce rapport, c'est-à-dire la

densité de la vapeur d'eau à l'égard de celle de l'air. L'équation précédente deviendra :

$$p = \langle g \rangle \frac{l}{\delta} \, \epsilon_o \, (1 + \beta \, t) \, \dots \, (8)$$

Nous avons de plus  $e_0 + e_0' = e_0$ ;  $p \varpi + p_0 = p$  ou  $p_0 = p(1 - \varpi)$ ; cette dernière valeur étant substituée dans l'équation (7), on aura par cette équation :

$$\mathfrak{s} \circ = \frac{p(1-\varpi)}{(g)l(1+\beta t)}$$

et par l'équation (8):

$$\mathfrak{g}_{\mathfrak{o}'} = \frac{p \otimes \delta}{(g) \, l \, (1 + \beta \, l)}$$

on tire de là:

$$\ell = \ell \circ + \ell \circ' = \frac{p \left\{1 - (1 - \delta) \pi\right\}}{(g) l \left(1 + \beta t\right)}$$

d'où, en posant  $1 - \delta = 2 \text{ m}$ 

$$p = \frac{(g) l_{\beta} (4 + \beta t)}{1 - 2 m \pi} \dots \dots (9)$$

En divisant l'éq. (5) par cette dernière équation, il vient enfin:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{a\left(1 - 2m\,\varpi\right)}{l} \cdot \frac{ds}{1 + \beta\,t} \cdots [10]$$

4. Le second membre de cette équation contient trois variables  $\varpi$ , t et s entre lesquelles il faut encore obtenir des relations pour parvenir à l'intégrer. — La température t est constamment variable dans l'atmosphère et ses variations accidentelles

ne sont soumises à aucune loi que l'analyse puisse exprimer; cependant un fait constant qui s'observe toujours dans l'état d'équilibre moyen de l'atmosphère, c'est que la température s'abaisse proportionnellement à la hauteur. C'est sous cette hypothèse que nous intégrerons cette équation en posant:

$$ds = - \Lambda dt \dots \dots \dots \dots \dots (11)$$

A étant une constante qui dépendra de l'état de l'atmosphère au moment de l'observation.

Quant à la variable  $\varpi$  qui exprime le rapport de la pression de la vapeur à la pression totale, elle décroit aussi en général depuis la station inférieure où sa valeur est habituellement la plus grande jusqu'à la station supérieure. Si l'on désigne par  $\varpi'$  la première et par  $\varpi'$  la seconde, on a en général :

$$\pi = \tau' - (\pi' - \pi'') \circ (s) \cdot \dots \cdot (12)$$

 $\circ$  (s) étant une fonction de la hauteur s, assujettie à la condition de devenir = 0 à la station inférieure et = 1 à la station supérieure. En substituant ces valeurs dans l'équation (10), elle devient:

$$\frac{dp}{p} = \frac{a\left(1 - 2m\,\pi'\right)}{l} A \frac{dt}{1 + \beta t} + \frac{2m\left(\pi' - \pi''\right)aA}{l} \varphi\left(s\right) \frac{dt}{1 + \beta t} \dots (13)$$

5. Désignons par t' la température à la station inférieure et par t'' à la station supérieure, posons de plus:

$$z = \frac{1+\beta t}{1+\beta t'}$$
.....(14);  $z'' = \frac{1+\beta t''}{1+\beta t'}$ .....(15).

356 NOTE

Nous pourrons supposer:

$$\phi(s) = \left(\frac{\lg z}{\lg z''}\right)^{n} \cdots \cdots (16)$$

Cette relation en effet satisfait aux conditions énoncées plus haut, car on a  $\circ$  (s) = 0 pour t=t' et  $\varphi$  (s) = 1 pour t=t'. Si de plus on observe que  $\frac{lg\ z}{lg\ z'}$  est à très-peu près égal à  $\frac{t'-t}{t-t''}$ , on voit que la supposition qu'elle exprime revient à admettre que  $\varpi$  varie d'une station à l'autre, suivant une loi continue qui, par la détermination de n, pourra se plier aux faits que l'expérience manifestera.

L'équation (14) étant différentiée après avoir pris les logarithmes de ses deux membres donne :

$$\frac{dt}{1+\beta t} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{dz}{z} = \frac{1}{\beta}. d. \lg z.$$

En substituant cette valeur et celle de  $\phi$  (s) dans l'éq. (15), nous aurons

$$\frac{d\,p}{p} = \frac{a\,(1-2\,m\,\pi')}{l\,\beta}A\,d.\,lg\,z + \frac{2\,A\,a\,m\,(\pi'-\pi'')}{\beta\,l}\,lg\,z''\,\Big(\frac{lg\,z}{lg\,z''}\Big)^nd.\,\Big(\frac{lg\,z}{lg\,z''}\Big)$$
d'où en intégrant :

$$lg \ p + C = \frac{a \ (1 - 2 \ m \ \varpi)}{l \ g} \ A \ lg \ z + \frac{2 \ A \ a \ m \ (\ \varpi' - \varpi'')}{\beta \ l \ (n + 1)} \ lg \ z'' \left(\frac{lg \ z}{lg \ z''}\right)^{n + 1}$$

La constante C doit être déterminée par la condition d'avoir p''=p, z'=z, t''=t à la station supérieure, et p'=p, z=1, t'=t à la station inférieure. On a donc

$$ly\left(\frac{p'}{p''}\right) = -\frac{a}{\beta}\frac{A}{l}lyz''\left\{1 - m\left(\frac{2n}{n+1}|\varpi' + \frac{2}{n+1}|\varpi''\right)\right\}$$

Et si l'on supprime les accents à la station supérieure et que l'on pose :

$$M = 1 - m \left( \frac{2n}{n+1} \ \varpi' + \frac{2}{n+1} \ \varpi'' \right) \dots \quad 17$$

on aura, en remplaçant z par sa valeur:

$$lg \frac{p'}{p} = \frac{A a}{\beta l} lg \left(\frac{1 + \beta t'}{1 + \beta t}\right) M \dots (18)$$

Pour déterminer la valeur de A nous devons intégrer l'équation  $(11)_2$  ce qui donne :

$$s = C - A t$$
 ou  $1 - \frac{a}{r} = C - A t$ 

Si l'on détermine la constante A de manière à avoir r=r'; pour t=t' et r=r'' pour t=t' on aura :

$$1 - \frac{a}{r'} = C - A t', \quad 1 - \frac{a}{r''} = C - A t'' \text{ d'où } A = \frac{a (r'' - r')}{r' r'' (t' - t'')}$$

ou bien en supprimant les accents à la station supérieure, comme nous l'avons déjà fait:

$$\Lambda = \frac{a(r-r')}{r \, r' \, (t'-t)}$$

Donc en substituant

$$\log\frac{p'}{p} = \frac{a^{2}\left(r-r'\right)}{r\,r'\,\beta\,l\left(l'-t\right)} \;\; lg\left(\frac{1+\beta\,l'}{4+\beta\,l}\right)\,\mathrm{M}.$$

6. En résolvant cette équation par rapport à la différence de niveau r-r' des deux stations on trouve :

$$(r-r') = \frac{l}{M} \frac{r r'}{a^2} lg\left(\frac{p'}{p}\right) \frac{\beta(t'-t)}{-lg\left(\frac{1+\beta t}{1+\beta t'}\right)} \dots (19)$$

En développant le dernier facteur du second membre, suivant les puissances ascendantes de  $\beta$  et en négligeant les termes affectés de la troisième puissance qui sont insensibles, on trouve :

$$\frac{\beta (t-t')}{-\lg \left(\frac{1+\beta t}{1+\beta t'}\right)} = \left\{1 + \frac{\beta}{2} (t'+t)\right\} \left\{1 - \frac{\beta^2}{12} (t'-t)^2\right\}$$

avec cette valeur l'éq. (19) devient :

$$r - r' = \frac{l}{M} \; \frac{r \; r'}{a^2} \; lg \left( \frac{p'}{p} \right) \; \left\{ \; \mathbf{1} + \frac{\beta}{2} \; (t' + t) \; \right\} \; \left\{ \; \mathbf{1} - \frac{\beta^2}{12} \; (t' - t)^2 \; \right\} \; . . \; (20)$$

Le log. contenu dans le second membre est népérien; si nous voulons le rendre tabulaire nous devrons le remplacer par  $\frac{1}{\mu}$  Log.  $\left(\frac{p'}{p}\right)$ ;  $\mu$  étant le module.

Les pressions p' et p s'obtiennent par l'observation de la hauteur de la colonne barométrique; on a par l'éq. (5):

$$p' - g' D. h'$$
 ;  $p = g D h.$ 

On a d'ailleurs:

$$g' = (g) \frac{a^2}{r'^2}$$
  $g = (g) \frac{a^2}{r^2}$ 

donc:

$$\frac{p'}{p} = \frac{r^2}{r^2} \frac{h'}{h} - \frac{h'}{h} \left(1 + \frac{r - r'}{r'}\right)^2 = \frac{h'}{h} \left(1 + 2 \frac{r - r'}{r'}\right)$$

en négligeant la fraction insensible  $(\frac{r-r'}{r'})^2$ .

Cette valeur de  $\frac{p'}{p}$  suppose que la pesanteur diminue en raison du carré de la distance au centre de la terre. Une diminution aussi rapide n'a lieu que dans les espaces atmosphériques; si les deux stations sont sur la surface de la terre, on doit avoir égard dans l'évaluation de la pesanteur, à l'action des couches de terrain comprises entre le niveau des mers et le point où se font les observations. Dans ce but on doit remplacer (*Poisson mèc.*, t. I, p. 495) le facteur

$$1 + 2 \frac{r - r'}{r'} \text{ par } 1 + 2 \frac{r - r'}{r'} - \frac{3}{2} \delta \frac{r - r'}{r'} = 1 + \frac{r - r'}{r'} \left(2 - \frac{3}{2} \delta\right)$$

où  $\delta$  exprime le rapport entre la densité de la terre à sa surface et sa densité moyenne. La densité moyenne de la terre est d'après les déterminations les plus récentes = 5,45 et la densité des couches superficielles varie en moyenne entre 2 et 5; en prenant  $\delta = \frac{1}{2}$ , on exprime l'état réel autant qu'il est actuellement connu. Le facteur devient donc:

$$1 + \frac{5}{4} \frac{r - r'}{r'}$$

et par conséquent:

$$\begin{split} lg\left(\frac{p'}{p}\right) &= \frac{1}{\mu} Log\left(\frac{h'}{h}\right) + \frac{4}{\mu} Log\left(1 + \frac{5}{4} \frac{r - r'}{r'}\right) \\ &= \frac{4}{\mu} \left\{ Log\left(\frac{h'}{h}\right) + \mu \frac{3}{4} \frac{r - r'}{r'} \right\} \\ lg\left(\frac{p'}{p}\right) &= \frac{1}{\mu} \left\{ Log\left(\frac{h'}{h}\right) + \mu \frac{5}{4} \frac{r - r'}{r'} \right\}. (21) \end{split}$$

Comme  $\frac{r-r'}{r'}$  est toujours une très-petite fraction, le der-Tome XIII,  $2^{\text{me}}$  Partie. nier terme du  $2^d$  facteur du  $2^d$  membre est très-petit à l'égard du  $1^{er}$ ; on pourra donc dans ce terme remplacer r-r' par sa valeur tirée de l'éq. (20), en remplaçant dans cette éq.  $lg \frac{p'}{p}$  par  $lg \frac{h'}{h}$ , en y faisant M=1, r=a; on aura ainsi :

$$\frac{r-r'}{r'} = \frac{l}{\mu a} Log\left(\frac{h'}{h}\right) \left\{1 + \frac{\beta}{2} (t'+t) - \frac{\beta^2}{12} (t'-t)^2\right\}$$

et par l'éq. (21):

$$lg\left(\frac{p'}{p}\right) = \frac{1}{a} Log\left(\frac{h'}{h}\right) \left\{1 + \frac{5}{4} \cdot \frac{l}{a} + \frac{5}{4} \cdot \frac{l}{a} \cdot \frac{\beta}{2} (t' + t) - \frac{5}{4} \cdot \frac{l}{a} \cdot \frac{\beta^2}{12} (t' - t)^2\right\}$$

Si nous substituons cette valeur dans l'éq. (20), en négligeant les termes du  $3^{\circ}$  ordre par rapport à  $\beta$ , nous aurons enfin:

$$r - r' = \frac{l}{\mu} \cdot \frac{4}{M} \cdot \frac{r r'}{a^2} Log\left(\frac{h'}{h}\right) \left\{ 4 + \left(1 + \frac{5}{4} \frac{l}{a}\right) \frac{\beta}{2} (t' + t) \right\}$$

$$\left\{ 4 - \left(1 + \frac{5}{4} \frac{l}{a}\right) \frac{\beta^2}{12} (t' - t)^2 \right\} \left\{ 1 + \frac{5}{4} \frac{l}{a} \right\} \dots (22)$$

7. Pour rendre cette formule applicable, nous devons déterminer la valeur numérique des constantes qu'elle renferme. Nous avons d'abord par l'éq. (6):

$$l = \frac{\gamma}{(g)} \cdot \frac{D}{\mathfrak{g}_1} \cdot 0^{\mathfrak{m}}, 76.$$

Les expériences qui fixent le poids de l'air et du mercure ont été faites par M. Regnault à Paris à la latitude de 48°. 50′. 14′, à une hauteur de 60 m au-dessus du niveau de la mer. Elles ont donné pour le poids du litre d'air sec à 0° sous la pres-

sion de 0<sup>m</sup>,76 (Mém. de l'Institut, Acad. des sc., t. XXI, p. 158).

16m,2932227 1

Cette détermination concerne l'air pur; mais dans l'air atmosphérique on a toujours trouvé un mélange d'acide carbonique qui augmente son poids. La proportion de ce gaz est variable, mais comme sa présence n'exerce qu'une influence très-faible, on peut lui supposer sa valeur moyenne qui est \(\frac{1}{10000}\) en volume. Comme la densité de l'acide carbonique à l'égard de l'air est 1,529, ce mélange augmente le poids de l'air dans le rapport de 1,0002116 à 1; on a donc pour le poids du litre d'air atmosphérique:

1gm, 2934963.

Un litre de mercure à 0° pèse d'après la détermination de M. Regnault :

13595gms,93.

#### On a d'ailleurs d'après les données précédentes :

<sup>1</sup> M Regnault donne 18m,293187, mais par suite d'une erreur de calcul qui a été 'signalée 12gm775706 par M. Lasch (Annalen der Physik und Chemie, Ergänzungs-12,780009 band III, p. 321). En faisant le calcul des 9 pesées du ballon plein d'air sec (Mém. de l'inst., t. XXI, p. 138), j'ai trouvé au lieu des 12,781074 12,776429 chiffres indiqués, ceux que je reproduis ici, qui donnent en moyenne pour le poids à 0° et sous la pression de 0m,76, de l'air sec 12,779353 12,777638 qui remplit le ballon, 125m,778444; en divisant ce poids par la 12,780834 capacité du ballon à cette température, savoir 9litres,881086 (ibid, p: 157), on trouve pour le poids du litre d'air sec 1gm.2932227 12,775924 au lieu de 1gm,293187. 12.779026

moyenne 12,778444

$$\gamma = G \; \left\{ 1 - \alpha \cos^2 \left( 48^{\circ} .\; 50' .\; 14'' \right) \right\} \frac{1}{1 + \frac{5}{4} .\; \frac{60}{a}} \; \; \mathrm{et} \; \; (g) = G \; (1 - \alpha \cos^2 \varphi) \; ;$$

substituant ces différentes valeurs dans l'éq. (6), on a:

$$l = \frac{\lambda}{1 - \alpha \cos^2 x}$$

en posant:

$$\lambda = \frac{\left\{1 - \alpha \cos^2\left(48^{\circ}.50'.14''\right)\right\}13595,93.0^{\circ}.76}{1,2934963\left\{1 + \frac{5}{4}.\frac{60}{a}\right\}}$$

8. Les différents auteurs donnent au coefficient a des valeurs très-variées. Ce coefficient exprime l'augmentation de la pesanteur au niveau des mers depuis l'équateur jusqu'au pôle. On peut le déduire de l'aplatissement de la terre au moyen du théorème de Clairaut; mais les expériences qui le donnent avec le plus de certitude sont celles de la longueur du pendule aux différentes latitudes. Par une discussion de toutes les observations faites jusqu'en 1850, Schmidt (Lehrbuch der math. und phys. Geographie, t. I, p. 381) fixe sa valeur à 0,005200481. Des expériences plus récentes de Forster (Memoirs of the Astronomical Society, t. VII), faites avec un pendule invariable dans un grand nombre de stations; donnent à ce coefficient la valeur très-peu différente 0,005218903. Nous admettrons la valeur de Schmidt comme déduite d'un plus grand nombre d'expériences. Avec cette valeur, en faisant  $a=6.366.198^{\rm m}$ , on trouve;

$$\lambda = 7970^{\text{m}},368$$
  $lg = 3.9014777$ 

$$l = \frac{7970^{\text{m}}, 422}{1 - 0.00520 \cos^2 \phi}$$

et

$$\frac{l}{\mu} = \frac{18352,422}{1 - 0.00520\cos^2 \alpha} \qquad lg = 4,2636934.$$

Nous prendrons pour valeur de l dans le facteur  $1+\frac{5}{4}\frac{l}{a}$  sa valeur à 45° qui est sa valeur moyenne; ce facteur est d'ailleurs si peu différent de l'unité que l'on obtient à peu près le même résultat, quelle que soit la latitude. Nous avons ainsi :

$$1 + \frac{5}{4} \cdot \frac{l}{a} = 1.001569035$$
  $lg = 0.0006809$ .

Il faut observer ici que s'il s'agissait de mesurer la hauteur dans un voyage aérostatique, il faudrait remplacer le facteur  $1 + \frac{5}{4} \frac{l}{a}$  par  $1 + 2 \frac{l}{a}$ , ce qui reviendrait à ajouter au logarithme de la hauteur obtenue dans la première hypothèse, le logarithme constant 0,0004087.

9. Le facteur M a pour valeur (17).

$$M = 1 - m \left( \frac{2n}{n+1} \pi' + \frac{2}{n+1} \pi \right)$$

Il exprime la correction due à la présence de la vapeur aqueuse dans l'air. Cette correction est dans le plus grand nombre des cas très-faible; cette circonstance fait qu'elle peut s'effectuer avec un assez grand degré d'exactitude, quoiqu'on ne connaisse pas la loi de la distribution de la vapeur aqueuse dans une colonne d'air dont on n'a étudié l'état hygrométrique qu'à ses deux extrémités.

Pour trouver la valeur de M, il faut d'abord fixer celle de n. Par les équations (12) et (16) on a :

$$\varpi = \varpi' - (\varpi' - \varpi'') \left(\frac{\lg z}{\lg z''}\right)^n$$

Or on trouve en développant les logarithmes en séries:

$$\lg z = -\left(\frac{\beta \left(t'-t\right)}{1+\beta t'}\right) \left\{1-\beta \cdot \frac{\left(t'-t\right)}{2\left(1+\beta t'\right)} + \frac{\beta^2}{3} \cdot \frac{\left(t'-t\right)^2}{\left(1+\beta t'\right)^2} \cdot \cdots \right\}$$

$$\lg z'' = -\left(\frac{\beta(t'-t'')}{1+\beta t'}\right) \left(1-\frac{\beta}{2}, \frac{t'-t''}{1+\beta t'} + \frac{\beta^3}{3}, \frac{(t'-t'')^2}{(1+\beta t')^2} + \cdots\right)$$

et par conséquent :

$$\frac{\lg z}{\lg z''} = \frac{t'-t}{t'-t''} \left( 1 - \frac{\beta}{2} \frac{t-t''}{1+\beta t'} + \cdots \right)$$

et à très peu près, en négligeant dans cette correction les quantités du 2<sup>me</sup> ordre:

$$-\frac{\lg z}{\lg z''} = \frac{t'-t}{t'-t''}$$

L'équation précédente revient donc à :

$$\pi = \pi' - (\pi' - \pi'') \left(\frac{t' - t}{t' - t''}\right)^n$$

Pour déterminer la valeur qu'il convient de donner à n

pour que l'équation précédente se rapproche autant que possible des faits, qu'elle représente d'ailleurs exactement aux deux stations extrêmes, j'ai supposé une colonne verticale d'air dans laquelle la température décroissait proportionnellement à la hauteur et en calculant la pression d'après la hauteur et en supposant la fraction de saturation la même dans toute la colonne, j'ai trouvé pour n des valeurs qui variaient entre 0,60 et 0,95. J'ai admis  $\frac{4}{5}$  comme moyenne; avec cette valeur l'équation (17) devient:

$$M = 1 - m \left( \frac{8}{9} \varpi' + \frac{10}{9} \varpi \right)$$

Nous avons fait  $m = \frac{1-\delta}{2}$ ,  $\delta$  étant la densité de la vapeur d'eau à l'égard de celle de l'air sec; en supposant  $\delta = 0.6219$ , qui est la valeur théorique de cette densité, on en conclut m = 0.18905.

On peut observer maintenant que, eu égard à la petitesse de cette correction, on peut, en négligeant les quantités du second ordre, écrire:

$$M = \left(1 - m\frac{8}{9} \pi'\right) \left(1 - m\frac{40}{9} \pi\right)$$

10. Le facteur  $\frac{r r'}{a^2}$  revient à  $\left(1 - \frac{r' - a}{a}\right) \left(1 - \frac{r - a}{a}\right)$  et r' - a et r - a expriment les hauteurs des deux stations au-dessus du niveau des mers. Nous admettrons comme plus haut que  $a = 6\ 366\ 198$  mètres.

366 NOTE

Si maintenant nous posons:

$$A = \frac{\lambda}{\mu} \left\{ 1 + \left( 1 + \frac{5}{4} \frac{l}{a} \right) \frac{\beta}{2} \left( t' + t \right) \right\}$$

$$B = \left( 1 + \frac{5}{4} \cdot \frac{l}{a} \right) \left\{ 1 - \left( 1 + \frac{5}{4} \frac{l}{a} \right) \frac{\beta^2}{12} \left( t' - t \right)^2 \right\}$$

$$C = \frac{1}{1 - m \frac{8}{9} \pi}$$

$$D = \frac{4}{1 - m \frac{10}{9} \pi}$$

$$E = \frac{4}{1 - \alpha \cos^2 \varphi}$$

$$F = 1 - \frac{r' - a}{a}$$

$$G = 1 - \frac{r - a}{a}$$

l'équation (22) deviendra:

[23] .... 
$$r-r' = Log \frac{h'}{h}$$
. A. B. C. D. E. F. G.

et par conséquent :

$$(24) \dots Log (r-r') = Log (Lg h' - Lg h) + Lg A + Lg B + Lg C + Lg D$$

$$Lg E + Lg F + Lg G.$$

On obtient ainsi immédiatement le logarithme de la différence absolue de niveau exprimée en mètres, par la somme de 8 logarithmes.

Le premier se détermine au moyen des tables de logarithmes, et en raison de la précision qu'on peut atteindre au moyen du baromètre pour mesurer les hauteurs, les tables à 5 décimales sont suffisantes.

Le  $\log A$  est donné par la table I qui a pour argument la somme des deux températures t'+t; elle est calculée de dixième en dixième de degré pour éviter les interpolations.

Le log B est donné par la table II qui a pour argument la différence des températures; la disposition de la table est telle que le logarithme qui doit être choisi est placé en regard des deux arguments entre lesquels se trouve la différence entre les températures observées.

Le  $\log C$  est donné par la table III dont la disposition à l'égard de l'argument est la même que dans la table précédente. L'argument de cette table est  $lg - \frac{8}{9} - \varpi'$ ; pour trouver cet argument on prend dans la table IV le logarithme de la pression de la vapeur d'eau qui répond à la température observée à la station inférieure, on lui ajoute le log. constant  $9.9488 \ (lg - \frac{8}{9})$ , le logarithme de la fraction de saturation et le complément du logarithme de la pression barométrique. La table IV est déduite de celles de M. Regnault sur la pression de la vapeur d'eau à saturation.

Le  $\log D$  se détermine par la même table; seulement à l'égard de D on prend pour argument  $\log \frac{40}{9} \varpi$ . Pour obtenir cet argument, on additionne 1° le logarithme qui dans la table IV répond à la température observée à la station supérieure; 2° le logarithme de la fraction de saturation correspondante; 5° le logarithme constant 0.0458  $(lg^{-\frac{10}{9}})$ ; 4° le complément du logarithme de la hauteur barométrique h.

368 NOTE.

Le  $log\ E$  s'obtient par la table V dont l'argument est la latitude moyenne entre les deux stations.

Le  $\log F$  s'obtient par la table VI, l'argument est la hauteur de la station inférieure au-dessus de la mer, ou, si elle est inconnue, la pression barométrique à cette station.

Le  $\log G$  s'obtient par la même table, en prenant pour argument la hauteur de la station supérieure au-dessus de la mer ou à défaut la pression barométrique observée à cette station.

Je donnerai pour exemple le calcul de la hauteur du ballon de MM. Barral et Bixio, à 4<sup>h</sup> 25', page 2.

		Log h'	= 9.8	7709
		Log h'	= 9.5	4127
	_	$Log \frac{h'}{h}$	= 0.3	3582
	Log	Log h'	= 9.5	2611
Argument	703	Lg $A$	=4.2	6947
»	28°3	Lg B	== 0.0	0029
»	8.2303	Lg C	=	140
»>	7.7641	$Lg^{\epsilon}_{i}D$	==	48
»	48°.50′	Lg E	=	98
<b>»</b>	0m,7534	Lg F		0
>>	0,3477	Lg G		43
Ascension	en ballon	Lg co	nst <sup>t</sup> =	41
	Lg (	$r-\overline{r'}$	=3.7 $=630$	
				,,,

Argument de	C	de D
Table IV	8,1809	7,2819
lg fract. de saturª	9.9777	9.9777
lg constant	9.9488	0.0458
comp. log pression	0.1229	0.4587
_	8.2303	7.7641

TABLE I.

Argument t + t' Log A

_													$\boxed{\begin{bmatrix} t'+t \\ +0,0 \\ 0,1 \\ 0,2 \\ 0,3 \\ 0,4 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,6 \\ 0,7 \\ 0,8 \\ 0,5 \\ 0,8 $										
-	- t	- 0,0	0°1	0°2	003	0°4	0°5	0°6	0°7	0"8	0°9	t'-	+1	+0,0	0,1	0,2	0,3	0.4	0,5	0,6	0,7	0,8	3 (
	30	4,23910	901	893	881	876	868	859	851	819	83.1		17	4,27704	711	719	727	795	742	750	750	765	
	29						952					11 '	18	781	780	796	80.1	812		827			
		4,24078					036					ш	19					889		904			
	27					128	120					П	20		943					981			
	26				221						170	Ш	_	4,28	10.20				10.0	0.51	1	1	1
	25	329	321	313	304	296	288	279	271	263	254	П									i		ľ
	24	413	405	396	388	380	371	363	351	346	338	11+	21	012	019	027	034	042	050	058	065	073	
	23		488			463	455					11	22	088	096	101	111	119		134			
	22				554						505	11	23		173	180	188	196	203	211	219	226	ŀ
	21	662	654	646	637	629	621	613	604	596	588		24		249								
												Ш	25	318	325	333	341	348		363			
	20				720		704					Ш	26	391	401					439			
	19				803						753	ш	27	470			493			515			
	18				886						836	Ш	28 29	040	553	561	568	576		591			
	17	4,25075			968		031				919	Ш	30		629	037	61.1	6.52		667			
					132						083	ll .	90	031	705	112	720	121	130	742	190	158	T
	15				214						165	+	31	773	780	700	~0=	000	010	010	0.15	022	I.
	13				296						247	11 '	32	818	855	863	193	000		818			
	12				378						329	H	33		931					968			
	ıı				459						410	li –	34	998	301	000	940	333	1001	300	310	300	ľ
		20-		10.	100	201	110	100		1220	110	H		4,29	006	013	021	098	036	043	051	058	1
	10	565	557	549	540	532	524	516	508	500	492	li .	35		081					118			
	9				622		605				573	li .	36		156					193			
	8				703						654	H	37	223	230	238	245	253		268			
	7	808	800	792	784	775	767	759	751	743	735	H	38		305					342			
	6	888	880	872	864	856	848	840	832	824	816	Ш	39		379					416			
	5	969	961	953	945	937	929	921				ш	$4\hat{v}$		454				483	491	498	505	1
	4								993	985	977	11.											l
		4,26049					009					1	41	520	528	535	543	550		565			
	3				106		089						42	594	602	609	617	624		639			
	2				186						138		43	668	676	683	690	698		713			
	1				266						218	ш	44		750					786			
-	0	369	30 T	353	345	337	329	321	314	306	208	1	45 46		823					860			
		0,0	0,1	0.0	0,3	0.4	0.5	0,6	0 77	0,8	0.0		47	009	897	904	911	919	926	933	941	948	1
		0,0	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	ll .		4,30	970	918	985	992	000	0.05	014	000	1,
		4,26369	377	205	303	363	409	417	125	133	441	fi .	48		043	051	AEO	00-		080			
	1				473		489				521	1	49		117					153			
	2				552		568						50		190					226			
	3				632		647						-	200		201	#U±	422	210	220	-50	~11	1
	4				711		727				758	1	51	255	263	270	277	285	292	299	306	313	
	5		774			798	806	813	821	829	837		52		335					372			
	6				869		884	892	900	908	916		53		408					441			
	7		932			955	963						54	473	481	488	495	502		517			
		4,27002									073		55	546						589			
	9				104		120						56	618					654				
	10	159	167	175	183	191	198	206	214	222	230		57	690						734			
			2.0		207	200	320	20.7	202	.300	200		58	763			784		799				
	11				261						308		59	835				863	871				
	12				339						386		60	906	914	921	928	935	942	949	957	964	1
	13				417		432					1	61	077	00-	000	000						
	14				494						541	+	01	1 31 977	985	993		(100	010	000	020	02=	0
	15				572		665				619		63	4,31	0-0	nc (			013				
	16	020	0.3-1	043	650	100	600	010	1190	003	000		00	0.49	U U	100	911	018	085	033	100	TOI	L

## TABLE III.

Log C. Argument  $lg = \frac{8}{9} = 2$ . Log D. Argument  $lg = \frac{10}{9} = 2$ . 0,0458

Argomeal	Log	Argument	Log 0,00	Argument	Log 0 Oh	Argument	Lng 0,011	Argument	Log 0,00	Argument	Log 0,00	Argument	Log 0,00	A goment	Log 0,00	Argument	Log 0.00
		7,806		8,108		8,285		S, 4100		8,5067		8,5858	4.7.0	8,6526		8,7104	
∞ 5,788	000	814	053	112	106	288	159	119	212 213	084	265	872	318	537	371	114	424
6, 261	001	822	054	117	107	200	160	140	214	8,5101	266	885	320	549	372 373	124	425
483	002	830	055	121	108	293	161 162	160	215	116	267 268	809	321	561	374	134	127
630	003	837	056	125	109	296	163	180	216	132	260	8,5912	322	572	375	144	128
739	001	845	058	128	111	298	164	8, 4200	217	149	270	926	323	584	376	154	429
826	006	853	059	132	112	8 301	165	220	218	181	271	939 952	324	595 8,6607	377	164 174	430
809	007	860	060	136	113	304	166	240 260	219	196	272	966	352	618	378	185	131
961	003	867	061	140	114	300 309	167	279	220	8,5212	273	979	326	630	379	195	432
7,015	009	874 881	062	144	115	311	168	299	221	558	271	992	327	641	380	8,7205	433
064	010	888	063	151	116	314	169	8, 4319	223	244	275	8,6005	328	652	381	215	434
7,107 $147$	011	895	064	155	117	317	170	338	223	260	276	018	329	664	382	225	435
183	012	7.902	065	159	118	319	171	357	221	275	277	032	331	675	384	231	436
7,216	013	908	066	162	119	322	172  $ 173 $	377	226	291	278	045	332	686	385	244	438
247	014	915	067	166	120	321	174	396	927	8,5306	279 280	058	333	697	386	251	439
276	015	921	069	170	121	327	175	8, 4415	228	521	281	071	331	8,6709	387	264	410
7,303	017	927	070	173	123	329	176	434	229	352	282	081	335	720 731	338	274 284	441
328	018	933	071	111	124	332	177	453 472	230	368	1 2.2.2	8,6109	336	7.11	389	203	412
353	019	910	07.0	180	125	334	178	490	231	383	284	122	337	753	390	8,7303	443
376	020	946		181 187	126	339	179	8. 4509	232	398	285	135	333	764	391	313	111
397	021	952 957	01-1	101	127	341	180	528	2.7.5	8,5413		148	339	775	392	323	445
7,418	0.55	963	075	10.1	128	344	181	546	1231	428		161	340	786	393	332	416
456	023	969	1010	197	129	346	182	5.65		443	1288	173	342	797	395	342	447
475	024	075		8.201	130	315	183	583	230	458	'289 290	186	313	8,6808	396	352	449
492	025	1 090		204	13.20	351	195	8,4601	0.33	473 488		198	311	819	397	361	150
7,504	020	986	080	7 207	133	353	120	619	239	8,5503		8,6211	345	833	398	371	451
525	028	991	081	210	1224	350	10-	0.07	210	518		224	346	841	399	380	152
510	0-20	996	1080	214	135	35	100	656	3 (1	533	20.4	249	347	862	400	$\frac{1}{1}$ 8,7400	453
555	030	8,002		217	136	362		693				261	348	873	401	409	4.54
570	031		UN.	-).)?	101	200	1196	8,4709	213			273	3.19	881	402	419	455
583	, 0.52	015	:080	901	. T.36	360	1191	1 797	241	010		286	350	895	403	429	436
597 7.610	10000	1193	Juer.	9:31	193	369	, 192	745	1240	1 000	208	298	351	8,6905	401	439	157
623	1003	0.27	1001	999	TAC	371	[19]		246	10,0000	299	8,6310	352	916	106	419	458
630	U.J.	035	108.	1 -2 -3 -	141		194	101		620		323	351	927	107	458	460
648	10.00	135		23:		011		131	100	004	lons	335	355	937	408	467	461
659		042	001	242	111	210	110-	10.401	350	040	Sugar	347	356	918	400	477	462
671	039	ıí 0±,	005	24.	111	200	1100	0.00	1051	663	1200	359	357	958	410	186	163
68:	010	051	000	248	110	34:	100	1 045	1350	691	10000	371	358	969 980	111	8, 75 11	707
693	0.13	050	119	201	1.17		300		253	8.5703		395	359	990	412	513	465
7,70:	049	001		254 257		389		8, 490	251	719	307	8 6107	360	8,7000	413	522	466
71.	1040		Jose	260	Tar	39	202	918	3 25.	734	308	419	361	011	114	531	167
72 73	04:	0.7	1001	9/:-	11.1	300	1 200	93	1 200	748	309	131	362	021	415	540	468
74;	) U 10	0.50	1008	26.	(151	391	303	3 00.		101		443	363	032	417	549	470
75	1020	1185	3 09:	268	119:	00		300		1110	1013	455	364	042	418	558	471
76			100	7.1	158	533		100	2000	190	010	467	366	052	419	567	170
77		091		) 21:	15	0 40	2000	16,000.	261	0,0300	107.4	419	367	063	120	576	172
78	050	1 090	110.	211	1356	40.	* 200	010	2000	810	315	401	368	073	421	585	174
78	9 05	100	10	1 213	150	400	21/		1100		1110	8,0502	369	083	422	591 8.7603	475
79	1 05	10-	1 10		1 1 50		1211		1000			514 8,6526	370	8,7101	423	613	
7,80	D	108	3	28.	'	410		9 900		0,0000		0,0020		1 1101		020	
	1_		1	1	]	1	1		1	1			1	)			1

# TABLE IV.

lg. tension de la vapeur à saturation.

=					-,				_	_				_										
	ŧ	- 0,0	0,1	0, 2	2 0.3	3 0, 4	0, 8	5 0,6	0,7	0,8	0,9		t	(	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
ŀ	- 25 25	1 .						1710			700	+			2671				777	803	830	857	883	909
	25	3 800	$\frac{0}{6}$	799	795		787	7 784	780	776	736		22	- 8,	3		989	015	041	067			147	173
	21					828		$\frac{5}{2} \begin{vmatrix} 821 \\ 858 \end{vmatrix}$			810 847		23	1	460	487	513		565	590	[617]	643	409 669	435 694
-	- 20	6,919	915	911	908	3 904		896					25 26	3	720 977			798					926	
	19	957	953	949	946	942	938	934	930		923		27	- 8, .	4			055 310			131 386		183	
	17 16	7,034		026	022	018	014	011	007	003	000		28	3	487	513	538	564 815	588	614	639	661	690	715
	15	110	106	103	099		091	087	083	080			30		990		l i			1			940	
	13	187	183	179	175	172	168	164	160	156	152	,			i	- }	1	064					189	
	12 11		221 259	217 255		210 248		202	198 236	194 233		+	31	1	238	509	534	558	583	607	386 631	656	681	705
-	- 10					286							33 34		730	754 99 <b>7</b>	779	803	827	852	876	900	924	949
	9 8	338	335 372	331 368	327 365	324 361	357	353	350		342		35	8,6	215			046 287		093	118 358		166 406	
	7 6	413	409	405	402	398 435	394		387	383	380		36 37	ſ	454 692	178	502	525	519	573	597	621	614	668
	5		483	479		472		464	461		453		38	1	929 9			999	- 11	1			881	1
	3	558	554	551	547	544	540	537	533	529	526		39		163 1			233	256	580	303	326	116 349	373
	1	628	625	621		614	611	607	569 604	600	597		40		396	19	443	466	489	513	536	559	582	606
-	0	0,0			$\frac{653}{0,3}$				$\frac{639}{0,7}$		$\frac{632}{0,9}$													
+	- 0 1	7,6628	659	690	721		_			875	_					T	Al	BL	E	VI.				
	2	7,7			029 337	060 367			152 458			A		g F e Lg E.				Lg F o		7.		lg F et	t Arg.	
	3	549		610	640	670	700	731	761	792	821	-	1	1	pressi	- II	-			ıl.		-		=
		7,8	182	1				032 ( 331 :					en eur.	0,00	baror			0,00	baron	ion b	netr.	0,00	pressi baron	_
	6 7	450		510	539	569	599	628 923	658	688				0001	0m,7	60 2 53 3	lannel	020	6m.5	40 5 30 5	0.40	0.101	0m.3	
	-	7,9			128			215		(	011 303	2:	20 (	001 002	7.	40 3	152	021 022	5	21 6	086	041	3.	65 58
	9	040 332	361	390	419	448	477	506	535 3	564	593	5	13	003	7	28 3 16 3	446	023	5(	02 6:	380	043	3.	51
	10	621			708	137	105	794 8	022	16.0	000	80	00	005		03 3 92 3	739	025 026		84 60	573	045	36	
+		8,0	937	i				080				110	00	000	68 66	30 3 38 4	886 032	027	47	$75 68 \\ 66 69$	320 0 067 0	047	31	25
	12 13	194	223 506	534	563	590	618	364 3 646 6	675 7	703 7		12: 139	93	009	63	57 4 15 4	179	028	43	$\frac{58}{19}$ , $\frac{71}{7}$	113	048	31	12
	14	758 8,1			843	871	898	927 9	954 9	982	011	153	39 1	010	60	31 4	472	030	4	$\frac{13}{41}$ $\frac{74}{33}$ $\frac{75}{75}$	107 0	)50 )51 0	30 30, <sub>29</sub>	00
	15 16	038	066					205 2 480 5		260 2	288	3 1911	32   0	012	61	12 4	765	032	42	25 77 17 78	00 0	153	28	88
	17	590	618	615	672	700	727	754 7				213	26 0	014	0 <b>m</b> ,59	10 50	059	034	40	79  79	94 0	54	28 27	7
	18	8,2	890	1		- 1		026				211	$\frac{721}{19} \frac{0}{0}$	016	57	0 5	206 353	020	0m,39		88 0	56 57	27 26	6
	19 20	134	161 3 430 4					296   3 564   5				250 271	19.0	)18		50 5: 50 56	646	038	37	87 81 79 85	81 0	58	26 25	
1	201				-	_			_	_		1		A I I Care				1.				122		
	20				_		-					285	910	019		10,57	793	- 9	37	72  87	28 0	59	25	

TAI	BLI	E 11.	(1)					T	AΒ	LE	v.				
Arg.	Log B	. Arg. 1	log B.	Ar	g.	Log E.	År	g.	Log E.	A	g.	Log E	. A	₫g.	Log E.
t'-t	0,00	t'-t	0,00	Latit	nde.	0,00	Latit	ade.	0,00	Lotit	ude.	0,00	Latit	ude.	0,00
t'-t  0°,00 2,91 5,38 7,04 8,37 9,52 10,55 11,48 12,35 13,16 14,62 15,31 91 14,62 15,31 91 14,62 22,39 44 23,28 72 24,15 57 98 25,39 24,15 57 98 25,39 24,15 57 98 25,39 24,15 57 98 25,39 24,15 57 98 25,39 26,19 58 60 27,34 71 28,08 30,19 53 86 31,20 53 87 88 31,20 53 88 631,20	0,00  068 068 067 066 065 064 063 062 059 058 052 054 053 052 054 053 052 049 048 047 046 045 040 049 048 043 042 041 040 039 038 037 036 035 031 030 029 028 027 026 025 023 622 021 020 019 018 017	t'-t  32°,48 80 33,11 42 72 34.03 33 62 92 35.21 50 78 36.07 36,64 92 37,19 47,74 38.01 39,08 40,11 37 62 87 41,12 86 42,11 35 59 83 43,07 61 86 42,11 70 93 44,01 21 47 70 93 45,16 83 46,06	0,00  016 015 014 013 012 011 010 008 007 006 005 004 003 002 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035	77° » 76° » 75° » 74° » 72° » 70° » 69° » 68° » 66° » 66° » 66° »	33' 58 24 19 49 49 49 550 22 555 528 2 311 46 22 335 11 40 20 30 318 58 37 17 57 37 18 59 40 20 11 53 36 47 20 11 53 36 6 47 20 11 53 36 6 47 36 6 6 47 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0,00  011 012 013 014 015 016 017 020 023 026 027 028 029 030 031 032 033 036 037 038 039 040 041 045 046 047 048 049 050 056 057 058 050 056 060 061 062	570 » » » 560 » » » » 550 » » » » » » » » » » » » »	ade.   43' 26 9 47 30 47	0,00  065 0667 0668 0677 0688 079 070 078 079 080 081 082 083 084 089 090 091 002 093 094 097 100 100 110 110 110 111 112 113 116 116 116 116 116	Lotit  430		0,00   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   130   131   133   134   135   136   137   138   140   141   141   142   143   144   145   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171	Latit	11' 53 35 17 59 40 22 3 44 26 6 47 28 8 48 8 27 6 45 21 118 5 32 9 16 22 27 41 15 47 20 51 21 49 16 41 5	0,00  173 174 175 176 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 191 192 200 201 202 203 204 205 207 208 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
(1) A pa de l'argun soustracti	ient, le	e la valeur 8 logarithme	37°,47 es sont	570"	59 43	064	430 "	53 38	118	"	29 11	172	() <sub>0</sub> »		226

# MÉMOIRE

SUB

# LA CAUSE DES AURORES BORÉALES

PAR

M. le Prof. A. DELA RIVE.

Communiqué à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, en Décembre 1848 et Novembre 1853.

Quand je publiai dans la Bibl. Univ., en juin 1836, une notice sur l'origine de la grêle et de l'électricité atmosphérique, j'entrevoyais déjà que je pourrais rattacher aux mêmes causes la production de l'aurore boréale et celle des variations diurnes et irrégulières de l'aiguille aimantée. Je me bornai à indiquer alors ce rapprochement; je n'osai insister, n'ayant jamais vu, à cette époque, d'aurores boréales et n'ayant pas encore réuni assez de faits pour établir avec quelque certitude une théorie.

Dès lors j'ai été témoin de deux belles aurores boréales, et l'apparence qu'elles m'ont présentée, en particulier celle du 17 novembre 1848, m'ont tout à fait confirmé dans les

<sup>1</sup> Voyez Bibl. Univ., 1836, tome III, page 217.

idées que je m'étais formées sur la nature de ce phénomène, d'autant plus qu'elles s'accordent très-bien avec les observations faites par plusieurs physiciens, soit à l'occasion de l'aurore que je viens de citer, soit précédemment, en particulier avec celles de Hansteen, de Bravais et Lottin, ainsi qu'avec les détails intéressants et nombreux que M. de Humboldt donne dans son Cosmos sur ce brillant météore. Quelques expériences électriques que j'ai faites récemment m'ont paru également pouvoir jeter du jour sur l'origine de l'aurore boréale. Cette dernière observation indique clairement que j'estime que cette origine est électrique, idée souvent mise en avant par M. Arago, à l'époque de la découverte d'Oersted. Mais personne, je ne sache, n'a jamais, jusqu'ici, expliqué le mode de production et d'action de l'électricité dans l'aurore boréale, non plus que dans les phénomènes qui l'accompagnent et qui se rattachent à la même cause.

Je n'exposerai point dans ce mémoire un historique des explications diverses qu'on a cherché à donner de l'aurore boréale, je ne les mentionnerai qu'en passant, lorsque l'occasion s'en présentera. Je me bornerai à décrire d'abord sommairement le phénomène lui-même et les effets qui l'accompagnent généralement, je passerai ensuite à l'exposition de ma propre théorie, et je chercherai à montrer qu'elle s'accorde avec les faits observés.

# § 1. Description de l'aurore boréale et des effets qui l'accompagnent.

J'emprunte au Cosmos les principaux détails relatifs à l'apparence du phénomène; ils sont du reste extraits eux-mêmes de la description qu'en ont donnée les observateurs, tels que Hansteen, Bravais, Lottin et les divers voyageurs qui ont été placés de manière à voir de près et souvent des aurores boréales. Mais le savant auteur du Cosmos les a groupés avec cet art d'en faire ressortir les points essentiels qui n'appartient qu'à lui, et dans lequel il semble pressentir avec un tact scientifique admirable la véritable théorie des phénomènes qu'il décrit.

Une aurore boréale est toujours précédée de la formation à l'horizon d'une sorte de voile nébuleux qui monte lentement jusqu'à une hauteur de 4 à 6, à 8 et même à 10 degrés. C'est vers le méridien magnétique du lieu que le ciel, d'abord pur, commence à se rembrunir. A travers ce segment obscur dont la couleur passe du brun au violet, les étoiles se voient comme à travers un épais brouillard. Un arc plus large, mais d'une lumière éclatante, d'abord blanc, puis jaune, borde le segment obscur. Quelquefois l'arc lumineux paraît agité pendant des heures entières, par une sorte d'effervescence et par un continuel changement de forme avant le lever des rayons et des colonnes de lumière qui montent jusqu'au zénith. Plus l'émission de la lumière polaire est intense et plus vives en sont les couleurs, qui du violet et du blanc bleuâtre

passent par toutes les nuances intermédiaires, au vert et au rouge purpurin. C'est comme les étincelles électriques qui ne se colorent que si la tension est forte et l'explosion violente. Tantôt les colonnes de lumière paraissent sortir de l'arc brillant, mélangées de rayons noirâtres semblables à une fumée épaisse, tantôt elles s'élèvent simultanément en différents points de l'horizon; elles se réunissent en une mer de flammes dont aucune peinture ne saurait rendre la magnificence, car à chaque instant de rapides ondulations en font varier la forme et l'éclat. Le mouvement paraît accroître la visibilité du phénomène. Autour du point qui répond, dans le ciel, à la direction prolongée de l'aiguille d'inclinaison, les rayons paraissent se rassembler et former la couronne de l'aurore boréale. Il est rare que l'apparition soit aussi complète et se prolonge jusqu'à la formation de la couronne; mais quand celle-ci paraît, elle annonce toujours la fin du phénomène. Les rayons deviennent alors plus rares, plus courts et moins vivement colorés. On ne voit bientôt plus sous la voûte céleste que de larges taches nébuleuses immobiles, pâles ou d'une couleur cendrée; elles ont déjà disparu que les traces du segment obscur par où l'apparition débuta, persistent encore à l'horizon.

La liaison qui paraît exister entre la lumière polaire et l'apparition d'une certaine espèce de nuages est confirmée par tous les observateurs, tous ont affirmé que la lumière polaire émettait ses plus vifs rayons lorsque les hautes régions de l'air contenaient des amas de circo-stratus assez tenus et assez légers pour faire naître une couronne autour de

la lumière. Quelquesois ces nuages se groupent et s'arrangent à peu près comme les rayons d'une aurore boréale; alors ils paraissent troubler l'aiguille aimantée. Après une brillante aurore boréale, on a pu reconnaître dans la matinée suivante des traînées de nuages qui avaient paru pendant la nuit autant de rayons lumineux.

La hauteur absolue des aurores boréales a été estimée d'une manière très-différente par les observateurs. On a cru longtemps pouvoir la déterminer en regardant, de deux endroits très-distants l'un de l'autre, la même partie de l'aurore, par exemple la couronne; mais on partait d'une base inexacte, savoir que les deux observateurs avaient bien leurs yeux dirigés sur le même point en même temps, tandis qu'il est bien prouvé maintenant que la couronne est un effet de perspective dû à la convergence apparente des rayons parallèles situés dans le méridien magnétique; de sorte que chacun voit son aurore boréale comme chacun voit son arc-en-ciel. Aussi l'aspect du phénomène dépend-il de la position de l'observateur. Le siége de l'aurore boréale est dans les régions supérieures de l'atmosphère; quelquefois même il paraît qu'elle se produit dans les régions moins élevées où se forment les nuages. C'est du moins ce qui résulte de quelques observations, de celles notamment du capitaine Franklin, qui vit une aurore boréale dont la lumière lui parut éclairer la surface inférieure d'une couche de nuages, tandis qu'à 30 ou 40 kilom. plus loin M. Kendal, qui avait veillé toute la nuit sans perdre le ciel de vue un seul moment, n'aperçut aucune trace de lumière. Le

capitaine Parry a vu une aurore boréale se dessiner contre le flanc d'une montagne, et on assure qu'on a aperçu quelquefois un cercle lumineux sur la surface même de la mer autour du pôle magnétique.

Mairan et Dalton avaient cru que l'aurore boréale était un phénomène cosmique et non atmosphérique. Mais déjà M. Biot, qui avait eu l'occasion d'observer lui-même les aurores aux îles Shetland en 1817, avait été conduit à reconnaître que c'est un phénomène atmosphérique, par la considération que les arcs et les couronnes de l'aurore ne participent nullement au mouvement apparent des astres d'orient en occident, preuve qu'ils sont entraînés par la rotation de la terre. Dès lors presque tous les observateurs sont arrivés à la même conclusion, en particulier MM. Lottin et Bravais, qui ont en l'occasion d'observer plus de 143 aurores boréales, dont ils ont donné des descriptions détaillées sur lesquelles nous reviendrons.

Il est donc bien constant maintenant que l'aurore boréale n'est point un phénomène extra-atmosphérique. Aux preuves tirées de l'apparence même du phénomène, on peut en ajouter d'autres tirées de certains effets qui l'accompagnent, tel que le bruit de crépitation que les habitants les plus rapprochés du pôle affirment entendre quand il y a apparition d'une aurore, telle que l'odeur sulfureuse qui l'accompagne également. Enfin, si le phénomène se passait en dehors de notre planète et de son atmosphère, pourquoi n'aurait-il lieu qu'aux régions polaires.

M. de Tessan qui, dans le voyage autour du monde de

la Vénus, a eu l'occasion de voir une belle aurore australe qu'il décrit avec beaucoup de soin, estime aussi que ce phénomène se passe dans l'atmosphère. Le sommet de l'aurore boréale étant dans le méridien magnétique, il n'était élevé que de 14° au-dessus de l'horizon, et le centre de l'arc était sur le prolongement de l'aiguille d'inclinaison, l'inclinaison étant d'environ 68° au lieu de l'observation. M. de Tessan n'a pas entendu de bruit provenant de l'aurore, ce qu'il attribue à ce qu'il était trop éloigné du lieu du phénomène, mais il rapporte l'observation d'un officier distingué de la marine française, M. Verdier qui, dans la nuit du 13 octobre 1819, étant dans les parages de Terre-Neuve, avait entendu trèsdistinctement une sorte de pétillement, soit de crépitation, lorsque le bâtiment qu'il montait s'était trouvé au milieu d'une magnifique aurore boréale. Tous les détails dans lesquels entre M. de Tessan prouvent l'exactitude de l'observation.

Nous venons de signaler, comme effets concomitants de l'aurore boréale, un bruit de crépitation semblable à des décharges éloignées et une odeur sulfureuse analogue à celle qui accompagne la chute de la foudre; M. Matteucci a encore observé, pendant l'apparition de la dernière aurore boréale, des signes prononcés d'électricité positive dans l'air. Mais de tous les phénomènes, ceux qui ont le plus invariablement lieu en même temps que l'apparition d'une aurore boréale, ce sont les effets magnétiques. Les aiguilles aimantées éprouvent dans leur direction normale des perturbations qui la font dévier à l'ouest quelquefois et le plus souvent

à l'est. Ces perturbations varient d'intensité, mais elles ne manquent jamais d'avoir lieu, et se manifestent même dans des lieux où l'aurore boréale n'est pas visible. Cette coïncidence, constatée par M. Arago sans aucune exception, pendant plusieurs années d'observation, est telle que le savant français a pu, sans jamais être pris en défaut, accuser, du fond des caves de l'observatoire de Paris, l'apparition d'une aurore boréale dans notre hémisphère. M. Matteucci a eu l'occasion d'observer, sous une forme nouvelle et remarquable, cette influence magnétique : il a vu, pendant l'apparition de l'aurore boréale du 17 novembre 1848, les armures de fer doux servant aux télégraphes électriques placés entre Florence et Pise, rester attachés à leurs électro-aimants comme si ceux-ci étaient fortement aimantés, sans que cependant l'appareil fût en action et sans que les courants des piles fussent mis en activité. Cet effet singulier cessa avec l'aurore, et le télégraphe ainsi que les piles purent opérer de nouveau sans avoir éprouvé aucune altération.

M. de Tessan cite encore une observation faite, en 1818, dans les mêmes parages de Terre-Neuve par un autre officier de marine, M. Baral, qui s'aperçut, au bout de quelques jours, qu'on avait fait fausse route en suivant les indications des compas; et, vérification faite, on trouva toutes les boussoles du bord affolée. Il n'y avait eu cependant, depuis les dernières observations de déclinaison magnétique, aucun orage, aucun tonnerre, aucun phénomène électrique apparent; on n'avait pas touché au compas. Seulement le soir même du jour où les dernières observations de déclinaison avaient

été faites, il y avait eu une aurore boréale des plus brillantes, et M. Baral n'avait pas hésité d'attribuer à l'influence de cette aurore l'affolement des boussoles, conclusion d'autant moins suspecte d'être dictée par la théorie, qu'à cette époque (1818) les rapports entre l'électricité et le magnétisme n'étaient pas encore connus.

La liaison intime et constante qui règne entre le phénomène de l'aurore boréale et le magnétisme terrestre a fait désigner, par M. de Humboldt, sous le nom d'orage magnétique, l'ensemble des perturbations qui se manifestent dans l'équilibre des forces magnétiques de la terre. La présence de cet orage est causée par les oscillations de l'aiguille aimantée, et ensuite par l'apparition de l'aurore, dont les oscillations sont comme les avant-coureurs, et qui, elle-même, met fin à l'orage, comme dans les orages électriques un phénomène de lumière, l'éclair, annonce que l'équilibre, momentanément troublé, vient de se rétablir enfin dans la distribution normale de l'électricité. M. de Humboldt trouve dans la découverte de Faraday, qui fait naître la lumière par l'action des seules forces magnétiques, une preuve qui donne à son opinion la valeur d'une certitude expérimentale, et il en conclut que la terre est douée, en vertu de son magnétisme, de la propriété d'émettre une lumière presque distincte de celle que lui envoie le soleil.

Tout en reconnaissant la vérité de l'analogie que cherche à établir M. de Humboldt, nous ne devons pas oublier que ce n'est p as par lui-même, mais parce qu'il produit des courants électriques, que le magnétisme peut donner naissance à

de la lumière, lumière dont l'origine est purement électrique. Le magnétisme ne produit donc des phénomènes lumineux que parce qu'il peut dégager de l'électricité, et c'est probablement en l'envisageant ainsi que M. de Humboldt dit d'une manière générale qu'il est une source de lumière.

Ainsi, c'est dans l'électricité et dans l'influence mutuelle que cet agent à l'état de mouvement et le magnétisme exercent l'un sur l'autre, qu'il faut chercher l'origine de l'aurore boréale et l'explication des phénomènes qui l'accompagnent. C'est ce que je vais essayer de démontrer, en ajoutant à l'appui de ma démonstration, soit quelques expériences directes, soit les résultats des observations très-nombreuses qui ont été faites depuis quelques années sur le phénomène qui nous occupe.

#### § 2. Essai de théorie.

L'atmosphère, dans son état normal, est constamment chargée d'une quantité considérable d'électricité positive, qui va en croissant à mesure qu'on s'élève, à partir de la surface du sol où elle est nulle.

Je n'examinerai pas ici qu'elle est la source de cette électricité; ce qu'il y a de certain, c'est que sa production est liée à l'action du soleil, puisque son intensité est sujette à des variations diurnes. Le soleil agit-il directement, soit par sa lumière, soit par sa chaleur, sur les parties dont se compose notre atmosphère pour y produire de l'électricité, ou bien toute cette production est-elle le résultat d'un effet indirect

des rayons solaires, en provenant de l'évaporation de l'eau des mers et de la végétation qui a lieu sur la surface de la terre? Il est probable que les deux causes contribuent au phénomène, mais je suis disposé à accorder à la première une action plus générale et plus constante. Mais peu importe ici; le fait de la charge constante d'électricité positive pour notre atmosphère, et de négative pour le globe terrestre, est bien prouvé, et cela suffit pour notre explication.

Cette production constante des deux électricités doit être nécessairement accompagnée d'une recomposition soit neutralisation; autrement les états électriques contraires de la terre et de l'atmosphère acquerraient une tension infinie, ce qui est contraire à l'observation. Cette recomposition ou neutralisation se fait de deux manières, d'une manière irrégulière et accidentelle, et d'une manière normale et constante.

Le premier mode se présente sous des formes très-variées; c'est, le plus souvent, la simple humidité de l'air, c'est quelquesois la chute de la pluie ou de la neige qui opèrent cette neutralisation. C'est, de temps à autre, la chute de la foudre ou des trombes, qui manifestent, sous une forme très-énergique, la tendance à s'unir des deux électricités accumulées, l'une dans l'atmosphère, l'autre sur le sol. Les vents, dans certains cas, en mélangeant l'air en contact avec la surface de la terre, et négatif comme elle, avec l'air positif d'une région un peu plus élevée de l'atmosphère, produisent cette neutralisation des deux électricités qui donnent naissance à des orages ou se manifeste sous forme d'éclairs de chaleur. En hiver, l'air étant constamment plus saturé d'humidité, la neu-

tralisation directe s'opère surtout par le moyen des vapeurs aqueuses, c'est pourquoi il y a moins de grandes perturbations et, par conséquent, d'orages; mais, en même temps, c'est ce qui fait que, comme l'a remarqué M. Arago, le tonnerre tombe plus souvent sur la terre en hiver qu'en été.

En général, l'influence de l'état hygrométrique de l'air dans les manifestations de l'électricité atmosphérique est presque aussi grande que celle de la cause même qui produit cette électricité, car cette influence se fait sentir, soit dans la production des phénomènes accidentels que nous venons d'énumérer, soit dans les indications des électromètres destinés à accuser l'état électrique normal de l'air dans les différentes heures de la journée et dans les différents jours de l'année. C'est pourquoi il est si difficile de conclure de ces observations l'intensité même de l'électricité atmosphérique à un moment donné, vu l'impossibilité où l'on est de séparer cette intensité à son origine du degré plus ou moins prononcé de manifestation des signes électriques.

Passons maintenant au second mode de neutralisation des deux électricités, le mode que je considère comme normal et régulier.

L'électricité positive dont sont chargées les couches supérieures de l'atmosphère peut y cheminer librement, vu l'état de raréfaction de ces couches; mais elle trouve aux régions polaires, où les glaces éternelles qui y règnent condensent constamment des vapeurs aqueuses, une portion de l'atmosphère saturée d'humidité, qui se présente sous forme de brume, au moyen de laquelle elle peut se réunir facilement

avec l'électricité négative dont la terre est elle-même chargée. Il en résulte donc des courants constants d'électricité positive s'élevant des différents points de la surface de la terre, se dirigeant dans les régions supérieures de l'atmosphère vers les pôles, et revenant, sous la surface de la terre, des pôles vers chacun des points d'où ils sont partis. Les courants qui partent de l'hémisphère boréal doivent se diriger vers le pôle nord, et ceux qui partent de l'hémisphère austral vers le pôle sud. Seulement, dans les régions équatoriales comprises entre les tropiques, la position du soleil variable avec les saisons de l'année doit influencer, d'une manière difficile à bien prévoir d'avance, le côté vers lequel se dirigent, dans le haut de l'atmosphère, les courants qui partent des différents points du sol. Ajoutons que les expériences faites à l'occasion du télégraphe électrique ont démontré, en effet, que le globe terrestre est un conducteur d'électricité presque parfait, compensant par sa masse ce qui peut manquer en conductibilité propre aux matériaux même dont il se compose. Ainsi, l'existence de ces courants, dont je viens de tracer la marche, repose sur des principes parfaitement établis, et fondés uniquement sur l'expérience.

Mais il y plus; on a la démonstration de leur existence dans un phénomène étudié depuis longtemps et parfaitement constaté, celui des variations diurnes de l'aiguille aimantée.

Je n'examine point ici l'origine du magnétisme terrestre, sujet sur lequel j'aurai occasion de revenir dans un prochain travail; pour le moment, je me borne à dire que je ne regarde point les causes perturbatrices de la direction de l'aiguille aimantée comme de même nature que celles qui déterminent cette direction. Je me contente donc actuellement de considérer le globe terrestre comme un gros aimant ayant ses deux pôles, et j'étudie seulement les causes qui peuvent modifier la direction qu'il tend à imprimer en cette qualité d'aimant, aux aiguilles de boussole. Or ces causes sont les courants électriques dont je viens de constater l'existence; ils expliquent parfaitement bien les variations diurnes. Ces variations, en effet, consistent en ce que, dans notre hémisphère, le pôle nord de l'aiguille se porte à l'ouest, depuis le matin jusqu'à une heure et demie environ après midi, puis revient à l'est pendant le reste de la journée, pour rester stationnaire pendant la nuit. Or, cette déviation est précisément celle que doivent occasionner des courants allant sous la surface du globe du pôle nord à l'équateur, augmentant d'intensité avec la chaleur du jour, et diminuant avec elle-La variation diurne est à son maximum (13 à 16') dans les mois pendant lesquels le soleil est le plus longtemps audessus de notre horizon, mai, juin, juillet et août. Elle est à son minimum (4 à 5') pendant les mois d'hiver. Les variations diurnes deviennent d'autant plus considérables qu'on s'éloigne davantage de l'équateur pour se rapprocher du pôle; or il est évident que si les courants partent des différents points de la surface de la terre chauffés par le soleil, pour s'élever dans l'atmosphère, redescendre aux régions polaires, et de là, en cheminant sur le globe, venir achever leur circuit à leur point de départ, plus l'aiguille aimantée sera rapprochée du pôle, plus le nombre des courants qui exercent une influence sur elle sera considérable; près de l'équateur, elle ne sera plus soumise à l'action de tous les courants qui ont été formés en dehors des lieux qui environnent ceux où elle est placée. En hiver, ces différences sont moins sensibles, parce que les courants partis des régions équatoriales sont les seuls dont les effets puissent être bien prononcés vu le peu de différence qui règne dans cette saison entre la température de la surface du sol et celle des parties supérieures de l'atmosphère, dans les zones tempérées et surtout polaires.

Enfin, d'après notre théorie, les mêmes effets devront se manifester dans l'hémisphère austral; seulement le sens de la variation diurne devra être inverse, c'est-à-dire que le pôle nord de l'aiguille devra dévier à l'est et non pas à l'ouest du matin jusqu'au milieu du jour, puisque le courant positif va, sous la surface du globe terrestre, du pôle austral à l'équateur, comme il va du pôle boréal à l'équateur. Or, l'observation est tout à fait d'accord avec ce résultat de la théorie, ainsi que je l'ai constaté en comparant avec soin tous les travaux nombreux qui ont été faits sur ce sujet, notamment par le colonel Sabine et un grand nombre de voyageurs.

Je dois reconnaître cependant qu'il y a des anomalies, soit dans les heures, soit dans le sens des variations diurnes, pour quelques points du globe, notamment l'île de Sainte-Hélène et le cap de Bonne-Espérance, anomalies qui sont difficiles à expliquer dans la théorie que je viens d'exposer. Mais je

suis convaincu qu'en les examinant de près, on arriverait à trouver qu'elles tiennent à des causes locales et accidentelles, telles en particulier que le voisinage de la mer, qui influe d'une manière très-notable sur les variations diurnes de la température, et en particulier sur leur amplitude et sur les heures du maximum et du minimum de chaleur.

Y a-t-il une région où il n'y ait point de variations diurnes? Cette question que M. Arago a souvent signalée à l'attention des voyageurs scientifiques, perd beaucoup de son importance dans l'explication que je viens de donner de ces variations. En effet, les points de la surface de la terre où il n'y aurait pas de variations diurnes seraient ceux où se rencontreraient et d'où partiraient les deux courants qui se déversent au haut de l'atmosphère à droite et à gauche également vers les deux pôles. Mais ces points, qui doivent être situés dans les régions équatoriales ne peuvent pas être bien déterminés; leur position doit varier avec la position du soleil, avec la distribution de la température dans l'atmosphère, avec la direction des vents et avec beaucoup de causes perturbatrices.

Mais je n'insiste pas sur ce sujet, mon intention n'étant point de traiter dans ce moment la question des variations diurnes de l'aiguille aimantée, qui exigerait beaucoup plus de développements que je ne puis lui en consacrer maintenant. Mon but a été seulement de montrer par l'action qu'ils exercent sur l'aiguille aimantée, l'existence des courants terrestres. Du reste, on peut avoir une autre preuve plus directe encore, quoique moins générale, de la présence de

ces courants sur la surface de la terre, en se servant, pour les recueillir, des fils métalliques tendus pour l'usage des télégraphes électriques. C'est ce que j'ai fait moi-même en Angleterre, ainsi que M. Barlow; c'est ce qu'a fait également M. Baumgartner en Allemagne, et partout, où on l'a tenté, on a réussi à percevoir, au moyen du galvanomètre, des courants électriques.

Ainsi, M. Baumgartner <sup>1</sup> ayant introduit un multiplicateur très-sensible dans le circuit formé par le fil télégraphique qui va de Vienne à Prague, et dont la longueur est d'environ soixante et un milles, obtint les résultats suivants, quand les deux extrémités du fil plongeaient dans le sol:

1° L'aiguille aimantée ne s'arrête jamais à son zéro; elle est toujours plus ou moins déviée.

2° Les déviations sont de deux espèces: les unes plus grandes, vont jusqu'à 50°; les autres, moindres, varient de 1° à 8°. Les premières se présentent plus rarement; elles changent de direction et d'intensité, de façon qu'on ne peut y découvrir aucune loi. Les dernières sont, au contraire, soumises à une loi simple, et elles sont très-régulières lorsque l'air est sec et le ciel serein, tandis qu'elles présentent des anomalies quand le temps est froid et pluvieux.

Voici maintenant M. Barlow qui a fait sur le même sujet un très-grand nombre d'observations, dont les résultats concourent tous à démontrer l'exactitude du principe que j'ai posé <sup>2</sup>. Quatre lignes principales partant de Derby avaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Bibl. Univ. (Archives des Sc. phys.), tome XI, p. 37.

id. tome XI, p. 299.

servi à ses observations, deux dirigées vers le nord et le nord-est, et deux dirigées vers le sud et le sud-ouest. La direction des courants perçus sur les deux premières lignes était toujours contraire à celle des courants qui parcouraient les deux autres, ce qui doit bien être, d'après la théorie que j'ai exposée. Mais le fait le plus remarquable, c'est la parfaite concordance que ces observations ont prouvé exister entre la marche de l'aiguille du galvanomètre placé dans le circuit du fil télégraphique, et les variations diurnes de l'aiguille aimantée. Cependant le mouvement diurne régulier de l'aiguille du galvanomètre est sujet à des perturbations d'une intensité et d'une durée plus ou moins considérables pendant les orages et quand l'aurore boréale est visible; c'est ce qui arrive dans le dernier cas seulement, et non dans le premier, à l'aiguille de déclinaison. Cette différence tient à ce que les courants qui agissent sur elle circulant sous la surface du sol, ils ne doivent pas, comme ceux que perçoivent les fils télégraphiques, être influencés par les perturbations qui peuvent survenir dans l'état électrique de l'air au milieu duquel se trouve ces fils.

Ainsi donc, l'existence de courants électriques circulant au-dessous de la surface du sol, nous paraît bien démontrée, et cette existence une fois constatée, elle conduit nécessairement à reconnaître qu'elle est la conséquense du rétablissement normal et régulier de l'équilibre électrique rompu, essentiellement dans les régions tropicales, entre le globe terrestre et son atmosphère; tandis que les décharges électriques plus ou moins intenses qui ont lieu directement entre

la terre et l'air sont la forme accidentelle et variable de ce rétablissement d'équilibre. Voyons maintenant comment l'explication du phénomène des aurores boréales et australes découle nécessairement de la formation de ces courants électriques circulant de l'équateur aux deux pôles dans les régions supérieures de l'atmosphère, et des deux pôles à l'équateur à la surface du globe.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'électricité positive dont l'atmosphère est chargée, surtout dans ses régions supérieures, est portée vers les deux pôles, soit par la conductibilité plus grande des couches atmosphériques les plus élévées et, par conséquent, les plus raréfiées, soit par les vents alizés qui se dirigent dans ces couches de l'équateur aux deux pôles. C'est donc dans les régions polaires que doit se faire, au moyen des vapeurs aqueuses qui y sont constamment condensées sous forme de brumes, le passage de l'électricité positive dans le globe terrestre, et par conséquent, la décharge. Cette décharge, quand elle a un certain degré d'intensité, doit être lumineuse, surtout si, comme c'est toujours le cas près des pôles et quelquesois dans les parties supérieures de l'atmosphère, elle rencontre sur sa route les particules glacées extrêmement ténues qui forment les brumes et les nuages très-élevés.

La formation des halos lunaires, qui précède presque toujours l'apparition d'une aurore boréale et la chute de la pluie ou de la neige qui la précède également le plus souvent, sont une preuve de la présence dans l'atmosphère de ces fines aiguilles de glace et de la part qu'elles jouent dans le phénomène qui nous occupe.

Cette brume si ténue, devenue lumineuse par la transmission de l'électricité, devrait apparaître sous forme régulière, et simplement comme une surface éclairée plus ou moins étendue et plus ou moins découpée. C'est bien ainsi que le phénomène se passe dans les parties de l'atmosphère les plus éloignées de la terre. On aperçoit ce qu'on nomme des plaques aurorales d'une couleur pourpre ou rouge violet, plus ou moins étendues, selon que cette espèce de voile formé par les particules glacées s'étend plus ou moins loin, à partir des pôles. La ténuité de ce voile est telle qu'elle permet d'apercevoir les étoiles à travers les plaques aurorales, ainsi que l'ont remarqué tous les observateurs. De plus, nous voyons que MM. Bixio et Barral, dans l'ascension aérostatique qu'ils ont faite récemment 1, se trouvèrent tout d'un coup, quoique le ciel parût parfaitement serein et l'atmosphère sans nuage, au milieu d'un voile parfaitement transparent, formé par une multitude de petites aiguilles glacées si fines, qu'elles étaient à peine visibles. Ce sont ces aiguilles qui deviennent lumineuses par le passage de l'électricité, déterminent la formation des halos, ainsi que cela a été rigoureusement démontré, et produisent, en condensant les vapeurs aqueuses dans leur passage à travers l'air pour tomber sur la terre, la chute de la neige ou de la pluie, quelquesois de la grêle, dans certaines circonstances particulières.

<sup>1</sup> Voyez Comptes rendus de l'Acad. des Sc., t. XXXI (1850), p. 129.

Maintenant, si nous étudions ce qui doit se passer dans la portion de la brume lumineuse qui est la plus rapprochée du globe terrestre, nous remarquerons que le voisinage du pôle magnétique exercera nécessairement sur cette matière électrisée, qui est un véritable conducteur mobile traversé par un courant, une action très-prononcée.

Pour me faire une idée de ce genre d'action, j'ai cherché à imiter artificiellement ce qui doit avoir lieu dans la nature. Voici, dans ce but, l'expérience que j'ai tentée.

J'introduis dans un ballon de verre de 30 à 40 centimètres de diamètre, par une des deux tubulures opposées dont il est muni, une tige de fer doux de 2 centimètres de diamètre environ, de façon que l'une de ses extrémités aboutisse à peu près au centre du ballon, et que l'autre ressorte par la tubulure et la dépasse. La tige de fer est recouverte dans toute son étendue, sauf à ses deux extrémités, d'une couche isolante très-épaisse, formée d'abord de gomme laque, puis d'un tube de verre recouvert lui-même de gomme laque, puis d'un second tube de verre, et enfin d'une couche de cire bien unie; la couche isolante dans son ensemble doit avoir au moins un centimètre d'épaisseur, ce qui donne 4 centimètres de diamètre au barreau ainsi recouvert. Un anneau de cuivre entoure le barreau par-dessus la couche isolante dans la portion la plus rapprochée de la tubulure, mais dans l'intérieur du ballon. Cet anneau peut être mis en communication avec une source électrique extérieure au ballon, au moyen d'un fil métallique isolé avec soin, qui traverse la tubulure et se termine extérieurement par un crochet. Un robinet fixé à la seconde tubulure du ballon permet d'y faire le vide. Lorsque l'air y est suffisamment raréfié, on fait communiquer le crochet avec le conducteur d'une machine électrique et l'extrémité extérieure du barreau de fer doux avec le sol, de façon que l'électricité forme dans l'intérieur du ballon une gerbe lumineuse plus ou moins irrégulière, qui part de l'anneau et aboutit à l'extrémité intérieure du fer doux, Mais au moment où l'on place l'extrémité extérieure du fer doux sur le pôle d'un fort électro-aimant, la lumière électrique prend un aspect tout différent. Au lieu de partir indifféremment des différents points de la surface supérieure du cylindre de fer, elle part uniquement de la circonférence de cette surface, de manière à former autour d'elle un anneau lumineux continu. Ce n'est pas tout; cet anneau a un mouvement de rotation autour du cylindre aimanté, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, suivant la direction du courant électrique et le sens de l'aimantation. Enfin, des jets plus brillants semblent partir de cette circonférence lumineuse sans se confondre avec le reste de la gerbe. Dès que l'aimantation cesse, le phénomène lumineux redevient ce qu'il était auparavant et ce qu'il est généralement dans l'expérience connue sous le nom de l'œuf *èlectrique*.

Il y a quelque avantage à se servir, pour l'expérience que nous venons de décrire, de la machine hydro-électrique d'Armstrong, dont on fait communiquer la chaudière avec le crochet uni métalliquement à l'anneau de cuivre intérieur, tandis qu'on met en communication avec le barreau de fer doux le conducteur qui reçoit la vapeur. Il en résulte qu'on

a dans l'intérieur du ballon un courant électrique d'une grande intensité, dont le sens peut changer, en établissant les communications inverses de celles que je viens d'indiquer.

# § 3. Accord des phénomènes avec la théorie.

Nous avons déjà fait remarquer que tous les observateurs s'accordent maintenant à reconnaître que l'aurore boréale est un phénomène atmosphérique; nous avons cité les faits à l'appui. En voici encore un qui ne peut laisser de doute à cet égard; il est extrait des observations sur l'aurore boréale, publiées dans la relation du voyage du capitaine Franklin 1. Le lieutenant Hood et le doct. Richardson s'étaient placés à 55 milles (18 lieues environ) de distance l'un de l'autre pour faire des observations simultanées, desquelles ont pût conclure la parallaxe du phénomène, et, par conséquent, sa hauteur. Or, voici trois résultats qui placent également l'aurore à la hauteur de 6 à 7 milles. Le 2 avril à la station la plus au nord, on voyait une bande brillante à 10° au-dessus de l'horizon; à l'autre station, le phénomène n'était pas visible. Le 6 août, l'aurore paraissait au zénith à la première station, à la seconde elle était à 9° de hauteur seulement. Enfin, le 7 avril, elle reparut encore au zénith à la première station, et elle était de 9° à 11° de hauteur à la seconde.

Mais il y plus. Hansteen 2 et après lui MM. Lottin et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl Univ. (Sc. et Arts), 1823, tome XXXIII, p. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id. 1828, tome XXXVII, p. 275.

Bravais 1 sont conduits à admettre comme conséquence de leurs observations, que l'arc de l'aurore boréale est un anneau lumineux dont les différents points sont sensiblement à égale distance de la terre, et qui est centré autour du pôle magnétique boréal, de manière à couper à angle droit tous les méridiens magnétiques qui convergent vers ce pôle. Un tel anneau, vu par un observateur placé à la surface du sol, lui offre évidemment l'apparence connue de l'arc de l'aurore, et son sommet apparent est toujours nécessairement situé dans le méridien magnétique du lieu. M. Bravais observe, en outre, que l'arc semble éprouver une sorte de mouvement de rotation de l'ouest à l'est, en passant par le sud. Toute cette description du phénomène est parfaitement semblable au résultat de l'expérience que j'ai décrite dans le § 2, et le sens du mouvement de rotation de l'anneau lumineux est précisément celui qui doit avoir lieu d'après les lois qui régissent l'action mutuelle des courants, si c'est bien l'électricité positive qui part de l'atmosphère pour se diriger vers la surface du sol, y pénétrer autour du pôle magnétique nord, se réunir à la négative, et constituer ainsi le courant.

Le diamètre de l'anneau lumineux est d'autant plus grand que le pôle magnétique est plus éloigné de la surface du sol, puisque ce pôle doit se trouver sur l'intersection du plan de l'anneau avec l'axe du globe terrestre.

Il résulte donc de ce qui précède que chaque observateur voit ainsi le sommet de l'arc auroral à son méridien

<sup>1</sup> Voyages de Gaymard en Scandinavie, etc. (Aurores boréales, Lottin, Bravais, etc., p. 457).

magnétique; il n'y a donc que ceux qui sont sur le même méridien magnétique qui voient le même sommet et qui puissent par des observations simultanées en prendre la hauteur.

Si le sommet de l'arc dépasse le zénith de l'observateur, celui-ci est entouré de toutes parts par la matière de l'aurore boréale qui sort de terre. C'est alors qu'en étant plus rapproché du lieu où se passe le phénomène, il entend le bruissement que nous avons signalé, surtout s'il est en rase campagne et dans un endroit tranquille; tandis que si l'arc n'atteint pas son zénith, l'observateur se trouve en dehors de la région où s'opère l'émanation du courant électrique, il ne voit qu'un arc un peu élevé au nord ou au sud, suivant qu'il se trouve dans l'un ou l'autre hémisphère, et il n'entend aucun bruit, à cause de son trop grand éloignement. Le bruissement dont nous venons de parler est le résultat de l'action d'un pôle magnétique puissant sur des jets électriques lumineux très-rapprochés de ce pôle, ainsi que me l'a prouvé l'expérience directe par laquelle j'ai réussi à produire un bruit parfaitement semblable en rapprochant d'un morceau de fer fortement aimanté l'arc lumineux qui se dégage entre les pôles d'une batterie voltaïque 1.

Quant à l'odeur sulfureuse que quelques observateurs ont sentie en étant également au milieu, pour ainsi dire, de l'aurore boréale, elle provient, comme celle qui accompagne la chute de la foudre, de la conversion en ozone

Bibl. Univ. (Archives des Sc. phys.), t. IV, p. 356.

de l'oxygène de l'air par le passage des décharges électriques.

La lumière de l'aurore boréale n'est point polarisée, c'est ce qu'avait déjà remarqué M. Biot en 1817 dans ses observations aux îles Shettland; ce résultat négatif vient d'être confirmé par M. Macquorn Rankine qui a montré que cette absence de polarisation ne tient point à la faiblesse de la lumière de l'aurore boréale, puisque cette même lumière, vue par la réflexion sur l'eau, se trouve être polarisée par le fait de cette réflexion. Or, l'étude la plus attentive de la lumière électrique artificielle, aussi bien celle des décharges à travers l'air, que celle de l'arc voltaïque dans le vide, n'a pu y faire découvrir la moindre trace de polarisation. Nouvelle preuve de l'identité des deux genres de phénomènes.

Enfin c'est dans la concordance de l'apparition des aurores avec celle de certains nuages ainsi qu'avec les perturbations de l'aiguille aimantée, que nous trouvons encore une importante confirmation de notre théorie.

Les observations du docteur Richardson, dont nous avons parlé plus haut, en montrant que l'aurore se trouve à des hauteurs qui ne sont pas considérables, indiquent en même temps qu'elle est liée à la formation des modifications variées des cirro-stratus. Le lieutenant Hood, en parlant du mouvement des bandes lumineuses de l'aurore, dit qu'il est convaincu qu'elles sont emportées par le vent, parce que les colonnes conservent exactement leur situation relative, ce qui n'a

<sup>1</sup> Bibl. Univ. (Archives des Sc. phys.), t. XXI, p. 16.

jamais lieu que quand la matière lumineuse se meut dans l'air par son action directe et propre. Enfin, ce qui prouve la coexistence avec l'aurore boréale de petites aiguilles de glace dans l'atmosphère, telles qu'on en trouve dans les nuages élevés, c'est l'observation du docteur Richardson qui, avant vu par une température de près de 52° cent. audessous de 0°, une aurore dont l'arc supérieur était voisin du zénith, remarqua que, quoique le ciel parût parfaitement serein pendant le phénomème, il en tombait une neige fine, à peine apercevable à l'œil nu, mais qu'on découvrait aisément quand elle tombait sur la main et s'y fondait. On avait observé le même fait précédemment, par un soleil brillant, dont les rayons permettaient de voir très-nettement les aiguilles de glace flottantes dans l'air.

Tous les observateurs sont d'accord sur l'existence d'un stratus, soit segment obscur qui, reposant sur l'horizon septentrional, paraît être le fond de toutes les aurores boréales. C'est du moins ce qui résulte des observations nombreuses de M. Struve à Dorpat et de celles de M. Argelander à Abo; c'est comme un voile qui, quoique laissant passer la lumière des étoiles, donne au ciel un aspect plus sombre; puis ce segment obscur finit par être bordé par un arc lumineux. L'existence de ce segment obscur est confirmée par l'observation de Gisler qui dit qu'en Suède, sur les hautes montagnes, le voyageur est quelquesois enveloppé subitement d'un brouillard très-transparent, d'un gris blanchâtre passant un peu au vert, qui s'élève du sol et se transforme en aurore boréale.

Les circo-cumulus et les brumes deviennent lumineuses quand elles sont traversées par des décharges électriques suffisamment énergiques, et quand la lumière du jour n'est plus là pour effacer leur lueur plus faible. Toutefois, il peut arriver quelquefois qu'on les aperçoive même de jour; ainsi M. Arago 'établit d'une manière péremptoire que le Dr Henri Ussher ne s'est point trompé dans une notice publiée dans le tome II des Mémoires de l'Académie d'Irlande, quand il décrit une aurore boréale vue en plein jour, à midi, le 24 Mai 1788. Cet observateur, dans le jour qui suivit une nuit où il avait observé une brillante aurore boréale, ayant trouvé que les astres oscillaient beaucoup dans sa lunette, aperçut dans le ciel des rayons d'une lumière blanche et vacillante, qui s'élevait de tous les points de l'horizon vers le pôle de l'aiguille d'inclinaison, où ils formaient une coupole légère et blanchâtre semblable à celle que présentent la nuit les plus brillantes aurores boréales. M. Arago a constaté, en consultant les anciens registres de l'observatoire, les perturbations considérables qu'éprouva au même moment l'aiguille des variations diurnes, preuve que le phénomène observé par le Dr Ussher était bien une aurore boréale de jour.

Je trouve également, dans la relation de M. de Tessan du voyage de la Vénus, que M. Cornulier, officier très-instruit de la marine royale, a souvent observé dans les parages de Terre-Neuve une direction particulière qu'affectent de jour les cirrus, qui annonce toujours pour la nuit une belle aurore

<sup>1</sup> Annales de Chimie et de Phys. (1821), t. XIX, p. 332.

boréale 1. M. Cornulier, d'accord avec M. Verdier, est convaincu, en étudiant la disposition de ces cirrus, qu'il y a presque tous les jours des aurores boréales dans ces parages, et que leur éclat seul est variable; il croit que, si on ne les observe pas toutes, cela tient à ce que la brume et les nuages des couches inférieures en masquent la vue. Cette remarque est tout à fait d'accord avec les observations d'aurores boréales qui sont faites maintenent depuis quatre ans, avec beaucoup de soin, dans l'hémisphère septentrional, au Canada en particulier. M. Lefroy 2 a enregistré à l'observatoire magnétique de Toronto les observations d'aurores boréales qui sont faites sous sa direction dans différentes stations au nombre de treize non comprises d'autres observations fort nombreuses faites aux Etats-Unis et qui sont recueillies par le professeur Henry, secrétaire de la Smithsonian Institution. Il résulte de tout cet ensemble d'observations que l'aurore boréale apparaît dans presque toutes les nuits claires, et dans lesquelles la pleine lune ne brille pas d'un éclat trop grand; mais elle ne se montre pas à la fois dans toutes les stations. Cela est vrai surtout pour les mois dont les jours sont les plus longs. D'octobre en mars, on peut dire que dans ces mois il n'y a presque pas une nuit où l'on n'aperçoive une aurore boréale; mais c'est en février qu'elles sont les plus brillantes. Il résulte des tableaux

¹ Il n'y a aucun doute que la direction qu'affectent les cirrus, surtout vers les régions polaires, ne soit due à l'électricité qu'ils transmettent, transmission qui pourrait également expliquer la phosphorescence qu'ils manifestent quelquefois.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bibl Univ. (Archives des Sc phys.), t. XXII, p 147.

qui donuent le nombre des aurores aperçues dans chaque mois de l'année, qu'on en a vu en tout pendant 261 nuits en 1850, et pendant 207 en 1851. Une chose assez remarquable, mais assez naturelle cependant, c'est que la proportion des nuits dans lesquelles on voit l'aurore est d'autant plus grande qu'on est plus rapproché du pôle magnétique.

Revenant à la coexistence des particules glacées dans l'air avec les aurores, nous en trouvons une preuve frappante dans les observations faites au Canada et aux Etats-Unis. Des registres d'observations météorologiques tenus avec beaucoup de soin, indiquent l'état de l'atmosphère les jours qui précèdent et qui suivent l'apparition d'aurores boréales. Or, presque toujours l'aurore est précédée de la chute de la pluie et surtout de la neige; il arrive aussi très-souvent, mais non toujours, que cette chute a lieu après l'aurore. Enfin, l'apparition des halos lunaires, qui précède le plus souvent celle des aurores boréales, est une preuve de la présence dans l'atmosphère de ces particules glacées qui forment le réseau illuminé par la transmission de l'électricité.

Mais de toutes les preuves en faveur de l'origine électrique de l'aurore boréale, la plus concluante est celle qui est tirée de l'action que l'apparition de ce phénomène exerce sur l'aiguille aimantée. Si nous examinons avec attention toutes les observations qui ont été faites sur les perturbations que l'aurore boréale détermine dans l'aiguille des variations diurnes, soit par M. Arago à l'observatoire de Paris!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales de Chimie et de Phys, t. X, p. 120; t. XXX, p. 423; t. XXXVI, p. 398; t. XXXIX, p. 369; t. XLII, p. 351; t. XLV, p. 403.

soit par Forster, par Farqubarson et par tous les voyageurs, nous pouvons en tirer les résultats suivants:

- 1º Dans la journée qui précède la nuit où apparaîtra une aurore boréale, la déclinaison de l'aiguille à l'ouest est toujours sensiblement augmentée de 10, 20, 30 minutes et même plus.
- 2º Au milieu et à la fin de l'apparition, l'aiguille dévie au contraire plus à l'est qu'elle ne devrait le faire dans son état normal.
- 3° Enfin l'aiguille éprouve, souvent pendant la période du phénomène de l'aurore boréale, des oscillations irrégulières dont l'amplitude peut être de quelques minutes de degrés.

Il arrive ordinairement que, pour les aurores boréales, qui se montrent dans la soirée, c'est à midi ou à une heure après midi que l'aiguille de déclinaison présente son maximum de déviation à l'ouest; la perturbation peut faire dévier l'aiguille de 5 à 50 minutes et au delà, de plus qu'elle ne déviait à la même heure les jours précédents et suivants. Quelquefois c'est à d'autres heures, le matin, par exemple, que le maximum de déviation occidentale a lieu; il est probable qu'alors cela tient à l'apparition d'une aurore boréale de jour. M. Arago en cite plusieurs cas; ainsi, le 17 août 1825, la déclinaison fut de 8 heures et demie du matin à midi constamment supérieure de 5 ' à la moyenne du mois pour les mêmes heures; or, le même jour, à 10 heures du soir, MM. Coldstream et Foggo apercevaient de faibles tra-

ces d'aurore boréale qui étaient très-probablement la fin d'une aurore boréale de jour. Le soir, l'aiguille était revenue à sa position ordinaire.

Les observations magnétiques faites dans les régions voisines du pôle confirment l'influence considérable exercée sur l'aiguille de déclinaison par l'aurore boréale. Ainsi à Reykinwik (64° 8′ 15 " de lat. nord), MM. Lottin et Bravais avant fait de nombreuses observations sur les variations diurnes de la déclinaison comparativement avec des observations semblables faites à Paris et à Cherbourg, avaient été frappés des perturbations presque continuelles de l'aiguille, qu'ils avaient attribuées d'abord à quelque mouvement du sol. Puis, remarquant la concordance de leurs observations avec celles faites cinquante ans auparavant (en 1786) par M. de Lœwenœrn, ils acquirent la conviction que cette marche irrégulière de l'aiguille était due à des aurores boréales invisibles pour eux à cause de la longue présence du soleil sur l'horizon. M. Ginge, missionnaire danois, avait fait, en 1786 et 1787, quelques observations sur l'aiguille aimantée qui l'avaient amené à reconnaître que, dans le courant de vingt-quatre heures, la déclinaison se trouve ordinairement la plus forte vers l'ouest de 9 à 10 heures du soir, et la plus faible de 9 à 10 heures du matin, ce qu'il n'hésite pas d'attribuer aux aurores boréales. MM. Lottin et Bravais confirment complétement cette conclusion qui résulte également de leurs nombreuses et excellentes observations.

Nous voyons donc que les observations magnétiques faites

dans les régions voisines du pôle avaient déjà, depuis longtemps, semblé indiquer que les aurores boréales doivent être beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense, ce qui vient d'être confirmé d'une manière directe par les apparitions d'aurores boréales signalées dans les stations du Canada et des Etats-Unis.

Ainsi, la production des aurores aux pôles boréal et austral serait l'état normal sous lequel se manifesterait la neutralisation de l'électricité positive de l'atmosphère avec la négative restée dans le globe terrestre. Cette neutralisation ne se ferait pas d'une manière parfaitement régulière et uniforme. Il est évident que, suivant l'état plus ou moins brumeux, et par conséquent plus ou moins conducteur de l'atmosphère, aux régions polaires, les deux électricités devraient se neutraliser avec plus ou moins de facilité. Ces différences seraient accusées par des déviations plus ou moins grandes de l'aiguille de déclinaison, et par leur irrégularité même, différences qui ne seraient sensibles à de grandes distances des pôles, par exemple dans la zone tempérée, qu'autant qu'elles seraient très-considérables. La plus grande déviation à l'ouest qui, aux latitudes peu élevées, précède généralement l'apparition d'une aurore indiquerait une grande accumulation d'électricité due à une forte condensation de vapeurs aux régions polaires, qui, en facilitant la réunion des deux principes électriques, augmenterait l'intensité du courant terrestre dirigé du nord à l'équateur dans notre hémisphère, et porterait par conséquent l'aiguille plus à l'ouest. Une fois l'aurore visible ce courant deviendrait moins fort, parce que la lumière même de l'aurore serait une preuve de la résistance plus grande que rencontre la réunion des deux électricités, à cause probablement de la congélation des particules d'eau suspendues dans l'air qui constituent la brume 1; aussi l'aiguille devrait rétrograder à l'est, ce qui a effectivement lieu.

Dans les latitudes plus élevées, les perturbations de l'aiguille sont continuelles parce que les plus légères différences dans l'intensité des décharges électriques qui ont lieu aux régions polaires doivent y être sensibles. Quant à la remarque de MM. Ginge, Lœwenœrn et Lottin, que le maximum de déviation de l'aiguille a lieu de 8 à 10 heures du soir, et le minimum de 9 à 10 heures du matin, comme elle est le résultat d'observations faites seulement pendant quelques semaines de l'été, elle prouve simplement qu'à cette époque de l'année, c'est-à-dire à l'époque où les jours sont les plus longs, la plus grande condensation d'humidité a lieu, ainsi que cela doit être, dans les moments qui précèdent et qui suivent le coucher du soleil, et la moindre sept ou huit heures après son lever. Du reste, d'après les observations du lieutenant Hood, consignées dans le voyage du capitaine Francklin, du 1er février au 31 mai, la plus grande déclinaison avait lieu entre 8 et 9 heures du matin et la moindre à une heure après minuit. Ainsi, comme on le voit, les époques des maxima et des minima de déclinaison sont éminemment variables avec les saisons dans les lati-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il est clair que la brume, quand elle commence à se former, doit être meilleure conductrice que lorsque plus tard, elle finit par ne se composer peu à peu que de particules glacées.

tudes élevées où les grandes différences dans la longueur des jours et dans la température, doivent amener des perturbations considérables dans l'état électrique de l'air.

Un fait assez curieux, c'est qu'il arrive quelquesois que lorsque l'observateur se trouve, pour ainsi dire, au milieu de l'aurore boréale, l'action sur l'aiguille peut devenir presque nulle. C'est ce que M. Forster a remarqué au Port-Bowen, situé plus au nord que 65°, latitude des forts Franklin et Entreprise, où le D<sup>r</sup> Richardson avait par contre remarqué l'action de l'aurore sur l'aiguille. En esset, si l'aiguille est située dans l'intérieur du cercle que sorme l'aurore boréale autour du pôle magnétique, elle n'est plus sous l'influence immédiate des courants électriques qui circulent alors autour d'elle et non au-dessous ou au-dessus, et elle ne doit en éprouver qu'une action irrégulière.

J'ai dit que l'aurore boréale était probablement un phénomène journalier, mais seulement d'une intensité variable. Ces différences dans son intensité sont la cause qui fait qu'elle n'est pas toujours perceptible, et que le nombre de fois qu'elle est apparente est d'autant moindre qu'on est plus éloigné des régions polaires. Quant aux différences dans le nombre des aurores boréales visibles dans chaque mois, elles tiennent à deux causes, d'abord à ce que, dans les mois où les nuits sont les plus courtes, on doit en apercevoir beaucoup moins, lors même qu'il y en aurait autant, ensuite à ce qu'il y a des mois où les aurores sont les plus fortes. Ainsi les mois de mai, de juin et de juillet sont ceux où l'on aperçoit le moins d'aurores, parce que

les jours sont les plus longs dans ces mois, tandis que dans les neuf autres, mais surtout en mars, septembre et octobre, il y en a beaucoup plus de visibles. Cette supériorité de ces trois mois sur ceux mêmes où les jours sont plus courts, ne peut tenir qu'à ce que les aurores sont plus fortes aux époques des équinoxes et surtout à l'époque de l'équinoxe d'automne. Ce résultat s'explique très-bien si l'on réfléchit que l'équinoxe du printemps est le moment où le soleil rapporte à l'hémisphère boréal son influence puissante, soit directe, soit indirecte, dans le développement de l'électricité; et que celui d'automne doit être suivi d'une condensation considérable des vapeurs accumulées dans l'athmosphère pendant les mois d'été, condensation qui facilite la neutralisation des deux électricités et augmente, par conséquent, l'intensité de la décharge au pôle.

On a prétendu qu'il y avait dans les apparitions d'aurores boréales des variations séculaires, en d'autres termes
qu'il y avait des époques comprenant un certain nombre
d'années pendant lesquelles on voyait plus d'aurores, et
d'autres pendant lesquelles on en voyait moins. Cette opinion ne m'a pas paru basée sur des documents assez exacts
pour qu'on puisse l'admettre; il peut y avoir eu des années où l'on ait moins vu d'aurores boréales, parce que
l'atmosphère était constamment plus humide et plus chaude
dans les régions polaires, de la même manière qu'il y a
des années plus chaudes et d'autres plus humides ou plus
froides. Mais de là à voir une périodicité dans l'apparition
des aurores boréales il y a loin; et il faudrait, pour éta-

blir cette périodicité, admettre qu'on avait, il y a un siècle au plus, des observateurs aussi nombreux, aussi exacts, et surtout aussi rapprochés des régions polaires, que ceux qu'on a maintenant; ce qui n'est pas. Nous n'insisterons donc pas sur ce point, nous bornant à remarquer que, si réellement cette périodicité existait, elle pourrait tenir au déplacement des pôles magnétiques qui sont les centres de l'aurore boréale et qui, suivant l'état de la surface du sol au-dessous de laquelle ils sont situés, rendraient plus ou moins facile la circulation de l'électricité autour d'eux.

Ajoutons encore, avant de terminer, que le Père Secchi vient dernièrement d'observer à Rome une aurore boréale dont la présence lui a été indiquée d'abord par les pertubations de l'aiguille de déclinaison, ensuite par la disposition des cirro-cumuli dont les bords légèrement phosphorescents ne laissaient aucun doute sur la réalité du phénomène; l'observation du Père Secchi et les détails qu'il en donne apportent de nouvelles preuves à l'appui de la théorie que nous venons d'exposer dans ce mémoire.

## Résumé.

1º Toutes les observations concourent à démontrer que l'aurore boréale est un phénomène ayant son siége dans l'atmosphère, et qui consiste dans la production d'un anneau lumineux ayant pour centre le pôle magnétique.

2º L'expérience directe démontre qu'en opérant dans l'air très-raréfié la réunion des deux électricités près du pôle d'un fort aimant artificiel, on produit un petit anneau lumineux semblable à celui qui constitue l'aurore boréale, et animé d'un mouvement de rotation semblable.

5° L'aurore boréale serait due, par conséquent, à des décharges électriques s'opérant dans les régions polaires entre l'électricité positive de l'atmosphère et la négative du globe terrestre; électricités séparées par l'action directe ou indirecte du soleil, surtout dans les régions équatoriales.

4º Ces décharges électriques ayant lieu constamment, mais avec des intensités variables suivant l'état de l'atmosphère, l'aurore boréale devrait être un phénomène journalier plus ou moins intense, par conséquent visible à de plus ou moins grandes distances, et seulement quand les nuits sont claires; ce qui est d'accord avec l'observation.

5° Les phénomènes qui accompagnent l'aurore boréale, tels que la présence et la forme des cirro-stratus, et surtout ceux qui sont relatifs aux perturbations de l'aiguille aimantée, démontrent la vérité de l'origine électrique que nous venons d'attribuer à l'aurore; hypothèse avec laquelle ces phénomènes se concilient jusque dans leurs moindres détails.

6° L'aurore australe, ainsi que cela résulte du petit nombre d'observations dont elle a été l'objet, présente exactement les mêmes phénomènes que la boréale, et s'explique, par conséquent, de la même manière.

# BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Liste des Ouvrages reçus par la Société en 1853.

#### Titres.

#### Donateurs.

Comptes-rendus hebdomadaires, etc., T. 36 et 37 4º Paris.	1855 Académie des Sciences.
Bulletin de la Soc. géolog. de France. T. 1X, files 20-40	Soc. géolog. de France.
T. X, files 1-16.8° Paris.	1855)
Annales des mines. Tables des mat. de 1842 à 1851	1852)
T. II, 5e et 6e livraisons	1852 Ecole des Mines.
T. III, 1re, 2e et 3e livraisons	1853)
Journal de l'Ecole polytechnique, 26e cahier	4858 \
·	1843
, 50° ,,	1845 Ecole Polytechnique.
, , , 51° ,,	1847
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1848
Bulletin des séances de la Société centrale d'Agriculture. T. VII,	Société centrale d'agri-
nos 7, 8, 9. T. VIII, nos 1, 6, 8, 9 8º Paris.	
Archives du Muséum d'hist. natur. T. VI, liv. 5 et 4 4º Paris.	1855 Muséum de Paris.
Bulletin de la Soc. Indust., nºs 114, 118, 119, 120. 8º 1851 à	1853 Soc. Indust. de Mulhouse.
Discours prononcé à la séance d'ouverture d'hiver de la Société	1852)
Actes de la Société linnéenne. T. VIII, 5e livraison 80	
T. IV, 1e	1855 ( Bordeaux.
Bulletin des travaux de la Société libre d'émulation 1850-51 et	) San diámilia I D
1851-52 8º Rouen 1851 et	1852 Soc. d'émulat. de Rouen.

	,	
Bulletin de la Société Industrielle d'Angers, 25° année, 3° de la seconde série	1852	Société Indust. d'Angers.
Mémoires de l'Académie de Dijon, 2e série. T. I, année 1851. 8º Dijon.	1852	Académie de Dijon.
Mémoires de la Société pour 1850	1851 1852	Société des Sciences Let- tres et Arts de Nancy.
Journal d'Agriculture du département de l'Ain, nº 4, 52e année. 8º Bourg.	4855	Société d'Agric. de l'Ain.
Actes de la Société Helvétique des sciences naturelles, 57° session 8° Sion.		Société Helvétique des Sciences naturelles.
Bulletin des séances de la Société Vaudoise des sciences naturelles.	1002	Société Vaudoise des Sciences naturelles.
T. III, n° 57, 8, 48, 25, 26, 27, 29, 50 8° Lausanne. Mittheilungen, n° 274 à 295 8° Berne.		Soc. Bern. des Sc. natur.
Bulletin de la Soc. des sciences de Neuchâtel. T. II, 8º Neuchât.	1852 1855	Société des Sciences de Neuchâtel.
Bericht über die Verandlungen der nat. hist. Gesselschafft in Basel. T. X	1852	Société d'Histoire natu- relle de Bâle.
Philosophical Transactions of the royal Society of London for the year MDCCCLII. Vol. 142. Part. I et II 4° London.	1852	Société Roy. de Londres.
Proceedings of the royal Society. Vol. VI, nos 83-93. 80 London. Notices of the meetings of the members of the Royal Institution of	1852	)   Institution Royale de la
Great Bretain. Part. II, 1851-52	1852	Grande-Bretagne. ) Société Géologique de
8° London 1852. Vol. IX, nos 52-55 8° London (2 ex.). Transactions of the Linnean Society of London. T. XXI, 2° partie.	1855	Londres.
4º London.	1855	Société Linnéenne de Londres.
Proceedings. 161 à 220. 5 fascicules 8°		)
Transactions of the zoological Society of London. T. IV, part. I, 4° London.	1850	Société Zoologique de Londres.
Proceedings, nos 206 à 215		) Société Royale d'Horti-
part. I, II et III		culture de Londres.  Société de Géographie de
8° London.  The quarterly Journal of the Chemical Society. T. V, n° 20.	1852	Londres. ) Société de Chimie de
8° London.  The Transactions of the entomological Society of London new se-	1855	Londres.  Société Entomologique
ries. Vol. II, part. 5	1852	de Londres.
4° Edimb. 1850. T. XX, part. 5 4° Edimb.		
Proceedings for the session 1851-52 8° Edimburgh.	1002	)

20222111 2122301111111111111111111111111	,	\
Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXII, part. 3,	(	
sciences, part. 4 littérature 4° Dublin.		Académie d'Irlande.
Proceedings. Vol. V, part. II	1852	
Memoirs of the Manchester Literary and Philosophical Society.		Société Littéraire et Phi-
second series. Vol. VIII. 8º London 1848. Vol. X. 8º London.	1852	losoph, de Manchester.
Abhanlungen der Kön. Academie der Wissenschaften fur das Jahr		Académie Royale des
1852		*Sciences de Berlin.
Monatsberichte, etc. Juillet 1852 à Juillet 1853. 8° Berlin 1852 à	1855	
Novorum Actorum Academiæ Leopoldino Carolinæ, 2°. Supplé-		Académie Ces. Leop. Car
ment. XXII, vol	1852	Academie Ocs. Leop. Car
Neun und zwanzigster Jahrsbericht der schlesischen Gesellschaft		
im Jahre 1851	1851	Société Silésienne.
Dreizigster Jahrsbericht, et., im Jahre 1852 4º Breslau.	1852	
Sitzungsbericht der K. Kayserl. Academie der Wissenschaften	\	
math. Classe. Band X, liv. 4 et 5	1855	
Band XI. liv. 1 et 2 8°	1855	A cadámia Impániala
Almanach der K. K. Academie der Wissenschaften für 1852	1	Académie Impériale et Royale des Sciences
8° Wien.	1852	de Vienne.
Denkschriften der K. K. Acad. der W. Math. Phys. Classe. T. IV,		
1e Lief f° Wien.	1852	}
Abhandlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Ie Band.		/
F <sup>0</sup> Wien.	1852	
Iahrbuch der K. K. Geol. Reichsanstalt I Jahrg. nos 1-4. 5 vol.	1002	
4º Wien.	1850	Institut Géolog. I. et R.
II <sup>r</sup> Jahrgang nos 1-4. 4 vol 4° Wien.	1851	de Vienne.
III ) ) ) ) ,	1852	
IVr > n <sup>0</sup> 1. 1 vol	1855	
Verhandlungen der zoologish-botanischen Vereins in Wien.	1000	/
Ir Band	1852	Société d'Hist. naturelle
	1855	de Vienne.
III »	1000	
Memoria delle I. R. Instituto Lombardo di Scienze littere ad arti.	LONG	
T. III F <sup>o</sup> Milan.	1852	Institut Lombard des
Giornale delle I. R. Instituto Lombardo di Scienze etc. Iº série.		Sciences, Lettres et Arts.
T. 4 à 8	1	
Nov. série. T. 1 à 5 4º Milan. 1847 à	1852	)
Abhandlungen der math. phys. Classe der K. bayar. Academie der		Académie Royale de
Wissenschaften. Band VII. 4º München		Bavière.
Bulletin der K. Bay. Acad. etc. Nº 25 ad finem. 4º München	1852	
Jahrsbericht der Kön. Sternwarte bey München. T. V. 2 exempl.		1
		Observatoire de Munich.
Annalen der K. Sternwarte für 1852 8° München.	1852	)

DOUBLIN DIDNIGOTOR		
Abhandlungen der Naturforschenden Geselschaft zu Halle. Ir Band, Ie Part	1855	Société d'Hist. naturelle de Halle.
Mémoires des savants étrangers publiés par l'Académie Royale de		\
Belgique. T. XXIV	1852	
		/
Annuaire de l'Ac. Roy. de Belgique pour 1852 18° Bruxelles.	1852	4 17 * D. 1 1
Mémoires couronnés par l'Académie Royale de Belgique. T. V,	(	Académie Royale des Sciences, Lettres et Arts
1 <sup>re</sup> partie 4º Bruxelles.	1852	de Belgique.
Mémoires de l'Acad. Royale de Belgique. T. XXVI. 4º Bruxelles.	1852	ao Doigidao.
Bulletins de l'Ac. Roy. de Belgique. T. XVIII, 2e partie. T. XIX,		
1re et 2e partie	1852	
Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles pour 1851 et 1852. 18°		<u> </u>
Bruxelles.	1851	Observatoire Royal de
Annales de l'Observatoire Royal de Bruxelles. T. VIII, 2e partie,		Bruxelles.
ct T. IX	1852	
Verhandelingen der eerste Klasse von het. Kong. Nederl, Instituut	1002	
a te Amsterdam, 3° série. T. V	1852	
		Institut Royal des
Jaarbock van het K. N. Instituut voor 1851 8° Amsterdam.	1852	Pays-Bas.
Tidschrift vor de Wis en Naturkundige Wetenschappen etc. T. V,		
1, 2 et 5° part		/
Naturkundige Verandlingen etc. 8e part 4º Harlem.	1855	Soc. Hol. des Sc. natur.
Berättelse om fremstegen i Molusken Naturhistoria 1845-49, af	١	
S. Lovén		
i Physik 1850, af E. Edlund 8° Stokholm.	1852	
i Kemi 1849, af L. F. Svanberg 8° Stokholm.	1852	
i Technologien 1847, 1848 et 1849, af D. E. Pasch.	1	
2 vol	1852	Académie Royale
i Botanik 1849, af J. E. Winström 8º Stokholm.	1852/	des Sciences de Stokholm
i Insekten 1849 et 1850, af C. H. Boheman. 8º Stok.	1852	
Handlingar för ar 1850 förra och sednara afdelning. 8° Stokholm.	1851	
OEsversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingars At-		
tonde argangen 1851	1852	
Oversigt over det Kong. Danske Vedenskabernes selskabs, etc.		Académie Danoise des
8º Copenhague	1852	
Sala Olafs Konungs ens Helga	1855	)
Olaf Tryggvesöns saga ved odd Munk 8° Christiania.	1855	
Bidrag til Pectinibranchiernes udviklingshistoria af J. Koren og D.	1000	
C. Danielsen et supp	1851	
Syphilisations forspg foretagne af H. Bæck 8° Christiania.	1855	Académie de Norwége.
**	1000	
Nyt Magazin for Natur videnskaberne 7°, vol. 1, 2, 5, 4 deel. 8°	1000	
Christiania.		
Nyt Magazin for Natur videnskaberne 8° vol. 1 deel 8° Christiania.	1855	


BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.		410
Annales de l'Observatoire physique central de Russie, par Kupsfer.	,	
Année 1850, nos 1 et 2 4º St-Pétersbour.	1855	Corps impérial
Compte-rendu annuel adressé à Son Ex. M. de Brok, année 1852,	(	des Ingénieurs des Mines de Russie.
<sup>3</sup> 4º Saint-Péterbourg.	1855	de Russie.
Bulletin de la Socité Impériale des naturalistes de Moscou, publié	,	
sous la rédaction du Dr Renard. Année 1849, nº 4.		
8º Moscou.	1849	Société Impériale des
Anané 1852, nos 2, 5 et 4	1852	naturalistes de Moscou.
1853, nº 1.	1855	
Der Naturforshende Verein zu Ríga 4º Riga.	1852	Soc. d'Hist. nat. de Riga.
Memorias de la real Academia de Ciencias de Madrid. T. I, 2º part.	1002	boo. d Mst. nat. de Riga.
4º Madrid.	1884	Académie des Sciences
Resumen de las Actas de la real Acad, de Ciencias 1850-1851.	1001	de Madrid.
8º Madrid.	1851	ao magriti.
	1001	
Rendiconto delle Adunanze et de lavori della reale Academia delle	1000	
Scienze session della Soc. Borbonica. Nos 1 à 5 4º Naples.	1852	Académie Royale
I! monte Vulture, etc., da L. Palmieri et Arscauchi 4º Naples.	,	des Sciences de Naples.
Relation sur la maladie de la vigne 4º Naples.	1852	
Memorie della Reale Academia delle Scienze di Torino. 2º série.		Académie des Sciences
T. XIII 4º Torino.	1855	de Turin.
Annales du Lycée d'Histoire naturelle de New-York. Vol. V, nºs.7		Lycée de New-York.
et 8	1852	Lycee de New-Tork.
Preceedings of the American association sixth Meeting. 8° Was-		Société Américaine
hington.	1852	pour l'avancement des Sc.
The American. Journal of science by Sillimann. Nos 57-45.80 New-		MAK (200)
Kaven.	1852	MM. Silliman et Dana.
Preceedings of the Acad. nat. sc. nos 5 à 6 80 Philadelphie.	1855	Ac. des Sc. nat. de Phil.
Journal of the Academie of nat. sciences new serie. V. II, part. 5.	1	
in-folio Philaldelphia	1853	
Contributions to Knowlege. Vol. V 4º Washington.	1855	
Fourth annual report of the board of regents of the Smithsonian		
Institution for 1849 8° Washington.	1850	
Fifth annual report, etc., for 1850 8° Washington.	1851	
Sixth annual report of the Board of regents of the Smithsonian		Institution Smithsonianna
Institution for 1851	1852/	Institution Smithsonienne à Wasington.
Meteorologie Tables by A. Guyot	1855	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Catalogue of Stanley's Indian Portrait Gallerie 8° Washington.	1852	
Catalogue of North Americ. Reptiles by Baird and Girard. Part. I.	2002	
8º Washington.	1855	
Forster and Whitney Geology of the Lake superior. Part. II. 8°	1000	
Washington.	1980.	
washington.	1002	

PIO BULLETIN BIBLIOURI ALGER
Report of the Commissioners of Patent for 1851. Part. I and II.
8° Washington, 1832
Maury's Sailing Direction. 4 ed. 4º Washington 4852
Maury's Wind and Corrent Charts Wate sheet. F. Nos 2, 5 et 4!.
Riggolds memoirs and Mapes of California Report of the superin-
tendant of the Coast surwey for 1851 8° Washington. 1852
Sketches accompagning the report of Coast survey for 1851
Nortous literary registre for
Stansbury Exploration of the Walley of the great salt Lake of Utah with 2 maps
Owen Geological surwey of Wisconsin, etc., with Illustrations
4° Philadelphia. 1852 Institution Smithsonieum
History Condition and Prospect of the Indians Tribes. Part. III.
4º Philadelphia. 1855
Classification of Mammalia by Ch. Girard.
Revision of the north Americ. Astici by Ch. Girard.
Caracteristics of some new Reptiles. Part. 2 and 5 by, Ch. Girard
and F. Baird.
On the Cause of Tornados by D' Hare.
American Zoological botanical and geological Bibliography. Ch.
Girard
Meteorological Register for 12 Years 1851-1842. 8° Washington. 1851
Smithsonian reports on recents improvements in the chemical arts.
8° Washington 1850
Madras Journal. Nº 59, Jan. à Juny 1851 8º Madras. 1851 Rédaction du Journal.
Monographie des Guêpes solitaires, par II. F. Desaussure. 8º Paris 4852
Traité de Chimie anatomique, etc., par Ch. Robin et F. Verdeil.
5 vol. et 4 atlas
Sur la géologie des Alpes vaudoises, par Renevier 8º Lausanne. 1852
Nouvelles observations sur les trèfles de la section des Chronose-
mium, par Soyer Willermet
Mémoire sur l'orage du 23 août 1850, par R. Blanchet. 8° Paris 1850
On the electrochemical polarity of Gases by W. G. Grove. 4º Lon-
don. 1852/
Die fünf Wurfelschnitte, etc. Theod. Gumbel 4° Landau. 1852
Rapport sur les recherches géologiques exécutées en 1852 dans la
Neerlande, par Van Breda
Documents relatifs aux tremblements de terre dans le nord de
l'Europe et de l'Asie, par Alexis Perret 4º St-Pétersbourg. 1849
A Treatise of Electricity in theory and pratice by Aug. de la Rive.
Vol. I

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Discours sur l'évolution des forces vitales dans la nature, par Ch.	
Desmoulins	1852
Etudes organ, sur les Cuscutes, par Ch. Desmoulins, 8º Bordeaux.	1855
Anæstetic proprieties of Ether by JG. Morton 8º Washington.	1855
Description géologique du département du Bas-Rhin, par Daubree.	
8º Strasbourg.	1852
Mémoire sur les Rafflesias Rochussenii et Patma, par WII. de	
Vrise Folio. Leyde.	1855
Opuscules, par le colonel Sykes. 15 fascicules. 8º London. varia.	
Mem. sur la radiation solaire, par le comte de Gasparin. 8º Paris.	1855
Considér, et expériences sur le Magnétisme, par Melloni, 4º Paris.	1855
A collection of Astronomical and meteor. Tables by Col. JJ. Boi-	
leau 4º Umballa .	1850
Observations magnétiques et météorologiques faites à Hobarton,	
par le cap. Sabine. Vol. 3, pour 1850 4º London.	1855
Notice nécrologique sur JJ. Destremx par le Bn d'Hombres-Firmas	1
8º Alais.	1855
Observations sur les Ulex des environs de Cherbourg. Aug. Lejolis	
· 8° Cherbourg.	1855
Nozioni teorico pratiche all'arte di fabricare il pano, di Abbene.	
8º Turin.	1855
Recherches sur les médianes, par Ernest Quetelet 8º Bruxelles.	1855
Sur les tables de mortalité et de popul., A. Quetelet. 4°	1853
On the Growth of Plants in closely glased Clases by NB. Ward.	
8° London.	1852
Thèses sur les vitesses relatives de la lumière dans l'air et dans	
l'eau, par L. Foucault	1855
Sur divers signes sensibles du mouvement de la terre, par L. Fou-	
cault	1852
Conductibilité propre des liquides, par L. Foucault 4º Paris.	1855

Dons des Auteurs.



# TABLE GÉNÉRALE

DES

## MATIÈRES CONTENUES DANS LE TREIZIÈME VOLUME.

Page	s. Nombre de plane	lies.
Plantamour, $E_{\gamma}$ Résumé des observations thermométriques et ba-		
rométriques faites à l'observatoire de Genève et au grand		
StBernard, pendant les dix années 1841 à 1850, suivi de		
tables hypsométriques calculées d'après la formule de Bessel.	1 -	
PICTET, FJ., prof. et Roux, W. Description des mollusques		
fossiles qui se trouvent dans les grès verts des environs de		
Genève. (Troisième partie : Acéphales orthoconques.)	75	13
Morin, A. Note relative aux apparences microscopiques des che-		
veux humains et des poils d'animaux	175	1
WARTMANN, E., prof. Recherches sur la conductibilité des miné-		
raux pour l'électricité voltaïque	199	—
Gosse, docteur. De l'étiologie du goître et du crétinisme	211	
Morin, A. Nouvelles expériences sur la perméabilité des vases		
poreux et des membranes desséchées par les substances		
nutritives	251	_

	Pages.	Nombre de pl.
PICTET, FJ., prof. et Roux, W. Description des mollusques		
fossiles qui se trouvent dans les grès verts des environs de		
Genève. (Quatrième partie : Acéphales Pleuroconques)	279	11
RITTER, E. Note sur la mesure des hauteurs par le baromètre	545	
DE LA RIVE, A., prof. Mémoire sur la cause des aurores boréales	575	_
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Liste des ouvrages reçus par la So-		
ciété pendant l'année 1855	411	-

NB. Ce volume renferme en outre deux suppléments contenant les observations astronomiques, faites à l'observatoire de Genève, par M. le professeur Plantamour, pendant les années 1849 et 1850.

# TABLE ANALYTIQUE

DYRIE

## MATIÈRES CONTENUES DANS LE TREIZIÈME VOLUME

RANGÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.


	Pages.
A	
Aurores boréales (Mémoire sur la cause des), par M. A. De la Rive, prof,	575
В	
Baromètre (Mesure des hauteurs par le), par M. E. Ritter	345
Bulletin bibliographique. Liste des ouvrages reçus par la Société pendant	
l'année 1853	411
С	
Cheveux humains. Apparences microscopiques qui les distinguent des	
poils d'animaux, par M. A. Morin	175
Conductibilité (Recherches sur la) des minéraux pour l'électricité voltaïque,	
par M. E. Wartmann, prof	199
Crétinisme (Etiologie du)	211


### TABLE ANALYTIQUE

D	Pages.
De la Rive, A., prof. Mémoire sur la cause des aurores boréales	575
G	
Goître (Etiologie du)	211 211 75
Id. Suite et lin	279
н	
Hauteurs (Mesure des) par le baromètre, par M. E. Ritter	545
M	
Membranes desséchées. Leur perméabilité par les substances alimentaires.	251
Mollusques fossiles (Description des) qui se trouvent dans les grès verts des environs de Genève, par MM. FJ. Pictet et W. Roux  Id. Suite et fin	75 279
mains et des poils d'animaux	175
des membranes desséchées par les substances alimentaires	251
0	
Observations (Résumé des) thermométriques et barométriques faites à l'Observatoire de Genève et au grand StBernard, pendant les dix années 1841 à 1850, par M. Plantamour, prof	í
P	
Perméabilité des vases poreux et des membranes desséchées par les substances alimentaires	251

DES MATIÈRES.	423
	Pages.
Pictet, FJ., prof. et W. Roux. Description des mollusques fossiles qui se trouvent dans les grès verts des environs de Genève  Id. Suite et fin du mémoire précédent  Plantamour, E., prof. Résumé des observations thermométriques et barométriques faites à Genève et au grand StBernard, pendant les dix années 1841 à 1850, suivi de tables hypsométriques calcu-	75 279
lées suivant la formule de Bessel	275
R	
Ritter, E., Docteur. Note sur la mesure des hauteurs par le baromètre Roux, W., Docteur en médecine (et FJ. Pictet). Description des mol- lusques fossiles qui se trouvent dans les grès verts des environs	545
de Genève	75
Id. Suite et fin du mémoire précédent	279
Т	
Tables hypsométriques, calculées suivant la formule de Bessel, par M.  Plantamour, prof	1
v	
Vases poreux. Leur perméabilité pour les substances alimentaires	251,
W	
Wartmann, E., prof. Recherches sur la conductibilité des minéraux pour l'électricité voltaïque	199

. ....





# OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

FAITES

# A L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE

DANS L'ANNÉE 4850

PAR

E. PLANTAMOUR,

Brofesseur d'Astronomie à l'Académie de Genève.

GENÈVE. — IMPRIMERIE FERD. RAMBOZ ET C<sup>ie</sup>.

## OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

FAITES

## A L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE

DANS L'ANNÉE 1850.

#### OBSERVATIONS FAITES A LA LUNETTE MÉRIDIENNE.

Les étoiles observées par M. Bruderer à la lunette méridienne, pendant l'année 1850, sont au nombre de 514, dont 47 étoiles fondamentales, 259 qui se trouvent déjà dans différents catalogues, et 208 anonymes.

#### RÉDUCTION DES ASCENSIONS DROITES.

La correction de l'instrument pour la réduction des ascensions droites a été calculée comme précédemment par la formule

$$\frac{c}{15}$$
 sécante  $\delta + \frac{n}{15}$  tang.  $\delta$ .

Les observations des mires donnent en moyenne, pour la demi-somme des azimuts des mires augmentée de l'erreur d'axe optique, les valeurs suivantes, en désignant par  $\alpha$  l'azimut de la nouvelle mire méridienne du Sud, et par A'', A''', A''' celui des trois mires du Nord.

$$\frac{\alpha + A''}{2} + c; \frac{\alpha + A'''}{2} + c; \frac{\alpha + A''}{2} + c;$$

Cercle Ouest, du 1er Jany. au 31 Juillet — 5",45 — 15",53 — 29",52

Le 1er Août, la lunette a été heurtée, ce qui a occasionné un changement dans l'erreur d'axe optique.

Les valeurs des demi-sommes des azimuts des mires, déterminées par sept retournements, sont:

$$\frac{\alpha + A''}{2} = -6'',40$$

$$\frac{\alpha + A'''}{2} = -16,71$$

$$\frac{\alpha + A^{1V}}{2} = -30,26$$

il en résulte pour la valeur de c:

du 1<sup>er</sup> Janv. au 31 Juill. 
$$c = +0'',96$$
  
du 1<sup>er</sup> Août au 31 Octob. -7,18  
du 1<sup>er</sup> Nov. au 31 Déc. -7,90

la constante —  $0^{\prime\prime}$ ,21 a été ajoutée à la valeur de c, pour tenir compte de l'aberration diurne.

Les passages de  $\alpha$  et  $\delta$  de la Petite Ourse ont donné pour la valeur de n :

Cercle Ouest, du 3 Février au 17 Février.	۰			n = + 6'',30
du 18 Février au 3 Mars			 ۰	+ 8,64
du 4 Mars au 15 Mars	٠			+ 9,81
3 Avril		٠		+ 11,40
du 5 Avril au 4 Mai		۰		+ 12,93
du 6 Mai au 6 Juin				+ 14,85
du 8 Juin au 20 Juin				+ 13,80
du 21 Juin au 6 Juillet		٠		+ 16,05
du 9 Juillet au 14 Juillet .				+ 13,35

Cercle Ouest,	du 14 Juillet au 25 Juillet $n = +15'',00$
	du 29 Juillet au 31 Juillet + 13,95
	du 3 Août au 6 Août
	du 7 Août au 26 Août + 10,92
	du 27 Août au 2 Septembre + 11,65
	du 3 Septembre au 4 Septembre + 10,50
	du 19 Septembre au 9 Octobre + 11,25
	du 12 Octobre au 16 Octobre + 9,00
; ;	du 17 Octobre au 19 Octobre + 10,20
	du 25 Octobre au 31 Octobre + 6,90
	du 2 Novembre au 10 Novembre + 11,05
	du 14 Novembre au 31 Décembre + 9,60

L'inclinaison de l'axe de rotation a été déterminée, soit par le nivellement, soit par l'observation du fil méridien réfléchi dans l'horizon de mercure; voici pour les périodes précédentes la valeur de l'inclinaison, b, ainsi que les demi-différences des azimuts des mires, augmentées de l'erreur azimutale a.

Cercle Ouest.	b	$\frac{\alpha - A''}{2} + a;$	$\frac{\alpha - A'''}{2} + a$	$;\frac{\alpha-A^{\text{IV}}}{2}+a$
du 3 Février au 17 Février.	<b>—3",60</b>	<b>—</b> 8",85	+ 2",35	+15",84
du 18 Février au 3 Mars	3,06	- 10,00	+ 0,85	+ 14,07
du 4 Mars au 15 Mars	<b>—</b> 2,53	- 11,46	1,23	+ 12,09
du 22 Mars au 30 Mars		<del>- 11,97</del>		+ 10,43
du 5 Avril au 4 Mai	<del>- 1,84</del>	<b>—</b> 12,56	<b></b> 2,91	+ 11,29
du 6 Mai au 6 Juin	<del>- 1,35</del>	<del>- 16,16</del>	6,08	+ 8,12
du 8 Juin au 20 Juin	+ 0,86	- 14,44	- 4,87	+ 9,75
du 21 Juin au 6 Juillet	+ 0,29	<b>—</b> 19,25	- 9,66	+ 5,21
du 9 Juillet au 14 Juillet	- 2,60	<b>—</b> 16,59	- 7,69	+ 7,41
du 14 Juillet au 25 Juillet		- 18,81	- 8,89	+ 5,55

du 29 Juillet au 31 Juillet.		.—16″,76	<b>—</b> 7",35	-+	5",98
du 3 Août au 6 Août	-3",12		6,80	+	7,35
du 7 Août au 26 Août	- 4,20	- 17,01	- 5,81	+	9,40
du 27 Août au 2 Septembre.	- 5,17	<b>—</b> 17,69	<b>—</b> 6,41	+-	7,61
du 3 Septemb. au 14 Sept.	- 7,58	<b>—</b> 18,21	- 7,43	-+-	6,70
du 19 Sept. au 9 Octobre.	- 7,84	<b>—</b> 19,15	- 9,15	+	5,39
du 12 Octob. au 16 Octob.	- 9,44	- 19,58	- 9,06	+	4,70
du 17 Octob. au 19 Octob.		21,55	- 10,77	+	2,35
du 25 Octob. au 31 Octob.		20,09	9,32	+	4,19
du 2 Novemb. au 10 Nov.	<b></b> 7,90	- 20,57	- 10,12	+	3,76
du 14 Nov. au 31 Décembre	-11,87	- 20,66	- 10,43	+	2,99
En adoptant pour la valeur	de α—A"	1 6	// or		

En adoptant pour la valeur de 
$$\frac{\alpha - A''}{2}$$
 + 4",87   
  $\frac{\alpha - A'''}{2}$  + 15,12   
  $\frac{\alpha - A^{\text{IV}}}{2}$  + 28,97

on obtient pour l'erreur azimutale a, et pour la déviation de l'instrument à l'équateur, calculée par la formule,  $m=\frac{a}{\sin\varphi}+n$  cotang.  $\varphi$ 

du 3 Fevrier au 17 Fevrier $a=$	$=-13^{\circ},21^{\circ}m=-12^{\circ},27^{\circ}$
du 18 Février au 3 Mars	<b>—</b> 14,68 · <b>—</b> 11,94
du 4 Mars au 15 Mars	<b>—</b> 16,51 . <b>—</b> 13,47 · ·
du 22 Mars au 30 Mars	<b>—. 17,69</b> .
3 Avril	<b>— 17,70 — 13,58</b>
du 5 Avril au 4 Mai	<u> </u>
du 6 Mai au 6 Juin	<b>—</b> 21,03
du 8 Juin au 20 Juin	-19,51 $-13,81$
du 21 Juin au 6 Juillet	<b>— 24,22</b>
du 9 Juillet au 14 Juillet	-21,94 $-17,60$
du 14 Juillet au 25 Juillet	-23,70 $-18,47$

du 29 Juillet au 31 Juillet	a = -22'',36	m = -17'',61
du 3 Août au 6 Août	- 21,77	- 18,02
du 7 Août au 26 Août	- 20,79	— 18,34
du 27 Août au 2 Septembre	- 21,82	- 19,07
du 3 Septembre au 14 Septembre .	— 22,63	- 21,29
du 19 Septembre au 9 Octobre	- 23,96	- 22,40
du 12 Octobre au 16 Octobre	<b>—</b> 24,30	- 25,04
du 17 Octobre au 19 Octobre	<del>- 26,31</del>	- 26,68
du 25 Octobre au 31 Octobre	<b>—</b> 24,73	- 27,65
du 2 Novembre au 10 Novembre .	- 25,30	— 24,46
du 14 Novembre au 31 Décembre.	<b>—</b> 25,69	- 26,39

Le tableau suivant contient l'état de la pendule sidérale calculé pour le midi moyen de tous les jours d'observation, en tenant compte de la correction  $\frac{m}{15}$ .

État de la Pendule sidérale Arnold et Dent sur le temps sidéral, à Midi moyen.—1850.

DATE.	ÉTAT  de li  pendule.  Diuan.	DATE.	ÉTAT de la PENDULE.	MARCHE DIURNE.	DATE.	ÉTAT MAR de la PENDULE.	
Février 3 4 9 11 14 16 17 18 19 20 21 .22 23 24 25 26	pendule a été avancé utes	Mars 1 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 22 27 28 30 Avril 3	- 25°,99 - 26,86 - 27,78 - 30,57 - 31,49 - 32,41 - 33,39 - 34,34 - 35,21 - 36,94 - 37,64 - 38,50 - 39,33 - 44,64 - 48,36 - 49,12 - 50,78 - 53,80 - 55,46 - 56,38	- 0°,95 - 0,92 - 0,93 - 0,93 - 0,93 - 0,95 - 0,87 - 0,86 - 0,76 - 0,76 - 0,76 - 0,78 - 0,78 - 0,78 - 0,78 - 0,83 - 0,76 - 0,83 - 0,76 - 0,83 - 0,76 - 0,83 - 0,76 - 0,83 - 0,76	Avril 8 11 14 19 23 24 25 29 30 Mai 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 18	- 70,96 - 0, - 71,51 - 0, - 73,14 - 0, - 73,86 - 0, - 74,97 - 0, - 76,29 - 0, - 77,66 - 0, - 78,33 - 0, - 79,71 - 0, - 80,41 - 0,	63 70 63 63 58 56 55 55 54 72 66 66 67 68

VIII

État de la pendule sidérale Arnold et Dent sur le temps sidéral, à Midi moyen.—1850.

DATE.	ÉTAT  de la  PENDULE.	MARCHE DIURNE.	DATE.	ÉTAT de la PENDULE.	MARCHE DIURNE.	DATE.	ÉTAT  de la  PENDULE.	MARCHE DIURNE.
Mai 19 20 21 22 23 25 29 30 31	- 83°,56 - 84,25 - 84,81 - 85,44 - 86,10 - 90,51 - 91,30 - 92,04	- 05,64 - 0,69 - 0,56 - 0,63 - 0,65 - 0,75 - 0,73 - 0,79	Juillet 21 22 23 24 25 29 30 31 Août 3	- 1°,41 - 1,95 - 2,35 - 2,72 - 3,06 - 4,72 - 5,02 - 5,32 - 6,50 - 6,86	- 05,48 - 0,54 - 0,40 - 0,37 - 0,34 - 0,41 - 0,30 - 0,30 - 0,39 - 0,40	Sept. 13 14 19 20 24 26 27 30 Octob. 7	- 14 <sup>3</sup> ,49 - 14,49 - 14,40 - 14,25 - 14,56 - 14,51 - 14,45 - 11,69 - 11,45	+ 0°,04 0,00 + 0,02 + 0,15 - 0,07 - 0,01 + 0,05 + 0,02 + 0,39 + 0,24 + 0,22
Juin 1a p deux minutes  Juin 4 5 6 9 10 11 18 19 21 23 24 25 26 27 30 Juillet 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20		- 0,69 - 0,62 - 0,63 - 0,64 - 0,69 - 0,53 - 0,68 - 0,58 - 0,56 - 0,55 - 0,51 - 0,53 - 0,45 - 0,46 - 0,46 - 0,37 - 0,56 - 0,58 - 0,59 - 0,55 - 0,56 - 0,46 - 0,37 - 0,45 - 0,56 - 0,56	5 6 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 Sept. 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12	- 7,26 - 7,66 - 8,32 - 8,65 - 8,98 - 9,30 - 10,10 - 10,28 - 10,64 - 10,90 - 11,17 - 11,41 - 12,42 - 12,67 - 12,84 - 13,03 - 13,24 - 13,42 - 13,42 - 14,20 - 14,20 - 14,20 - 14,20 - 14,20 - 14,59 - 14,59 - 14,75 - 14,80 - 14,63 - 14,53	- 0,40 - 0,43 - 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,20 - 0,20 - 0,28 - 0,18 - 0,18 - 0,27 - 0,24 - 0,23 - 0,21 - 0,19 - 0,11 - 0,19 - 0,21 - 0,11 - 0,22 - 0,17 - 0,13 - 0,03 + 0,17 + 0,10	9 13 14 15 16 17 18 19 25 26 31 Nov. 2 3 4 5 6 7 9 10 15 16 22 24 Déc. 5 26 27 28 29	- 11,23 - 10,54 - 10,12 - 9,65 - 9,21 - 8,86 - 8,86 - 8,30 - 4,72 - 4,01 - 0,93 + 0,44 + 0,80 + 1,08 + 1,33 + 1,74 + 2,54 + 2,54 + 10,01 + 11,21 + 18,06 + 19,15 + 29,74 + 30,72 + 30,72 + 30,72 + 31,22	+ 0,22 + 0,42 + 0,42 + 0,44 + 0,45 + 0,46 + 0,50 + 0,66 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,61 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,56 +

### RÉDUCTION DES DÉCLINAISONS.

Les lieux de l'équateur sur le cercle, déduits des observations des étoiles fondamentales, sont:

Cercle Ouest,	le 3 Février				279°54′29″,35
	du 4 Février au 16 Février				32,76
	du 17 Février au 21 Février			4	31,83
	du 22 Février au 25 Février				30,99
	du 26 Février au 27 Février			٠	31,60
	du 28 Février au 1er Mars.				30,64
	du 2 Mars au 7 Mars			P	31,75
	du 8 Mars au 15 Mars				30,75
	3 Avril			٠	58 47,10
	du 5 Avril au 11 Avril .		٠		41,50
	du 13 Avril au 25 Avril	٠			40,00
	du 29 Avril au 18 Mai.				41,46
	19 Mai				40,30
	du 20 Mai au 22 Mai				42,24
	du 24 Mai au 4 Juin.				40,80
	du 5 Juin au 8 Juin.				42,20
	du 9 Juin au 22 Juin				41,27
	du 23 Juin au 2 Juillet.				39,68
	du 3 Juillet au 6 Juillet.				40,90
	du 10 Juillet au 16 Juillet .				39,46
	du 17 Juillet au 25 Juillet .				38,48
	du 29 Juillet au 31 Juillet .				36,40
Le rer Anút	la lunette a été heurtée.	•		i	30,.0
201 2000	du 3 Août au 11 Août				3,26
	2				55 47,50
					,

	du 31 Août au 2 S	Septembre			279°55′50″,23
	3 Septemb	ore			47,00
	4 Septeml	bre			48,42
	du 5 Septembre a	u 10 Septem	bre .		50,15
	du 11 Septembre	au 26 Septer	mbre .		48,92
	du 27 Septembre	au 8 Octobr	е		46,52
	du 9 Octobre au	16 Octobre			47,92
	du 17 Octobre au	3 Novembre	e		45,70
	du 4 Novembre a	u 5 Décemb	re .		47,46
	du 7 Décembre a	u 25 Décemb	bre		43,95
	du 26 Décembre	au 29 Décem	bre .		46,45
La latitude	de l'Observatoire	, déduite d	e l'obse	rvation	du Nadir par
la réflexion d	es fils, a été tro	uvée comm	e suit:		
Cercle Ouest,	4 Février.	, .			46°11′58″,24
	19 Février.				56,33
	28 Février				56,51
	8 Mars				56,00
	10 Avril				56,23
	25 Avril				56,70
	20 Mai				56,66
	9 Juin				58,10
	10 Juin				57,13
	4 Juillet				56,10
	11 Juillet				57.57
	3 Août				57,67
	11 Août				58,04
	10 Septembre.				57,61
	16 Octobre .				56,70
	26 Décembre				56,45
	Moyenne.				46°11′57″,00

CALCUL DES ASCENSIONS DROITES ET DES DÉCLINAISONS MOYENNES DES ÉTOILES AU 1<sup>et</sup> janvier 1850.

Les pages 117—142 renferment les positions moyennes des étoiles réduites au 1° Janvier 1850, au moyen des constantes données dans les Ephémérides de Berlin; on trouve à la suite de ces tableaux, page 143, la comparaison des positions observées des étoiles fondamentales avec les positions tirées des mèmes Ephémérides

RÉDUCTION DES ORSERVATIONS DU SOLEIL ET DES PLANÈTES.

Les pages 144—150 renferment les positions apparentes des centres du Soleil et des planètes corrigées de la parallaxe. Tous les éléments qui ont servi à la réduction de ces observations, tels que la durée du passage, le rayon du disque, la parallaxe horizontale, ont été tirés des Ephémérides de Berlin. C'est également aux positions tirées de ces Ephémérides que les positions observées ont été comparées.

OCCULTATIONS D'ÉTOILES PAR LA LUNE.

Ces observations se trouvent à la page 151.



Samoi	NOM	PASSAGE CONCLU		RECTION de	MOVENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE		ОМЕТКЕ	RÉFRACTION	LIEU da
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	ЛОХ.	POLE.
3	Soleil, bord 1, sup. α Pégase	h. m. s. 21. 6.10,92 22.57.14,78	- 0,07 + 0,16	- 1,34	263.40.33,6 294.18.59,2	731,3 731,0	+ 5,8 + 7,4	+ 9,5	-1.46,7 - 34,7	29,6
	Soleil, bord 1	21.10.12,38 1. 4.32,80 4.27.16,60 4.36.40,93 4.41.54,46 4.43.24,02	+ 0,17 - 0,14 - 0,07	- 2,61	296. 4. 5,3 255.21.30,8 263.29.54,5	728,6 728,6	+ 6,5	+ 5,5	- 32,7 -2.40,9 -1.49,1	29,7
	A Cocher	5. 5.34,69 5. 7.17,78 5. 9.44,30 5.16.46,54 5.21.43,24 5.28. 3,87 5.36. 5,58	+ 0,50 - 0,01 + 0,26 + 0,29 - 0,07 - 0,01	- 2,53 - 2,53 - 2,59	27 t.32.49,9 305.56.46,6 308.23.12,6 262.57.25,3 273.54.42,0 259.42.37,5	728,6	+ 6,1	+ 5,0 + 4,8 + 3,8	-1.19,6 - 20,9 - 18,2 -1.52,0 -1.13,4 -2. 9,9	32,0 30,1
	Lalande 10922 Lalande 11059 α Orion Lalande 11376 Anonyme	5.47. 1,19 5.51.59,11 5.55.45,72	- 0,11 + 0,10 - 0,11 - 0,11	- 2,47	259.51.34,2 287.17.34,7 259.45.28,2 259.54.55,4	728,5	+ 5,6	+ 3,1	-2. 9,1 - 46,0 -2. 9,9 -2. 8,9	33,4
	Lalande 11677 δ Petite Ourse I α Grand Chien Anonyme Anonyme δ-22°9'.	6.20,34,66 6.38.30,64 6.45.59,99	- 0,07 - 0,13	- 2,51	13.17.49,2 263.25.18,3 257.55.16,1	728,4	+ 5,1	+ 2,4	+1. 1,8 -1.50,6 -2.22,3	34,5 36, <sub>7</sub>
	Lalande 13510 Lalande 13620 Anonyme Anonyme Anonyme & 23°55'	7.10.31,11	- 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13		257.56.10,3 258. 1.50,8 257.51. 1,5 256. 7. 5,0	728,0	+ 4,5	+ 2,0	$ \begin{array}{c} -2.22,2 \\ -2.21,6 \\ -2.22,8 \\ -2.36,6 \end{array} $	
	α Petit Chien 3 Gémeaux	7.31.25,22 7.36. 6,01	+ 0,09	- 2,47 - 2,42	285.31.30,5 308.17.43,7	727,8	+ 4,1	+ 1,4	- 49,2 - 18,5	36,1
5	Soleil, bord 1, sup.	21.14.13,24	- 0,07		264.16.13,1	725,3	+ 6,2	+ 5,4	-1.45,0	
8	δ Petite Ourse S α Lyre γ Aigle α Aigle	18.20.15,70 18.31.43,61 19.38.59,78 19.43.19,96	+ 0,13	- 6,48	6.29.30,6 318.33.25,2 290.10.18,3 288.23.47,9	730,3	+ 4,0	+ 2,5	+ 48,8 - 7,6 - 41,2 - 43,9	36,8 35,2 34,3 32,7
9	Soleil, bord 1, sup.	21.30. 8,82	- 0,07	٠.	265.31. 2,2	729,4	+ 5,5	+ 6,r	-1.40,1	

Le 3, Mire Sud-15P,69. Nord D-53P,38.

Le 4, Mire Sud- $16^{\circ}$ ,32. Mire Nord  $E+4^{\circ}$ ,91. Mire Nord  $C-22^{\circ}$ ,58. Mire Nord  $D-52^{\circ}$ ,54.  $d-10^{\circ}$ ,43. Nadir  $146^{\circ}$ 6'31",00.

Le 5, Niveau-19,55.

Anonyme	JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté-	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
60 Eridan		Anonyme Lalande 8033 Anonyme  Taureau Anonyme	3.13.31,19 4. 0. 5,17 4. 9.17,95 4.15.12,21 4.27.12,42 4.36.36,95	s. + 0,57 - 0,13 - 0,13 - 0,13 + 0,17 - 0,14	- 6,81	329.13.54,6 257.52. 4,5 257.24.57,8 257.48.47,5 296. 7. 2,6 255.21.3c,5	727,3 727,6	+ 5,4 + 5,2	+ 5,1 + 3,5 + 4,0 + 2,9 + 3,5	+ 3,1 -2.21,9 -2.25,1 -2.22,1 - 32,0 -2.41,6	33,1 27,8
10 γ Dragon 3 Petite Ourse S 4 Lyre		60 Eridan Lalande 9394 α Cocher 3 Orion Mars, bord 1, centre β Taureau α Orion α Petit Chien	4.43.19,82 4.51.35,66 5. 5.30,47 5. 7.13,48 5.13.15,75 5.16.42,29 5.46.56,93 7.31.20,99	- 0,07 - 0,13 + 0,50 - 0,01 + 0,27 + 0,29 + 0,10 + 0,09	- 6,78 - 6,68 - 6,69	257.41.17,3 325.44.58,3 271.32.50,1 305.56. 4,3 308.23.14,9 287.17.35,1 285.31.26,4	727,6 727,6	+ 4,9 + 4,9	+ 3,7	-2.22,8 - 0,4 -1.19,7 - 20,9 - 18,1 - 45,6 - 48,3	36,7 32,6 34,4 34,4 33,4 30,1
α Aigle   19.43.15,52   + 0,12   - 10,94   - 288.23.47,3   324.39.18,4   738,6   + 4,8   + 1,1   - 1,5   324.39.18,4   738,6   + 4,8   + 1,1   - 1,5   324.39.18,4   738,6   + 4,8   + 1,1   - 1,5   324.39.18,4   738,6   + 4,8   + 1,1   - 1,5   324.39.18,4   738,3   + 5,5   + 1,7   + 16,4   + 1,8   + 25,6   14.50   14.5	10	y Dragon de Petite Ourse S	17.52.57,52 18.20.12,95	+ 0,61	- 8,09	331.24.47,9	734,7 734,5	+ 4,2 + 4,1	- 0,8 + 0,2	+ 5,4 + 49,5	32,9 34,4 33,9
α Pégase	τ3	α Aigle α Cygne α Céphée β Céphée	19.43.15,52 20.36. 6,33 21.14.46,02 21.26.27,57	+ 0,12 + 0,49 + 0,90 + 1,30	- 10,94 - 10,75 - 10,76	288.23.47,3 324.39.18,4 341.51.19,9 349.48.19,2	738,6 738,3	+ 4,8 + 5,5	+ 0,8 + 1,1 + 1,7 + 1,8	- 45,1 - 1,5 + 16,4 + 25,6	33,4 31,6 33,7 34,4 35,5
B Petite Ourse I   2.51, 2,41   -1,73   -10,91   25, 7, 0,8   -11,09   283,25, 4,4   736,7   +4,4   +1,9   -53,5   -0,4   -53,5   -0,4	14	α Pégase α Andromède γ Pégase. α Cassiopée α Petite Ourse S α Bélier β Petite Ourse I α Baleine α Cocher β Orion	22.57. 5,04 0. 0.26,19 0. 5.18,72 0.31.48,66 1. 4.20,59 1.58.31,67 2.51. 2,41 2.54.14,99 5. 5.25,77 5. 7. 8,81	+ 0,16 + 0,28 + 0,16 + 0,71 + 0,23 - 1,73 + 0,08 + 0,50 - 0,01	- 10,98 - 11,10 - 11,11 - 11,13 - 10,91 - 11,09 - 11,25	308.10.33,5 294.15.58,0 335.37.19,2 8.24.27,3 302.39.54,1 25. 7. 0,8 283.25. 4,4 325.44.57,5 271.32.50,9	737,0 736,9 736,8 736,8 736,7	+ 4,8 + 4,6 + 4,7 + 4,6 + 4,4	+ 2,3 + 2,7 + 2,5 + 2,1 + 1,9 + 0,2	- 18,8 - 36,0 + 9,7 + 52,7 - 25,2 +1.36,4 - 53,5 - 0,4 -1.22,0	32,5 29,7 34,6 33,0 31,0 28,3 31,1 35,6 31,4

Le 14, Mire Sud-14P,75. Mire Nord B+5P,85. Mire Nord D-51P,89.

5

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERM Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	α Hercule α Ophiuchus γ Dragon δ Petite Ourse S α Lyre γ Aigle α Aigle α Céphée	b. m. s. 17. 7.33,92 17.27.43,50 17.52.51,74 18.20.10,92 18.31.36,03 19.38.52,40 19.43.12,54 21.14.42,83	5. + 0,16 + 0,14 + 0,61 + 0,40 + 0,13 + 0,12 + 0,90	s. - 13,86 - 13,90 - 14,09 - 14,03 - 14,01 - 13,98 - 13,98	294.28.59,0 292.35.26,2 331.24.46,4 6.29.28,6 318.33.23,5 290.10.14,6 288.23.48,2 341.51.20,0	737,4 737,5 737,7 737,5 737,6 738,0	+ 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,4 + 4,4 + 4,8 + 5,5	+ 2,6 + 3,2 + 3,1 + 2,8 + 3,0 + 4,4 + 5,4	- 35,7 - 38,3 + 5,4 + 49,3 - 7,7 - 41,8 - 44,5 + 16,2	33,6 27,6 32,7 37,3 35,2 31,1 33,5 35,3
17	Soleil, bord 1, inf  A Audromède  Pégase  Cassiopée  Bélier  Persée.  Anonyme.  Lalande 8033  Anonyme  Taureau.  Anonyme  Lalande 9079	22. 1.22,00 0. 0.23,09 0. 5.15,48 0.31,45,58 1. 4.12,44 1.58.28,59 3.13.23,39 3.59.57,55 4. 9.10,09 4.15. 4,34 4.27. 4,58 4.36.28,77 4.41.36,28	- 0,04 + 0,28 + 0,16 + 0,71 + 0,23 + 0,57 - 0,13 - 0,13 - 0,13 + 0,17	- 14,06 - 14,32 - 14,12 - 14,17 - 14,39	267.39.50,0 308.10.32,3 294.15.55,0 335.37.18,6 8.24.28,5 302.39.51,4 329.13.54,4 257.52. 3,6 257.24.55,6 257.48.48,7 296. 7. 5,9 255.21.26,9 263.29.53,0	737,8 737,3 737,5 737,5 737,5 737,4 737,3	+ 5,8 + 6,1 + 6,1 + 6,4 + 6,5 + 6,1 + 6,0 + 5,9	+ 5,4 + 6,3 + 6,5 + 7,8 + 6,8 + 5,6 + 5,5 + 5,0 + 4,8 + 4,9	-1.33,2 - 18,5 - 35,5 + 9,6 + 51,7 - 24,8 + 3,1 -2.22,7 -2.26,2 -2.23,4 - 33,2 -2.43,1 -1.50,5	32,1 27,6 34,5 33,8 28,9 33,3
	60 Eridan	4.43.11,96 4.51.27,65 5. 5.22,57 5. 7. 5,71 5.16.34,49 5.21. 2,63 5.46.49,01 21.14.41,68 21.26.23,27	- 0,07 - 0,13 + 0,50 - 0,01 + 0,29 + 0,25 + 0,10 + 0,90 + 1,30	- 14,38 - 14,40 - 14,44 - 14,49 - 15,14 - 15,02	257.41.19,5 325.44.57,2 271.32.46,7 308.23.15,4 305.56. 4,2 287.17.30,7 341.51.18,9 349.48.20,0	737,3 737,3 737,4 736,7	+ 5,7 + 5,3 + 5,1 + 6,1	+ 5,0 + 4,2 + 4,0 + 3,7 + 3,0 + 7,0 + 7,6	-2.24,2 - 0,4 -1.20,8 - 18,4 - 21,2 - 46,5 + 16,1 + 25,0	35,τ 28,7 32,4 29,4 34,4 37,1
	Soleil, bord 1, sup.  A Andromède  Cassiopée  Petite Ourse S  Bélier  Taureau  Mars, bord 1, centre Lalande 10853  Lalande 11059  Anonyme	22. 5.12,74 0. 0.22,03 0.31.44,34 1. 49,34 1.58.27,47 5.16.33,29 5.22.10,73 5.35.52,82 5.41.27,35 5.42.25,50	- 0,04 + 0,37 + 0,93 + 0,37 + 0,32 - 0,16 - 0,16	- 15,02 - 15,12 - 15,21 - 15,55	268.33.22,4 308.10.33,1 335.37.18,9 8.24.24,9 302.39.50,7 308.23.15,2 305.56. 5,0 259.42.32,7	736,5 735,8 735,7 735,6 735,5 735,9	+ 6,8 + 7,2 + 7,3 + 7,5 + 7,4 + 6,2	+ 7,4 +11,4 + 9,4 + 6,2 + 5,8 + 4,3	-1.29,3 - 18,1 + 9,5 + 51,9 - 24,8 - 18,4 - 21,1 -2.10,9	33,4 34,9 30,7 28,3 32,2

Le 17, Mire Sud-16P,48. Mire Nord C-21P,34.

4
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1850.

			====		mer terretorie en					
JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		la pendule.	MOVENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERM Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	α Orion Lalande 11376 Anonyme Lalande 11677 δ Petite Ourse I α Grand Chien Lalande 13316 Anonyme Lalande 13510 Lalande 13620 Anonyme α Gémeaux α Petit Chien γ Aigle α Aigle α Cygne Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup>	19.43.10,52	5. + 0,12 - 0,16 - 0,16 - 0,16 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 + 0,42 + 0,10 + 0,15 + 0,14 + 0,64 - 0,14	5. - 15,50 - 15,29 - 15,07 - 15,30 - 16,09 - 16,74	287.17.31,8 259.45.28,6 259.54.49,4 260. 0.45,2 13.17.50,0 257.48.59,8 257.47.51,2 257.56.11,5 258. 1.50,1 257.35.22,3 312. 7.21,6 285.31.26,0 290.10.13,5 288.23.45,3 324.39.15,0 264.16.53,8	736,0 736,0 736,1 736,0 736,0 736,0	+ 5,5 + 5,4 + 5,6 + 5,6 + 5,8	+ 3,6 + 4,0 + 4,3 + 3,5 + 2,9 + 4,2 + 5,0 + 5,4	- 46,3 -2.10,8 -2. 9,9 -2. 9,3 +1. 2,1 -1.50,9 -2.23,8 -2.22,3 -2.22,3 -2.25,5 - 14,4 - 49,5 - 41,7 - 44,5 - 1,46,6	30,7 32,4 37,0 30,3 32,3 30,4 30,8 31,7
IÇ	Vénus, bord 2, centr.  Soleil, bord 1, inf.  α Andromède  γ Pégase  α Cassiopée  α Petite Ourse S  α Bélier  β Petite Ourse I  α Baleine  α Persée  ε Taureau  Lune, bord 1, inf.  Anonyme  t Taureau  α Taureau  α Taureau  α Taureau  α Taureau  Α Taureau  A Taureau  A Taureau  A Taureau  A Taureau  Anonyme  Lalande 9079	22. 1. 6,50  22. 9. 2,88 0. 0.20,95 0. 5.13,36 0.31.43,38 1. 4. 5,94 1.58.26,41 2.51.57,96 2.54. 9,65 3.13.21,13 3.39.46,12 3.51.48,72 3.59.55,62 4. 9. 7,43 4.15. 2,16 4.19.35,02 4.27. 2,36 4.36.26,69 4.41.37,20	- 0,08 - 0,06 + 0,37 + 0,20 + 0,93 - 2,30 + 0,08 + 0,75 + 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 + 0,25 + 0,22 - 0,20 - 0,12	- 16,09 - 16,39 - 16,06 - 16,26 - 16,37 - 16,35 - 16,41	266.23.14,8 268.22.12,7 308.10.28,0 294.15.53,6 335.37.18,9 8.24.25,7 302.39.52,3 25. 7. 3,7 283.25. 3,8 329.13.52,3 29.35.38,8 294. 0.58,2 257.52. 2,1 257.48.46,4 298.45.27,1 296. 7. 3,0 255.21.28,1 263.29.55,0	735,8 735,7 734,6 734,4 734,3 734,1 734,3 734,3 734,6	+ 7,0 + 7,5 + 7,6 + 7,6 + 7,6 + 7,6 + 7,3 + 7,2 + 7,2 + 7,2	+ 7,4 + 7,4 + 8,5 + 8,6 + 8,6 + 9,2 + 6,6 + 6,8 + 6,9 + 6,9 + 6,8 + 6,3 + 6,2 + 5,6 + 6,4	-1.36,5 -1.29,8 - 18,3 - 35,1 + 9,5 + 51,4 - 24,4 + 1.34,4 - 52,4 - 35,6 -2.21,4 -2.24,7 -2.22,0 - 29,5 - 32,9 -2.42,1 -1.49,5	28,3 26,8 35,1 31,2 30,4 29,4 31,8 31,3
	60 Eridan Lalande 9394 α Cocher β Orion 3 Taureau	4.43. 9,92 4.51.25,62 5. 5.20,43 5. 7. 3,68 5.16.32,25	- 0,12 - 0,18 + 0,66 - 0,03 + 0,37	- 16,32 - 16,42 - 16,57	271.32.45,8	734,6	+ 7,0	+ 6,4	-2.23,0 - 0,4 -1.20,0 - 18,2	35,1 29,8 32,4

Le 19, Mire Sud-17, 14. Mire Nord B+5,84. Mire Nord C-20,39. Mire Nord D-50,51. d-10,89.

Niveau-1,50. Nadir 1,66,28,15.

-Sanor	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	CORF	RECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERM Inté-	IOMĖTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	€ €	rieur.	rieur.		POLE.
	Mars, centre 44: Orion Lalande 10853 Lalande 10922	h. m. s. 5.23.21,09 5.27.49,51 5.35.51,46 5.37.45,12	5. + 0,33 - 0,01 - 0,16 - 0,16	s,	305.56. 9,0 273.54.38,5 259.42.37,3	mm.	0	0	- 21,0 -1.13,6 -2.10,2	"
	Lalande 11059 α Orion Lalande 11376 Αποπημπε δ-20°1'.	5.41.26,39 5.46.46,86 5.51.44,90 5.55.31,47	- 0,16 + 0,12 - 0,16 - 0,16	- 16,59	259.51.29,7 287.17.30,6 259.45.24,8	0.5			-2. 9,3 - 46,0 -2.10,1	29,8
	Anonyme δ Petite Ourse I α Grand Chien Anonyme Anonyme δ-22°q'.	6. 1.21,44 6.20.27,16 6.38.16,68 6.45.45,90 6.47.19,68	- 0,16 - 0,12 - 0,18 - 0,18	- 16,36	260.10.56,8 13.17.53,7 263.25.16,0 257.55.12,0	735,0 735,0 735,1	+ 6,8 + 6,6 + 6,4	+ 4,5 + 3,9 + 4,3	-2. 7,7 +1. 2,0 -1.50,7 -2.22,6	35,8 36,4
	Lalande 13510 Anonyme α² Gémeaux α Petit Chien β Gémeaux	6.50.37,48 7.10.17,23 7.24.45,32 7.31.11,17 7.35.51,75	- 0,18 - 0,19 + 0,42 + 0,10 + 0,37	- 16,23 - 16,43 - 16,53	257.56. 6,3 256. 6.54,6 312. 7.22,5 285.31.25,5 308.17.42,7	735,1 735,2	+ 6,4	+ 4,0 + 3,6 + 3,2	-2.22,6 -2.36,8 - 14,4 - 49,4 - 18,6	31,1 31,9 30,4
	Anonyme B. A. C. 2652 α Lyre γ Aigle α Aigle	7.39.41,28 7.50. 9,29 18.31.33,07 19.38.49,36 19.43. 9,52	- 0,17 - 0,18 + 0,52 + 0,15 + 0,14	- 16,95 - 17,09 - 17,04	258.45.34,0 257.27.35,5 318.33.23,4 290.10.16,4 288.23.46,0	735,3 734,8	+ 5,5 + 5,1 + 5,8	+ 3,6 + 3,5 + 0,3 + 5,1	$ \begin{array}{r} -2.17,1 \\ -2.26,3 \\ -7.7 \\ -41,5 \\ -44,2 \end{array} $	35,7 33,6 32,0
	α Cygne	20.35.59,95 20.45. 9,94 21.14.39,56 22. 5.56,00	+ 0,64 - 0,11 + 1,19 - 0,08	- 17,07 - 16,99	324.39.12,0 264. 4.13,6 341.51.18,4 266.48.39,3	734,9 734,9 735,0 734,7	+ 6,5 + 6,5 + 7,0 + 7,9	+ 7,9 + 7,7 + 9,5 + 6,9	- 1,4 -1.46,4 + 15,9 -1.35,4	29,0 34,3
20	Soleil, bord 1, sup.   Andromède  Cassiopée  Petite Ourse S  Bélier	22.12.51,94 0. 0.20,01 0.31.42,18 1. 4. 3,74 1.58.25,41	- 0,05 + 0,37 + 0,93 + 0,29	- 17,03 - 17,24 - 17,25	269.16. 0,4 308.10.28,3 335.37.17,9 8.24.27,2 302.39.51,3	734,6 733,9 733,8 733,7 733,6	+ 7.7 + 7.9 + 7.9 + 8.1 + 7.9	+ 7,4 + 8,3 + 8,2 + 8,2 + 6,7	-1.30,0 - 18,3 + 9,5 + 51,4 - 24,6	28,8 34,4 32,9 29,3
è	β Petite Ourse I  α Baleine  α Persée  ε Taureau  Anonyme	2.50.57,11 2.54. 8,61 3.13.20,17 3.39.45,34 3.59.54,54	- 2,30 + 0,08 + 0,75 + 0,15 - 0,18	- 17,30 - 17,38 - 17,34	25. 7. 3,1 283.25. 3,4 329.13.52,7 290.35.39,9 257.52. 3,5	733,5 733,7 733,7 733,8	+ 7,6 + 7,5 + 7,2 + 7,2	+ 6,5 + 5,8 + 5,7 + 5,7	+1.34,3 - 52,6 + 3,1 - 40,7 -2.21,9	28,7 31,2 31,8
,	Lalande 8033 Anonyme E Taureau Z Taureau	4. 9. 7,05 4.15. 1,34 4.19.34,18 4.27. 1,50	- 0,18 - 0,18 + 0,25 + 0,22	- 17,40	257.24.56,2 257.48.51,7 298.45.25,7 296. 7. 2,9	733,8	+ 7,1	+ 5,4 + 5,1 + 5,1	-2.25,3 -2.22,7 - 28,9 - 33,0	27,4

Observations faites à la lunette méridienne en Février 1850.

Jours.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERMO	OMÉTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	Anonyme Lalande 9079	h. m. s. 4.36.25,85 4.41.36,26	ment. - 0,20 - 0,12	pendule.	pour le niveau. 255.21.30,2	mm.	rieur.	+ 5,1	-2.42,6	"
	60 Eridan Lune, bord 1, inf α Cocher β Orion β Taureau Anonyme Mars, centre	4.43. 8,88 4.51. 2,24 5. 5.19,57 5. 7. 2,71 5.16.31,31 5.21.28,15 5.24.33,57	- 0,12 + 0,23 + 0,66 - 0,03 + 0,37 - 0,12 + 0,33	- 17,15 - 17,37 - 17,49	263.27- 7,7 296.42.49,0 325.44.52,8 271.32.47,1 308.23.15,7 262.57.27,3 305.56. 8,6	733,9	+ 6,9	+ 5,t + 4,9	-1.50,1 - 32,2 - 0,4 -1.20,2 - 18,3 -1.52,5 - 21,0	30,6 29,7 32,8
	44: Orion Lalande 10853 Lalande 10922 Lalande 11059 Anonyme		- 0,01 - 0,16 - 0,16 - 0,16 - 0,16 + 0,12	- 17,46	273.54.40,0 259.44.36,3 259.47.15,7 287.17.33,8	733,9	+ 6,6	+ 4.9	-1.13,6 -2.10,0 -2. 9,8 - 46,1	32,9
	Anonyme  Anonyme  Petite Ourse I  Grand Chien	5.51.44,30 5.55.30,52 6. 1.20,44 6.20.25,36 6.38.15,56	- 0,16 - 0,16 - 0,16 - 0,12	- 17,46	259.45.28,5 259.54.54,1 260.10.58,9 13.17.50,5	734,1 734,1	+ 6,5 + 6,4	+ 4,5	-2.10,0 -3. 9,1 -2. 7,6 +1. 1,9	32,4
	α Petit Chien β Gémeaux Anonyme Β. A. C. 2652 α Lyre	7.31. 9,79 7.35.50,85 7.39.40,28 7.50. 8,25 18.31.32,03	+ 0,10 + 0,37 - 0,17 - 0,18 + 0,52	- 17,80 - 17,42 - 18,02	285.31.26,2 258.45.36,5 257.27.37,7 318.33.22,9	734,3	+ 5,5 + 5,6	+ 2,5 + 2,5 + 2,4 + 3,1	- 49,5 -2.17,5 -2.26,7 - 7,7	32,6
2.1	Soleil, bord 1, sup.  α Petite Ourse S  α Bélier  β Petite Ourse I  α Baleine  ε Taureau  δ Petite Ourse I	22.16.40,50 1. 4. 1,54 1.58.24,33 2.50.56,12 2.54. 7,69 3.39.44,30 6.20.25,86	- 0,05 + 0,29 - 2,30 + 0,08 + 0,15	- 18,31 - 18,28 - 18,28	269.37.33,4 302.39.50,7 25. 7. 5,6 283.25. 1,9 290.35.37,8 13.17.54,5	736,7 737,2 737,1 737,2 737,5	+ 7,5 +10,5 +10,0 + 9,4 + 8,6	+14,3 +14,8 +12,5 +12,4 +10,5 + 7,1	-1.23,6 - 24,0 +1.32,8 - 51,5 - 40,2 +1. 1,5	29,4 29,8 30,8 35,8
22	Soleil, bord 1, sup. α Petite Ourse S α Bélier β Petite Ourse I α Baleine α Persée ε Taureau		- 0,04 + 0,29 - 2,30 + 0,08 + 0,75 + 0,25	- 19,50 - 19,17 - 19,39 - 19,47	26g.5g.13,3 8.24.27,2 302.3g.50,1 283.25. 2,5 32g.13.50,4 2g8.45.24,5	735,7 735,4 735,3 735,5 735,5 735,7	+ 8,4 + 8,5 + 8,5 + 8,6 + 8,5 + 8,1	+ 8,9 + 9,5 + 9,2 + 9,0 + 7,0 + 6,9	-1.24,0 + 51,3 - 24,5 - 52,1 + 3,1 - 29,4 - 33,0	33,2 28,4 30,8 29,7

Le 21, Mire Sud-169,78. Mire Nord B+59,87. Mire Nord D-499,94.

7

sanor	NOM	PASSAGE CONCLU	- 11111	ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	MÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	corrigée pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	α Cocher	h. m. s. 5. 5.17,33 5. 7. 0,51 5.16.29,11 5.21.26,26 5.27. 4,05 5.35.48,44 5.37.41,84	5. + 0,66 - 0,03 + 0,37 - 0,12 + 0,33 - 0,16 - 0,16	- 19,35 - 19,54 - 19,66	325.44.55,8 271.32.49,3 308.23.15,3 262.57.20,0 305.56.13,3	<sub>тт.</sub>	+ 7,7	+ 6,2 + 5,9 + 5,9	- 0,4 -1,20,1 - 18,3 -1.52,4 - 21,0	33,5 32,1 32,4
	Lalande 11059 Anonyme  Corion Lalande 11376 Anonyme Anonyme	5.41.23,50 5.42.21,62 5.46.43,83 5.51.42,08 5.55.28,60 6. 1.18,40	- 0,16 - 0,16 + 0,12 - 0,16 - 0,16 - 0,16	- 19,57	259.47.12,4 287.17.32,0 259.45.25,5 259.54.51,2 260.10.54,5	25.0		+ .5,4	-2. 9,9 -2. 9,7 - 46,0 -2. 9,9 -2. 9,0 -2. 7,4	31,3
	µ Gémeaux  δ Petite Ourse I  γ Gémeaux  α Grand Chien  Anonyme δ-22°8'.  Anonyme	6.13.33,87 6.20.24,36 6.28.43,38 6.38.13,52 6.45.42,73 6.47.16,54	+ 0,29 + 0,22 - 0,12 - 0,18 - 0,18	- 19,47	302.29.52,5 13.17.52,0 296.26.11,0	735,6	† 7,2	+ 5,4	- 25,0 +1. 1,7 - 32,6	33,3
	Lalande 13620 Lune, bord 1, sup.  \$\frac{3}{3}\$ Gémeaux  \$\alpha\$ Petit Chien  \$\frac{3}{3}\$ Gémeaux  \$\frac{3}{3}\$ Gémeaux	6.53.38,52 6.57.11,22 7.10.50,49 7.24.42,19 7.31. 8,01 7.35.48,67	- 0,18 + 0,25 + 0,29 + 0,42 + 0,10 + 0,37	- 19,32 - 19,56 - 19,58	258. 1.47,0 299. 5.36,3 302.10. 0,2 312. 7.18,1 285.31.23,1 308.17.43,9	735,7	+ 7,0	+ 5,3 + 4,5 + 4,9	-2.21,3 - 29,2 - 25,5 - 14,3 - 49,1 - 18,4	26,6 29,9 31,6
	Anonyme B. A. C. 2652 Anonyme &-22°45' Anonyme Lalande 16381	7.39.38,28	- 0,17 - 0,18 - 0,18 - 0,17	25,00	258.45.32,2 257.27.37,8 257.59.36,7	735,5 735,5	+ 6,7 + 6,6 + 6,5	+ 5,1 + 4,6 + 5,3	-2.16,4 -2.25,8 -2.21,7	
	α Lyre γ Aigle α Aigleα Cygne	18.31.29.97 19.38.46,32 19.43. 6,38 20.35.56,93	- 0,18 + 0,52 + 0,15 + 0,14 + 0,64	- 20,14 - 20,19 - 20,24 - 20,14	256.57.13,7 318.33.18,0 290.10.10,0 288.23.44,8 324.39.14,7	734,5 734,5 734,4	+ 6,6 + 7,0 + 7,4	+ 5,3 + 6,7 + 7,6	-2.29,2 - 7,6 - 41,3 - 44,0 - 1,4	31,0 27,7 31,2 32,5
22	Mercure, centre Vénus, centre Soleil, bord 1, inf	20.48.13,34 22.20.17,98	- 0,12 - 0,06 - 0,05		263.36.16,7 268. 6.46,0 269.48.55,3	734,3 733,9 733,8	+ 7,5 + 8,1 + 8,1	+ 7,6 + 8,4 + 8,4	-1.48,6 -1.30,1 -1.24,5	
20	Andromède γ Pégase α Cassiopée α Petite Ourse S	o. 0.16,77 o. 5. 9,38 o.31.39,02	+ 0,37 + 0,20 + 0,93	- 20,25 - 20,35 - 20,36	308.10.27,9 294.15.54,8 8.24.26,7	733,4	+ 8,3	+ 9,8	- 18,2 - 34,9	29,0 28,6

Le 22, Mire Sud-17°,25. Mire Nord B+5°,64. Mire Nord C-20°,33. Mire Nord D-50°,67.

-	1					_			1	
30	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION	MOYENNE	BARONÈTRE	THERM	OMÈTRE	RÉF	LIEU
JOURS.	HOM	au		de	DES VERNIERS	200			RÉFRACTION	du
13.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru-	la	corrigée		Inté-	Exté-		POLE.
		rii meriqiea.	ment.	pendule.	pour le niveau.	, ES	rieur.	rieur.	.2	FULL.
-		h. m. s.	s.	5.	0 1 11	mm.	0	0	, ,,	"
	α Bélier	1.58.22,17	+ 0,29	- 20,42	302.39.50,9	733,1	+ 9,1	+ 9,1	- 24,4	29,4
	B Petite Ourse I	2.50.54,93	- 2,30	- 19,83	25. 7. 5,5	,,-	. 3/	,	+1.33,6	30,7
	α Baleine	2.54. 5,49	+ 0,08	- 20,45	283.25. 4,5	732,9	+ 9,0	+ 8,5	- 52,0	33,0
ł	α Persée	3.13.16,77	+ 0,75	- 20,67	329.13.52,7	733,0	+ 8,9	+ 8,3	+ 3,1	32,1
	e Taureau	3.39.42,08	+ 0,15		290.35.39,2	733,1	+ 8,6	+ 7,8	- 40,3	
	Lalande 8033	4. 9. 3,85	- 0,18		257.24.57,0	733.1	+ 8,6	+ 8,4	-2.23,6	
	Anonyme	4.14.58,18	- 0,18		257.48.51,5				-2.20,8	
	ε Taureau	4.19.30,84	+ 0,25		298.45.25,5	733,2	+ 8,6	+ 8,4	- 29,2	
	α Taureau	4.26.58,16	+ 0,22	- 20,69	296. 7. 2,0			+ 8,5	- 32,6	26,9
	Anonyme	4.36.22,63	- 0,20		255.21.25,9			+ 8,4	-2.40,T	
	Lalande 9079	4.41.33,14	- 0,12		263.29.55,4			+ 8,2	-1.48,6	
	60 Eridan	4.43. 5,74	- 0,12		F / 0			. 0	0	
	Lalande 9394	4.51.21,49	- 0,18	-	257.41.18,1	22.4	. 0.0	+ 8,2	-2.21,8	2. /
	α Cocher	5, 5, 16, 13	+ 0,66	- 20,52	325.44.54,7	733,4	+ 8,6	+ 8,0	- 0,4	32,4
Ų.	3 Orion	5. 6.59,41	- 0,03	- 20,62	271.32.44,6				-1.19,3	30,6
	A Taureau	5.16.28,03	+ 0,37	- 20,71	308.23.13,4			+ 7,7	- 18,1	30,0
	Anonyme Mars, centre	5.21.24,92 5.28.21.83	- 0,12		262.57.16,7 305.56.14,0					
	Lalande 10853	5.35.47,37	+ 0,33		303-30-14,0			+ 7,5	- 20,8	
	Lalande 10033	5.37.40,95	- 0,16		259.44.30,6				-2. 8,7	
	Lalande 10922	5.41.22,28	- 0,16		239.44.30,0				-2. 0,7	
	Anonyme	5.42.20,40	- 0,16		259.47.12,6				-2. 8,5	
	α Orion	5.46.42,77	+ 0,12	- 20,62	287.17.31.9				- 45,6	31,6
	Lalande 11376	5.51.40,86	- 0,16	20,02	259.45.20,8				- 45,0 -2. 8,8	0.,0
	Anonyme	5.55.27,42	- 0,16		259.54.47,4				-2. 7,9	
	Lalande 11677	6. o. 4,68	- 0,16		260. 0.43,7	733,5	+ 8,1	+ 6,7	-2. 7,4	
	Anonyme 8-19°45'	6. 1.17,28	- 0,16			100,0	, ,,,	,/	- /14	
	μ Gémeaux	6.13.32,59	+ 0,29		302.29.52,1	733,5	+ 8,1	+ 6,7	- 24,8	
	& Petite Ourse I	6.20.24,53	, ,		13.17.53,2	, ,,		+ 6,6	+1. 1,3	33,9
	y Gémeaux	6.28.42,34	+ 0,22		296.26.11,8			+ 5,3	-32,5	
	α Grand Chien	6.38.12,32	- 0,12	- 20,66	263.35.13,8	733,6	+ 7,7	+ 5,1	-1.50,2	35,0
	Anonyme	6.45.41,80	- 0,18		257.55.14,5			+ 4,9	-2.21,9	
	Anonyme 8-2209'.		- 0,18							
	Lalande 13510	6.50.33,34	- 0,18		257.56. 7,8				-2.21,9	
	Lalande 13620	6.53.37,22	- 0,18		258. 1.47,7				-2.21,6	
	Anonyme		- 0,18		257.50.55,7			+ 5,4	-2.22,2	
	Anonyme	7. 6.15,09	+ 0,29		302. 8. 4,7				- 25,4	
	8 Gémeaux	7.10.49,27	+ 0,29		302.10. 0,3	22			- 25,4	2. 2
H	α Gémeaux	7.24.40,94	+ 0,42	- 20,56	312. 7.22,9	733,9	+ 7,2	+ 4,6	- 14,3	31,3
	α Petit Chien	7.31. 6,91	+ 0,10	- 20,65	285.31.25,5				- 49,0	32,5
	B Gémeaux	7.35.47,51	+ 0,37	- 20,73	308.17.44,1				- 18,4	31,7
1:	Anonyme	7.39.37,22	- 0,17		258.45.35,0				-2.16,4	1

9

Observations faites à la lunette méridienne en Février 1850.

JOHRS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	0.000	de la pendule.	MOYEXXE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Anonyme	h. m. s. 7.43. 8,72 7.50. 4,93 7.54.36,09 8. 1.51,14 8.13.15,73 8.20. 8,73 8.24.20,71 8.30.48,91 8.35.49,20 8.43. 4,59 8.49.56,70 17.52.44,84 20.50. 0,82	s 0,27 - 0,18 - 0,23 - 0,18 - 0,18 - 0,19 - 0,19 + 0,24 - 0,19 + 0,24 - 0,19 + 0,17 + 0,80 - 0,12	s. - 21,05	249.46.55,9 257.27.35,4 254.56.50,9 297.53.55,4 256.57.13,8 257.11. 0,7 256.31.39,8 256.35.10,7 298.36.57,4 256.33. 0,0 292.21. 6,8 331.24.43,4 263.30.16,1	734,1 734,1 734,1 734,1 734,3 734,3	+ 6,9 + 6,4 + 5,7 + 5,5 + 5,3 + 6,0	+ 4,6 + 4,6 + 3,8 + 3,5 + 2,9 + 2,9 - 0,7 + 6,2	-3.51,1 -2.25,5 -2.46,5 -30,8 -2.29,9 -2.28,2 -2.33,4 -2.33,1 -31,1 -2.33,4 -2.33,4 -1.49,5	30,9
4	Soleil, bord 1, sup.  2 Petite Ourse S  3 Petite Ourse I  Balcine  2 Persée  Lalande 8033  5 Taureau  A Taureau  Anonyme  Lalande 9079	22.28. 2,74 1. 3.56,84 1.58.21,13 2.50.53,15 2.54. 4,59 3.13.15,69 4. 9. 2,70 4.19.29,92 4.26.57,16 4.36.21,55	- 0,04 + 0,29 - 2,30 + 0,08 + 0,75 - 0,18 + 0,25 + 0,22 - 0,20	- 21,47 - 21,59 - 21,33 - 21,72	270.43·16,7 8.24·26,8 302.39·47,9 25. 7. 6,7 283.25. 5,1 329·13.51,7 257.24.57,4 298.45.25,4 296. 7. 1,9 255.21.25,5	734,5 733,8 733,7 733,9 733,9 733,9 734,0	+ 8,2 + 8,2 + 8,1 + 8,1 + 8,0 + 7,6 + 7,6	+ 6,4 + 6,9 + 6,4 + 5,8 + 5,8 + 5,6 + 5,5 + 5,5	-1.22,1 + 51,6 - 24,7 +1.34,6 - 52,5 + 3,1 -2.25,1 - 29,5 - 32,9 -2.42,0	33,4 26,2 33,0 33,1 31,1
	60 Eridan	4.41.32,04 4.43. 4,48 4.51.2c,45 5. 5.15,09 5. 6.58,33 5.16.26,93 5.21.23,92 5.29,41,65 5.35,46,28 5.36,32,28	- 0,12 - 0,12 - 0,18 + 0,66 - 0,03 + 0,37 - 0,12 + 0,33 - 0,16 - 0,16	- 21,53 - 21,68 - 21,79	263.27. 4,5 257.41.19,5 325.44.56,5 271.32.46,3 308.23.12,2 262.57.20,5 305.56.10,5	734,1	+ 7,4	+ 5,6 + 5,4 + 5,2	-1.50,0 -2.23,3 - 0,4 -1.20,1 - 18,2 -1.52,4 - 21,0	34,2 29,2 29,3
	Lalande 10922 Lalande 11059 Anonyme α Orion Lalande 11376 Anonyme Lalande 11677 Anonyme δ-19°45′	5.37.39,96 5.41.21,20 5.42.19,28 5.46.41,61 5.51.39,88 5.55.26,40 6. o. 3,58	- 0,16 - 0,16 - 0,16 + 0,12 - 0,16 - 0,16 - 0,16	- 21,76	259.47.11,0 287.17.31,3 259.45.25,8 259.54.49,9 260. 0.43,4	734,3	+ 6,7	+ 3,9	-2. 9,7 - 46,1 -2.10,2 -2. 9,3 -2. 8,9	30,5

Le 24, Mire Sud-168,40. Mire Nord B+58,51. Mire Nord C-198,20. Mire Nord D-518,62.

10
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE		DUÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	FION.	POLE.
	μ Gémeaux	h. m. s. 6.13.31,59 6.20.24,59 6.28,41,16 6.38.11,26 6.45.40,92 6.47.14,16	+ 0,29 + 0,22 - 0,12 - 0,18 - 0,18	- 21,70	302.29.52,8 13.17.52,0 296.26.11,5 263.25.17,7 257.55.10,0	<sub>тш.</sub>	+ 6,4	° + 3,9 + 3,6	- 25,1 +1. 1,9 - 32,8 -1.53,3 -2.22,8	33,0 35,9
	Lalande 13510 Lalande 13620 Anonyme Anonyme Anonyme  \[ \alpha \] Anonyme \[ \alpha \] Gemeaux \[ \alpha \] Gemeaux \[ \alpha \] Uyre Vénus, centre	6.50.32,12 6.53.36,14 6.57.17,02 7. 6.13,99 7.10.11,95 7.15.33,31 7.24.39,90 7.31. 5,79 7.35.46,49 18.31.28,05 22.29.47,66	- 0,18 - 0,18 - 0,18 + 0,29 - 0,19 - 0,19 + 0,42 + 0,10 + 0,37 + 0,52 - 0,05	- 21,58 - 21,76 - 21,74 - 22,12	257.56. 4,7 257.50.55,8 302. 8. 2,2 256. 6.53,7 256. 1.41,6 312. 7.20,2 285.31.25,8 308.17.42,2 318.33.19,5 269. 0.25,8	734,6 736,5 736,6	+ 5,8 + 5,2 + 7,0	+ 3,3 + 2,8 + 0,2 + 4,0	-2.22,7 -2.23,4 - 25,6 -2.36,9 -2.37,7 - 14,4 - 49,4 - 18,5 - 7,7 -1.28,8	28,4 32,4 29,7 32,7
25	Soleil, bord 2 α Andromède γ Pégase δ Petite Ourse I α Lyre α Aigle Vénus, centre	22.34. 0,00 0. 0.14,51 0. 5. 7,12 6.20.23,36 18.31.27,05 19.43. 3,58 22.34.31,00	- 0,04 + 0,37 + 0,20 + 0,52 + 0,14 - 0,05	- 22,50 - 22,61 - 23,15 - 23,11	308.10.26,3 294.15.54,8 13.17.53,5 318.33.19,3 288.23.45,3 269.27.42,6	736,6 737,0 738,6 738,7 738,6	+ 8,0 + 7,3 + 5,6 + 5,7 + 8,1	+ 8,2 + 5,4 - 0,5 + 2,8 + 6,7	- 18,4 - 35,2 +1. 1,9 - 7,8 - 44,8 -1.26,7	27,5 28,5 34,3 32,6 31,2
26	Soleil, bord 2 α Andromède α Cassiopée α Petite Ourse S α Bélier β Petite Ourse I α Baleine ε Taureau α Taureau Α Taureau Anonyme Lalande 9079	22.37.45,52 0. 0.13,83 0.31.36,02 1. 3.53,24 1.58.19,09 2.50.51,71 2.54. 2,53 3.39.39,10 4.19.27,92 4.26.55,26 4.36.19,71 4.41.29,86	- 0,04 + 0,37 + 0,93 + 0,29 - 2,30 + 0,08 + 0,15 + 0,25 + 0,22 - 0,20 - 0,12	- 23,17 - 23,31 - 23,48 - 23,20 - 23,36 - 23,53	308.10.25,1 335.37,17,6 8.24,26,3 302.39.52,1 25. 7. 5,2 283.25. 5,6 290.35.39,4 298.45.25,9 296. 7. 1,5 255.21,28,6	738,0 738,0 737,9 737,9 737,8 737,8 737,9 738,0	+ 7,0 + 8,0 + 8,1 + 7,9 + 7,6 + 7,4 + 7,4	+ 9,1 + 9,6 + 7,6 + 6,6 + 6,5 + 5,9 + 5,7 + 5,4	- 18,3 + 9,5 + 51,8 - 24,8 + 1.34,9 - 52,7 - 40,9 - 29,7 - 33,2 -2.42,9	26,6 35,5 33,6 30,5 31,9 33,4
	Lalande 9394  Sorion  Taureau	4.43. 2,56 4.51.18,09 5. 6.56,38	- 0,12 - 0,18 - 0,03	- 23,59 - 23,70	263.27. 6,8 257.41.20,4 271.32.46,0 308.23.14,2	738,0 738,0	+ 7,2	+ 5,5 + 5,4 + 5,1 + 5,1	-1.50,5 -2.24,1 -1.20,6 - 18,4	28,4 31,1

Le 26, Mire Sud-17P,92. Mire Nord B+6P,06. Mire Nord C-19P,24. Mire Nord D-50P,53.

11
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
18.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Anonyme	h. m. s. 5.21.21,72 5.27.42,56 5.32.26,75 5.35.44,10 5.37.37,78 5.55.24,04	s 0,12 - 0,01 + 0,33 - 0,16 - 0,16 - 0,16	S.	262.57.25.7 273.54.44,5 305.56. 5,2 259.42.33,9	mm.	O	+ 4,7	-1.53,1 -1.14,0 - 21,1 -2.11,0	,,
	Lalande 11677 Anonyme &-19°45' µ Gémeaux  ô Petite Ourse I γ Gémeaux A Grand Chien Anonyme	6. o. 1,32 6. 1.14,10 6.13.29,49 6.20.21,61 6.28.39,18 6.38. 9,16 6.41. 3,06 6.45.38,58	- 0,16 - 0,16 + 0,29 + 0,22 - 0,12 - 0,18 - 0,18	- 23,77	260. 0.44,3 302.29.53,8 13.17.54,7 296.26.11,6 263.25.14,2 257.56. 5,7 257.55.11,4	738,2	+ 6,4	+ 3,9	-2. 9,3 - 25,2 +1. 2,2 - 32,9 -1.51,4 -2.23,3 -2.23,5	35,6 34,5
	Anonyme δ-22°9'. Lalande 13510 Lalande 13620 Anonyme Anonyme α Gémeaux α Petit Chien β Gémeaux Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme B. A. C. 2652	6.47.12,14 6.50.30,18 6.53.34,20 6.57.14,64 7.6.11,87 7.10. 9,79 7.24.38,08 7.31. 3,75 7.35.44,53 7.39.34,04 7.43. 5,39 7.50. 1,95 7.54.32,89	- 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 + 0,29 - 0,19 + 0,42 + 0,10 + 0,37 - 0,17 - 0,27 - 0,18 - 0,20	- 23,38 - 23,78 - 23,67	257.56. 7,3 258. 1.49,0 257.50.56,2 302. 8. 6,8 256. 6.58,8 312. 7.24,5 285.31.26,7 308.17.42,6 258.45.37,5 249.47. 5,4 257.27,40,5 254.56,51,0	738,1	+ 5,9	+ 3,3 + 3,2 + 2,0 + 1,9	-2.23,4 -2.22,8 -2.24,1 - 25,7 -2.37,6 - 14,4 - 49,6 - 18,6 -2.18,3 -3.54,7 -2.27,7 -2.27,7	32,5 33,1 29,8
were a	AnonymeLalande 16381Lalande 16649AnonymeLalande 17277Lalande 17461  a Lyre	8. 6.19,29 8.13.12,43 8.20. 5,33 8.24.17,34 8.27.31,65 8.37.44,01 8.43. 1,51 18.31.26,20 20.35.53,23	- 0,17 - 0,19 - 0,19 - 0,19 - 0,19 - 0,19 + 0,52 + 0,64	- 24,03 - 23,92	257.59.36,3 256.57.14,3 257.11. 1,0 256.31.44,0 256.37.59,7 256.42. 5,9 256.33. 2,0 318.33.17.7 324.39.10,1	7 <sup>3</sup> 7,9 7 <sup>3</sup> 7,1 7 <sup>3</sup> 6,9	+ 4,6 + 4,8 + 5,2	+ 1,2 - 2,2 + 4,4	-2.23,8 -2.31,6 -2.29,9 -2.35,2 -2.34,4 -2.34,0 -2.35,2 -7,8 -1,4	31,1 29,0
27	Soleil, bord 1, inf α Cassiopée α Petite Ourse S α Bélier ε Taureau	22.39.19,28 0.31.35,02 1. 3.52,64 1.58.18,23 4.19.27,02	- 0,03 + 0,93 + 0,29 + 0,25	- 24,29 - 24,33	271.17.48,5 335.37.13,0 8.24.26,0 302.39.47,7 298.45.25,4	736,4 735,5 735,3 734,8 734,3	+ 7,2 + 7,4 + 7,6 + 7,6 + 7,1	+ 7,0 + 8,0 + 7,3 + 7,6 + 6,3	-1.20,6 + 9,5 + 51,7 - 24,6 - 29,5	31,4 33,5 26,4

Le 27, Mire Sud-179,64. Mire Nord B+59,76. Mire Nord C-199,81. Mire Nord D-519,08.

12
Observations faites à la lunette méridienne en Février 1850.

Jouns.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION le la pendule.	MOYEXXE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté-	DMÈTRE Exté- rieur.	néfraction.	LIEU du POLE.
	α Taureau 59 Eridan	h. m. s. 4.26.54,34 4.41.23,30	s. † 0,22 – 0,12	- 24,44	296. 7. 2,5	<sub>тт.</sub> 734,4	+ 7,1	+ 6,2	- 32,9	27,2
	Lalande 9079  60 Eridan  Lalande 9394  Piazzi, IV, 289  Piazzi, IV, 307  α Cocher  β Taureau  Anonyme  44 ι Orion.  Mars, centre  Lalande 10853  Lalande 10879  Lalande 10922	4.41.29,20 4.43. 1,48 4.51.17,53 4.55.39,77 4.58.46,67 5. 5.11.99 5.16.24,13 5.21.20,93 5.27.41,59 5.33.51,83 5.35.43,29 5.36.29,34	- 0,12 - 0,18 - 0,20 - 0,20 + 0,66 + 0,37 - 0,12 - 0,01 + 0,33 - 0,16 - 0,16 - 0,16	- 24,56 - 24,54	263.27. 6,4 257.41.18,8 253.27.36,1 253.35.34,55,9 308.23.14,6 262.57.20,9 273.54.41,7 305.56. 2,6			+ 5,9 + 5,9 + 5,5 + 5,5	-1.49,8 -2.23,2 -3. 0,5 -2.59,2 - 0,4 - 18,2 -1.52,4 -1.13,5 - 21,0 -2.10,3	33,5 31,7
	Lalande 11059 Anonymeα Orion Lalande 11376 Anonyme Lalande 11677	5.41.18,04 5.42.16,34 5.46.38,93 5.51.36,98 5.55.23,52 6. o. 0,68	- 0,16 - 0,16 + 0,12 - 0,16 - 0,16 - 0,16	- 24,39	259.47. 9,2 287.17.31,4 259.45.25,7 259.54.48,4 260. 0.41,7	734,5	+ 6,6	+ 5,3	-2. 9,6 - 46,0 -2. 9,8 -2. 8,8 -2. 8,3	30,8
	Anonyme &-19°45  µ Gémeaux  å Petite Ourse I  y Gémeaux  α Grand Chien  Anonyme  Lalande 13316  Ationyme  Lalande 13510  Lalande 13620	6.13.28,75 6.16. 6,07 6.20.21,36 6.28.38,42 6.38. 8,34 6.41. 2,28 6.45.10,69 6.47,11,32 6.50.29,44	- 0,16 + 0,29 + 0,29 + 0,22 - 0,12 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18	- 24,57	302.29.56,3 302.26.50,3 13.17.53,7 296.26. 9,9 263.25.17,4 257.56. 5,7 257.48.55,7 257.47.45,5 257.56. 6,2	734,5	+ 6,4	+ 4,1	- 25,0 - 25,1 +1. 1,8 - 32,7 -1.50,8 -2.22,5 -2.23,5 -2.23,7	34,o 38,4
	Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anotyme 2° Gemeaux A Petit Chien B Gemeaux Anonyme	6.54.17,78 6.57.14,66 6.59.47,77 7. 6.14,17 7.10. 8,99 7.15.30,48 7.24.37,12 7.31. 2,97 7.35.43,61	- 0,18 - 0,18 - 0,18 + 0,29 - 0,19 - 0,19 + 0,42 + 0,10 + 0,37	$\begin{vmatrix} -24,55 \\ -24,58 \end{vmatrix}$	258.t1. 3,7 257.50.52,0 258. 9.23,5 302.19.36,6 256. 7. 0,5 256. 1.43,5 312. 7.23,0 285.31.29,6 308.17.46,7 258.45.36,3	734,5	+ 5,5	+ 2,6	-2.21,1 -2.23,5 -2.21,4 - 25,4 -2.37,2 -2.38,0 - 14,4 - 49,5 - 18,5 -2.17,5	30,9 36,2 34,0

15

Observations faites à la lunette méridienne en Février 1850.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	HOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	TUERN Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	<b>E</b>	rieur.	rieur.	0X.	POLE.
	Anonyme B. A. C. 2652 B. A. C. 2675 Auonyme 3-22°45! Anonyme 3-21°53'	h. m. s 7.43. 4,73 7.50. 1,23 7.54.32,09 8. 2.13,63 8. 6.47,72	- 0,27 - 0,18 - 0,20 - 0,18	S.	249.47. 2,2 257.27.39,9 254.56.52,4	man.	0	+ 2,8 + 2,9	-3.52,9 -2.26,5 -2.47,6	"
	Lalande 16381 Lalande 16384 Lalande 16649	8.13.11,85 8.13.17,31 8.20. 4,41	- 0,17 - 0,19 - 0,19 - 0,18		256.57.11,5 257.11. 1,3			+ 2,5	-2.30,7 -2.29,0	
	Anonyme Anonyme Lalande 17048 Lalande 17277 Lalande 17461	8.24.16,57 8.27.30,97 8.30.44,97 8.37.43,25 8.43. 0,61	- 0,19 - 0,19 - 0,19 - 0,19 - 0,19		256.31.43,2 256.37.58,9 256.35. 9,2 256.42. 4,6 256.33. 0,2	734,5	+ 5,3	+ 1,7	-2.34,2 -2.33,8 -2.33,9 -2.33,1 -2.34,3	
	Anonyme B. A. C. 3096 γ Aigle α Aigle β Aigle	8.47. 8,64 8.56.11,61 19.38.41,68 19.43. 1,60 19.47.30,51	- 0,19 - 0,20 + 0,15 + 0,14 + 0,13	- 24,94 - 25,13 - 25,13	256.13.40,1 255. 2.11,5 290.10.12,1 288.23.43,6 285.57.26,6	734,5 733,5	+ 5,3 + 5,t	+ 1,3 + 2,1 + 2,3 + 5,6	$ \begin{array}{r} -2.37,6 \\ -2.48,7 \\ -41,9 \\ -44,6 \\ -48,7 \end{array} $	29,7 29,9 33,8
	« Cygne	20.35.52,27	+ 0,64	- 24,90	324.39.12,1 263.22.25,8	733,3	+ 5,7 + 6,1	+ 5,6 + 7,6	- 1,4	31,1
28	Soleil, bord 1, sup.  Andromède  Pégase.  Cassiopée.  Petite Ourse S.  Bélier.  Taureau  Sy Eridan.	22.43. 3,49 o. o. 11,95 o. 5. 4,24 o.31.34,02 1. 3.51,34 1.58.17,35 4.26.53,46 4.41.22,54	- 0,02 + 0,37 + 0,20 + 0,93 + 0,29 + 0,22 - 0,12	- 25,04 - 25,47 - 25,28 - 25,19 - 25,30	272.12.51,6 308.10.27,1 294.15.55,5 335.37.13,1 8.24.27,4 302.39.47,9 296. 7. 2,8 263.20. 5,9	732,8 732,2 732,0 731,8 731,6 731,6	+ 6,9 + 7,2 + 7,4 + 7,4 + 7,5 + 7,6	+ 7,6 + 8,5 + 8,6 + 9,7 +10,3 + 8,4 + 8,3	-1.17,4 - 18,2 - 35,0 + 9,4 + 51,0 - 24,3 - 32,5 -1.49,0	29,0 29,7 31,4 34,4 27,0 28,0
	Piazzi, IV, 289 Piazzi, IV, 307 α Cocher 3 Orion β Taureau Anonyme	4.55.38,59 4.58.45,73 5. 5.11,13 5. 6.54,48 5.16.23,01 5.19.32,98	- 0,20 - 0,20 + 0,66 - 0,03 + 0,37 - 0,16	- 25,39 - 25,46 - 25,64	253.27.36,4 253.35.33,6 325.44.55,3 271.32.43,9 308.23.12,2 259. 5.18,2	731,7 731,7	+ 7,5	+ 7,2	-2 58,9 -2.57,5 - 0,4 -1.19,3 - 18,1 -2.12,7	32,9 27,7 29,4
	9 B Lièvre	5.21.23,92 5.24.17,22 5.28. 8,34 5.35.18,43 5.41.17,20 5.47. 3,18 5.59.59,66	- 0,16 - 0,16 + 0,33 - 0,16 - 0,16 - 0,16		258.57.39,6 258.46. 8,9 305.55.52,5 259.51.28,2 260.15.51,7	731,8	+ 7,4	+ 6,3	-2.13,6 -2.15,0 - 20,9 -2. 8,3 -2. 5,9	

Le 28, Mire Sud-189,52. Mire Nord B + 69,10. Mire Nord C - 189,69. Mire Nord D - 509,11. Niveau-19,53.  $d - 9^9$ ,56. Nadir 146°6'27",15.

14
Observations faites à la lunette méridienne en Février et Mars 1850.

lours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION -	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROUETRE	THERMO	OMÈTRE Exté-	RÉFUACTION	LIEU du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	ment.	la pendule.	pour le niveau.	25.	luté- rieur.	rieur.	10N.	POLE.
	Anonyme	6. 1.12,10 6.10.56,93	- 0,16 + 0,29	ş.	260.10.52,0 302.24.25,0	um.	o	+ 5,9	-2. 6,5 - 25,0	
	Anonyme  3 Petite Ourse I Anonyme	6.16. 5,15 6.20.22,06 6.28. 2,00	+ 0,29		302.24.25,0 302.26.49,4 13.17.52,8 302.10.51,5	732,0	+ 7,0	+ 5,0	- 25,0 - 24,9 +1. 1,4 - 25,3	32,5
	α Grand Chien Lalande 13316 Anonyme	6.45. 9,50 6.48.45,92	-0.12 $-0.18$ $-0.18$	- 25,29	263.25.13,9 257.48.55,5 258. 5.33,8	702,0	7,50	+ 4,9	-25,5 -1.50,0 -2.22,4 -2.20,5	35,8
	Anonyme	6.54.16,80 6.59.46,68 7. 6.13,31	- 0,18 - 0,18 + 0,29		258. g.18,8 302.tg.29,6	732,0	+ 6.6	+ 4.4	-2.20,0 $-2.20,0$ $-2.20,1$ $-2.5,2$	
	Anonyme	7.10. 8,02 7.24.36,14 7.31. 1,83	- 0,19 + 0,42 + 0,10	- 25,29 - 25,68	256. 6.56,5 312. 7.17,6 285.31.24,5	732,0 732,0	+ 6,6	+ 5,1 + 4,9	$\begin{bmatrix} -2.35, 3 \\ -14, 2 \\ -48, 9 \end{bmatrix}$	25,6 31,7
	3 Gémeaux Lalande 16381 Lalande 16384	7.35.42,71 8.13.10,92 8.13.16,35	+ 0,37	- 25,47	308.17.45,5 256.57. 5,4	7 <sup>3</sup> 2,0 7 <sup>3</sup> 2,1	÷ 6,2 + 6,1	+ 4,0 + 3,6	- 18,4 -2.29,4	32,8
	Anonyme	8.20. 3,73 8.24.15,63 8.27.30,03	- 0,18 - 0,19 - 0,19		257.10.59,6 256.31.35,4 256.37.57,7				-2.27,8 -2.33,0 -2.32,2	
	Lalande 17277 Lalande 17277 Lalande 17461	8.37.42,27 8.42.59,81	- 0,19 - 0,19 - 0,19		256.35. 3,7 256.42. 0,4 256.32.58,4	732,1	+ 6,0	+ 2,8	-2.32,7 -2.31,9 -2.33,3	
	B. A. C. 3096 Lacaille 3692 Anonyme 3-26°8'	8.56.10,59	+ 0,17 $- 0,20$ $- 0,21$ $- 0,21$		292.21. 3,9 255. 2. 9,7	732,3	+ 5,1	+ 1,7	- 38,5 -2.48,0	
	Anonyme  A Hydre  Lyre	9-14-39,94	-0.16 $-0.02$ $+0.52$	- 25,61 - 25,94	259.51.48,5 271.54.52,7 318.33.21,1	732,3 734,5	+ 5,0	+ 1,8	-2.10,5 -1.19,9 - 7.7	26,2 35.0
	α Aigleα Cygne		+ 0,14	- 25,99 - 25.78	288.23.42,0 324.39.12,4	734,6	+ 5,5 + 6,1	+ 3,2 + 5,6	- 41,8 - 1,4	31,2 31,6
1	Soleil, bord 1, inf a Petite Ourse S	22.47.47,77 1. 3.47,85	- 0,02		272. 3.13,0 8.24.23,7	735, <sub>2</sub> 734,8	+ 7,3 + 7,8	+ 7,6 + 8,5	-1.18,1 + 51,4	31,4
	β Petite Ourse I  α Baleine  α Persée		- 2,30 + 0,08 + 0,75	-25,95 $-26,20$ $-26,21$	25. 7. 4.0 283.25. 3,0 329.13.50,4	735,0 735,0	+ 8,0	+ 9,2	+1.33,7 - 52,0 + 3,1	29,8 31,6 30,3
	59 Eridan Piazzi, IV, 289		+ 0,22 - 0,12 - 0,20	- 26,10	296. 7. 3,1 263.20. 7,5 253.27.35,5	735,4	+ 8,5 + 8,5	+ 7,6 + 7,6 + 7,7	- 32,7 -1.49,9 -2.59,5	28,1

Le 1, Mire Sud-18p,22. Mire Nord B+5p,64. Mire Nord D-49p,95.

Sydon	NOM	PASSAGE CONCLU	CORR l'instru-	ECTION ·	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO	MÈTRE Exté-	RÉPRACTION	LIEU
i	DES 237 REST	Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	RE.	ricur.	rieur.	10X	POLE.
	Piazzi, IV, 307   Cocher  GOrion  A Taureau  Anonyme  G Lièvre	6. m. 4. 4.58.44,75 5. 5.10,21 5. 6.53,58 5.16.22,23 5.19.32,40 5.21,23,08	5. - 0,20 + 0,66 - 0,03 + 0,37 - 0,16 - 0,16	- 26,29 - 26,34 - 26,40	253.35.32,8 325.24.56,0 271.32.44,5 308.23.11,9 259. 5.22,4	735.7	+ 7,6	+ 7:7	-2.58,1 - 0,4 -1.19,6 - 18,1 -2.13,1	33,6 28,0 29,1
,	Anonyme. Lalande 10694 Lalande 11059 Lalande 11212 Anonyme. Anonyme.	5.24.16,46 5.28.7,70 5.31.23,82 5.36.46,77 5.41.16,44 5.47. 2,50 5.50.48,16 5.54.41,77	- 0,16 - 0,16 - 0,16 + 0,33 - 0,16 - 0,16 - 0,20 - 0,20		258.57.36,9 258.46. 6,5 259.13.25,3 305.55.43,4 259.51.25,8 260.15.51,9 254.57.31,1 254.31.27,1			+ 7,4 + 6,7	-2.13,9 -2.15.2 -2.12,3 - 20,9 -2. 8,5 -2. 6,2 -2.45.2 -2.49,6	,
1	Lalande 11677 Anonyme Anonyme Anonyme A Petite Ourse I Anonyme Anonyme & 22°9′.	5.59.58,72 6. 1.11,24 6.10.55,93 6.16. 3,54 6.20.21,66 6.28. 1,13 6.29.37,57	- 0,16 - 0,16 + 0,29 + 0,29 + 0,29		260.10.52,7 302.24.29,1 302.30.20,4 13.17.52,4 302.10.52,9	735,8	+ 7,6	+ 6,4	-2. 7,0 - 25,1 - 25,0 +1. 1,6 - 25,4	32,2
	a Grand Chien Anonyme Lalande 13316 Anonyme Anonyme Anonyme Lacaille 2698	6.38. 6,66 6.41. 0,35 6.45. 8,78 6. 8.45,08 6.54.16,00 6.59.45,66 7. 6.12,19	- 0,12 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 + 0,29	- 26,22	263.25.14,4 257.55.56,5 257.48.55,3 258. 5.36,7 258.11. 0,8 258. 9.19,0 302.19.31,4 255. 3.14,5	736,3	+ 7,3	+ 5,2	-1.50,5 -2.22,2 -2.23,1 -2.21,3 -2.20,7 -2.21,0 - 25,4 -2.46,2	35,9+
	Lacaille 2792.  2° Gémeaux.  2 Petit Chien  3 Gémeaux.  Anonyme.  Anonyme.  Anonyme.  Anonyme.  Anonyme.	7.18.46,93 7.24.35,24 7.31. 1,13 7.35.41,75 7.43. 2,86 7.48.57,87 7.54.30,47	- 0,19 - 0,19 + 0,42 + 0,10 + 0,37 - 0,27 - 0,19 - 0,18 - 0,17	- 26,18 - 26,37 - 26,42	255. 1.28,9 312. 7.23,2 285.31.24,5 308.17.42,6 249.47. 0,9 255. 3.36,6 254.56.52,2 257.11.26,3 258. 3.11,1	736,5	+ 6,3	+ 3,8 + 3,8 + 4,0 + 4,2 + 3,6	-2.46,6 -14,4 -49,4 -18,5 -3.52,3 -2.46,2 -2.47,5 -2.28,7 -2.23,4	31,0 31,2 29,7
	Anouyme 3-22°46' Lalande 16384 Lalande 1664g Anonyme	8.11.15,25 8.13.15,65 8.20. 2,71	- 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,19		257. 3.19,3 257.11. 1,7 256.31.39,6		Angeling Control of the Control of t	48	-2.29,9 -2.28,9 -2.34,2	

Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

	JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE.	THERMO	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du
			Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	æ.	rieur.	rieur.	ON.	POLE.
		Anonyme Lalande 17048 Lalande 17277 Lalande 17461 α Cancer B. A. C. 3096 Lacaille 3692	h. m. s. 8.27.29,31 8.30.43,31 8.37.41,51 8.42.58,99 8.49.51,06 8.56. 9,87 9. 1.47,03	s 0,19 - 0,19 - 0,19 - 0,19 + 0,17 - 0,19 - 0,20	S.	256.38. 0,3 256.35. 9,1 256.42. 5,8 256.33. 1,4 292.21. 6,7 255. 2.15,3	737,0	+ 5,8	+ 2,7	-2.33,4 -2.33,9 -2.33,0 -2.34,3 - 38,7 -2.48,7	,
		Anonyme.  Lalande 18250.  Anonyme.  A Hydre.  γ Aigle.  α Cygne.  Mercure, bord 2, ctre  α Céphée.  β Céphée.		- 0,20 - 0,18 - 0,18 - 0,15 - 0,02 + 0,15 + 0,14 + 0,64 - 0,12 + 1,19 + 1,72	- 26,35 - 26,92 - 26,85 - 26,84 - 26,74 - 26,53	253.48.46,8 257.46. 0,2 259.51.51,6 271.54.57,9 290.10.12,3 288.23.42,8 324.39.11,0 263.28. 4,8 341.51.14,5 349.48.14,7	737,3 738,5 738,6 738,5 738,5 738,4	+ 5,1 + 5,1 + 5,8 + 6,2 + 6,3 + 6,5	+ 2,0 + 3,0 + 6,3 + 7,4 + 7,5 + 5,6	-2.59,8 -2.25,2 -2.11,2 -1.20,4 - 42,0 - 44,7 - 1,4 -1.49,8 + 16,1 + 25,2	31,0 30,0 29,2 30,5 33,7 35,9
		Soleil, bord 1, sup.  a Cassiopée  a Petite Ourse S  a Bélier  B Petite Ourse I  a Baleine  a Persée  a Taureau  59 Eridan  Piazzi, 1V, 289  Piazzi, 1V, 307  a Cocher  B Orion  B Taureau	22.50.31,09 0.31.32,26 1. 3.47,04 1.58.15,43 2.50.48,48 2.53.58,81 3.13.10,05 4.26.51,52 4.41.20,46 4.55.36,91 4.58.44,03 5. 5. 9,31 5. 6.52,68 5.16.21,37	- 0,02 + 0,93 + 0,29 - 2,30 + 0,05 + 0,75 + 0,22 - 0,12 - 0,21 - 0,65 - 0,63 + 0,37	- 27,01 - 27,09 - 26,76 - 27,03 - 27,20 - 27,16 - 27,16 - 27,42 - 27,42	272.58.19,7 335.37,13,5 8.24,27,7 302.39.53,1 25. 7. 2,8 283.25. 6,6 329.13.52,1 296. 7. 4,3 263.20. 5,5 253.27.37,8 253.35.36,8 335.44.57,2 271.32.46,0 308.23.16,0	738,1 737,3 737,1 736,8 736,4 736,4 736,1	+ 7,1 + 7,6 + 7,7 + 7,8 + 8,0 + 8,2 + 7,7 + 7,7 + 7,6	+ 8,0 + 9,1 + 9,1 + 9,2 + 9,6 + 9,4 + 7,5 + 7,1 + 6,9 + 7,0 + 6,9	-1.15,7 + 9,5 + 51,5 - 24,5 +1.33,7 - 52,0 + 3,1 - 32,8 -1.50,2 -3. 0,2 -2.58,8 - 0,4 -1.19,9 - 18,2	32,4 35,8 32,2 30,2 35,2 32,1 29,2
The second secon		Anonyme ô-20°51' 9 2 Lièvre 10 Lièvre. Anonyme. Lalande 10694. Mars, centre. Lalande 11059. Lalande 11212. Lalande 11231.	5.19.31,40 5.21.22,22 5.24.15,60 5.28. 6,92 5.31.23,12 5.38.16,69 5.41.15,50 5.47. 1,58	+ 0,37 - 0,16 - 0,16 - 0,16 - 0,16 + 0,33 - 0,15 - 0,15	-2/124	258.57.42,0 258.46.10,5 259.13.32,3 305.55.34,0 259.51.31,8			+ 6,8	-2.14,3 -2.15,6 -2.12,7 - 21,0 -2. 8,8 -2. 6,7	33,1

Le 2, Mire Sud-18,18. Mire Nord B+6,29. Mire Nord C-19,29. Mire Nord D-49,83. d-9,24.

17
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		de la pendule.	MOYEXNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÉTRE.	THERMO Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU da POLE.
	Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme.	h. n. s. 5.50.47,45 5.54.40,95 6. 1.10,56 6.10.55,21 6.16. 2,87 6.20.19,76 6.28. 0,39	5. - 0,19 - 0,19 - 0,15 + 0,29 + 0,29	S	254.57.36,4 254.31.30,4 260.10.58,6 302.24.30,4 302.30.22,9 13.17.53,7 302.10.53,4	736,2	+ 7,4	+ 6,7	-2.45,4 -2.49,7 -2.6,9 - 25,1 - 25,1 +1.1,7 - 25,4	33,5
	Anonyme & +22°9', \( \alpha\) Grand Chien  Anonyme  Lalande 13316  Anonyme	6.29.36,98 6.38. 5,74 6.40.59,60 6.44. 8,00 6.48.44,42	+ 0,29 - 0,12 - 0,17 - 0,17 - 0,17	- 27,12	263.25.13,9 257.55.59,2 257.48.56,4 258. 5.36,9	736,2	+ 7,3	+ 5,9	-1.50,3 -2.21,8 -2.22,7 -2.20,8	35,7
	Anonyme Anonymeα Gémeauxα Petit Chien β Gémeaux	6.53.30,71 6.59.45,08 7.24.34,36 7.31. 0,29 7.35.41,07	- 0,17 - 0,17 + 0,42 + 0,10 + 0,37	- 27,04 - 27,20 - 27,00	268. 1.44,9 258. 9.23,2 312. 7.21,9 285.31.26,4 308.17.45,9	736,1 736,0	+ 7,2 + 7,0	+ 5,4 + 4,7 + 4,6	-2.21,3 -2.20,5 - 14,3 - 49,2 - 18,5	<sup>29,7</sup> 33,4 32,9
5	Anonyme	7.43. 2,17 7.48.56,99 7.54.29,53 8. 2.10,99 8. 6.15,48	- 0,27 - 0,19 - 0,19 - 0,18 - 0,17		249.37. 2,4 255. 3.41,5 254.56.50,7 257.11.26,0 257.59.39,5	736,1	+ 6,6	+ 4,6 + 4,5	-3.51,8 -2.45,7 -2.46,8 -2.28,0	
	Lalande 16384 Anonyme Anonyme Anonyme &-23°2'. Anonyme	8.13.14,67 8.19.15,34 8.22.55,29 8.24.42,33 8.27.28,25	- 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18		257. 3.20,7 256.49.31,5 256.54.20,0				-2.29,2 -2.31,0 -2.30,4	
	Lalande 17048 Lalande 17277 Anonyme Anonyme Lacaille 3692	8.30.42,35 8.37.40,73 8.47, 5,98 8.55.59,82	- 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,19		256.35 10,9 256.42. 2,4 256.13.39,4 254.55. 7,8	735,9	+ 6,1	+ 3,5	-2.33,1 -2.32,2 -2.36,1 -2.47.7	
	Anonyme. Anonyme. Anonyme.  A Hydre.  A Hydre.  Ophiuchus.	9. 1.46,01 9. 3.41,55 9. 7.47,22 9.14.38,44 9.19.46,69 17. 7.20,28 17.27.30,06	- 0,21 - 0,21 - 0,17 - 0,15 - 0,02 + 0,20 + 0,17	- 27,32 - 27,86 - 27,71	253.48.50,4 257.46. 1,2 259.51.51,0 271.54.59,4 294.28.52,0 292.32.25,7	735,7 733,5 733,3	+ 5,3 + 5,0 + 4,3	+ 2,4 + 2,3 + 2,3 - 0,8 - 1,0	+2.59,1 -2.24,7 -2.10,8 -1.20,1 - 35,9 - 38,7	33,1 27,8 28,1
3	γ Dragon Soleil, bord 1, sup.	17.52.38,66	+ 0,80	- 27,42 - 27,42	273.21.11,7	733,3	+ 4,4	+ 9,0	+ 5,4	32,7

Jours.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION le la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté-	DMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
4	γ Aigle	h. m. s. 19.38.37,04 19.42.57,18 20.35.47,95 21.14.27,50 21.18.43,86	+ 0,17 + 0,15 + 0,72 + 1,34 - 0,14	s - 29,67 - 29,65 - 29,25 - 29,14	290.10.13,6 288.23.42,1 324.39.12,1 341.51.14,7 263.47.54,7	737,1 737,5 737,7	+ 7,3 + 7,8 + 8,3	+ 6,0 + 8,7 + 8,8	- 41,5 - 44,2 - 1,4 + 16,0 -1.47,6	32,0 29,2 31,8 34,6
5	Soleil, bord 1, inf  a Cassiopée  a Petite Ourse S  a Bélier  a Baleine  a Persée  a Taureau  59 Eridan  Piazzi, IV, 289	23. 1.38,91 0.31,29,50 1. 3.41,64 1.58,12,77 2.53,56,05 3.13. 7,22 4.26,48,76 4.41,17,78 4.55,34,21	- 0,02 + 1,05 + 0,32 + 0,09 + 0,84 + 0,24 - 0,14 - 0,27	- 29,62 - 29,68 - 29,73 - 29,87 - 29,89	273.34.56,0 335.37.16,7 8.24.26,3 302.39.48,0 283.25. 3,9 329.13.50,7 296. 7. 3,6 263.20. 3,9 253.27.42,6	738,0 737,7 737,9 737,8 737,9 737,9 738,1	+ 9,0 + 9,3 + 9,5 + 9,8 + 9,9 + 10,0 + 9,6 + 9,6	+ 9,1 +11,2 +11,5 +11,5 +11,5 +10,7 +10,4	-1.13,8 + 9,4 + 51,1 - 24,4 - 51,9 + 3,1 - 32,5 -1.49,2 -2.59,1	36,3 34,8 27,4 32,7 31,0 28,9
	Piazzi, IV, 307  Cocher  Orion  Taureau  Anonyme  B Lièvre	4.58.41,17 5. 5. 6.51 5. 6.50,11 5.16.18,45 5.19.28,72	- 0,27 - 0,27 + 0,74 - 0,05 + 0,42 - 0,20 - 0,20	- 29,81 - 29,75 - 30,05	253.35,36,2 325.44.55,0 271.32.48,7 308.23.11,9 259. 5.25,2	738,3	+ 9,6	+ 9,6 + 9,4 + 9,0	-2.39,1 -2.57,8 - 0,4 - 18,1 -2.13,5	32,6
	10 Lièvre	5.24.12,98 5.28. 4,04 5.31.20,26 5.42.55,17 5.46.58,84 5.47.30,72	- 0,20 - 0,20 - 0,20 + 0,37 - 0,18 - 0,18		258.57.41,7 258.46.10,7 259.13.24,7 305.54.45,0	738,4	+ 9,4	+ 8,8 + 8,6	-2.13,8 -2.15,1 -2.12,2 - 20,9 -2. 6,4	
	AnonymeAnonymeAnonymeAnonymeAnonymeAnonymeAnonyme	5.50.44,84 5.54.38,33 6. 1. 7,96 6.10.52,45 6.16. 0,63 6.20.20,06	- 0,25 - 0,25 - 0,19 + 0,31 + 0,31		254.57.35,6 254.31.31,1 260.10.56,4 302.24.30,1 302.26.50,3 13.17.54,9	738,6	+ 9,3	+ 8,6	-2.45,0 -2.49,3 -2.6,7 - 25,0 - 24,9 +1.1,3	34,0
	Anonyme. Anonyme δ+22°9'. α Grand Chien Anonyme. Lalande 13316 Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme.	6.27.57,67 6.29.34,01 6.38. 2,98 6.40.56,85 6.45. 5,18 6.48.41,64 6.54.12,64 6.59,42,28 7. 6. 8,61	+ 0,31 + 0,31 - 0,14 - 0,22 - 0,22 - 0,21 - 0,31 + 0,31	- 29,85	302.10.52,1 263.25.13,9 257.55.59,0 257.48.56,5 258. 5.36,5 258.11. 1,1 258. 9.20,8 302.19.35,8	738,8	+ 8,9	+ 8,6	- 25,2 -1.49,7 -2.21,1 -2.21,9 -2.20,0 -3.19,4 -2.19,8 - 25,1	36,5

Le 5, Mire Sud-19°,56. Mire Nord B+6°,77. Mire Nord C-18°,52. Mire Nord D-48°,79.

19
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM	DUÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	' corrigée pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Lacaille 2698 Lacaille 2792 α² Gémeaux α Petit Chien 3 Gémeaux Anonyme	h. m. s. 7.10. 9,39 7.18.43,39 7.24.31,64 7.30.57,49 7.35.38,19 7.41.11,42	s. - 0,25 - 0,25 + 0,47 + 0,11 + 0,42 - 0,32	- 29,67 - 29,95 - 29,87	255. 3.12,0 255. 1.31,3 312. 7.21,2 285.31.23,6 308.17.42,9 249.47. 6,9	<sub>mm</sub> . 739,0	+ 8,6	+ 6,3	-2.44,8 -2.45,4 - 14,3 - 49,0 - 18,4 -3.50,8	28,8 30,8 29,8
	Anonyme ô-30°11' Anonyme B. A. C. 2675 Anonyme Anonyme ô-21°53' Anonyme	7,42.59,39 7,48.54,47 7,54.26,71 8. 2. 8,15 8. 6.12,82 8. 6,42,52 8.11,11,63	- 0,32 - 0,25 - 0,25 - 0,22 - 0,21 - 0,21 - 0,22		255. 3.39,7 254.56.48,4 257.11.22,0 257.59.39,3	6		+.710	-2.45,0 -2.46,0 -2.27,4 -2.21,7	
	Lalande 16381 Lalande 16384 Anonyme Anonyme &-23°2'. Anonyme	8.13. 6,38 8.13.11,79 8.19.12,67 8.22.52,73 8.24.39,45	$ \begin{array}{ccccc}  & & & & & & & & & & & \\  & & & & & & &$		257. 3.19,3 256.49.30,8 256.54.38.6	739,4	+ 7,7	+ 5,4	-2.28,9 -2.30,7 -2.30,3	
	Anonyme	8.29.52,22 9. 1.43,51 9. 3.39,03 9. 7.44,52 9.14.35,67	+ 0,27 - 0,26 - 0,26 - 0,21 - 0,19		298.24.19,8 253.48.43,5 257.45.58,7	739,4	+ 7,7	+ 5,0	- 30,2 -2.58,5 -2.23,8	
	a Hydre	9.19.43,97	- 0,04	- 30,05	271.54.54,0	739,6	+ 7,8	+ 6,7	-1.19,2	28,7
6	α Cassiopée α Petite Ourse S α Bélier	0.31.28,64 1. 3.40,44 1.58.11,75	+ 0,32	- 30,46 - 30,69	335.3 <sub>7.1</sub> 3,6 8.24.25,4	741,1 741,0	+ 8,5 + 8,8	+ 8,3 + 7,8	+ 9,6 + 52,0	33,6 35,1
	ß Petite Ourse I  α Baleine  α Persée  Piazzi, IV, 289  α Cocher  β Orion	2.50.44,98 2.53.55,05 3.13. 6,27 4.55.33,25 5. 5. 5,57 5. 6.48,96	- 2,59 + 0,09 + 0,84 - 0,27 + 0,74 - 0,05	- 30,79 - 30,79 - 30,79 - 30,88	25. 7. 2,3 283.25. 5,4 329.13.51,0 253.27.42,0 325.44.55,3 271.32.49,2	740,2 740,4 740,4	+ 8,9 + 8,6 + 8,4	+ 7,6 + 7,3 + 6,8 + 6,5	+1.34,8 - 52,7 + 3,1 -3. 1,3 - 0,4 -1.20,4	28,8 33,4 31,4 32,9 32,0
	3 Taureau	5.21.18,50 5.24.11,98 5.28. 3,02 5.31.19,28 5.36.22,94	+ 0,42 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 + 0,38	- 30,85	259. 3.25,6 258.57.44,1 258.46.15,1 259.13.33,8 259.40.39,3 305.55. 4,1			+ 6,6	- 18,3 -2.14,7 -2.15,3 -2.16,5 -2.13,5 -2.10,8 - 21,1	30,9

Le 6, Mire Sud-189,76. Mire Nord B+69,49. Mire Nord D-499,05.

20
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS,	NOM	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYBANE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE	- Inté-	OUÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE.
-		h. m. s	шент.	pendure.	0 / "	m.a.	rieur.	rieur.	1 11	
	Mars, centre	5.43.30,73	+ 0,38	5.	305.54.30,3	211	0	٥	- 21,1	"
	Lalande 11212	5.46.57,74	- 0,18						- '	
	Lalande 11231	5.47.29,60	- 0,18		260.12. 5,8				-2. 7,7	The state of the s
	Anonyme	5.50.43,60 5.54.3 <sub>7,17</sub>	- 0,25		254.57.35,8				-2.46,6	1
	Anonyme	5.58.15,36	- 0,25 - 0,34		254.31.30,4 247.48.18,8	740,5	+ 8,0	+ 6,1	-2.51,0 $-4.30,6$	
	Anonyme	6.10.51,45	+ 0,31		302.24.28,0	740,3	7 0,0	7 0,1	-4.30,0 $-25,2$	
1	Anonyme 8+22°36'		+ 0,31		002.24.20,0				20,2	
	& Petite Ourse I	6.20.18,56			13.17.55,6	740,5	+ 8,0	+ 6,4	+1. 1,9	34,6
	Anonyme 8+22°16'		+ 0,31							
	Anonyme	6.29.33,01	+ 0,31	D 0#	302. 4.16,8				- 25,6	i
1	α Grand Chien Lalande 13168	6.38. 1,96	- 0,14	- 30,85	263.25.15,5			+ 6,0	-1.50,9	37,0
1	Anonyme	6.41.24,07	- 0,21		258.11.53,7 258.15.25,7				-2.20,8	
	Lalande 13773	6.57.53,52	- 0,21		230.13.23,7				-2.20,0	4
	Anonyme		- 0,21		258.12.41,6	740,4	+ 7,6	+ 5,0	-2.21,1	2
	Anonyme	7. 6. 4,65	+ 0,31		302. 8. 6,9	7 , ,			- 25,6	
	Lacaille 2698		- 0,25		255. 3.15,6				-2.46,3	-
	Anonyme		- 0,25		256. 1.38,6			- 0	-2.37,6	
1	Lacaille 2792		- 0,25	2 00	255. 1.30,6			+ 5,3	-2.46,5	0
	α <sup>2</sup> Gémeaux α Petit Chien	7.24.30,64	+ 0,47	- 30,65 - 30,75	312. 7.24,0				- 14,4	31,4
	B Gémeaux	7.35.37,21	+ 0,42	- 30,75 - 30,84	285.31.26,2 308.17.42,3			+ 5,c	- 49,4 - 18,5	33,0
	Anonyme		- 0,32	- 30,04	249.47.12,2			т Ј,С	-3.52,5	29,1
l	Anonyme &-30011'	7.42.58,49	- 0,32		-49.4/112,2				0.02,0	
l l	Anonyme	7.48.53,41	- 0,25		255. 3.37,5			+ 5,2	-2.46,3	
	Anonyme	7.53.32,55	- 0,25		254.58.18,6				-2.47,2	
	Lacaille 3127		- 0,25		254.40.23,3				-2.49,7	(
	Anonyme	8. 1.20,03	- 0,25		254.34. 9,5				-2.51,2	1
	Anonyme	8. 6.41,22	- 0,2 t - 0,22		258. 3.19,2 257.10.40,0				-2.22,4 $-2.28,0$	
1	Lalande 16384		- 0,22		257. 3.19,2				-2.30,0	
ł I	Anonyme	8.19.11,51	- 0,22		256.49.34,0				-2.31,8	
	Anonyme		- 0,22	-	256.54.19,4				-2.31,2	
	Anonyme &-23°2'.	8.24.38,35	- 0,22		3					-
	Anonyme	8.29.51,32	+ 0,27		298.24.21,7	740,2	+ 6,8	+ 3,9	- 30,4	
	d Cancer	8.35.38,74	+ 0,27		298.36.57,4				- 30,2	
	Lacaille 3521	8.40.22,76 8.40.57,04	- 0,36 - 0,36		0/5 55 00 -				-5.23,1	
	Anonyme	8.47. 2,25	- 0,36 - 0,24		245.56.29,7 256.13.45,0				-3.25,1	
	Anonyme	45 10 10 10 10 10	- 0,25		254.55. 6,2	740,1	+ 6,4	+ 3,0	-2.48,9	1
	Lacaille 3692		- 0,26		, , , , ,	/ , .	7 77	7-	70,9	

21
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Anonyme Anonyme Anonyme A Hydre γ Aigle α Aigle α Céphée Mercure, bord 2,c <sup>tre</sup>	h m. s 9. 3.37,75 9. 7.43,38 9.14.34,72 9.19.43,05 19.38.35,36 19.42.55,40 21.14.25,45 21.27.20,54	- 0,26 - 0,22 - 0,19 - 0,04 + 0,17 + 0,15 + 1,34 - 0,13	- 30,96 - 31,40 - 31,47 - 31,24	253.48.48,5 257.45.59,9 259.51.50,7 271.54.58,0 290.10.12,5 288.23.41,6 341.51.11,9 264. 8.45,6	739,9 740,4 740,6 740,8	+ 5,7 + 5,7 + 6,9 + 6,8	+ 3,4 + 3,8 + 5,6 + 5,9	-3. c,0 -2.25,1 -2.11,1 -1.20,3 - 42,0 - 44,8 + 16,2 -1.47,6	31,7 30,6 28,7 32,5
7	Soleil, bord 1, sup. Vénus, centre	23. 9. 1,53 23.16.24,78 0.31.27,54 1. 3.40,04 2.50.44,11 2.53.54,09 5. 5. 4,59 5. 6.47,96 5.16.16,59 5.19.26,80	- 0,01 - 0,02 + 1,05 - 2,59 + 0,09 + 0,74 - 0,05 + 0,42 - 0,20	- 31,55 - 31,80 - 31,66 - 31,69 - 31,87 - 31,87	274.53.45,3 273.44.21,8 335.37.12,5 8.24.24,8 25. 7. 1,0 283.35. 3,0 325.44.56,4 308.23.15,4 259. 5.24,7	739,9 739,8 739,7 738,9 738,4 738,1	† 7,9 + 8,5 + 8,7 + 8,8 + 9,7 + 9,8	+ 8,3 + 8,6 + 9,6 + 10,9 + 11,3 + 11,2	-1.10,7 -1.13,7 + 9,5 + 51,3 +1.33,2 - 51,7 - 0,4 - 18,0 -2.11,9	32,7 34,0 27,3 32,0 34,0
	9 & Lièvre	5.21.17,66 5.24.11,02 5.28. 2,08 5.31.18,26 5.36.21,90 5.40.57,13 5.46. 8,21 5.50.42,91 5.54.36,43	- 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 + 0,38 + 0,38 - 0,25 - 0,25		258.57.40,8 256.46.10,5 259.13.30,1 259.40.33,5 305.55.2,1 305.554.1,5 254.57.30,9 254.31.30,8				-2.12,9 -2.14,2 -2.11,5 -2. 8,8 - 20,8 - 20,9 -2.44,5 -2.48,9	
	Anonyme	5.58.14,48 6.10.50,43 6.15.58,29 6.20.18,50 6.27.25,81 6.29.57,49 6.38. 1,02 6.41.23,16	- 0,34 + 0,31 + 0,31 + 0,31 - 0,14 - 0,21 - 0,21 - 0,21	- 31,77	247.48.15,5 302.24.30,0 302.30.22,2 13.17.56,3 302. 4.53,1 302. 2.32,2 263.25.14,9 258.11.51,8 258.15.25,2	738,1	+ 9,6	+ 8,5 + 8,4 + 8,1 + 7,4 + 7,2	-4.27,2 - 24,9 - 24,9 +1. 1,3 - 25,3 - 25,4 -1.49,7 -2.19,5 -2.19,2	35,2
	Lalande 13773 Anonyme Lacaille 2655 Lacaille 2666	6.57.52,70 6.59.44,50 7. 5.32,06	- 0,21 - 0,21 - 0,28 - 0,28		258.12.39,9 252.51. 5,6	738,1	+ 8,7	+ 7,0	-2.19,6 -3. 7,4	1

Le 7, Mire Sud-19°,07. Mire Nord B+8°,15. Mire Nord C-16°,42. Mire Nord D-47°,22.

22
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS.	NOM des astres.	PASSAGE CONCLL au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOVENNE DES VERNIERS corrigés pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERMO	MÉTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Lacaille 2698  Anonyme Lacaille 2792	h. m. s. 7.10. 7,31 7.14. 8,13 7.18.41,47 7.24.29.68 7.30.55,61 7.35.36,31	5. - 0,25 - 0,25 - 0,25 + 0,47 + 0,11 + 0,42 - 0,32 - 0,32	- 31,59 - 31,79 - 31,72	255. 3.15,1 255.13.34,1 255.13.2,1 312. 7.22,2 285.31.22,8 308.17.43,8 249.47. 8,8	738,1	+ 8,3	+ 6,2	-2.44,9 -2.43,5 -2.45,3 - 14,3 - 49,0 - 18,4 -3.51,0	29,6 30,0 30,6
	Anonyme &-30°11' Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme	7.42.57,33 7.48.52,47 7.53.31,51 7.57.43,67 8. 1.19,25 8. 4.39,20 8.11. 9,63 8.13. 9,81 8.19.10,71 8.22.50,69	- 0,32 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,22 - 0,22 - 0,22 - 0,22		255. 3.37,8 254.58.19,2 254.40.20,2 254.34. 9,6 254.20.33,5 257.10.40,0 257. 3.20,5 256.49,30,8			+ 5,4	-2.45,2 -2.46,1 -2.49,0 -2.50,1 -2.52,4 -2.27,9 -2.28,8 -2.30,4	
	Anonyme  Anonyme  Cancer Lacaille 3521 Lacaille 3525	8.24.37,49 8.29.50,34 8.35.37,92 8.40.21,84 8.40.56,22	- 0,22 - 0,22 + 0,27 - 0,36 - 0,36 - 0,24		256.54.38,0 298.24.20,7 298.36.56,0 245.55. 3,6 256.13.43,1	737,9	+ 7,6	+ 6,4	-2.29,6 - 30,0 - 29,8 -5.17,7	
	Anonyme	8.47. 1,21 8.55.55,45 9. 1.41,52 9. 3.36,81 9. 7.42,58	$ \begin{array}{r} -0,25 \\ -0,26 \\ -0,26 \\ -0,22 \end{array} $		254.55. 3,2 253.47.23,8 257.45.54,5	737,9	+ 7,6	+ 5,2	-2.47,0 -2.58,1 -2.23,5	
	Anonyme.  α Hydre.  γ Aigle.  α Aigle.  β Aigle.  α Céphée.  β Céphée.  Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup>	19.38.34,32 19.42.54,48 19.47.23,37 21.14.24,40 21.26. 5,97	- 0,19 - 0,04 + 0,17 + 0,15 + 0,13 + 1,34 + 1,94 - 0,13	- 31,91 - 32,46 - 32,42 - 32,45 - 32,32 - 32,04	259.51.47,6 271.54.54,2 290.10.13,6 288.23.43,4 285.57.27,7 341.51.12,5 349.48.13,1 264.21.17,9	738,0 736,9 736,8 736,7 736,7	+ 7,5 + 7,1 + 8,0 + 8,2 + 8,2	+ 5,8 + 5,0 + 9,0 + 8,7 + 8,9	-2. 9,6 -1.19,3 - 41,6 - 44,4 - 48,4 + 16,0 + 24,9 -1.45,0	28,9 32,1 30,5 35,7 33,2 35,8
	8 Soleil, bord 1, inf Vénus, centre   Cassiopée  Petite Ourse S  Bélier  Petite Ourse I	23.21. 0,63 0.31.26,56 1. 3.36,04 1.58. 9,77	- 0,01 - 0,01 + 1,05 + 0,32 - 2,59	- 32,52 - 32,65 - 32,33	274.44.50,8 274.13.47,0 335.37.12,7 8.24.25,8 302.39.47,1 25. 7. 1,5	736,1 735,9 735,1 734,8 734,8	+ 9,0 + 9,3 + 9,5 + 9,5 + 9,8	+10,5 +11,2 +13,7 +13,3 +14,3	-1.10,2 -1.11,4 + 9,3 + 50,5 - 24,0 +1.32,0	1 -

25
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

HOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO	OMĖTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
_		A TO METIGIES.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.		TODE.
	α Baleine	1. m. s. 2.53.53,11 3.13. 4,19 5. 5. 3,71 5. 6.47,01 5.16.15,63	\$ + 0,09 + 0,84 + 0,74 - 0,05 + 0,42	- 32,62 - 32,82 - 32,53 - 32,80 - 32,81	283.25. 2,7 329.13.50,1 325.44.54,6 271.32.42,7 308.23.12,7	734,2 734,0 733,9	+ 9,9 + 9,9 + 9,7	+14,0 +14,0 +10,6 +10,6	- 51,1 + 3,0 - 0,4 -1.18,6 - 17,9	31,3 30,7 32,2 27,3 30,1
	Anonyme &-20°51' 9 & Lièvre	5.19.25,82 5.21.16,74 5.24.10,02 5.28. 1,14 5.31.17,52 5.36.21,10	- 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20		259. 3.22,7 258.57.39.9 258.46.11,5 259.13.31,2 259.40.34,4				-2.11,6 -2.12,3 -2.13,6 -2.10,9 -2. 8,2	
	Anonyme	5.40.56,09 5.47.46,47 5.50.41,95 5.54.35,31 5.58.13,72 6.10.10,90	+ 0,38 + 0,38 - 0,25 - 0,25 - 0,34 + 0,31		305.55. 1,2 305.53.35,4 254.57.34,5 254.31.26,0 247.48.14,9 302.16.19,8	733,9	+ 9,7	+ 9,3	- 20,7 - 20,8 -2.43,5 -2.47,8 -4.25,5 - 24,9	
	Anonyme	6.15.57,65 6.20.18,88 6.27.24,84 6.29.56,59 6.38. 0,12 6.41.22,14	+ 0,31 + 0,31 + 0,31 - 0,14 - 0,21	→ 32,65	302.26.50,2 13.17.54,2 302. 4.50,7 302. 2.33,9 263.25.11,5 258.11.46,3	733,9	+ 9,4	+ 8,3 + 8,0 + 7,8	- 24,7 +1. 0,9 - 25,2 - 25,3 -1.49,1 -2.18,5	32,5
	Anonyme	6.44.37,02 6.47.50,53 6.48.16,92 6.53.25,08 6.57.51,88 6.59.41,94	- 0,21 - 0,21 - 0,21 - 0,21 - 0,21 - 0,21		258. 1.41,2 258. 2.24,4	-21			-2.18,8 -2.18,2 -2.19,8 -2.19,8	
	Lacaille 2655. Lacaille 2666. Lacaille 2698. Lacaille 2792. 2 Gémeaux. 2 Petit Chien. 3 Gémeaux. Anonyme.	7. 5.31,21 7. 7. 2,11 7.10. 6,28 7.18.40,53 7.24.28,84 7.30.54,63 7.35.35,25 7.41. 8,41	- 0,28 - 0,28 - 0,25 - 0,25 † 0,47 † 0,41 † 0,42 - 0,32	- 32,52 - 32,76 - 32,76	252.52. 2,4 255. 3.10,4 255. 1.25,9 312. 7.20,2 285.31.23,7 308.17.44,0 249.47. 5,8	734,0	+ 9,2	+ 7,4	-3. 5,8 -2.43,5 -2.43,8 - 14,1 - 48,5 - 18,2 -3.48,7	27,7 31,5 30,9
	AnonymeAnonymeAnonyme	7.44.54,96 7.45.34,00 7.48.51,51 7.53.30,55 7.57.42,75	- 0,32 - 0,32 - 0,25 - 0,25 - 0,25		248.43. 1,4 248.43. 1,4 255. 3.37,9 254.58.18,0 254.40.24,8				-4. 8,0 -4. 8,0 -2.43,6 -2.44,4 -2.47,2	

Le 8, Mire Sud-19°,36. Mire Nord  $E+7^{\circ},27$ . Mire Nord  $C-15^{\circ},91$ . Mire Nord  $D-47^{\circ},64$ .  $d-8^{\circ},17$ . Niveau-1°,17. Nadir 146°6′26″,70.

24
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERMO	DMÉTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
-			ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.		
	Anonyme. Anonyme. Anonyme. Lalande 16384. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme &-23°2'. Anonyme. Cancer. Lacaille 3521. Lacaille 3525. Anonyme. Lacaille 3614. Anonyme. B. A. C. 3096. Lacaille 3692. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Aligle. A Aigle. B Aigle. C Céphée. C Céphée.	8.11. 8,59 8.13. 9,05 8.19. 9,81 8.22.49,75 8.24.36,57 8.29.49,38 8.35.36,84 8.40.20,76 8.40.55,04 8.47. 0,09 8.50.33,67 8.55.54,17 8.56. 3,49 9. 1.40,56 9. 7.41,56 9.12.41,24 9.19.41,11 9.38.33,46 9.47.22,55 21.14.23,48	5.  - 0,25  - 0,25  - 0,22  - 0,22  - 0,22  - 0,27  - 0,36  - 0,36  - 0,24  - 0,25  - 0,25  - 0,26  - 0,22  - 0,22  - 0,04  + 0,17  + 0,13  + 1,34  + 1,94	- 32,89 - 33,35 - 33,42 - 33,27 - 33,27	254.34, 4,2 254.20.34,0 257.10.33,0 257.3.16,8 256.49.29,6 256.54.12,2 298.24.19,4 298.36 55,9 245.53.21,0 256.13.41,9 255.40.55,7 254.55. 4,3 257.45.53,9 257.45.53,9 257.37. 1,1 271.54.52,9 290.10.12,8 288.23.42,0 285.57.22,6 285.57.22,8 341.51.10,5 349.48.12,0	733,9 733,5 732,5 732,3 732,2	+ 8,7 + 8,0 + 7,7 + 7,6 + 8,2 + 8,5	+ 7,1 + 5,8 + 5,4 + 5,3 + 4,6 + 8,6 + 8,8	-2.48,2 -2.50,4 -2.26,2 -2.27,2 -2.29,1 -2.28,7 -2.9,9 -2.9,7 -5.17,6 -2.34,4 -2.39,0 -2.45,9 -2.57,1 -2.22,7 -2.23,8 -1.19,0 -41,4 -44,2 -48,2 + 15,9 + 24,7	28,0 31,6 29,3 31,3 31,3 34,8
	Soleil, bord 1, sup. Vénus, centre α Cassiopée α Petite Ourse S α Bélier β Petite Ourse I α Cocher β Orion β Taureau Anonyme δ-20°51' 9 β Lièvre 10 Lièvre 10 Lièvre Lalande 10694 Lalande 10879 Anonyme	0.31.25,68 1. 3.33,54 1.58. 8,87 2.50.43,04 2.53.52,17 5. 5. 2,43 5. 6.46,21 5.16.14,69 5.21.15,72 5.24. 9,06 5.28. 0,28 5.31.16,56 5.36.20,22	+ 0,01 0,00. + 1,05 + 0,32 - 2,59 + 0,09 + 0,74 - 0,05 + 0,42 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20	- 33,39 - 33,54 - 33,03 - 33,55 - 33,78 - 33,58 - 33,73	275.40.31,7 274.43.27,1 335.37.11,8 8.24.25,5 302.39.45,9 25. 7. 1,7 283.25. 3,0 325.44.56,2 271.32.43,0 308.23.11,4 259. 3.21,6 258.57.39,4 258.46.10,2 259.13.26,9 259.40.36,1 305.55. 2,7	731,7 731,6 730,9 730,5 730,2 729,9	+ 9,5 + 9,5 + 9,8 + 9,9 +10,2 +10,3	+10,6 +11,1 +12,3 +12,7 +13,3 +14,3 +11,6 +11,5	-1. 7,5 -1. 9,7 + 9,3 + 50,3 - 24,0 +1.31,3 - 0,4 -1.17,9 - 17,8 -2.10,4 -2.11,0 -2.12,3 -2.9,4 -2.6,6	32,3 34,2 26,1 26,3 33,0 33,8 29,3 28,9

Le 9, Mire Sud-21P,77. Mire Nord B+7P,04. Mire Nord C-16P,74. Mire Nord D-47P,27.

25
Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-		MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE	Inté-	OMĖTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLE.
_			ment.	pendule.		-	rieur.	rieur.		
	α Orion	h. m. s. 5.46.29,45	+ 0,14	- 33,68	0 1 11	nim	O	0	/ //	"
	Mars, centre	5.49.26,13	+ 0,14	- 33,00	305.53. 3.7	730,0	+10,1	+ 9,4	- 20,6	
	Anonyme	5.58.12,52	- 0,34		247.48.11,3	750,0	710,1	+ 9,2	-4.23,6	
	Anonyme	6.11. 9,97	+ 0,31		302.16.20,5			1 37-	- 24,8	
	Anonyme	6.15.56,23	+ 0,31		302.30.20,7				- 24,6	
	8 Petite Ourse I	6.20.18,17			13.17.55,0	730,0	+ 9.9	+ 8,3	+1. 0,6	32,9
	Anonyme	6.27.23,96	+ 0,31		302. 4.56,7				- 25,1	
	Anonyme	6.29.55,63	+ 0,31	DD 00	302. 2.36,2				- 25,1	
	α Grand Chien	6.37.59,10	- 0,14	- 33,66	263.25.10,7			+ 8,2	-1.48,4	34,8
	Lalande 13168	6.41.21,22	- 0,21		258.11.48,3				-2.17,6	
	Anonyme	6.44.35,90 6.47.49,46	- 0,21		258.10.12,4 258.15.20,7				-2.17.9	
	Anonyme &-21°41'	6.48.15,96	- 0,21 - 0,21		230.13.20,7				-2.17,3	
	Anonyme	6.53.24,10	- 0,21		258. 1.43,4				-2.19,0	1
	Lalande 13773	6.57.50,82	- 0,21		200. 1.43,4				-2.19,0	1
	Anonyme:	6.59.40,96	- 0,21		258. 2.21,9				-2.19,0	
	Lacaille 2655	7. 5.30,21	- 0,28				ļ		2019,0	
	Lacaille 2666	7. 7. 1,03	- 0,28		252.51. 3,5				-3. 5,0	
	Lacaille 2698	7.10. 5,27	- 0,25		255. 3.10,2	730,3	+ 9,5	+ 7.4	-2.42,7	
	Lacaille 2792	7.18.39,51	- 0,25		255. 1.21,7	′ ′	3,	. , , .	-2.42,9	
	α² Gémeaux	7.24.27,66	+ 0,47	- 33,58	312. 7.21,6				- 14,0	29,1
	α Petit Chien	7.30.53,59	+ 0,11	- 33,79	285.31.23,7			+ 8,1	- 48,2	31,8
	B Gémeaux	7.35.34,25	+ 0,42	- 33,75	308.17.43,6				- 18,1	30,5
	Anonyme	7.41. 7,51	- 0,32		249.47. 5,9				-3.47,2	
	Auonyme	7.44.54,01	- 0,32		248.43. 2,1				-4. 6,4	
	Anonyme	7.45.33,01	- 0,32		248.43. 2,1				-4, 6,4	
	Anonyme	7.48.50,47	- 0,25		255. 3.33,4		,		-2.42,6	
	Anonyme Lacaille 3127	7.53.29,65	- 0,25 - 0,25		254.58.11,7 254.40.19,3				-2.43,5	
	Anonyme	7.57.41,79 8. 1.17,39	- 0,25		254.34. 5,5				-2.46,4 -2.47,4	
	Anonyme	8. 4.37,29	- 0,25		254.20.33,4	730,6	+ 9,3	+ 7,1	-2.49,7	ì
	Anonyme	8.11. 7.77	- 0,23		257.10.32.7	/30,0	T 9,5	T 791	-2.49,7 -2.25,6	
	Anonyme	8.11. 7,77 8.15. 6,35	- 0,22		257. 0.21,3				-2.26,0	
	Anonyme	8.19. 8,87	- 0,22		256.49.31,6				-2.28,3	
	Anonyme	8.22.48,69	- 0,22		256.54.15,5				-2.27,8	
	Anonyme	8.24.35,42	- 0,22		256.54.39,7				-2.27,8	
	Anonyme	8.29.48,46	+ 0,27		298.24.18,7	730,6	+ 8,9	+ 6,5	- 29,7	1
	3 Cancer	8.35.36,04	+ 0,27		298.36.58,8		.0	+ 6,4	- 29,5	
	Lacaille 3521	8.40.19,86	- 0,36		245.54.55,2				-5.13,9	1
	Lacaille 3525	8.40.54,32	- 0,36		HQ () (					
	Anonyme	8.46.59,39	- 0,24		256.13.42,5				-2.33,4	1
1	Lacaille 3614	8.50.32,77	- 0,25		255.40.59,3	1	1		-2.38,0	

Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

iours	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO		RÉFRACTION	LIEU
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	HON.	POLE.
	Anonyme	h. m. s. 8.55.53,47 8.56. 2,39 9. 1.39,71	s. - 0,25 - 0,25 - 0,26	s	254.54.59,4 253.47.21,3 257.41.20,3	mm.	+ 8,3	+ 6,1	-2.44,8 $-2.55,8$ $-2.22,3$	//
	Anonyme Anonyme  A Hydre  Lyre	9.19.40,25	- 0,22 - 0,22 - 0,04 + 0,58	- 33,74 - 34,38	257.37. 0,8 257.34.55,5 271.54.53,2 318.33.16,9	730,6 730,8	+ 8,2 + 7,6	+ 6,3 + 1,5	-2.22,5 $-2.22,8$ $-2.23,1$ $-1.18,4$ $-7,6$	29,0 31,9
	γ Aigle	19.47.21,51 21.14.22,74 21.26. 4,05	+ 0,17 + 0,15 + 0,13 + 1,34 + 1,94 - 0,12	- 34,23 - 34,36 - 34,35 - 34,03 - 34,02	290.10.13,7 288.23.41,7 285.37.25,7 341.51.12,1 349.48.15,0 264.50.38,0	730,8 730,6 730,6 730,4	+ 7,1 + 8,6 + 8,7 + 9,0	+ 6,0 +10,9 +10,4 +12,1	- 41,1 - 43,8 - 47,8 + 15,8 + 24,5 -1.40,5	32,9 29,5 34,4 33,1 37,9
to	Soleil, bord 1, inf y Aigle  a Aigle a Céphée	19.42.51,78	+ 0,01 + 0,17 + 0,15 + 0,13	- 35,16 - 35,19 - 35,16	275.31.39,1 290.10.11,1 288.23.42,3 285.37.21,9	7 <sup>30,2</sup> 7 <sup>2</sup> 9,8	+10,0 +10,1	+12,0	-1. 7,4 - 41,0 - 43,8 - 47,7	30,5 30,2 30,8
12	Soleil, hord 1, sup.  y Aigle  α Aigle  β Aigle  α Céphée  β Céphée  Mercure, bord 2, c <sup>tro</sup>	19.38.30,10 19.42.50,30 19.47.19,09 21.14.20,54 21.26. 1,91	+ 0,02 + 0,17 + 0,15 + 0,13 + 1,34 + 1,94 - 0,12	- 36,80 - 36,71 - 36,84 - 36,33 - 36,26	276.51. 0,6 290.10.13,6 288.23.45,3 285.37.25,6 341.51.11,1 349.48.14,0 265.45.22,4	734,7 735,7 735,8 735,7	+ 6,6 + 4,3 + 4,9 + 5,3	+ 5,0 + 1,9 + 3,8 + 3,6 + 5,0	-1. 3,7 - 42,0 - 44,8 - 48,9 + 16,3 + 25,3 -1.40,4	32,1 32,2 33,6 33,4 38,5
13	B Soleil, bord 1, inf  A Petite Ourse S  B Petite Ourse I  B Petite Ourse I  Corse  Cocher.  Cocher.  Corion.  Taureau.  B Lièvre.  Anonyme.  Orion.	1. 3.33,73 1.58. 5,59 2.50.39,33 2.53.48,97 3.13. 0,11 5. 4.59,29 5. 6.42,73 5.16.11,15 5.21,12,18 5.40.51,81	+ 0,02 + 0,32 - 2,59 + 0,09 + 0,84 + 0,74 - 0,05 + 0,42 - 0,20 + 0,38 + 0,74	- 36,77 - 37,01 - 36,70 - 36,78 - 36,82 - 36,98 - 37,19	276.42.20,2 8.24.21,3 302.39.46,9 25. 7. 1,1 283.25. 4,8 329.13.51,6 325.44.52,2 271.32.42,9 308.23.12,6 259. 3.22,4 305.55. 2,7	735,8 735,3 735,0 735,0 735,0 735,5 735,5	+ 6,1 + 7,0 + 7,7 + 8,1 + 8,2 + 7,6 + 8,2	+ 6,6 + 8,7 + 9,0 + 8,7 + 9,2 + 9,2 + 7,6	-1. 6,5 + 51,4 - 24,5 + 1.33,8 - 52,1 + 3,1 - 0,4 -1.19,2 - 18,5 -2 13,3 - 20,9	32,3 27,0 28,8 33,4 32,9 29,9 26,9 29,5
	Mars, centre	. 5.56.18,31	+ 0,38		305.50.24,0			+ 8,1	- 20,9 -4.26,9	

Le 13, Mire Sud-20P,44. Mire Nord C-17P,99.

27

#### Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS corrigce	BARONÈTRE	THERMO	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	RE.	rieur.	rieur.	0N.	POLE.
	Anonyme	6.48.12,68 6.53.20,58	+ 0,31 + 0,31 + 0,31 + 0,31 - 0,14 - 0,21 - 0,21 - 0,21 - 0,21	- 36,96	302.16.24,8 302.26.51,5 13.17.54,9 302. 4.54,5 302. 2.36,3 263.25.12,5 258.11.50,9 258.10.11,5 258.15.25,8 258.15.25,8	735, <sub>7</sub>	+ 7,6	+ 8,0 + 7,6 + 7,3	- 25,1 - 24,9 +1. 1,2 - 25,3 - 25,4 -1.49,7 -2.19,4 -2.18,9 -2.20,5	32,9
	Lalande 13773  Anonyme.  Lacaille 2655.  Lacaille 2666  δ Gémeaux  α Petit Chien  β Gémeaux  Anonyme  Anonyme	7. 5.26,95 7. 7.57,71 7.10.32,71 7.24.24,46 7.30.50,53 7.35.30,95 7.41. 4,09	- 0,21 - 0,29 - 0,29 - 0,31 + 0,47 + 0,11 + 0,42 - 0,32 - 0,32	- 36,71 - 36,79 - 36,98	258. 2.24,9 252.52. 2,2 302.10. 0,5 312. 7.21,9 285.31.22,9 308.17.44,0 249.47. 5,8 248.43. 2,9	735,8	+ 7,4	+ 6,6	-2.20,5 -3. 6,7 - 25,3 - 14,2 - 48,8 - 18,3 -3.50,1 -4. 9,4	29,0 30,4 30,5
	Anonyme. Anonyme. Lacaille 3127 Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme.	7.53.26,21 7.57.38,45 8. 1.13,79 8. 4.33,77 8.15. 2,97 8.17.47,68 8.22.45,58 8.24.32,37 8.30.24,12	- 0,32 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,22 - 0,22 - 0,22 - 0,22 - 0,37 - 0,36		248.43. 2,9 254.58.15,7 254.40.19,6 254.34. 5,0 254.20.34,2 257. 0.22,8 257.16.22,4 256.54.15,0 256.54.38,7 245.25.34,9 245.47.33,9	735,5	+ 7,1	+ 6,5	-4. 9,4 -2.45,3 -2.48,1 -2.49,1 -2.51,2 -2.28,2 -2.26,3 -2.29,2 -2.29,2 -5.34,1 -5.22,2	
	Lacaille 3521 Lacaille 3525 Lacaille 3614 Anonyme. Lacaille 3692 Lalande 18250 Anonyme. Anonyme. Alonyme. Alonyme. Lalande 18885 Anonyme.	8.40.16,50 8.40.50,84 8.50.29,63 8.53.47,08 9. 1.36,71 9. 6.27,08 9.12.37,17 9.15.51,57 9.19.36,93 9.27.58,58	- 0,36 - 0,36 - 0,25 - 0,25 - 0,27 - 0,22 - 0,22 - 0,04 - 0,22	- 37,03	245.56.17,2 255.41. 0,3 255.33.39,9 253.47.20,2 257.41.22,2 257.36.59,6 257.34.55,2	735,4	+ 6,8	+ 5,4	,	26,5

# Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYEXNE DES VERNIERS corrigee pour le niveau.	BAROMÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	AnonymeLalande 19269AnonymeAnonyme	h. m. s 9.35,23,84 9.41, 4,02 9.46,16,87 9.51,29,24 9.59,46,50 19.38,29,48	- 0,22 - 0,22 - 0,21 - 0,21 + 0,20 + 0,17	- 37,02 - 37,45	257.39.39,4 257.57.29,4 258. 7. 9,3 258.28.11,3	mer.	v	v	-2.24,3 -2.22,2 -2.21,0 -2.18,6	28,5
	α Aigle β Aigleα Céphée β Céphée Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup>	19.42.49,52 19.47.18,55 21.14.19,74 21.26. 1,07 22. 1.22,60	+ 0,17 + 0,15 + 0,13 + 1,34 + 1,94 - 0,10	- 37,52 - 37,41 - 37,14 - 37,14	288.23.42,9 285.57.23,8 341.51. 9,8 349.48.11,5 266. 6.10,0	734,5 734,2 734,2 734,0	+ 5,8 + 6,5 + 6,6 + 7,0	+ 3,4 + 7,2 + 7,4 + 7,8	- 44,5 - 48,5 + 15,0 + 24,9 -1.37,8	30,2 32,0 32,0 35,8
14	4 Soleil, bord 1, sup.  A Petite Ourse S  B Petite Ourse I  Baleine  Persée  Cocher  G Orion	2.50.38,86 2.53.48,05 3.12.59,11 5. 4.58,27	+ 0,03 - 2,59 + 0,09 + 0,84 + 0,74 - 0,05	- 37,55 - 37,60 - 37,75 - 37,81	277.38.15,4 8.24.19,9 25. 7. 0,5 283.25. 3,3 329.13.49,2 325.44.51,3	733,2 732,3 731,4 731,4	+ 7,6 + 8,3 + 9,3 + 9,3	+10,5 +11,3 +12,8 +12,8	-1. 3,2 + 50,7 +1.32,0 - 51,1 + 3,0 - 0,4	30,5 26,6 32,9 30,5 29,0
	B Taureau.  9 B Lièvre.  a Orion  Mars, centre.  d Petite Ourse I  Anonyme.	5.16.10,47 5.21.11,44 5.46.25,21 5.58. 4,53 6.20,15,74	+ 0,42 - 0,20 + 0,14 + 0,37	- 3 <sub>7,79</sub> - 3 <sub>7,85</sub> - 3 <sub>7,83</sub>	308.23.11,9 259. 3.18,1 287.17.30,1 305.49.31,7 13.17.55,3 302. 4.54,7	7 <sup>30</sup> ,9 7 <sup>30</sup> ,8 7 <sup>30</sup> ,9 7 <sup>30</sup> ,9	+ 8,9 + 8,9 + 8,7 + 8,6	+10,0 + 9,4 + 8,0 + 8,8 + 9,4	- 17.9 -2.11.6 - 45.3 - 20.8 +1. 0.4 - 25.0	29,4 30,3 32,4
	Anonyme.  α Grand Chien.  γ Aigle.  α Aigle.  β Aigle  Mercure, bord 2, ctr	6.29.51,35 6.37.54,92 19.38.28,66 19.42.48,74 19.47.17,54	+ 0,31 - 0,14 + 0,17 + 0,15 + 0,13 - 0,11	- 37,74 - 38,29 - 38,32 - 38,44	302. 2.36,2 263.25. 9,6 290.10. 9,7 288.23.41,3 285.57.21,4 266.28.27,1	731,0	+ 8,7 + 6,6 + 7,6	+ 9,0 + 9,0 + 3,6 + 3,7 + 3,8 + 6,3	- 25,1 -1.48,3 - 41,4 - 44,2 - 48,2 -1.36,3	34,1 28,8 28,9 29,9
I	5 Soleil, bord 1, inf. α Petite Ourse S. α Bélier. α Cocher. β Orion	1. 3.27,04 1.58. 3,93 5. 4.57,51 5. 6.41,01	+ 0,74	- 38,41 - 38,54 - 38,67 - 38,61	277.29.37,4 8.24.21,3 302.39.46,2 325.44.51,7 271.32.45,0	729,4 728,8 728,4 729,1	+ 8,1 + 8,8 + 9,2 + 7,1	+ 7,7 + 9,4 + 9,2 + 3,9	-1. 3,8 + 50,8 - 24,2 - 0,4 -1.20,0	32,3 26,8 29,5 28,2
	β Taureau	. 5.46.24,35 19.38.28,00 19.42.48,06	+ 0,14 + 0,17 + 0,15	- 38,67 - 38,98 - 38,99	288.23.41,5	729,6	+ 6,4	+ 3,2	- 46,0 - 42,0 - 44,8 - 48,9	29,8 29,5 28,5 35,3

29

Observations faites à la lunette méridienne en Mars 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERM Inté-	OMĖTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
_		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.		ricur.	rieur.	, i	POLE.
	α Céphée β Céphée Mercure, bord 2,c <sup>tre</sup>	h. m. s 21.14.18,20 21.25.59,85 22.11.57,28	+ 1,34 + 1,94 - 0,10	s. - 38,75 - 38,44	341.51. 8,5 349.48. 9,5 266.52. 3,3	728,2 728,2 727,7	+ 4,2 + 4,3 + 4,6	+ 0,t + 0,3 + 0,9	+ 16,3 + 25,4 -1.36,5	30,5 34,9
1 (	Soleil, bord 1, sup. a Petite Ourse S	23.41.58,11	+ 0,04		278.25.33,3 8.24.22,4	727,0 726,2	+ 5,2 + 5,9	+ 3,4 + 4,0	-1. 2,5 + 51,7	34,6
2:	Soleil, bord 1  bord 2  a Petile Ourse S	o. 3.45,59 o. 5.54,55 i. 3.27,35	+ 0,06							
	δ Petite Ourse I  α² Gémeaux  α Petit Chien  β Gémeaux	6.20, 9,06 7.24.17,58 7.30.43,41 7.35.24,07	+ 0,41 + 0,10 + 0,36	- 43,48 - 43,75 - 43,76						
2	Soleil, bord 1 bord 2  a Petite Ourse S b Petite Ourse I	0.21.51,61 0.24. 0,43 1. 3.21,01 6.20. 7,66	+ ,0,07							
	Lune, bord 1	12.30. 0,61 13. 4. 5,87 13.16.31,40	+ 0,04	- 47,82						1
	η Grande Ourse α Bouvier	13.40.50,65	+ 0,74 + 0,25	- 47,59 - 47,61						
28	δ Petite Ourse I	5.46.14,57	+ 0,12	- 48,23 - 48,05						
۱	α <sup>2</sup> Gémeaux β Gémeaux	7.24.12,89° 7.30.38,85 7.35.19,53	+ 0,41	- 48,25 - 48,21						
	α Hydre α Lion	9.19.25,57 9.59.35,14	- 0,03 + 0,17	- 48,24 - 48,31						
	Soleil, bord τ bord 2 α Petite Ourse S	1. 3.18,60	+ 0,08							
3	Soleil, bord 1 bord 2	0.34.51,51	+ 0,08							
	β Petite Ourse I α Taureau	1 1 10 10 10	+ 0,21	- 49,27   - 49,75						

Le 20, le niveau du cercle a été enlevé pour cause de réparation; il a été replacé le 3 Avril.

Le 22, Mire Sud-21,33. Mire Nord B+6,57. Mire Nord D-47,62.

Le 28, Mire Sud-22P,03.

Le 30, Mire Sud-23°,26. Mire Nord B+5°,00. Mire Nord C-12°,80. Mire Nord D-45°,83.

30
Observations faites à la lunette méridienne en Mars et Avril 1850.

IOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE	THERMO	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	δ Petite Ourse I α Gémeaux β Gémeaux	h. m. s. 6.20. 7,46 7.24.11,08 7.30.37,19 7.35.17,67	ment.  + 0,41 + 0,10 + 0,36	pendule.  - 49,82 - 49,86 - 50,01	0 / //	nim.	rieur.	rieur.	, ,,	"
3	α Taureau	4.26.25,18 5.46. 9,63 6.20. 7,66 6.36.49,59 7.24. 7,72 7.30.33,85 7.35.14,43 9.19.20,61 9.27.42,18 9.40.47,98 9.59,30,06 10.53,32,73 10.58.37,31 11. 3.21,07	+ 0,27 + 0,15 + 0,42 + 0,54 + 0,12 + 0,47 - 0,26 - 0,26 + 0,22 + 1,57 + 0,37 + 0,37	- 52,95 - 53,04 - 52,97 - 53,11 - 53,06 - 53,14 - 53,28 - 52,84	287,21,46,7 13,22,14,3 305,19,50,6 312,11,39,0 285,35,39,8 308,22,0,6 271,59,43,0 258,1,41,5 29,241,8,9 342,32,7,8 302,50,47,1 302,51,11,3	722,5 722,6 722,8 723,1 723,4 723,4 723,3 723,2 723,1	+10,8 +10,8 +10,9 +10,9 + 9,6 + 9,5 + 9,1 + 9,0 + 8,8	+13,5 +13,2 +12,7 +11,0 +10,8 + 9,7 + 9,0 + 8,8 + 9,7 + 7,7	- 43,9 + 58,9 - 20,9 - 13,8 - 47,2 - 17,7 -1.16,6 -2.17,8 -2.17,7 - 36,7 + 16,4 - 24,1 - 24,1	48,2 49,9 45,3 48,8 46,5 42,5 47,5 48,0
11.7	Anonyme	10.53.30,10 10.58.35,31 11. 3.19,35 11.21.52,28 11.26.17,73 11.40.30,14 11.45.21,69 11.47.46,05	+ 1,77 + 0,41 + 0,41 + 1,63 + 1,55 + 0,29 + 2,07 + 2,07	- 55,23 - 54,96	342.32. 2,7 302.50.43,5 302.51. 6,2 340.30. 9,6 339. 0.28,4 295.23.40,8 346. 1.45,1	729,7	+ 9,3	+ 6,5 + 6,4 + 7,2 + 6,8	+ 16,6 - 24,4 - 24,4 + 14,4 + 12,9 - 33,6 + 20,4	36,7
	Anonyme. Anonyme. 4 Dragon. 6 Dragon.      Petite Ourse I.      Vierge.	12.10.44,00 12.14.56,80 12.22.35,23 12.27.26,17 13. 4.11,62 13.16.24,16	+ 2,67 + 2,44 + 2,44 + 2,53 + 2,64	- 55,19	349.22. 7,0 349.19.47,2 350. 0.20,1 350.49.18,2 11.27.11,7 269.37 27,7	729,4 729,3 729,2	+ 8,9 + 8,3 + 8,3	+ 5,6 + 5,4 + 5,4	+ 24,2 + 24,2 + 25,0 + 26,0 + 57,2 -1.25,7	42,4 45,8
	AnonymeAnonymeAnonymeLalande 1926gAnonymeAnonyme.	9.31. 8,96 9.35. 4,44 9.40.45,04	- 0,30 - 0,30 - 0,30 - 0,30 - 0,30 - 0,29		257.59.35,4 257.43. 2,2 257.43.39,9 258. 1.33,1 258.13.48,9 258.32.16,1	727,7	+ 9,9	+ 9,8	-2.18,2 -2.20,3 -2.20,5 -2.18,6 -2.17,2 -2.15,2	

31

Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1850.

	1									
JC	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	OMÈTRE .	RÉFRACTION	LIEU
JOURS		зu	-		corrigée		-	D.	ACI	du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.		Inté-	Exté- rieur.	NO.	POLE.
L							rieur.	rieur.		
		h. m. s.	s.	S.	0 1 11	mm.	0	. 0 1	1 11	2 //
	α Lion	9.59.27,38	+ 0,24	- 55,90	292.41. 1,0	727,7	+ 9,7	+ 8,3	- 37,0	39,1
	Anonyme	10.53.29,55	+ 1,77	- 55,76	342.32. 6,3 302.50.43,9	727,6	+ 9,7	+ 7,2	+ 16,5	45,9
П	Anonyme	11. 3.18,19	+ 0,41		302.51. 6,9				- 24,3	
	Anonyme	11. 6.30,16	+ 1,17		331.25.58,2	727,4	+ 9,7	+ 7,5	+ 5,2	
ш	Anonyme	11.21.51,59	+ 1,63		340.30. 9,2	7 - 2 1 +	. 37	1 //	+ 14,1	
	Anonyme	11.26.16,78	+ 1,55		339. 0.27,7			+ 6,9	+ 12,8	,
	3 Lion	11.40.29,12	+ 0,29	- 55,98						
	Anonyme	11.45.20,53	+ 2,07		346. 1.49,1				+ 20,3	
	Anonyme	11.47.44,93	+ 2,07		346. 3. 8,6	727,4	+ 9,6	+ 7,8	+ 20,3	
	Anonyme	12.10.43,22	+ 2,44		349.22. 2,7			1	+ 24,1	
	Anonyme	12.14.55,74	+ 2,44		349.19.48,4 350. 0.20,7				+ 24,1	
	4 Dragon	12.22.34,37	+ 2,55		350. 49.18,7	727,3	+ 9,3	+ 5,2	+ 24,9	
	α Petite Ourse I	13. 4. 7,59	1 104		11.27.16,1	727,1	+ 9,2	+ 5,5	+ 57,1	46,5
	α Vierge	13.16.23,26	- 0,11	- 56,10	269.37.25,9	727,0	+ 9,2	+ 5,5	-1.25,4	46,3
				,	3-7-2-73	/-/,-	. 3,-	1 - 7-	******	
8	α <sup>2</sup> Gémeaux	7.24. 3,52	+ 0,60	- 57,02	312.11.34,9				- 13,7	41,1
	α Petit Chien	7.30.29,58	+ 0,13	- 57,25	285.35.36,6	718,6	+11,0	+11,0	- 46,9	45,8
	α Hydre		- 0,07	- 57,42			,			
	Lalande 18885	9.27.37,64	- 0,30		257.59.32,3	718,9	+10,4	+10,4	-2.16,2	
	Anonyme 8-22°17'		- 0,30		-= /2/-C				0	
	Anonyme Lalande 19269	9.40.43,24	- 0,30 - 0,30		257.43.40,6 258. 1.31,5				-2.18,2 -2.16,2	
	Anonyme	9.46.38,22	- 0,30		258.13.48,6			1	-2.14,9	
	Anonyme	9.50.45,38	- 0,30		258.24. 2,9				-2.13,q	
	Anonyme 8-21°28'	9.51. 8,54	- 0,30		2,9				2,10,9	
	α Lion	9.59.25,62	+ 0,24	- 57,64	292.41. 1,6	719,1	+10,5	+ 9,5	- 36,5	40,1
	α Grande Ourse	10.53.27,89	+ 1,77	- 57,38	342.32. 8,2	719,0	+10,5	+ 8,8	+ 16,2	47,0
	Anonyme	10.58.32,83	+ 0,41		302.50.42,4				- 23,8	
	Anonyme	11. 3.16,53	+ 0,41		302:51. 9,3			+ 8,5	- 23,8	
	Anonyme	11.21.49,81	+ 1,63		340.30.15,2			+ 8,5	+ 14,1	1
	Anonyme	11.26.15.08	+ 1,55		339. 0.28,9	0	1.01	101	+ 12,5	
	Anonyme  3 Lion	11.28.56,37	+ 1,77	- 57,56	342.26.15,7	718,9	+10,4	+ 9,4	+ 16,1	
	Anonyme	11.45.18,77	+ 0,29	- 5/,50	346. 1.49,3				+ 19,9	
	Anonyme	11.47.43,43	+ 2,07		346. 3. 6,0	718,9	+10,3	+ 8,6	+ 20,0	1
	Anonyme	12.10.41,70	+ 2,44		349.22. 5,7	7-019		+ 8,8	+ 23,7	
	Anonyme	12.14.54,54	+ 2,44		349.19.48,6				+ 23,6	
	4 Dragon	12.22.32,59	+ 2,53		350. 0.21,7				+ 24,5	
	6 Dragon	12.27.23,77	+ 2,64		350.49.20,0			+ 8,1	+ 25,4	
	α Petite Oursc 1	13. 4. 6,66			11.27.16,8	719,0	+10,1	+ 7,7	+ 55,9	45,2

Le 6, Mire Sud-19,91. Mire Nord B+6,88. Mire Nord C-15,97. Mire Nord D-49,37. Le 8, Mire Sud-21,03.

32

Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1850. CORRECTION MOYENNE PASSAGE CONCLU BAROMETRE THERMOMÈTRE LIEU NOM 100 DES VERNIERS du DES ASTRES. corrigée l'instrula Inté-Exté-Fil Méridien. POLE. pour le niveau. ment. pendule. rieur. rieur. mm. α Vierge..... 13.16.21,76 269.37.22,3 - 0,11 -57,62719,0 +10,1 + 7,7 -1.23,8 42,5 10 Soleil, bord 1, inf. . 1.12.40,99 + 0,19 287.38. 9,0 + 9,8 +9,5- 43,7 716,1 11 Soleil, bord 1, sup. 1.16.20,96 288.32.13,5 +15.4 + 0,20 719,5 +10,6 -41.6α Taureau . . . . . . 4.26.18,82 + 0,30 - 59,18 α Cocher ...... 5. 4.36,02 325.49. 2,7 + 0,96 -59,170,4 42,3 B Orion ...... 5. 6.20,14 271.36.55,6 +13,0 +16,0 - 0,08 -59,11719,0 -1.15,5 42,1 B Taureau..... 5.15.48,39 - 59,30 +15,9 + 0.53308.27.22,3 +13,3 41,3 719,0 - 17,2 α Orion ..... 5.46. 3,41 + 0,16 -59,12287.21.42,5 +13,5 +15,5 - 43,4 44,3 719,0 & Petite Ourse I... 6.20. 6,10 α Grand Chien.... 6.37.33,14 263.29.16,5 718,8 - 0,20 - 59,03 +13,4 +14,9 -1.44,245,0 Mars, centre..... 6.53.41,05 304.54.53,9 718,8 + 0,40 +13,4 +14,6 - 21,0 α ? Gémeaux . . . . . 312.11.36,0 42,3 7.24. 1,26 + 0,50 -59,22718,7 +13,1 +14,4 13,5 α Petit Chien . . . . + 0,13 -59,23285.35.33,8 7.30.27,57 - 46,4 43,4 B Gémeaux..... 7.35. 8,19 + 0,53 308.21.55,7 +14,3 - 59,09 - 17,4 41,6 Anonyme..... 8.17.25,15 -0.31257.20.27,5 718,6 +12,2 +13,3 -2.19,3 Lacaille 3521.... 8.39.53,94 245.58.48,3 - 0,51 +12,1 718,8 +12,4 -5.2,0Lacaille 3525.... 8.40.28,24 -0,51Lacaille 3614.... 8.50. 6,81 **- 0,33** 255.45. 1,9 +10,7 -2.32,9 Anonyme..... 8.53.24,67 - 0,33 255.37.42,8 -2.33,9 +11,9 +10,7 718,9 Lalande 18250.... 9. 6. 4,37 - 0,30 257.45.19,6 +10,8 -2.17,6 Anonyme. . . . . . . 9.12.14,41 - 0,31 257.41. 0,0 -2.18.0 Anonyme..... 9.15.28,99 -0.31257.38.59,8 -2.18,1 α Hydre..... +11,6 38,2 9.19.14,55 - 59,10 271.58.58,1 +11,8 -1.15,6- 0,07 719,0 Lalande 18885 .... 9.27.36,00 - 0,30 257.59.30,4 -2.15,7Anonyme..... 9.31. 5,35 257.43. 9.4 - 0,30 -2.17,7 Anonyme..... - 0,30 257.43.38,9 9.35. 1,11 -2.17,7 -2.15,8Lalande 19269... 9.40.41,58 - 0,30 258. 1.33,5 Anonyme..... 9.46.36,62 - 0,30 258.13.44,8 -2.14,5Anonyme. . . . . . . 9.50.43,64 - 0,30 258.24. 6,2 -2.13,4 Anonyme 8-21028' 9.51. 6,78 - 0,30 α Lion. . . . . . . . . -. 59,27 9.59.23,96 + 0,24 292.41. 1,5 +11,6 +10,5 -36,340,0 719,2 α Petite Ourse S. . . 1. 2.57,27 8.28.23,3 +11,3 +11,8 + 49,8 721,2 41,9 12 Soleil, bord 1, inf.. + 0,18 42,5 1.20. 0,12 288.22.11,1 721,2 +11,6 +11,7

Le 10, Mire Sud-219,50. Mire Nord B+89,62. Mire Nord C-139,96. Mire Nord D-479,93. d-69,92.

Nadir 146°10'37",73.

 $|\alpha|$  Taureau . . . . . . | 4.25.16.78 | + 0.30 | - 61.19 | 296.11.12.3 | 727.3 | +11.7 | +13.9 | - 31.6 | 39.2 |

308.14.30,5

294.20. 5,0

728,1

+10,9

+11,1

18,0

34,4

38,2

41,8

Le 11, Mire Sud-22P, 19. Mire Nord B+7P,54. Mire Nord C-13P,49. Mire Nord D-47P,33.

- 60,97

- 61,31

+ 0,52

+ 0,28

+ 0,18

13 a Andromède....

14 Soleil, bord 2....

y Pégase.....

23.59.36,13

0. 4.28,57

1.29.30,74

33
Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1850.

TOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONĖTRE	THERM Inté-	OMĖTRE   Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
II_		THE MEHICIE.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.		TOLL.
	β Taureau	5.15.46,24 9.12.12,35 9.19.12,17 10.53.23,91 10.58. 4,61	+ 0,53 - 0,31 - 0,07 + 1,77 + 0,16	- 61,41 - 61,43 - 61,22	308.27.22,3 257.41. 4,3 271.58.59,4 342.32. 5,8 287.29.45,2	727,3 726,9 726,7	+12,1 +10,7 +10,3	+13,2 + 8,9 + 8,1	- 17,6 -2.20,7 -1.17,2 + 16,4 - 44,8	37,9 43,5
	Groombridge 1745. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. B Lion Anonyme. Anonyme. Anonyme.	11. 2.25,65 11. 6.24,47 11.12.29,88 11.16.44,11 11.21.46,09 11.26.11,22 11.28.52,30 11.40.23,64 11.47.39,65	+ 0,89 + 1,17 + 1,56 + 1,56 + 1,55 + 1,77 + 0,29 + 2,07 + 2,07	- 61,43	323.38. 6,1 331.25.53,2 331.29. 8,2 339. 6. 1,7 340.30. 8,4 339. 0.29,0 342.26.14,8 295.23.42,1 346. 1.51,6 346. 3. 8,6	726,5 726,5	+10,3	+ 7,0	- 2,5 + 5,2 + 5,2 + 12,9 + 14,3 + 12,8 + 16,4 - 33,5 + 20,3 + 20,3	37,3
	Anonyme \$\frac{1}{9}\cdot 24' Anonyme	12.10.37,60 12.14.50,66 12.22.29,11 12.27.19,91 13. 4. 6,92	+ 2,44 + 2,44 + 2,53 + 2,64		349.19.47,5 350. 0.21,0 350.49.17,7 11.27.15,7	726,3 726,0	+10,1 +10,0	+ 6,4 + 6,5	+ 24,1 + 24,9 + 25,8 + 56,7	42,8
17	α Hydre	9.19.10,39	- 0,07	- 63,17	271.58.58,3	725,4	+10,6	+ 8,2	-1.17,1	36,9
18	α Andromède α Petite Ourse S	23.59.32,97 1. 2.53,67	+ 0,52	- 64,22	308.14.32,5	733,5	+10,5	+10,8	- 18,1	40,1
19	Soleil, bord 1, inf  a Cocher  3 Orion  Taurcau  a Orion	1.45.47,61 5. 4.30,70 5. 6.14,63 5.15.43,07 5.45.57,89	+ 0,22 + 0,96 - 0,08 + 0,53 + 0,16	- 64,34 - 64,51 - 64,50 - 64,52	290.51.36,0 325.48.59,5 271.36.55,9 308.27.21,0 287.21.37,0	733,1 732,7 732,7 732,8	+11,5 +12,4 +12,4 +12,7	+11,8 +14,1 +14,4 +14,4	- 39,5 - 0,4 -1.17,5 - 17,6 - 44,4	39,9 39,8 39,5 37,5
	Petite Ourse I  α³ Gémeaux  α Petit Chien  β Gémeaux  γ Gémeaux  Lune, bord 1, sup.  α Cancer	6.20. 5,38 7.23.56,14 7.30.22,15 7.35. 2,59 7.43.13,50 8.20.14,90 8.49.12,16	+ 0,60 + 0,13 + 0,52 + 0,50 + 0,33 + 0,23	- 64,17 - 64,52 - 64,55	312.11.34,6 285.35.35,1 308.21.54,4 307. 7.50,5 297.38. 9,5 292.25.17,5	732,6 732,6 732,6 732,6	+12,5 +12,5 +12,2 +12,1	+13,4 +13,4 +12,7 +12,5	- 13,8 - 47,4 - 17,8 - 19,1 - 30,2 - 37,1	40,5 43,4 39,7
	Lalande 18250 Anonyme Anonyme Anonyme a Hydre	9. 5.59,27 9.12. 9,23 9.15.23,70	- 0,31 - 0,31 - 0,31 - 0,07	- 64,44	257.45.24,2 257.40.58,9 257.39, 4,6	732,7	+12,0	+11,9	-2.19,7 -2.20,3 -2.20,6 -1.17,1	

Le 19, Mire Sud-221,92. Mire Nord B+10,33. Mire Nord C-111,61. Mire Nord D-44,40. Niveau-11,00.

34 Observations faites à la lunette méridienne en Avril 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYEXXE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO	DNÉTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Lalande 18885 Anonyme Lalande 19269 Anonyme &-21°28'  \alpha Lion Grande Ourse Weisse, X, 1069 Anonyme	9.34.55,83	s. - 0,30 - 0,31 - 0,31 - 0,31 - 0,30 + 0,24 + 1,77 + 0,16 + 1,17	- 64,48 - 64,29	257.59.35,3 257.35.28,3 257.43.40,8 258. t.35,8 292.41. 3,3 342.32. 4,9 287.29.51,5 331.26. 0,1	732,6 732,5	+11,9	+10,8 +10,6 + 9,9	-2.18,4 -2.21,3 -2.20,3 -2.18,3 -37,0 + 16,5 -44,9 + 5,2	40,6 41,6
	Anonyme. Anonyme. Anonyme. 3 Lion. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. 4 Dragon. 6 Dragon.  2 Petite Ourse I.	12.27.16,22	+ 1,56 + 1,55 + 1,76 + 0,29 + 2,06 + 2,07 + 2,38 + 2,53 + 2,64	- 64,48	339.13.59,6 339. 0.29,7 342.26.17,9 295.23 43,5 345.51.43,4 346. 3.11,4 348.52.35,2 350. 0.21,8 350.49.19,8	732,6 732,6 732,6 732,6 732,5	+11,1 +11,0 +10,9 +11,0	+ 8,2 + 9,0 + 8,8 + 7,6 + 7,3	- 33,6 + 20,1 + 20,3 + 23,5 + 24,9 + 25,9 + 57,1	38,1
22	Anonyme Anonyme Anonyme  A Petite Ourse S	13.26.48,00	+ 2,89 + 2,91 + 2,90		352.25. 6,8 352.32.21,0 352.28.44,8 8.28.19,1	732,4	+10,8	+ 7,0	+ 27,9 + 28,0 + 28,0 + 50,7	41,8
23	Soleil, bord ι	9.19. 6,51	+ 0,24 + 0,30 - 0,07 + 0,27	- 66,96 - 66,97 - 67,29	296.11. 9,4 271.59. 0,7 294.22.59,5	727,1 727,2 726,4	+10,6 + 9,8 + 8,7	+ 9,8 + 7,7 + 7,0	- 32,t -1.17,6 - 34,8	36,5 38,8 34,4
24	Soleil, bord 1, inf  α Pégase  α Andromède  α Cassiopée  α Petite Ourse S	23.59.29,39	+ 0,24 + 0,27 + 0,52 + 1,35	- 67,90 - 67,91 - 67,90	292.33. 2,7 294.23. 2,1 308.14.30,9 335.41.10,0 8.28.19,9	726,9 729,7 729,4 729,1 729,1	+10,6 + 9,0 + 9,3 + 9,5 + 9,6	+11,5 + 8,0 + 8,9 + 9,2 + 9,3	- 36,8 - 34,8 - 18,1 + 9,4 + 50,9	37,0 38,9 41,3
25	Soleil, bord 1, sup. α Taureau α Cocher β Orion β Taureau	4.26. 9,86 5. 4.27,02 5. 6.11,12	+ 0,26 + 0,30 + 0,96 - 0,08 + 0,53	- 68,03 - 67,96 - 67,96 - 68,22	293.24.35,3 296.11. 9,2 325.49. 1,4 271.36.57,2 308.27.21,1	728,5 727,2 726,8 726,8	+10,1 +10,4 +10,5 +10,5	+ 9.9 +10.6 +10.6	- 0,3	35,7 42,7 40,1 40,2

Le 23, Mire Sud-22P,12. Mire Nord B+8P88. Mire Nord D-46P,57. Le 25, Mire Sud-24p,00. Mire Nord B+9p,43. Mire Nord C-12p,16. Mire Nord D-46,02. Niveau-1p,22. d-6,21. Nadir. 146,10/36",70.

35

# Observations faites à la lunette méridienne en Avril et Mai 1850.

Sanor	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	DUĖTRE	RÉFRACTION	LIEU du
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	α Orion δ Petite Ourse I	6.20. 5,60	+ 0,16	- 68,03	0 / // 287.21.38,2	726,5	+10,8	+10,3	- 44,6	38,3
29	Soleil, hord 1, sup. α Cassiopée α Petite Ourse S	2.23.14,04 0.31.48,86 1. 2.51,56	+ 0,28 + 1,35	- 70,41	294.40.54,» 335.41.12,7 8.28.14,7	727,1 727,0 726,9	+ 9,5 + 9,2 + 9,4	+ 8,8 + 8,2 + 7,6	- 34,2 + 9,4 + 51,0	44,8 39,7
30	Soleil, bord 1, inf  A Hydre  C Lion  Grande Ourse  Anonyme  Groombridge 1745.  Anonyme	2.27. 1,18 9.19. 2,55 9.59.12,14 10.53.13,81 10.57.39,57 11. 2.15,95 11. 5.49,36	+ 0,28 - 0,07 + 0,24 + 1,77 + 0,37 + 0,89 + 1,07	- 70,82 - 70,84 - 70,87	294.27.42,7 271.59. 3,4 292.41. 7,9 342.32.11,8 299.55.32,7 323.38. 1,7 328.16.27,2	726,5 725,4 725,4 725,6	+ 9,8 + 9,8 + 9,6 + 9,5	+10,0 + 7,7 + 7,5 + 5,6	- 34,3 -1.17,4 - 37,0 + 16,5 - 27,6 - 2,5 + 2,1	41,5 44,5 46,4
	AnonymeAnonymeAnonymeAnonymeB LionAnonyme	11.17.56,48 11.22.17,70 11.26. 1,03 11.28.17,41 11.40.13,96 11.44.11,03	+ 1,53 + 1,56 + 1,55 + 1,58 + 0,29 + 2,06	- 71,00	338.32.36,8 339.14. 0,5 339. 0.33,2 339.36.18,3 345.51.48,5	725,6	+ 9,1	+ 5,2	+ 12,4 + 13,1 + 12,9 + 13,5 + 20,2	
	Anonyme	11.47.29,31 12.15.17,87 12.22.19,01 12.27. 9,67 13. 4. 5,83	+ 2,07 + 2,38 + 2,53 + 2,64 + 2,89 + 2,91		346. 3.12,3 358.52.32,4 350. 0.28,8 350.49.27,1 11.27.21,3 352.25.12,0 352.32.26,7	725,4 725,3 725,4 725,4	+ 9,0 + 8,7 + 8,9 + 8,7	+ 4,6 + 5,6 + 5,3 + 5,3	+ 20,5 + 23,6 + 24,9 + 25,9 + 56,9 + 27,8 + 28,0	44,1
	Anonyme n Grande Ourse		+ 2,90	- 70,90	352.28.50,5 330. 2.26,7	725,4	+ 8,7	+ 4,8	+ <sup>27,9</sup> + <sup>3,8</sup>	40,0
83	Soleil, bord 1, inf  3 Taureau  4 Orion  4 Hydre  5 Lion  6 Anonyme  6 Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme	5.15.35,11 5.45.49,83 9.19. 0,89 9.59.10,46 10.57.40,50 11.2.14,35 11.5.48,06 11.12.17,83 11.17.54,46		- 72,34 - 72,44 - 72,44 - 72,48	295.21.42,2 308.27.21;0 287.21.40,8 271.59. 2,0 292.41. 8,8 300. 5.18,3 323.38. 8,6 328.16.27,9 331.29.12,2 338.32.39,1 339.14. 0,0		+ 8,2	+ 7,1 + 7,8 + 7,8 + 6,6 + 6,4 + 6,0	- 33,7 - 18,0 - 45,3 -1.18,3 - 37,5 - 27,5 - 2,5 + 2,1 + 5,3 + 12,5 + 13,2	40,1 39,7 39,1 44,4

Le 3, Mire Sud-24P,08. Niveau-1P,75.

36

#### Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1850.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE	THERMO	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	Anonyme	h. m. s. 11.28.15,50 11.40.12,16 11.44. 9,67 11.47.27,57 12.15.16,15	ment.  5.  + 1,58  + 0,29  + 2,06  + 2,07  + 2,38	pendule.	339.36.18,6 295.23.43,9 345.51.47,6 346. 3.14,7 348.52.35,5	731,0 731,0	rienr. + 7,6 + 7,4 + 7,3	rieur. + 4,7 + 4,6 + 4,6	+ 13,6 - 34,0 + 20,4 + 20,6 + 23,9	36,7
	4 Dragon	12.22,17,06 12.25,49,82 13. 4. 0,90 13.17,45,18 13.26,40,01 13.36. 4,40 13.40.25,59	+ 2,53 + 2,55 + 2,89 + 2,91 + 2,90 + 1,12	- 72,47	350. 0.29,4 350.35.22,8 11.27.22,7 352.25.12,5 352.32.26,3 352.28.50,0 330. 2.30,0	730,9 730,9 730,9	+ 7,1 + 6,7 + 6,7 + 6,6	+ 4,4 + 4,2 + 4,2 + 3,6	+ 25,2 + 25,9 + 57,6 + 28,2 + 28,3 + 28,3 + 3,9	45,5
	α Andromède α Cassiopée α Petite Ourse S Soleil, bord 1, sup.	23.59.24,64 0.30.46,76 1. 2.52,66	+ 0,52 + 1,35 + 0,30	- 72,47 - 72,87 - 72,64	308.14.31,8 335.41.10,8 8.28.14,3	729,7 729,6 729,4 728,5	+ 7,0 + 7,1 + 7,2 + 8,2	+ 6,1 + 6,2 + 6,1 + 8,6	- 18,3 + 9,5 + 51,5	39,3 44,5 40,7
	B Taureau  A Petite Ourse I  Anonyme  Anonyme	5.15.34,45 13. 4. 2,35 13.17.42,88 13.25.37,73	+ 0,53 + 3,30 + 3,32	- 72,99	308.27.21,5 11.27.23,1 352.25.15,0 352.32.26,5	726,7	+ 8,7	+10,5 +10,7 +11,2	- 17,8 + 55,3 + 27,0 + 27,1	40,9 42,8
	Anonyme  n Grande Ourse  Anonyme  Anonyme  Bouvier	13.40.23,73 13.47.18,94 13.52.31,82	+ 3,31 + 1,26 - 0,31 - 0,32 + 0,41	- 74,17 - 74,34	352.28.52,4 330. 2.28,2 259.58.33,7 259.36.33,0 299.56.59,0	7184	+11,4	+11,3	+ 27,0 + 3,7 -2. 3,5 -2. 5,7 - 27,0	39,8 38,0
	7 α Petite Ourse S α Lion α Grande Ourse Anonyme	9.59. 7,36 10.53. 8,93	+ 0,27 + 2,02 + 1,78	- 75,48 - 75,24	8.28.18,3 292.41. 4,7 342.32.10,9 339.14. 1,2	721,5 722,4 722,6	+11,6 +12,2 +11,8	+13,6 +11,2 +10,2	+ 49,6 - 36,4 + 16,2 + 12,8	43,9 41,3 44,1
	Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme.	11.28.12,30 11.40. 9,28 11.44. 6,57 11.47.24,57 12. 9.39,40	+ 1,80 + 0,32 + 2,34 + 2,36 + 2,82	- 75,58	339.36.19,6 295.23.43,8 345.51.42,8 346. 3.13,6 349.36.14,9 348.52.37,3	722,7	+11,7	+ 9,9	+ 13,2 - 32,9 + 19,8 + 20,0 + 24,0 + 23,2	37,2
	Anonyme	12.22.14,01	+ 2,72 + 2,89 + 2,98		348.52.37,3 350. 0.27,8 350.35.21,6 11.27.22,8	722,7	+11,3		+ 24,5 + 25,2	42,9

Le 4, Mire Sud-25P,07. Mire Nord B+13P,44. Mire Nord C-10P,37. Mire Nord D-43P,47. Le 8, Mire Sud-26P,39.

37

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1850.

TOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	CORR l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÉTRE	THERM Inté-	OMĖTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
1		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	55	rieur.	rieur.	)N.	rule.
	Anonyme	h. m. s. 13.17.42,00 13.25.36,71	+ 3,30 + 3,32	s.	352.25.13,5 352.32.27,3	nın.	0	0	1 " + 27,5 + 27,6	"
	Anonyme  n Grande Ourse	13.36. 0,76	+ 3,31	- 75,58	352.28.51,8 330, 2.31,8	722,7	+11,1	+ 7,2	+ 27,6	43,0
	Anonyme	13.47.17,80	- 0,31	70,00	259.58.35,6	1,227	1	1 /7-	-2.5,7	
	α Bouvier	14. 7.34,66	+ 0,41	- 75,59	299.56.59,7	722,7	+10,7	+ 7,6	- 27,5	37,9
IC	Soleil, bord 1, sup.	3. 5.25,28 0.30.42,40	+ 0,36 + 1,54	- 77,03	297.50.35,0 335.41. 8,1	728,2	†12,2 †10,5	+12,4	- 29,8 + 9,4	41,5
	α Petite Ourse S	1. 2.46,56	1 -7	77,50	8.28.12,1	732,7	+10,7	+10,5	+ 50,9	39,8
11	Soleil, bord I, inf	3. 9.18,60	+ 0,36		297.34.18,5	732,4	+12,0	+12,4	- 30,3	10
	α Cassiopée α Petite Ourse S	0.30.41,68	+ 1,54	- 77,79	335.41. 9,7 8.28.16,0	729,9	+11,4	+11,8	+ 9,3 + 50,4	43,1
Ш	3 Petite Ourse I	2.50. 1,28	- 3,83	- 78,11	25.10.56,7	729,1	+12,4	+14,6	+1.31,1	38,5
12	Soleil, bord 1, sup.	3.13.12,76	+ 0,38	0	298.21.24,5	728,9	+12,7	+14,9	- 28,7	15.0
Ш	3 Taureau	5.15.29,25	+ 0,60	- 78,09 - 78,13	308.27.20,8 287.21.41,6	728,0	+12,7	+15,9	- 17,4 - 43,7	40,9
	α Grand Chien	6.37.13,86	- 0,24	- 77,89	263.29.22,8	727,6	+12,7	+17,3	-1.44,6	48,0
	B Lion	11.40. 6,56	+ 0,32	- 78,26	295.23.43,8				- 32,8	36,9
	Anonyme	11.44. 3,23	+ 2,34		345.51.50,9	727,8	+12,9	+12,9	+ 19,7	
Ш	a Petite Ourse I	13. 4. 6,94	+ 2,36		346. 3.15,9	727,9	+12,8	+12,8	+ 19,9	42,7
	α Vierge	13.16. 1,08	- 0,12	- 78,37	269.37.22,4	7280	+12,8	+12,2	-1.23,4	43,6
Ш	α Andromède	23.59.19,05	+ 0,59	- 78,62	308.14.32,8	726,9	+12,0	+13,8	- 17.8	40,9
	γ Pégaseα α Cassiopée	0.30.40,90	+ 0,30	- 78,74 - 78,60	294.20. 8,9 335.41. 9,0	726,9	+12,4	+14,3	+ 9,2	44,3
	a Petite Ourse S	1. 2.44,66	T 1,54	- 70,00	8.28.15,9	726,7	+12,9	+14,8	+ 9,2	42,8
	3 Petite Ourse I	2.50. 0,79	- 3,83	- 78,58	25.10.56,5	726,2	+14,2	+17,2	+1.29,9	37,4
13	Soleil, bord 1, inf	3.17. 7,12	+ 0,38		298. 4.42,4	726,0	+14,3	+17,8	- 28,9	
14	α Orion	5.45.42,61	+ 0,17	- 79,59	287.21.40,0	724,4	+14,3	+14,3	- 43,9	39,8
	α Grand Chien	6.37.12,28	- 0,24	- 79,45	263.29.22,6	724,4	+14,5	+13,0	-1.45,7	46,4
15	Soleil, bord 1, sup.	3.24.58,46	+ 0,40	O	299. 5.35,2	722,3	+13,7	+13,8	- 27,9 - 13,5	100
	α Petit Chien	7.23.39,76 7.30. 6,01	+ 0,68	- 80,09 - 80,30	312.11.35,7				- 15,5	42,1
	3 Gémeaux	7.34.45,43	+ 0,60	- 80,25	308.21.57,9	721,1	+14,1	+13,6	- 17,5	43,3
18	Soleil, bord 2	3.39. 3,97	+ 0,41							

Le 12, Mire Sud-269,89. Mire Nord B+139,34. Mire Nord C-99,82. Mire Nord D-439,93.

38

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1850.

JOURS	MOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM		RÉFRACTION	LIEU du
,,	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TON.	POLE.
	ß Taureau	b. m. s. 5.15.25,37 5.45.40,25 7.23.37,98 7.30. 4,27 7.34.44,65 9.18.51,01 9.31.46,22 9.59. 0,66	s. + 0,60 + 0,18 + 0,68 + 0,15 + 0,60 - 0,09 + 0,24 + 0,27	s - 81,96 - 81,93 - 81,82 - 82,00 - 81,98 - 82,13 - 82,05	308.27.20,3 287.21.41,1 312.11.36,9 285.35.37,0 308.21.57,2 271.58.57,7 290.33.29,4	724,4 724,3 723,9 723,7 723,7	+11,5 +11,7 +11,8 +11,9 +11,8	+12,7 +12,8 +13,3 +11,8 +11,7	- 17,5 - 44,1 - 13,6 - 46,9 - 17,6 -1.16,1 - 39,4	40,6 40,4 43,3 44,5 42,6 36,1
	Lune, bord 1, sup. p Lion	10. 1.17,54 10.23,32,58 10.53. 2,03 10.58.51,65 11.40. 2,64 12. 9.32,44 12.15. 5,93 12.25.39,56 13. 3.59,78	+ 0,27 + 0,23 + 2,02 + 0,18 + 0,32 + 2,82 + 2,72 + 2,98	- 81,80 - 82,12	292.33.21,0 290. 3.50,2 342.32. 9,9 287.50.30,1 295.23.43,9 349.36.18,3 348.52.39,7 350.35.26,6	723,9 723,9 724,1 724,1 724,3 724,4	+11,9 +11,8 +11,6 +11,5 +11,2 +11,0	+11,2 +11,0 +10,8 +10,7 +10,0 + 9,6 + 9,6	- 36,7 - 40,2 + 16,0 - 43,7 - 33,0 + 24,0 + 23,2 + 25,2	41,8
	Anonyme	13.17.34,38 13.26.29.59 13.35.53,72 13.40.15,60 13.47.10,54 13.52.23,80 14. 7.27,94	+ 3,30 + 3,32 + 3,31 + 1,26 - 0,31 - 0,41 - 0,17 - 0,17	- 82,20 - 82,31	352.25.16,8 352.32.30,3 352.28.55,5 330. 2.33,5 259.58.36,0 259.36.39,9 299.57. 2,0 267.42.20,0 267.46.42,3	724,7	+ 9.9	+ 8,0 + 8,0 + 7,9 + 7,6	+ 27,5 + 27,7 + 27,5 + 2,4 -2, 5,9 -2, 8,1 - 27,5 -1,30,8 -1,30,6	40,8 38,6
IG	Soleil, bord 1, sup.  α Orion	9.18.50,49 9.31.45,66 9.59. 0,00 10.23.32,04	+ 0,41 + 0,18 + 0,15 + 0,60 - 0,09 + 0,24 + 0,23 + 0,32 + 0,03 - 0,52	- 82,73 - 82,67 - 82,65 - 82,63 - 82,69 - 82,77 - 83,02 - 83,31	299.59.40,7 287.21.42,5 285.35.34,6 308.21.53,9 271.58.58,7 290.33.29,5 292.41.5,4 290. 3.49,0 195.23.46,0 278.56.54,5	723,4 722,5 721,9 721,5 721,6 721,6 721,7 721,8	+11,6 +12,6 +12,4 +12,5 +12,5 +12,5 +12,5 +12,7	+10,6 +12,3 +13,6 +13,8 +13,7 +12,9 +13,3 + 8,3	- 27,2 - 44,1 - 46,7 - 17,5 -1.15,3 - 39,0 - 36,0 - 39,8 - 32,5 -1.0,0	41,8 42,2 39,4 38,0 41,8 38,7 41,0
	α Pégase α Andromède γ Pégase α Cassiopée	22.55.54,28 23.59.14,89 0. 4. 7,40	+ 0,30 + 0,59 + 0,30	- 83,16 - 82,97 - 83,21	294.23. 4,3 308.14.31,9 294.20. 4,1 335.41. 8,0	721,8	+11,0 +11,5 +11,8	+11,0 +12,2 +12,6	- 34,1 - 17,7 - 34,0 + 9,2	37,2 39,7 38,8 41,9

Le 18, Mire Sud-24 $^{p}$ ,31. Mire Nord  $B+12^{p}$ ,78. Mire Nord  $C-12^{p}$ ,18. Mire Nord  $D-45^{p}$ ,29. Le 19, Mire Sud-24 $^{p}$ ,99. Mire Nord  $B+12^{p}$ ,10. Mire Nord  $C-12^{p}$ ,27. Mire Nord  $D-44^{p}$ ,64. Niveau-1 $^{p}$ ,30.

39

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1850.

-	JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU	l'instru-		MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE	THERMO	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
1	-		h. sa. s.	ment.	pendule.	0 1 11	mm.	rieur.	ricur.	1 11	
H	ı	α Petite Ourse S	1. 2.45,16			8.28.14,8	721,5	+12,0	+13,5	+ 49,6	42,9
	20	Soleil, bord 1, inf	3.44.45,82	+ 0,41	- 83,68	299.40.43,2 308.14.31,3	720,4	+14,3	+16,7	- 26,8 - 17,8	38,9
ı		y Pégase α Cassiopée α Petite Ourse S	o. 4. 6,72 o.30.36,14 1. 2.43,10	+ 0,30 + 1,54	- 83,92 - 83,66	294.20. 7,1 335.41.12,5	723,6	+12,8	+13,7	- 34,1 + 9,2	41,6
	21	Soleil, bord 1, sup.	3.48.44,86 5.45.38,09	+ 0,42	- 84,08	300.24.55,8 287.21.43,5	723,4	+13,8 +14,4	+16,8	- 26,1 - 43,2	43,5
		α Petit Chien	7.30. 2,41	+ 0,15	- 83,83 - 83,87	285.35.38,0 308.21.57,2	722,7	+16,2	+18,9	- 45,9 - 17,2	46,3 43,0
		α Hydre υ Lion	9.18.49,17	- 0,09 + 0,24	- 83,93	271.58.58,8	722,4	+15,9	+17,9	-1.14,2 - 38,5	39,0
I	ı	7 Vierge Lune, bord 1, sup.	12.10.51,01	+ 0,05		280. 9.34,0 278.58.50,5	722,8	+14,9	+13,7	- 56,5 - 59,1	
ı		α Petite Ourse I 6 Petite Ourse	13. 4. 3,03	+ 3,33		352.33.56,7	723,1	+14,2	+12,8	+ 55,2	43,6
ļ		β Petite Ourse α Andromède	14.49.47,59 23.59.13,67	+ 3,83 + 0,59	- 83,97 - 84,25	354.44.26,1 308.14.30,4	723,2 722,6	+14,0	+11,6	+ 30,0	42,6 38,0
l	22	Soleil, bord 1, inf  Andromède	3.52.44,26	+ 0,42	- 85,00	300. 5.10,5 308.14.32,1	721,5	+15,0	+16,6	- 26,4 - 17,6	39,7
ı		γ Pégase α Cassiopée	0. 4. 5,66	+ 0,30	- 85,04 - 85,12	294.20. 7,3 335.41.11,0	720,2	+14,4	+13,4	- 33,8 + 9,t	41,8
ı		α Petite Ourse S	1. 2.42,16			8.28.12,7	719,9	+14,5	+14,5	+ 49,3	41,1
	23	Soleil, bord 2	3.59. 0,28	+ 0,42							
i	24	α Andromède γ Pégase	0. 4. 4,22	+ 0,59	- 86,38 - 86,54	308.14.32,2	726,7	+14,3	+14,4	- 17,7 - 34,0	39,5
		α Cassiopée α Petite Ourse S	1. 2.43,86	+ 1,54	- 86,39	335.41. 8,0 8.28.10,6	726,6	+14,5	+14,6	+ 9,2 + 49,8	39,9
		β Petite Ourse I α Persée		- 3,83 + 1,23	- 86,58 - 86,76	25.10.53,2 329.17.46,0	726,4 726,5	+15,6	+18,3	+1.29,6	3 <sub>7</sub> ,3 38, <sub>7</sub>
	25	α Orionα <sup>2</sup> Gémeaux		+ 0,18	- 86,66 - 86,48	287.21.41,5 312.11.35,9	726,0	+16,3	+20,1 +20,0	- 43,1 - 13,4	41,3
		α Petit Chien β Gémeaux	7.29.59,43	+ 0,15	- 86,78 - 86,60	285.35.34,4 308.21.55,6	/20,5	710,3	+20,0	- 45,9 - 17,2	42,7 42,4 41,5
		α Lion		+ 0,00	- 86,66	292.41. 4,8	725,7	+18,0	+19,4	- 35,5	41,3

Le 20, Mire Sud-25°,77. Mire Nord B+12°,10. Mire Nord C-10°,08. Mire Nord D-42°,72. Niveau-1°,15.

d-5°,40. Nadir 146°10′38″,90.

Le 25, Mire Sud-24°,60. Mire Nord B+11°,67. Mire Nord C-12°,03. Mire Nord D-45°,62.

Observations faites à la lunette méridienne en Mai 1850.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOVENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO	MÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
		rii meriolen.	ment.	pendule.	pour le niveau.	ça .	rieur.	rieur.	.2	TOLE.
	Soleil, bord I bord 2 Lion Grande Ourse Jupiter, centre S Lion Grande Ourse Vierge T Petite Ourse I Anonyme Anonyme Bouvier Weisse, XIV, 283 Lalande 26736 Lalande 26855 G Petite Ourse	14. 7.20,26 14.14. 8,22 14.32.20,59 14.36. 3,19	+ 0,45 + 0,45 + 0,27 + 2,01 + 0,18 + 0,05 + 2,98 + 3,30 + 3,32 + 1,26 + 0,41 - 0,17 - 0,37 - 0,36 + 3,33	- 89,59 - 89,53 - 89,66 - 89,81 - 89,91 - 89,96	292.41. 7,6 287.37.50,1 295.23.46,4 334.30.27,8 280. 9.35,1 350.35.26,9 11.27.28,9 352.25.18,7 352.32.30,4 230. 2.33,4 299.57. 0,6 267.42.119,1 257.14. 8,2 257.29.59,1 352.33.58,6	729,4 729,4 729,4 729,4 729,5 729,5 729,5 729,5	+16,5 +16,4 +16,3 +15,9 +16,0 +15,6 +15,5 +15,5	+15,2 +15,2 +15,1 +14,8 +14,9 +14,1 +13,8 +13,8 +13,8 +13,2	- 36,2 - 43,6 - 32,6 + 8,0 - 56,8 + 24,9 + 55,5 + 27,1 + 27,3 + 3,7 - 27,1 -1.29,4 -2.22,1 -2.20,2 + 27,4	38,1 43,7 44,3 39,5 35,8
	ß Petite Ourse  α Andromède  γ Pégase  α Cassiopée  α Petite Ourse S	23.59. 8,21	+ 3,83 + 0,59 + 0,30 + 1,54	- 90,17 - 89,96 - 90,10 - 89,82	308.14.33,3 294.20. 6,9 335.41. 8,1 8.28.10,9	728,1 728,1 728,1	+15,2 +15,3 +15,6	+14,9 +15,4 +16,0	- 17,7 - 34,0 + 9,2 + 49,6	40,1 40,2 42,3 40,6
30	Soleil, bord 1, inf  A Petite Ourse I  A Vierge  Grande Ourse  Bouvier  Weisse, XIV, 283.  Lalande 26493  Lalande 26736  Lalande 26855	13. 4. 3,95 13.15.48,76 13.40. 7,03 14. 7.19,62 14.14. 7,48 14.17.18,58 14.22. 6,93 14.32.19,77	+ 0,44 - 0,13 + 1,26 + 0,41 - 0,17 - 0,37 - 0,37 - 0,36	- 90,63 - 90,62 - 90,60	301.28.46,7 11.27.27,1 269.37.18,3 299.57.4,3 267.42.17,6 267.46.37,9 257.14.11,6 257.14.6,2 257.29.59,5	727,1 726,8 726,9 727,1	+17,3 +16,0 +15,9 +15,2 +15,0	+18,1 +13,0 +13,0 +12,5	- 24,8 + 55,5 -1.23,0 - 27,2 -1.29,6 +1.29,4 -2.22,2 -2.22,3	42,4 39,6 39,3
31	Callande 20855 6 Petite Ourse α Couronne α Serpent α Petite Ourse S α Petite Ourse I  Soleil, bord 1, sup. α Petite Ourse S	14.43.34,49 15.26.50,69 15.35.23,93 1. 2.42,56 2.49.48,11	+ 3,33 + 0,57 + 0,17 - 3,83 + 0,46	- 90,68 - 90,65 - 90,82	257.29.39,5 352.33.58,5 307.12.21,3 286.53.28,3 8.28.11,5 25.10.50,9 302. 9.10,1 8.28.13,0	727,1 727,0 728,9 728,9 728,8 731,9	+15,0 +14,5 +15,6 +16,4 +17,7 +16,7	+12,0 +11,9 +14,7 +17,2 +19,2 +15,8	-2.20,3 + 27,4 - 19,0 - 45,1 + 49,8 +1.30,2 - 24,0 + 49,7	37,1 38,9 41,5 37,3

41
Observations faites à la lunette méridienne en Mai et Juin 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONĖTRE	THERM	OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
ns.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ètre.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	B Petite Ourse I	h. m. s 2.49.47,58	- 3,83	- 91,31	25.10.52,8	<sub>ты.</sub> 731,9	+17,3	+18,3	+1.30,3	39,5
4	α Lion	10. 0.48,62 11.41.50,64 11.46.19,97 13. 6. 0,88 13.17.45,34 13.28.16,84	+ 0,27 + 0,32 + 1,48 - 0,13 + 3,32	+ 26,11 + 26,06 + 25,80 + 25,99	292.41. 6,7 295.23.47,1 334.30.27,3 11.27.28,4 269.37.18,2 352.32.36,4	728,2 728,0 728,3	+17,5 +17,5 +17,2	+17,5 +16,7 +15,5 +15,5	- 35,9 - 32,4 + 8,0 + 55,1 -1.22,5 + 27,1	41,3 38,6 42,7 42,7 39,8
	Anonyme  n Grande Ourse  Anonyme  Bouvier  Weisse, XIV, 283.  Weisse, XIV, 335.	13.26.16,64 13.37.40,77 13.42. 3,38 13.48.58,84 14. 9.16,10 14.16. 4,10 14.19.14,66	+ 3,32 + 3,31 + 1,26 - 0,31 + 0,41 - 0,17 - 0,17	+ 25,81	352.32.30,4 352.29. 0,9 330. 2.37,0 259.58.29,7 299.57. 2,5 267.42.18,8 267.46.37,4	728,6	+17,0	+15,5 +15,2 +15,0	+ 3,7 + 3,7 -2. 3,6 - 27,0 -1.29,0 -1.28,8	42,0 37,0
	Lalande 26493	14.24. 3,29	- 0,37		257.14. 9,6 8.28.11,1	728,1 729,2	+16,5	+14,7	-2.21,1 + 49,6	41,6
5	Soleil, bord 1, inf  A Hydre  Lion  Grande Ourse	10. 0.47,96	+ 0,47 - 0,09 + 0,27 + 0,23	+ 25,59 + 25,46	302.15.36,9 271.58.58,0 292.41. 6,0 290. 3.48,6	729,1 727,5 727,5 727,4	+18,2 +18,6 +18,4 +18,4 +18,4	+19,4 +18,4 +18,4 +18,1 +18,0	- 23,9 -1.14,9 - 35,8 - 39,4 + 15,9	36,4 41,6 45,3
	Jupiter, centre  3 Vierge  y Grande Ourse  y Vierge	11.43.19,07	+ 2,02 + 0,18 + 0,10 + 1,48 + 0,05	+ 25,58 + 25,52 + 25,12	342.32.14,2 287.25.42,7 282.36. 4,8 334.30 30,8 280. 9.31,0	727,4 727,4 727,4 727,3	+18,4 +18,4 +18,3	+17,9	- 43,4 - 51,5 + 7,9 - 56,2	44,9
	5 × Dragon α Petite Ourse I α Vierge Anonyme	13. 6. 5,42 13.17.44,58 13.28.15,72	+ 2,98 - 0,13 + 3,32 + 3,31	+ 25,24	350.35.28,1 11.27.28,8 269.37.20,0 352.32.34,4 352.29, 4,0	727,3 727,6 727,6	+18,2 +18,2 +18,2	+17,2 +16,4 +16,6	$\begin{vmatrix} + 24.6 \\ + 54.9 \\ -1.22.1 \\ \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} + 26.9 \\ + 26.9 \end{vmatrix}$	42,7
	Anonyme Anonyme Bouvier	13.42. 2,71 13.48.58,18 13.54.11,10 14. 9.15.58	+ 1,26 - 0,31 - 0,32 + 0,41	+ 25,16	330. 2.38,4 259.58.27,7 259.36.35,8 299.57. 4,3	727:9	+18,0	+16,0	+ 3,7 -2. 2,7 -2. 4,9 - 26,9	38,7
	Weisse, XIV, 283. Weisse, XIV, 335. Lalande 26493 Anonyme  Petite Ourse S	14.19.14,38 14.24. 2,71 14.55.12,26	- 0,17 - 0,17 - 0,37 - 0,12		267.42.17,1 267.46.36,1 257.14.14,1 270.12. 5,5 8.28.11.5	7 <sup>2</sup> 7,9 7 <sup>2</sup> 7,9 7 <sup>2</sup> 7,5	+17,7 +17,3 +17,4	+15,2 +15,3 +16,9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1
	a retite Ourself	1. 4.40,20	1		0.20.11,5	727,3	111/94	1.0,9	1 4314	72,0

Le 3 Juin, la pendule a été avancée de deux minutes.

Le 5, Mire Sud-25P,61. Mire Nord C-10P,57. Niveau-0P,47:

42
Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1850.

JOHRS	NOM	PASSAGE CONCLU	001111	ECTION de	MOVENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	OWÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ETRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	IIION.	POLE.
6	Soleil, bord 1, sup.	4.55.35,91	+ 0,47	s.	302.53.52,2	727,1	+23,0	+24,6	- 22,7	**
8	α Petite Ourse I α Cassiopée	13. 6. 0,14	+ 1,44	+ 23,02	11,27,29,7 335,41, 9,6	733,1 734,5	+16,5	+10,0	+ 56,5	44,9 43, <sub>7</sub>
	α Petite Ourse S α Bélier α Baleine	1. 4.45,66 1.59. 5,97 2.54.48,99	+ 0,45	+ 22,93	8.28.10,4 302.43.58,4 283.29.17,8	734,6 734,2 734,0	+15,6 +15,5 +15,8	+12,1	+ 50,7 - 24,0 - 50,0	42,5 40,3 40,4
	α Persée Soleil, bord 1, inf	3.13.59,69	+ 1,15	+ 22,95	329.17.47,2	734,0	+15,9	+14,7	+ 3,0	41,6
9	α <sup>2</sup> Gémeaux α Petit Chien	5. 7.56,99 7.25.22,76 7.31.49,09	+ 0,44 + 0,64 + 0,14	+ 23,04	302.39. 7,9 312.11.31,9 285.35.37,1	733,6	+16,6	+16,6	- 23,9 - 13,6 - 46,9	39,2 43,1
	B Gémeaux Mars, centre α Hydre	7.36.29,39 9. 9.23,48 9.20.35,83	+ 0,56 + 0,34 - 0,06	+ 22,86	308.21.56,6 297.50. 8,7 271.59. 3,4	732,2	+17,2	+16,2	- 17,6 - 29,5 -1.15,8	40,4
	α Lion	10. 0.45,30	+ 0,26	+ 22,83	290. 3.48,9	732,0	+17,0	+15,8	- 40,0	
	a Grande Ourse Jupiter, centre 3 Vierge	10.54.46,11 11. 5. 8,66 11.43.16,31	+ 0,17	+ 22,89	342.32.11,6 287.17.28,6 282.36, 1,9	731,9 731,9 731,7	+16,9 +16,8 +16,7	+15,6 +15,4 +15,6	+ 16,0 - 44,2 - 52,2	42,9
	γ Grande Ourse 5 x Dragon α Petite Ourse I	11.46.16,75 12.27.23,38 13. 6. 0,16	+ 1,38 + 2,78	+ 22,60	334.30.30,6 350.35.29,8 11.27.27,5	731,7	+16,5	+14,6	+ 8,0 + 25,0 + 55,6	45,7
	Anonyme	13.17.41,86	- 0,12 + 3,10	+ 22,55	269.37.18,6 352.32.37,6	731,9		+14,3	+ 27,3	39,4
	η Grande Ourse α Bouvier Weisse, XIV, 283.	13.41. 0,43 14. 9.12,78 14.16. 0,66	+ 1,18 + 0,38 - 0,15	+ 22,86	330. 2.38,3 299.57. 4,0 267.42.22,7	731,9	+15,9	+14,4	+ 3,7 - 27,2 -1.29,7	42,3 37,6
	Weisse, XIV, 335. Lalande 26493 Lalande 26662	14.19.12,02 14.23.59,83 14.30.47,15	- 0,15 - 0,34		267.46.38,0 257.14.13,7	731,9	+15,8	+14,0	-1.29,4 $-2.22,2$ $-2.21,3$	
	Lalande 26736 Lalande 26855	14.34.12,97	- 0,33 - 0,34 - 0,33		257.21.21,5 257.14. 8,0 257.30. 2,5				-2.21,3 -2.22,2 -2.20,3	
	6 Petite Ourse	14.45.27,77 14.51.33,75 14.55. 9,70	+ 3,10 + 3,57 - 0,11	+ 22,60	352.34. 0,3 354.44.34,3 270.12. 4,7	731,9	+15,8	+13,8	+ 27,4 + 30,1 -1.21,6	45,9
	α Cassiopée α Petite Ourse S	0.32.23,08	+ 1,44	+ 22,32	335.41. 9,6 8.28. 9,2	731,6 731,5	+15,3	+12,6	+ 9,3 + 50,3	43,6 40,9
	α Bélier	1.59. 5,25 2.51.40,23 2.54.48,29	+ 0,45	+22,18 $+21,96$ $+22,32$	302.43.58,5 25.10.49,7 283.29.18,9	731,5	+15,5	+14,0	- 23,9 +1.31,1 - 50,6	40,4 39,5 41,7
	α Persée	3.13.59,01	+ 1,15		329.17.45,4	731,3		+15,1	+ 3,0	40,9

Le 9, Mire Sud-24P,13. Mire Nord B+10P,57. Mire Nord C-13P,08. Mire Nord D-47P,38. Niveau-0P,28.

d op,0. Nadir 146º10'30",37.

43

Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1850.

Le 10, Mire Sud-23P,84. Mire Nord B+10P,62. Mire Nord C-12P,21. Mire Nord D-46P,47. Niveau-0P,39.  $d-0^{\circ},39. \text{ Nadir } 146^{\circ}10'38'',40.$ 

44
Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	MÉTRE	RÉFRACTION	LIEU
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Anonyme	h. m. s. 17.24.14,45 17.28.22,06 1. 4.46,04 1.59. 4,75 2.51.39,83 3.13.58,39	s. + 3,41 + 0,26 + 0,45 - 3,57 + 1,15	5. + 22,13 + 21,65 + 21,61 + 21,65	354. 3. 8,3 292.39.42,1 302.43.56,9 25.10.50,2 329.17.46,2	729.7 730,5 730,4	+15,0 +16,8 +17,2	+11,6 +18,1 +19,1 +19,6	+ 29,3 - 36,7 - 23,5 +1.29,8 + 2,9	36,8 39,1 38,9 40,6
	Soleil, bord 1, inf	5.16.12,57	+ 0,44		302.48.29,1 8.28.10,7	730,1 727,5	+18,3	+24,0	- 23,0 + 48,9	41,1
	A Petite Ourse S  B Soleil, bord 1 bord 2 γ Grande Ourse α Petite Ourse I α Vierge Lune, bord 1, sup. η Grande Ourse α Bouvier Αnonyme	5.45.12,00 5.47.29,69 11.46.10,49 13. 5.59,43 13.17.35,72 13.21. 6,55 13.41.54,05 14.9. 6,72	+ 0,44 + 0,44 + 1,38 - 0,12 - 0,01 + 1,18 + 0,38 - 0,11	+ 16,55 + 16,48 + 16,65 + 16,57	334.30.29,1 11.27.28,7 269.37.22,8 273.53.23,6 330. 2.41,2 299.57. 6,8 270.12.12,2	732,0 732,5 732,4 732,3 732,3 732,4	+16,7 +16,4 +16,0 +15,4 +15,5	+15,0 +13,8 +13,6 +13,1 +13,0 +12,9	+ 8,0 + 55,7 -1.23,7 -1. 6,3 + 3,7 - 27,3 -1.21,9	43,9 42,6 42,9 43,8 39,1
	Soleil, bord 1, sup.  x Vierge	14. 5.11,64 14. 9. 6,14 14.11.50,16 14.17. 1,47 14.23.53,25 14.30.40,43 14.37.49,09 14.45.20,93 14.55. 3,02 15. 0.49,83	- 0,33 - 0,34 - 0,33 + 3,10 + 3,57 - 0,11 - 0,37	+ 16,02	271.28. 0,0 251.49. 8,5 257.14.14,8 257.21.21,8 257.30. 5,0 257.30. 5,0 352.34. 4,3 354.44.36,2 270.12. 9,3 254.55. 6,3	733,0		+12,7 +12,6 +12,1 +12,1 +12,1	-2.23,2 -2.22,4 -2.23,3 -2.22,1 + 27,6 + 30,3 -1.22,2 -2.42,4	45,8
2	α Couronne α Serpent ο Soleil, hord 1 bord 2	. 15.37.10,54	+ 0,16				+14,5	+11,7		
-	bord 2	3.33.47,41	+ 0,44		1					

Le 18, Mire Sud-230,53. Mire Nord B+8060. Mire Nord D-460,30.

45
Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERM!	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
		rii merialen.	ment.	pendule.	pour le niveau.	.50	rieur.	rieur.	N.	A ULL.
21	α Serpent Lune, bord 1, sup. y Scorpion	h. m. s. 15.37. 9,48 15.53.50,86 16. 3.34,42	s + 0,18 - 0,22 - 0,32	+ 14,89	286.53.33,9 264.12.10,5	730,6	+15,3	+13,3	- 45,1 -1.43,3	41.7
The second secon	Anonyme 8+71°12' Anonyme	16.16. 1,57 16.16.10,72 16.20.30,75 16.27.13,96 16.35.36,95	+ 3,32 + 3,33 - 0,46 + 3,41 - 0,39	+ 14,85	351.17. 7,9 253.55.53,9 351.41.36,7 257.46.51,6	730,7	+14,9	+12,5 +12,3 +12,3	+ 25,9 -2.51,1 + 26,4 -2.18,8	42,4
	Anonyme	16.37.47,33 16.48.10,40 16.56.51,87 16.59.32,30 17. 3.49,53	- 0,39 + 3,70 + 3,72 + 3,76 + 3,78		257.40. 6,6 353. 3.27.9 353. 7.34,9 353.19.32,6 353.22.39,6			+12,9	-2.19,4 $+28,0$ $+28,1$ $+28,4$ $+28,5$	
	Anonyme Anonyme Anonyme Q Ophiuchus Lalande 32630	17. 4.44,95 17.12.24,67 17.24. 7,23 17.28.15,10 17.40.22,97	+ 3,82 + 3,76 + 3,94 + 0,29 + 3,94	+ 15,11	353.29.31,1 353.18.25,2 354. 3.15,4 354. 3.41,5	731,0	+14,8	+12,6	+ 28,6 + 28,4 + 29,3 + 29,4	
	Anonyme	17.48.55,21	+ 3,91 + 4,03		354. o. 6,7 354.22.47,6	731,0	+14,8	+11,5	+ 29,4 + 29,3 + 29,8	
22	γ Grande Ourse α Petite Ourse I	11.46. 8,07 13. 6. 2,07	+ 1,59	+ 14,45	334.30.28,1	732,1 732,5	+16,8 +17,3	†20,0 †18,2	† 7,9 + 54,9	42,8
23	Soleil, bord 1, inf  a Lion  a Petite Ourse I  a Vierge	6. 5.56,57 10. 0.36,10 13. 6. 6,01 13.17.32,80	+ 0,52 + 0,29 - 0,15	+ 13,78	303.10. 3,9 292.41. 3,6 11.27.28,7 269.37.18,8	732.0 731,3 731,3 731,3	+17,6 +19,1 +18,5 +18,5	+19,4 +19,9 +19,0 +19,0	- 23,0 - 35,7 + 54,6 -1.21,8	38,5 41,3 40,4
	Bouvier  Betite Ourse S  Anonyme  Couronne	14. 9. 3,66 14.51-23,52 15. 6.27,35 15.28.34,79	+ 0,42   + 4,13   + 2,38   + 0,61	+ 13,62 + 13,67 + 13,52	345: 5.35,0 307.12.27,1	731,5	+18,3	+19,3	- 26,7 + 18,6 - 18,7	37,5
	α Serpent β Petite Ourse I α Baleine α Persée	15.37. 8,15 2.51.30,96 2.54.39,55 3.13.50,41	+ 0,18 - 4,12 + 0,11 + 1,33	+ 13,56 + 12,90 + 13,24 + 13,35	286.53.30,3 25.10.47,7 283.29.17,9 329.17.43,6	732,1	+18,1	+20,0 +20,1 +21,1	- 44,4 +1.29,7 - 49,8 + 2,9	38,5 38,8 39,1 38,7
24	Soleil, bord 1, sup.  a Lion	6.10. 4,95 10. 0.35,48 14.51.22,52	+ 0,53 + 0,29 + 4,12	+ 13,17 + 12,73	303.40.46,4 292.41. 2,3	731,8	+19,4 +20,5	+22,8 +24,8	- 22,2 - 35,1	37,7
	Anonyme	14.54.59,82	-0,11 $+2,44$		270.12. 8,8 345. 5.39,0	730,6	+20,1	+20,7	-1.19,5 + 18,4	

Le 22, Mire Sud-25P,54.

46
Observations faites à la lunette méridienne en Juin 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM		RÉFRACTION	LIEU du
5.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	α Couronne Groombridge 2418.	15.28.34,15 17. 3.46,71	s. + 0,61 + 3,80 + 3,85	+ 12,89	307.12.28,8	730,6	+20,4	+21,0	_ 18,5	40,2
	Anonyme &+73°31' Anonyme Anonyme  Cophiuchus Lalande 32630	17. 4.42,53 17.12.22,05 17.24. 4,77 17.28.13,12 17.40.20,73	+ 3,76 + 3,94 + 0,29 + 3,94	+ 13,12	353.18.28,7 354. 3.16,7 292.39.47,1 354. 3.42,8	730,9	+19,7	+18,4	+ 27,8 + 28,7 - 35,9 + 28,7	40,0
	Anonyme 8+74°2'. Anonyme	17.48.53,69 17.57.57,02 1. 4.42,64	+ 3,91		354.22.53,2	730,9	+19,5	+17,8	+ 29,1	2 0
	α Bélier β Petite Ourse I α Baleine α Persée	2.51.30,46	+ 0,50 - 4,12 + 0,11 + 1,33	+ 12,63 + 12,46 + 12,77 + 12,67	302.43.57,1 25.10.46,4 283.29.22,5 329.17.45,8	730,6 730,6 730,5	+19,3 +20,0 +20,1	+21,0 +22,0 +22,1	- 23,3 +1.28,9 - 49,4 + 2,9	37,8 36,9 43,9 41,9
25	Soleil, bord 1, inf Anonyme 8+65°7'.  Couronne	6.14.13,81 15. 6.25,49 15.28.33,43	+ 0,51 + 2,44 + 0,61	+ 12,18	303. 7.49,7	730,1	+20,8	+23,6	- 22,7 - 18,4	40,0
	Serpent  Scorpion  Anonyme 8+71012	15.37. 6,61 16. 3.31,56 16.15.58,52	+ 0,18 - 0,32 + 3,32	+ 12,03	286.53.32,4 260.56.40,9	728,9	+21,0	†20,9 †20,0	- 43,8 -1.55,9	41,0
	Anonyme  Groombridge 2356.  Lalande 30391  Anonyme  Groombridge 2404.	16.20.28,19 16.27.10,53 16.35.34,31 16.48. 6,32 16.56,48,76	+ 3,32 - 0,46 + 3,40 - 0,39 + 3,70 + 3,72	+ 12,28	351.17.10,9 253.55.47,7 351.41.38,0 257.46.45,4 353. 3.32,8 353. 7.37,4	728,8	+21,0	+19,2 +19,0	$\begin{array}{c} + 25,2 \\ -2.46,2 \\ + 25,7 \\ -2.15,2 \\ + 27,3 \\ + 27,4 \end{array}$	41,2
	Groombridge 2411. Groombridge 2418. Anonyme Anonyme  Anonyme  Ophiuchus	17. 3.46,14 17. 4.41,67 17.12.20,86 17.24. 3,61	+ 3,76 + 3,78 + 3,82 + 3,75 + 3,93 + 0,29	+ 12,28	353.19.36,4 353.22.41,9 353.29.31,5 353.18.25,9 354. 3.14,9	729,0	+20,3	+18,5	+ 27,7 + 27,8 + 27,9 + 27,7 + 28,6	
	α Petite Ourse S α Bélier β Petite Ourse I α Baleine α Taureau	1.58.55,49 2.51.29,96 2.54.38,35	+ 0,50 - 4,12 + 0,11 + 0,36	+ 11,99 + 12,08 + 11,98	8.28. 9,8 302.43.59,4 25.10.48,7 283.29.23,0 296.11.10,6	728,6 728,6 728,6	+19,9 +20,4 +20,7	+19,4 +21,6 +22,2	+ 49,0 - 23,2 +1.28,5 - 49,1 - 30.7	40,7 40,1 39,0 44,5 35,7
26	Soleil, bord 1, sup.  a Bouvier	6.18.22,03	+ 0,50 + 0,52 + 0,44 - 0,11	+ 12,05	303.37.39,8 299.57. 7,2 270.12. 5,6	728,4 727,9 727,0	+21,8 +21,8 +22,1 +22,0	+23,0 +23,1 +22,4 +21,2	- 30,7 - 22,6 - 26,2 -1.18,9	39,7

47
Observations faites à la lunette méridienne en Juin et Juillet 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE des verniers	BAROMÈTRE	THERMO		RÉFRACTION.	LIEG du
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté - rieur.	Exté- ricor.	TION.	POLE.
	α Couronne α Serpent	h. m. s. 15.28.32,83 15.37. 6,23	s. + 0,60 + 0,18	+ 11,58 + 11,65	307.12.27,7 286.53.33,2	727,4	+22,1	+21,2	- 18,4 - 43,7	38,8 41,8
27	Soleil, bord 1, inf Lion Jupiter, centre	6.22.30,59 10. 0.33,58 11.12. 2,16 1.58.54,49	+ 0,51 + 0,29 + 0,17 + 0,50	+ 11,29	303. 3.54,1 292.41. 4,6 286.29.29,3 302.43.58,1	728,8 727,3 726,9 727,1	+22,5 +22,3 +22,2 +21,2	+24,4 +21,8 +21,5 +19,2	- 22,6 - 35,5 - 44,0 - 23,4	39,5 38,3
25	α Taureau		+ 0,36	+ 9,80 + 9,86	296.11.10,2	731,9	+21,1	+21,4	- 31,0	34,7
30	Soleil, bord 1, inf  a Lion  B Lion  y Grande Ourse  a Petite Ourse I  a Vierge  Bouvier  Groombridge 2182.  Anonyme  a Couronne  Serpent	10. 0.32,10 11.41.33,98 11.46. 2,95 13. 6.10,89 13.17.28,75 14. 8.59,52	+ 0,51 + 0,29 + 0,34 + 1,59 - 0,15 + 0,44 + 2,02 + 2,44 + 0,61 + 0,18	+ 9,82 + 9,71 + 9,52 + 9,59 + 9,57 + 9,49 + 9,52	302.55.16,7 292.41. 7,2 295.23.47,2 334.30.27,4 11.27.30,1 269.37.21,8 299.57. 5,2 340.46.28,1 345. 5.38,9 307.12.27,7 286.53.32,4	732,1 732,1 732,0 732,1 732,1 732,2 732,4 732,4 732,4	+21,7 +23,7 +22,5 +21,8 +21,7 +21,5 +20,9 +20,8 +20,8	+22,5 +24,0 +20,7 +19,4 +19,5 +18,3 +17,1 +17,0 +17,2	- 23,0 - 35,2 - 32,1 + 7,9 + 54,6 -1.21,7 - 26,8 + 14,2 + 18,7 - 18,8 - 44,6	42,3 37,4 42,3 42,9 43,1 36,7
	Soleil, bord 1, sup.  α Petite Ourse S  α Bélier  β Petite Ourse I  α Baleine  α Taureau  α Cocher  Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup>	1.58.52,01 2.51.25,73 2.54.35,01 4.27.26,84 5. 5.43,83	+ 0,50 + 0,50 - 4,12 + 0,11 + 0,36 + 1,16 + 0,44	+ 8,30 + 8,23 + 8,45 + 8,32 + 8,48	303.18.52,9 302.43.58,4 25.10.48,2 283.29.24,8 296.11.11,8 325.48.50,8 299.55.13,0	730,5 733,8 733,8 733,8 733,9 733,9	+21,4 +19,2 +19,2 +19,8 +20,3 +20,3	+22,6 +15,7 +17,2 +17,4 +18,6 +20,3 +21,2	- 22,5 - 23,8 +1.30,7 - 50,4 - 31,4 - 0,4 - 26,6	3 <sub>7</sub> ,5 41,7 43,8 35,6 40,2
	Soleil, bord 1, inf Vénus, bord 1, centr. α Lion α Grande Ourse γ Grande Ourse α Cassiopée I α Petite Ourse I	10. 0.30,52 10. 4.23,08 10.54.30,57 11.41.32,64 11.46. 1,31 12.32.13,14	+ 0,50 + 0,41 + 0,29 + 0,30 + 2,17 + 0,34 + 1,59 - 1,66	+ 8,26 + 8,33 + 8,40 + 7,95 + 8,18	302.42.41,7 298.45. 6,4 292.41. 5,8 293. 2.52,4 342.32.12,6 44.11.57,0 11.27.31,7			+21,4 +23,0 +23,4 +23,4 +23,0 +22,8		40,6 45,4 40,8 44,0

Le 27, Mire Sud-30°,40. Mire Nord B+15°,93. Mire Nord C-6°,10. Mire Nord D-40°,06. Niveau-0°,62.

d 0°,0.

Le 3, Mire Sud-289,36. Mire Nord B+15P11. Mire Nord D-429,74.

## Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

Sanor	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERW	OMĖTRE	RÉFRACTION	LIEU
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	loté- rieur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
	α Vierge	h. m. s 13.17.27,44 14. 5. 3,82 14. 8.58,08 14.42.34,08	- 0,15 - 0,13 + 0,44 - 0,22	+ 8,31 + 8,16 + 8,22	269.37.21,9 270.25.33,4 299.57. 5,8 264.38. 5,2	733,5 733,6 733,7	+22,4 +22,5 +21,9	0 +22,7 +21,2 +21,1 +19,8	-1.21,0 -1.19,0 - 26,6 -1.39,6	37,2 42,4
	a² Balance. 18 Balance. Groombridge 2182. Anonyme. α Couronne. α Serpent. Lalande 28786. Anonyme.	15. 6.21,51 15.28.29,41 15.37. 2,59 15.41.38,58 15.44.52,80	- 0,22 - 0,16 + 2,02 + 2,44 + 0,61 + 0,18 - 0,29 - 0,29	+ 8,18 + 8,22 + 8,04	269.27.45,4 340.46.29,3 345. 5.43,7 307.12.30,7 286.53.32,4 262.19.43,7 262.29.32,5	733,8 733,9	+21,3 +21,2	+19,2 +19,0 +19,0 +17,9 +17,8	-1.22,5 + 14,2 + 18,6 - 18,7 - 44,6 -1.50,6 -1.49,8	40,4 39,3
	Anonyme. Anonyme. Lalande 29244 Anonyme.  \( \alpha \) Ophiuchus Lalande 32630 Anonyme.	15.54. 9,48 15.57.42,16 17.23.59,33 17.28. 8,46 17.40.15,27 17.48.47,55	- 0,29 - 0,29 - 0,31 + 3,94 + 0,29 + 3,94 + 3,91	+ 8,43	262.25.16,5 262.34. 5,7 261. 2.45,0 354. 3.18,9 292.39.45,3 354. 3.48,7 354. 0.15,4	734,0 734,3	+20,6 +20,3	+17,7 +16,2 +16,0 +15,4	-1.50,2 -1.49,5 -1.57,1 + 29,0 - 36,4 + 29,1 + 29,1	36,1
	AnonymeLalande 34077Lalande 34107  ô Petite Ourse S  a Petite Ourse S  Lune, bord 2	18.15.54,80 18.16.26,07 18.20.50,17	+ 4,63 + 4,61 + 3,99		354.22.54,8 354.18.55,3 354.15.14,7 6.33.56,0	734,3	+19,8 +19,7	+15,2 +14,8 +14,8	+ 29,5 + 29,5 + 29,4 + 46,9	44,5
	Piazzi, II. 167  β Petite Ourse I  α Baleine  α Cocher  β Orion  β Taureau  Mercure, bord 2, cleen	2.36.58,41 2.51.25,26 2.54.34,53 5. 5.43,36 5. 7.27,31 5.16.55,69	+ 0,17 + 0,23 - 4,12 + 0,11 + 1,16 - 0,11 + 0,64 + 0,44	+ 7,83 + 7,94 + 7,98 + 7,83 + 7,83	28g.27.5g,0 25.10.45,7 283.2g.23,6 325.48.52,4 271.37.6,8 308.27.16,9 300.10.36,1	734,4 734,3 733,5 733,6	+19,0 +19,1 +19,3 +20,0	+17,4 +17,2 +20,2 +20,4 +21,4 +21,5	- 40,8 +1.30,8 - 50,4 - 0,4 -1.15,8 - 17,2 - 26,3	39,4 42,4 41,9 39,9 38,4
	Soleil, bord 1, sup. Vénus, bord 1, centr. α Hydre α Lion α Grande Ourse α Petite Ourse I α Vierge x Vierge α Bouvier	9. 6.27,00 9.20.20,68 10. 0.30,06 10.54.30,17 13. 6. 9,89 13.17.26,96 14. 5. 3,44	+ 0,51 + 0,40 - 0,10 + 0,29 + 2,17 - 0,15 - 0,13 + 0,44	+ 7,92 + 7,86 + 7,96 + 7,85 + 7,70	342.32.11,3 11.27.30,5 269.37.20,0 270.25.32,0	733,1 732,5 732,5 732,5 732,1 731,9 731,9 732,0	+20,8 +22,3 +23,1 +28,4 +24,5 +25,3 +25,3 +24,4	+23,6 +27,5 +27,7 +27,7 +27,9 +26,4 +26,4 +25,2 +25,2	- 22,7 - 27,7 -1.12,8 - 34,8 + 15,4 + 53,3 -1.19,7 -1.17,7 - 20,1	36,4 42,6 44,0 42,1 43,1

Le 4, Mire Sud-28P,36. Mire Nord C-9P,70. Niveau-0P,70. d-3P,54. Nadir 146°10'37",00.

49
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

fours.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYEXNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERW Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	α¹ Balance	h. m. s 14.42.33,62 14.42,44,88	3. - 0,22 - 0,22	s. + 7,77 + 7,61	264.38. 4,7	mm. 732,0	+23,7	+21,6	-1.38,7	42,8
	To Balance.  Groombridge 2182.  Anonyme.  α Couronne.  α Serpent.  Lalande 28786  Anonyme.  Anonyme.  Anonyme.	14.50.56,80 14.58, 3,63 15. 6.21,03 15.28.28,85 15.37, 2,21 15.41.38,16 15.44.52,30 15.47.24.10 15.54, 8,66	- 0,22 - 0,16 + 2,02 + 2,44 + 0,61 + 0,18 - 0,29 - 0,29 - 0,29	+ 7,67 + 7,67	269.27.45,0 340.46.30,7 345. 5.44,9 307.12.26,5 286.53.33,1 262.19.43,5 262.29.34,4 262.25.18,1 262.34.10,0	732,0 732,1	+23,4	+21,4 +22,1 +22,0 +21,3	-1.21,6 + 14,0 + 18,4 - 18,4 - 43,9 -1.49,0 -1.48,3 -1.48,6 -1.48,0	36,3 40,6
	Anonyme. Lalande 29244 Taylor 8399 Scorpion Anonyme. Anonyme. a Scorpion Groombridge 2356. Lalande 32630 Anonyme. Anonyme.	15.57.41,48 16. 0.48,56 16. 3.26,88 16.15.53,92 16.16. 2,84 16.20.23,50 16.27. 6,15 17.40.15,00 17.48.47,47 17.57.51,38	- 0,29 - 0,31 - 0,32 - 0,32 + 3,31 + 3,32 - 0,46 + 3,40 + 3,94 + 3,92 + 4,03	+ 7,59	261. 2.43,8 260.57.24,3 260.56.37,8 351.10.54,8 351.17.13,0 253.55.47,4 351.41.43,5 354. 3.48,5 354. 0.15,1 354.22.55,9	7 <sup>3</sup> 2,4 7 <sup>3</sup> 2,6 7 <sup>3</sup> 2,6	+22,4 +21,8 +21,5	+20,6 +20,3 +20,3 +18,9 +18,8	-1.55,6 -1.56,1 -1.56,2 + 25,2 + 25,3 -2.46,6 + 25,8 + 28,7 + 28,6 + 29,1	40,8
	Lalande 34107 & Petite Ourse S Lune, bord 2	18.15.54,00 18.16.25,31 18.20.50,02 2.54.49,06	+ 4,01 + 3,99 + 0,18		354.18.57,1 354.15.20,9 6.33.56,9	732,5	+21,5	+18,5	+ 29,0 + 29,0 + 46,2	44,3
	α Cocher β Orion β Taureau	5. 5.42,91 5. 7.26,94 5.16.55,15	+ 1,16 - 0,11 + 0,64	+ 7,50 + 7,45 + 7,27	325.48.53,4 271.37. 4,4 308.27.20,4	733,3 733,5	+23,2 +23,3	+26,4 +25,6	- 0,4 -1.14,2 - 17,0	43,0 38,9 42,1
5	Soleil, bord 1, inf. Vénus, bord 1, centr.  a Hydre  a Lion  a Grande Ourse  Jupiter, centre  y Grande Ourse I	9.20.20,31 10. 0.29,64 10.54.29,49 11.15.55,95 11.46. 0,35 13. 6.10,82	+ 0,52 + 0,40 - 0,10 + 0,29 + 2,17 + 0,16 + 1,59	+ 7,55 + 7,38 + 7,33 + 7,03	302.32.20,5 298. 2.54,3 271.58.59,3 292.41. 7,7 342.32.10,8 286. 3. 1,6 334.30.28,6 11.27.31,6	733,2 733,1 733,1 733,2 733,4 733,5 733,6	+23,2 +24,8 +24,7 +24,5 +24,8 +24,9 +24,9 +24,5	+29,0 +28,2 +27,5 +27,7 +26,8 +26,7 +25,7 +24,2	- 23,0 - 28,1 -1.12,9 - 34,9 + 15,5 - 44,5 + 7,8 + 53,3	36,1 42,9 43,7 43,7 43,2
	α Vierge	13.17.26,50 14. 8.57,12 14.51.16,30 15.37. 1,50 16.20.22,83	- 0,15 + 0,44 + 4,12 + 0,18 - 0,46	+ 7,40 + 7,23 + 7,21 + 6,86 + 6,92	299.57. 6,9 354.44.40,7 286.53.33,2 253.55.45,0	733,8 733,9 734,0 733,9	+24,3 +23,4 +23,3 +23,3	+23,1 +22,0 +20,8 +19,5	- 26,4 + 29,3 - 44,1 -2.47,4	38,3 46,9 40,3 37,7

Le 5, Mire Sud-27P,44. Niveau-ov,51.

Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

Carombridge 2356.   16.27. 5,05   3.40   35.1.41.44.8   257.46.44.6   4.60   257.40.3,3   4.19,3   4.21,5   4.60   4.19,3   4.21,5   4.20	JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	WĖTRE	RÉFRACTION	LIEU da
Groombridge 2356. Lalande 3o391 16.37.5,05   + 3,40   Lalande 3o391 16.37.39,21   16.37.39,21   + 3,71   3.75   16.59.23,71   + 3,75   3.75   4.76	S	DES ASTRES.	Fil Méridien.				TRE.			TION.	POLE.
Anonyme 15.47.23,50 - 0,29		Lalande 30391 Anonyme Groombridge 2404. Groombridge 2411.  \$ Petite Ourse S  \$ Petite Ourse I  \$ Baleine Lune, bord 2  \$ Taureau  \$ Cocher  \$ Orion  \$ Taureau  Mercure, bord 2, ctre  \$ Orion  \$ Petite Ourse I  \$ Grand Chien  \$ Soleil, bord 1, sup.  Vénus, bord 1, centr  \$ Hydre  \$ Petite Ourse I  \$ Vierge  \$ Grande Ourse I  \$ Vierge  \$ Bouvier  \$ Balance  \$ Balance  \$ Balance  \$ Anonyme  \$ Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Alande 29444  Taylor 8399  Lalande 29488  Lalande 29488  Anonyme  Anonyme  Anonyme  Lalande 29488  Lalande 29488  Lalande 29488  Anonyme	16.27. 5,05 16.35.29,09 16.37.39,21 16.56.42,91 16.59.23,71 18.20.48,00 2.51.23,81 2.54.33,67 3.52.11,84 4.27.25,54 5. 5.42,43 5. 7.26,50 5.16.54,77 5.29.29,62 5.47. 9,49 6.21.26,95 6.38,38,70 6.59.39,00 9.16. 1,92 9.20.19,82 13. 6.12,70 13.17.25.96 13.4.143,61 14. 5. 2,54 14. 8.56,66 14.42.44,16 14.50.55,82 14.58. 2,69 15.6.19,93 15.37. 1,37 15.41.37,26 15.42,24,16 15.47.23,50 15.54. 8,08 15.57.40,66 16. 0.47,98 16. 0.47,98 16. 0.47,94 16. 4,10,28 16.15.52,78	+ 3,40 - 0,39 - 0,39 + 3,71 + 3,75 - 4,12 + 0,11 + 0,20 + 0,36 + 1,16 - 0,11 + 0,64 + 0,45 + 0,19 - 0,26 - 0,15 + 1,36 - 0,15 + 1,36 - 0,15 + 1,36 - 0,15 + 1,36 - 0,15 + 1,36 - 0,15 + 2,02 + 2,44 + 0,61 + 0,61 + 0,22 - 0,29 - 0,29 - 0,29 - 0,32 - 0,33 - 0,32 - 0,32	+ 6,5 <sub>1</sub> + 7,03 + 6,94 + 6,99 + 6,87 + 6,91 + 6,91 + 6,78 + 6,78 + 6,78 + 6,78	351.41.44,8 257.46.44,6 257.40.3,3 353.7.39,0 353.19.39,0 6.33.57,3 25.10.45,3 283.29.24,5  325.48.52,6 271.37.5,6 287.21.43,1 13.21.43,8 263.29.27,7 302.58.12,3 297.41.5,5 271.59.0,4 269.37.16,5 330.2.43,4 270.25.29,8 299.57.7,264.35.18,6 169.27.42,0 340.46.29,8 345.5.44,5 307.12.29,3 286.53.34,1 262.29.31,2 262.25.18,0 262.34.5,2 261.2.44,7 260.57.22,5 260.49.28,7 351.10.54,0	734,0 733,9 733,2 732,4 732,4 732,3 731,9 731,7 730,5 729,1 729,1 729,2 729,2 729,2 729,2 729,2 729,2	+21,6 +21,3 +21,3 +21,3 +21,6 +21,7 +21,8 +21,8 +22,5 +22,6 +23,6 +23,6 +23,8 +23,5 +23,4 +23,4 +23,3	+19,3 +18,8 +18,8 +16,8 +19,0 +20,9 +21,1 +21,2 +22,8 +22,8 +22,9 +24,7 +24,8 +23,9 +23,0 +23,0 +21,8 +21,8 +21,7 +21,7	+ 26,0 -2.16,1 -2.17,0 + 27,9 + 46,6 + 1.30,1 - 50,0 - 0,4 -1.15,5 - 17,2 - 25,6 - 43,1 + 57,6 -1.43,1 - 22,9 - 28,8 -1.13,4 -1.19,9 + 3,6 -1.18,0 - 26,2 -1.38,3 -1.43,1 - 1.43,4 - 1.43,4 - 1.43,4 - 1.43,6 - 1.43,6 - 1.43,6 - 1.43,6 - 1.43,6 - 1.43,6 - 1.43,6 - 1.43,6 - 1.55,6 - 1.55,6	44,8 39,1 43,4 43,4 42,2 38,8 37,6 38,9 40,9 44,4 36,8 39,3 44,2 39,2 37,9 38,8 41,6

Le 6, Mire Sud-29<sup>p</sup>, 13. Mire Nord B+15<sup>p</sup>, 27. Mire Nord C-8<sup>p</sup>, 04. Mire Nord D-41<sup>p</sup>, 48. d-3<sup>p</sup>, 11.

Nadir 146°10' 37", 00.

51

## Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fit Méridien.		ECTION le la pendule.	MOYEXNE  DES VERNIERS  corrigge pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERMO Inté- riour.	Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Groombridge 2356. & Petite Ourse S	h. m. s. 16.27. 5,39 18.20.50,52	+ 3,41	5	351.41.40,9 6.33.56,8	7 <sup>2</sup> 9, <sup>2</sup> 7 <sup>2</sup> 8,6	+22,6 +21,5	+20,1 +17,1	+ 25,7 + 46,2	43,5
10	α Petite Ourse I α Vierge. α Serpent. Lalande 28786 Anonyme. Anonyme.	13. 6. 4,28 13.17.23,90 15.36.59,39 15.41.35,48 15.44.49,78 15.47.21,60 15.54. 5,95	- 0,11 + 0,16 - 0,23 - 0,23 - 0,23 - 0,23	+ 4,89 + 4,87	269.37.18,2 286.53.31,7 262.19.44,0 262.29.35,8 262.25.19,3 262.34.10,9	731,0 731,5	+17,4 +16,0	+14,4	-1.23,1 - 45,2 -1.52,2 -1.51,5 -1.51,9 -1.51,2	3 <sub>7</sub> ,5 3 <sub>7</sub> ,3
	Lalande 29480 Lalande 29488 Anonyme Anonyme  Scorpion Groombridge 2356. Lalande 30391	16. 3.45,92 16. 4. 8,30 16.15.51,26 16.16. 0,22 16.20.20,67 16.27. 3,95 16.35.26,65	- 0,26 - 0,26 + 2,79 + 2,80 - 0,38 + 2,86 - 0,32	+ 4,86	260.54. 1,0 351.10.54,7 351.17.11,9 253.55.50,2 351.41.42,4 257.46.51,3	731,7	+15,4	+12,2	-1.59.9 $+ 25.9$ $+ 26.1$ $-2.52.1$ $+ 26.6$ $-2.19.9$	38,3
	Lalande 34077 Lalande 34107  \$ Petite Ourse S  \$ Petite Ourse I  \$ Baleine  \$ Persée  \$ Taureau	3.13.42,77 4.27.23.62	+ 3,37 + 3,35 - 3,46 + 0,11 + 1,11 + 0,31	+ 4,21 + 4,80 + 4,84 + 4,84	354.18.57,8 354.15.19,6 6.33.56,4 25.10.40,6 283.29.27,5 329.17.45,2	731,7 731,2 731,2	+15,4	+ 8,5 +10,9 +11,0 +12,2	+ 30,1 + 30,0 + 47,8 +1.32,5 - 51,3 + 3,0	44,8 36,8 44,2 40,4
	α Cocher     β Orion     β Taureau     α Orion     α Grand Chien	5. 5.40,81 5. 7.24,28 5.16.52,91 5.47. 7,31 6.38.36,52	+ 0,99 - 0,08 + 0,54 + 0,17 - 0,21	+ 5,06 + 4,70 + 4,79 + 4,64 + 4,72	325.48.50,5 271.37. 7,0 308.27.17,3 287.21.43,8 263.29.29,2	731,1 731,2 731,2 731,3	+16,1 +16,3 +16,5 +17,1	+15,4 +15,5 +16,5 +15,8	- 0,3 -1.16,9 - 17,8 - 43,9 -1.45,6	40,6 37,7 38,2 38,2 42,2
[1]	Soleil, bord I, inf  β Lion  α Baleine  α Persée  α Taureau  α Oorion  β Taureau  β Taureau	7.20. 6,45 11.41.28,88 2.54.31,31 3.13.42,41 4.27.23,20 5. 5.40,31 5. 7.23,96 5.16.52,47	+ 0,39 + 0,29 + 0,11 + 1,11 + 0,31 + 0,99 - 0,08 + 0,54	+ 4,67 + 4,49 + 4,44 + 4,40 + 4,53 + 4,36 + 4,33	301:51:52,2 295:23.46,0 283:29:28,0 329:17:44,1 296:11:13,2 325:48:51,1 271:37-9,3 308:27:16,6	731,2 730,9 729,9 729,7 729,5 729,3	+17,3 +17,6 +16,3 +16,4 +16,4 +16,5	+16,4 +17,1 +14,0 +14,6 +14,8 +16,4 +16,8	- 24,7 - 32,5 - 50,7 + 3,0 - 31,6 - 0,3 -1.16,4 - 17,4	35,4 45,1 39,3 35,9 41,3 40,3 37,9
12	Soleil, bord 1, sup.  a Petite Ourse I  a Vierge	7.24.11,02	+ 0,40		302.15.18,7 11.27.27,2 269.37.18,9	728,7	+17,2 +18,5 +1,85	+18,4 +18,5 +18,7	- 24,0 + 54,4 -1.21,4	40,6

Le 10, Mire Sud-239,18.

Le 11, Mire Sud-240,43. Mire Nord B+100,13. Mire Nord D-440,37. Niveau-10,89. d-70,71.

Nadir 146010/37",03.

52

Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO		RÉFRACTION	LIEU du
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la peodule.	corrigée pour le niveau.	ètre.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	η Grande Ourse α Bouvier α² Balance β Petite Ourse S α Couronne α Serpent Lalande 28786 Anonyme Anonyme Lalande 29244 Taylor 8399 Lalande 29480	h. m. s. 13.41.41,19 14. 8.54,16 14.42.41,42 14.51.13,49 15.28.25,43 15.36.58,79 15.41.34,70 15.44.49,06 15.47.20,93 15.57.38,31 16. 0.45,18 16. 3.45,32	5. + 1,14 + 0,37 - 0,19 + 3,46 + 0,52 + 0,16 - 0,23 - 0,23 - 0,26 - 0,26 - 0,26	5. + 4,28 + 4,28 + 4,25 + 4,23 + 4,24 + 4,29	330. 2.40,8 299.57. 4,1 264.35.19,7 354.44.37,5 307.12.26,3 286.53.30,6 262.19.42,1 262.29.33,1 262.25.16,7 261, 2.45,1 260.57.23,4 260.49.27,0	727,1 727,1 727,2 727,2 727,2	+18,5 +18,5 +18,3 +18,0	+18,6 +18,4 +16,6 +16,5 +16,1 +16,1	+ 3,6 - 26,6 - 1.40,0 + 29,6 - 1.87,7 - 44,5 - 1.50,3 - 1.49,8 - 1.50,0 - 1.57,0 - 1.57,5 - 1.58,2	41,4 34,8 37,1 43,3 34,7 36,7
	Lalande 29488 Piazzi, XVI, 28 Anonyme Anonyme Groombridge 2356. Lalande 30391 Anonyme  delta Ourse S Betite Ourse S Betite Ourse I	16.15.59,18 16.20.20,01 16.27. 3,00 16.35.26,17 16.37.36,41 18.20.48,99 2.51.20,35	- 0,26 - 0,27 + 2,79 + 2,80 - 0,38 + 2,86 - 0,32 - 0,32 - 3,46	+ 4,21	260.17. 2,8 351.10.55,0 351.17.12,0 253.55.49,2 351.41.42,0 257.46.53,0 257.40. 6,0 6.33.59,1 25.10.43,5	727,6 727,5 727,3 726,9	+17,5 +17,0 +15,3 +15,7	+15,3 +14,9 +13,6 +10,7 +13,9	-2. 1,3 + 25,5 + 25,6 -2.48,8 + 26,1 -2.17,5 -2.18,4 + 47,2 +1.31,0	40,7 45,2 38,3
		3.13.42,27 4.27.22,64 5. 5.40,16 5. 7.23,66 5.16.52,13 5.47. 6,67 6.10.14,39 6.21.18,67	+ 0,11 + 1,11 + 0,31 + 0,99 - 0,08 + 0,54 + 0,17 + 0,41	+ 4,10 + 4,25 + 3,81 + 4,34 + 4,03 + 3,96 + 4,02	283.29.25,4 329.17.43,2 296.11.13,3 325.48.49,8 271.37.7,6 287.21.45,2 302.23.58,7 13.21.40,5 263.29.27,8	726,7 726,5 726,4 726,4 726,3 726,2 726,2 726,2	+15,8 +16,0 +16,4 +16,6 +16,9 +17,3 +17,3 +17,5	+15,4 +15,2 +15,9 +16,4 +16,8 +17,0 +17,0 +17,9	- 50,5 + 3,0 - 31,5 - 0,3 -1.16,3 - 17,4 - 43,6 - 23,9 + 58,4 -1.44,0	42,5 38,3 36,0 40,0 38,1 37,2 39,7 40,2 42,0
13	Soleil, bord 1, inf Vénus, bord 1, centr. α Lion α [Grande Ourse Lune; bord 1, sup. Jupiter, centre	9.48.50,84 10. 0.26,28 10.54.26,63 11.15.48,36 11.20.16,10	+ 0,39 + 0,29 + 0,25 + 1,82 + 0,17 + 0,13 + 0,09	+ 4,01 + 4,27 + 4,00	342.32. 5,5 287.19.57,0	725,9 725,8 725,8 725,5 725,5	+17,6 +18,5 +18,5 +18,8 +18,8	+19,0 +20,7 +20,8 +20,7 +21,4	- 24,7 - 32,4 - 35,5 + 15,7 - 42,9 - 50,8	36,4 39,8 40,2 40,2
	γ Grande Ourse α Petite Ourse I		+ 1,35	+ 3,78	11.27.27,8	725,6	+18,9	<del>+</del> 20,5   <del>+</del> 19,1	+ 7,8 + 54,2	41,1

Le 12, Mire Sud-26,50. Mire Nord B+12,56. Mire Nord D-43,49. Niveau-2,17.

53
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	CORR l'instru- ment.	ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO	OMÉTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	α Vierge η Grande Ourse α Bouvier α Couronne	h. m. s. 13.17.22,68 13.41.40,77 14. 8.53,70 15.28.25,01	5. - 0,11 + 1,14 + 0,37 + 0,52	s. + 3,70 + 3,88 + 3,82 + 3,83	269.37.20,0 330. 2.38.9 307.12.26,5	725,4 726,1	+18,9	+19,2 +19,6 +17,6	-1.21,0 + 3,6 - 18,6	34,9
	Lalande 29480 Lalande 29488 Piazzi, XVI, 28  Petite Ourse S  Petite Ourse S	15.36.58,33 16. 3.44,90 16. 4. 7,30 16. 8.19,70 18.20.46,24 1. 4.54,30	+ 0,16 - 0,26 - 0,26 - 0,27	+ 3,84	286.53.32,8 260.53.51,9 260.17. 3,9	726,2	+18,4	+17,6	- 44,2 -1.56,7 -2, 0,1	39,2
	α Cocher β Orion β Taureau	5. 5.39,71 5. 7.23,22 5.16.51,79	+ 0,99 - 0,08 + 0,54	+ 3,86 + 3,57 + 3,60	325.48.48,4	728,9	+17,5	+18.0	- 0,3 - 17,3	38, <sub>7</sub> 36,8
14	Soleil, bord 1, sup.  A Hydre Vénus, bord 1, centr.  Petite Ourse I  Vierge	7.32.18,04 9.19.16,62 9.53.26,64 13. 6.10,18 13.17.22,52	+ 0,39 - 0,07 + 0,26 - 0,11	+ 3,90	301.58. 0,7 271.59. 5,3 294.31.18,0 11.27.28,1 269.37.16,6	728,7 728,5 728,5 727:7 727:8	+18,8 +19,1 +19,4 +19,8 +19,8	+20,2 +22,4 +22,7 +22,0 +21,6	$ \begin{array}{r} - 24,2 \\ -1.13,8 \\ - 32,8 \\ + 53,8 \\ -1.20,7 \end{array} $	40,3 41,1 38,1
	α Couronne	15.28.24,53 15.36.57,77 16.20.19,07 16.27. 1,95 16.35.25,37 16.37.35,50	+ 0,51 + 0,16 - 0,38 + 2,86 - 0,32 - 0,32	+ 3,36 + 3,29 + 3,29	307.12.26,5 286.53.32,6 253.55.48,7 351.41.41,2 257.46.46,8 257.40. 3,1	728,4	+19,5	+18,8 +18,8 +17,1 +17,4 +17,3	$ \begin{array}{r} - 18,6 \\ - 44,1 \\ -2.47,6 \\ + 25,9 \\ -2.16,1 \\ -2.16,0 \end{array} $	34, <sub>7</sub> 38, <sub>0</sub> 41, <sub>4</sub>
	Anonyme	16.57.53,36 16.47.57,74 16.56.39,76 16.59.20,33 18.20.46,32 5. 5.39,08	+ 3,11 + 3,13 + 3,17	+ 3,20	353. 3.29,9 353. 7.37,2 353.19.38,2 6.33.59,4 325.48.48,4	728,8 728,9 729,1 729,5	+18,6 +18,7 +18,2 +19,0	+16,7 +14,8 +20,6	+ 27,5 + 27,7 + 27,9 + 46,6 - 0,3	44,3 38, <sub>7</sub>
	& Orion	5. 7.22,62 5.16.51,23 5.47. 5,75	+ 0,54 + 0,54 + 0,17	+ 2,95 + 3,01 + 3,00	271.37. 5,5 308.27.15,8 287.21.41,0	729,5 729,5 729,5	+19,2 +19,5	+20,7 +20,8 +24,0	-1.15,3 -17,2 -43,2 -24,2	37,0 37,2 35,7
16	α Lion Vénus, bord 1, centr. α Grande Ourse Jupiter, centre	10. 0.24,60 10. 2.34,22 10.54.24,67 11.21.59,49	+ 0,28 + 0,30 + 2,04 + 0,15	+ 2,37	301.39. 2,2 292.41. 3,9 293.40. 3,3 342.32. 4,5 285.22.11,3	728,5 728,2 728,1	+22,0 +22,2 +22,3 +22,4	+24,4 +23,8 +23,9	- 35,0 - 33,7 + 15,6 - 45,8	38,8
	β Lion	11.41.26,62 11.45.55,57 13. 6.12,55	+ 0,32	+ 2,48 + 2,39	295.23.45,5 334.30.26,9 11.27.30,3	728,0	+22,4	+24,2	- 31,5 + 7,7 + 53,8	35,8 42,9 43,5

Le 14, Mire Sud-28p,07. Mire Nord B+14p,92. Mire Nord C-9p,28. Mire Nord D-43p,03.

54
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-	ECTION le	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BAROMÈTRE	THERMO	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	α Serpent Lalande 28786 Taylor 8399 Lalande 29480	h. m. s. 15.36.56,57 15.41.32,72 16. 0.43,40 16. 3.43,20	s. + 0,17 - 0,27 - 0,30 - 0,30	pendule.	286.53.34,4 262.19.38,3 260.57.19,7 260.49.24,1	727,6	ricur. +21,5	rieur.  0 +21,2 +21,1	- 43,7 -1.48,4 -1.55,2 -1.55,9	41,0
	Lalande 29488 Piazzi, XVI, 28 Anonyme Anonyme  Groombridge 2356. Piazzi, XVI, 137 15 Ophiuchus Anonyme Taylor 7817 Piazzi, XVI, 222.	16. 4, 5,56 16. 8.18,14 16.15.47,90 16.15.56,78 16.20.18,07 16.26.59,81 16.31.49,12 16.36.12,79 16.40.17,46 16.44.45,27 16.46.15,85	- 0,30 - 0,31 † 3,12 + 3,13 - 0,43 + 3,20 - 0,32 - 0,36 - 0,60 - 0,60	+ 2,25	260.17. 3,8 351.10.54,4 351.17.14,4 253.55.45,0 351.41.38,2 259.54. 3,5 257. 7. 2,4 257.34.19,6 246.49.55,0	,-,,-		+20,9	-1.58,8 + 25,0 + 25,1 -2.45,2 + 25,5 -2. 1,2 -2.19,0 -2.15,9 -4.35,3	40,1
	Anonyme Lalande 34077 Lalande 34107 δ Petite Ourse S α Orion α Grand Chien Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup>	16.49.20,02 18.15.49,16 18.16.20,41 18.20.44,00 5.47. 4,63 6.38.34,12 6.40. 6,36	- 0,60 + 3,76 + 3,74 + 0,18 - 0,25 + 0,46	+ 1,85 + 2,20	246.45.49,0 354.18.54,7 354.15.18,2 6.33.57,7 287.21.43,8 263.29.25,1 302.57.32,6	727,8 727,9 728,3 728,2	+21,3 +20,6 +21,5 +22,9	+19,7 +17,8 +23,8 +27,7	-4.37,0 + 29,0 + 28,9 + 46,0 - 42,7 -1.40,9 - 22,5	41,4 38,8 41,8
17	Soleil, bord 1, inf  A Hydre  Lion  Vénus, bord 1, centr.  Jupiter, centre  3 Lion  y Grande Ourse		+ 0,44 - 0,09 + 0,28 + 0,29 + 0,14 + 0,32 + 1,50	+ 2,08 + 2,14 + 1,99 + 1,69	300.57.42,9 271.58.59,4 293.13.54,8 285.18.24,1 295.23.43,9 334.30.25,1	728,0 727,6 727,6 727,4 727,3	+22,6 +23,0 +24,3 +23,7 +23,7	+28,9 +30,4 +29,8 +28,0 +28,6	- 24,6 -1.11,7 - 33,6 - 45,2 - 31,0 + 7,6	36,1 34,7 41,1
	α Petite Ourse I α Vierge α Cocher α Orion	13. 6.13,26 13.17.20.72 5. 5.37,31 5.47. 4,05	- 0,13 + 1,10 + 0,18	+ 1,77 + 1,25	267.37.14,6 325.48.49,0 287.21.44,2	727,4 731,3 731,5	+25,2 +21,9 +22,5	+27,3 +22,3 +23,0	-1.19,0 - 0,3 - 42,9	3 <sub>7</sub> ,6 3 <sub>9</sub> ,5 38,9
18	Soleil, bord 1, sup. α Lion Vénus, bord 1, centr. α Grande Ourse Jupiter, centre β Lion γ Grande Ourse	10.54.23,31 11.23. 9,93 11.41.25,50	+ 0,44 + 0,28 + 0,29 + 2,04 + 0,14 + 0,32 + 1,50	+ 1,36 + 1,25 + 1,38 + 1,01	301.18.51,9 292.41. 2,1 293.47.24,9 342.32. 5,5 285.14.33,5 295.23.43,0 334.30.26,5	731,5 731,3 731,4 731,4 731,3 731,3	+22,7 +23,5 +23,7 +24,3 +24,1 +24,3	+25,6 +25,0 +26,1 +25,4 +25,9 +25,8	- 24,5 - 35,1 - 33,5 + 15,5 - 45,8 - 31,5 + 7,7	36,9 40,5 33,3 42,7

Le 16, Mire Sud-297,29. Mire Nord B+157,34. Mire Nord C-67,93. Mire Nord D-417,24.

55
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-		MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE	THERMO	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
-			ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.		
	α Petite Ourse I α Vierge	13. 6.13,44 13.17.20,14	- 0,13	f 1,20	267.37.17,4	731,3	+23,9	+24,2	-1.20,3	39,1
	η Grande Ourse  α Bouvier  Lune, bord 1, sup. δ Scorpion	13.41.37,81 14. 8.50,94 15.37.48,84 15.51.31,87	+ 1,28 + 0,41 - 0,17 - 0,32	+ 1,18 + 1,18	330. 2.40,1 299.57. 3,6 265.15. 9,3	731,4 731,5 731,8	+23,8 +23,7 +22,7	+23,2 +23,7 +20,2	+ 3,6 - 26,3 -1.36,7	40,5 34,2
	β · Scorpion	15.56.46,86 17. 7.51,58 18.20.43,40	- 0,26 + 0,31	+ 1,36	260.37. 9,4 294.33.17,7 6.33.57,8	731,8 731,8 731,8	+22,5 +21,1 +20,8	+20,0 +18,2 +16,6	-1.58,i - 33,4 + 46,5	39,0
	α Cocher β Taureau	5. 5.36,85	+ 1,10 + 0,59 + 0,28	+ 0,95	325.48.49,5	731,0	+23,7	+25,8	- 0,3	37,1
19	Vénus, bord 1, centr. Mars, centre		+ 0,28 + 0,21 - 2,04	+ 0,75	292.41. 3,2 292.20.42,0 289.23.10,0 342.32. 6,2	730,0 730,0 730,0	+24,0 +24,3 +24,2	+25,0 +26,2 +24,9 +25,5	- 34,9 - 35,3 - 39,6 + 15,5	41,4
	Jupiter, centre  B Lion	11.41.24,92	+ 0,14 + 0,32 + 1,50	+ 0,81	285.10.27,2 295.23.44,0 334.30.26,3	729,7	+24,3 +24,3	+25,6 +25,4	- 45.9 - 31,5	34,3 42,6
	α Petite Ourse I α Vierge η Grande Ourse	13. 6.12,88 13.17.19,58 13.41.37,39	- 0,13 + 1,28	+ 0,65 + 0,78	11.27.26,2 267.37.18,4 330. 2.40,6	729,5 729,4 729,4	+23,8 +23,6 +23,4	+23,7 +22,7 +22,3	+ 7,7 + 53,6 -1.20,5 + 3,6	39,5 39,8 41,0
20	a Hercule  Ophiuchus Lune, bord 1, sup.	17. 7.50,30 17.12.51,12 17.21.19,19	+ 0,31 - 0,36 - 0,27	+ 0,09	294.33.16,2 255.10.39,5 260.30.41,0	727,4	+20,8 +20,5	+17,8	- 33,3 -2.35,5 -1.59,0	37,3
	α Ophiuchus δ Petite Ourse S α Cocher	17.28. 0,36 18.20.42,66 5. 5.36,03	+ 0,27	+ 0,33	292.39.45,3 325.48.48,8	727,4	+20,5	+17,8	- 35,8 - 35,8	34,1 39,5
	3 Orion 3 Taureau  Corion	5. 7.19,61 5.16.48,15 5.47. 2,74	- 0,10 + 0,60 + 0,18	- 0,21 - 0,17 - 0,12	271.37. 7,3 308.27.15,1 287.21.45,1	728,2 728,2 728,1	+20,3 +20,3 +20,8	+18,8 +18,9 +19,2	-0.3 $-1.15.6$ $-17.2$ $-43.3$	35,4 36,4 39,0
21	Soleil, bord 1, inf Cocher	8. 0.25,71 5. 5.35,48 5. 7.19,12	+ 0,43	- 0,51 - 0,73	300.14.17,7 325.48.48,9 271.37. 6,3	727.7	+21,4	+21,8	- 26,0 - 0,3 -1.15,6	39,6 36,2
	B Taureau Soleil, bord 1, sup.	5.16.47,75	+ 0,60	- 0,60	308.27.15,2	729,4	+20,3	+18,9	- 17,3	36,4
122	α Couronne α Serpent α Scorpion	15.28.20,15	+ 0,45 + 0,57 + 0,17 - 0,43	- 0,87 - 0,85 - 1,16	307.12.31,9 286.53.33,9 253.55.43,7	729,3 728,4 728,8	+21,3 +21,9 +22,0	+21,6	- 25,6 - 18,4 - 43,7 -2.47,3	39,4 40,0 36,9

Le 19, Mire Sud-27°,40. Mire Nord B+15°,02. Mire Nord C-8°,32. Mire Nord D-42°,35.

Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

Sunoi	Nom	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	TOERW	ONÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	corrigee pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Groombridge 2356.	h. m. s	s. + 3,20	۶.	351.41.42,8	mm.	0	+17,5	+ 25,9	"
	Piazzi, XVI, 137.	16.31.45,74	- 0,32		259.54. 1,5			417,5	-2. 2,6	1
	t5 Ophiuchus	16.36. 9,43	- 0,37		257. 7. 1,9				-2.20,5	
	Anonyme	16.40.14,14	- 0,36		257.34.24,1				-2.17,2	
1	Taylor 7817	16.44.42,07	- 0,60		20/.04.24,1				-2.1/92	
	Piazzi, XVI, 222	16.46.12,65	- 0,60		246.47.34,2	728,9	+21,2	+18,0	-4.39,6	
	α Ophiuchus	17.27.59,28	+ 0,27	- 0,74	292.39.52,4	728,9	+21,0	+18,0	- 35,8	40,9
	α Cocher	5. 5.35,17	+ 1,10	- 0,85	325.48.45,4	1 13		1 ,-	- 0,3	36,1
	B Orion	5. 7.18,73	- 0,10	- 1,14	271.37. 6,1	729,6	+20,8	+21,3	-1.15,1	36,3
	3 Taureau	5.16.47,41	+ 0,60	- 0,97	308.27.16,7	729,5	+20,8	+21,5	- 17,1	38,0
	α Orion	5.47. 1,77	+ 0,18	- 1,14	287.21.45,4	729,5	+21,3	+22,1	- 43,0	39,4
	Soleil, bord 1, inf	8. 8.23,00	+ 0,43		299.50.31,9	728,7	+22,2	+23,4	- 26,3	
	α Grande Ourse	10.54.20,95	+ 2,04	- 1,01	342.32. 4,8	727,6	+22,8	+25,5	+ 15,5	40,8
	3 Lion	11.41.22,94	+ 0,32	- 1,14	295.23.46,6				- 31,4	37,0
	y Grande Ourse	11.45.51,71	+ 1,50	- 1,34	334.30.24,3	727,1	+23,2	+25,0	+ 7,7	41,2
	α Petite Oursc I				11.27.25,5	726,7	+23,2	+25,9	+ 53,0	38,9
	α Vierge	13.17.17,74	- 0,13	- 1,14	269.37.18,1	726,7	+23,3	+26,2	-1.19,3	40,4
	η Grande Ourse	13.41.35,07	+ 1,28	- 1,44	330. 2.39,7	726,8	+25,1	+28,4	+ 3,5	40,1
24	Soleil, bord 1, sup.	8.12.21,00	+ 0,42		300. 9.46,5	731,0	+22,I	+21,5	- 26,2	
1	α Lion	10. 0.20,72	+ 0,28	- 1,50	292.41. 3,4	730,4	+22,5	+22,5	- 35,4	37,8
	Vénus, bord 1, centr.		+ 0,22		290. 2.30,9	730,2	+23,5	+22,2	- 39,0	1
	α Grande Ourse	10.54.20,75	+ 2,04	- 1,19	342.32. 0,9	730,2	+22,5	+22,2	+ 15,7	37,4
	Jupiter, centre		+ 0,13		284.49.52,2	730,0	+22,7	+22,1	- 47,0	
	3 Lion	11.41.22,50	+ 0,32	- 1,57	295.23.46,9	729,9	+22,7	+21,8	- 31,9	36,8
	y Grande Ourse		+ 1,50	- 1,58	334.30.24,7				+ 7,8	41,9
	α Petite Ourse I	13. 6.13,85	2		11.27.28,0	729,6	+22,4	+21,6	+ 54,0	42,6
	α Vierge	13.17.17,18	- 0,13	- 1,69	269.37.17,3	729,6	+22,4	+21,6	-1.20,8	38,1
	n Grande Ourse		+ 1,28	- 1,52	330. 2.40,1	729,6	+22,4	+21,7	+ 3,6	40,6
	α Bouvier		+ 0,41	- 1,56	299.57. 4,5	729.7	+22,4	+21,1	- 26,4	34,8
	Groombridge 2404. Groombridge 2411.		+ 3,48		353. 7.41,2	730,1	+21,4	+19,0	+ 27,5	
	Groombridge 2411.	16.59.14,63	+ 3,52		353.19.43,2				+ 27,7	
	0 .	17. 3.31,33	+ 3,54	·	353.22.44,3 353.29.36,8				+ 27,8	
	Anonyme		+ 3,52		353.18.27,3	730,2	+21,3	+18,2	+ 28,0	
	α Ophiuchus	17.12. 0,55	+ 0,27	- 1,51	333.10.27,3	/30,2	721,0	710,2	+ 27,8	
	y Dragon	1-0 0 0	+ 1,34	- 1,58	331.29.23,7	730,0	+20,7	+18,3	+ 5,0	42,7
	Petite Ourse S	18.20.39,84	1 2904	1,50	001.59.25,7	750,0	120,/	110,0	T 3,0	421)
	3 Taureau	5.16.46,63	+ 0,60	- 1,80						
	α Orion	5.47. 1,09	+ 0,18	- 1,86	287.21.44,3	729,1	+21,0	+20,5	- 43,2	37,9
	a Petit Chien				285.35.37.9	7-31-		, , _	- 45,7	41,3

Le 22, Mire Sud-27P,78.

Le 24, Mire Sud-280,04. Mire Nord B+15063. Mire Nord C-80,60. Mire Nord D-420,03.

57
Observations faites à la lunette méridienne en Juillet 1850.

jours.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERW Inté-	ONÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU   du POLS.
		in attitute.	ment.	pendule.	pour le niveau.	.00	rieur.	rieur.		T OBE.
	B Gémeaux Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup>	7.36. 5,05 7.49.20,08	, + 0,60 + 0,46	- x,77	308.41.46,9 302.16.27,7	729,0 728,9	+21,7 +21,8	0 +22,2 +21,8	- 17,2 - 23,7	35,1
2,5	Soleil, bord 1, inf  B Lion  y Grande Ourse  α Petite Ourse I  α Vierge	8.16.18,00 11.41.22,20 11.45.50,95 13. 6.14,22 13.17.17,04	+ 0,41 + 0,32 + 1,50 - 0,13	- 1,86 - 2,06 - 1,84	299.25,28,6 295.23.42,8 334.30.23,6 11.27,26,2 269.37.15,9	728,8 728,8 727,9 727,9	+22,0 +22,7 +23,8 +23,8	+22,3 +25,7 +25,2 +25,2	- 26,9 - 31,4 + 7,7 + 53,2 -1.19,7	33,1 40,8 40,2 37.7
29	Soleil, bord 1, sup. 3 Petite Ourse 1	8.32. 1,68 6.21. 6,46 6.38.28,16	+ 0,37	- 3,94	299. 2.57,4 13.21.31,2 263.29.28,9	726,6 730,0 730,1	+19,8 +18,7 +18,9	+19,8 +18,0 +18,3	- 27,5 + 58,4 -1.44,4	35,5 39,2
30	Soleil, bord 1, inf α Grande Ourse Vénus, bord 1, centr. Mars, centre	8.35.55,84 10.54.18,49 11. 4.16,05 11. 5.57,86	+ 0,37 + 1,90 + 0,17 + 0,16	- 3,50	298.17. 4,8 342.31.58,8 287. 8.55,4 286.41.57,9	729,7 729,0	+19,9 +20,9 +21,2	+20,4	- 28,5 + 15,7 - 43,4 - 44,1	36,5
	Jupiter, centre  B Lion  y Grande Ourse  a Petite Ourse I	11.30.40,61 11.41.20,20 11.45.49,09 13. 6.13,54	+ 0,13 + 0,31 + 1,41	- 3,83 - 3,94	284.24.10,0 295.23.42,0 334.30.22,0 11.27.23,4	728,8 728,8 728,6	+21,0 +21,0 +21,0	+21,3 +21,5 +22,4	- 47,8 - 31,9 + 7,8 + 53,8	32,1 40,1 38,7
	α Vierge α Bouvier β Petite Ourse α Couronne	13.17.14,74 14. 8.45,72 14.51. 4,19 15.28.17,01	- 0,12 + 0,38 + 3,60 + 0,54	- 4,05 - 3,91 - 3,59 - 3,91	269.37.15,1 299.57. 3,9 354.44.37,3 307.12.25,3	728,6 728,6 728,8 729,2	+21,0 +21,0 +21,0 +20,8	+22,5 +21,5 +21,2 +20,4	-1.20,5 - 26,4 + 29,2 - 18,5	35,3 34,0 42,0 33,0
	α Serpent	15.36.56,45 5.46.58,97 6.21. 6,15 6.38.27,96	+ 0,16 + 0,17 - 0,22	$\begin{bmatrix} -3.87 \\ -4.12 \\ -4.16 \end{bmatrix}$	286.53.27,8 287.21.41,0 13.21.32,5 263.29.28,3	731,5 731,5	+19,1 +19,5	+20,4 +19,2 +18,6 +18,6	- 43,9 - 43,5 + 58,4 -1.44,6	33,1 33,7 37,1 38,3
	ß Gémeaux	7.31.22,41 7.36. 2,81	+ 0,14	- 4,τ3 - 4,17	285.35.34,2 308.21.45,5	731,2	+19,9	+19,6	- 45,6 - 17,4 - 28,1	37,2
31	Soleil, bord 1, sup.  a Lion  a Grande Ourse  Mars, centre	8.39.49,72 10. 0.18,12 11.54.18,13 11. 8.15,10	+ 0,37 + 0,26 + 1,89 + 0,16	- 4,13 - 3,85	298.34. 5,5 292.41. 2,6 342.31.59,8 286.26.46,8	730,9 730,3 729,9 729,6	+20,5 +20,7 +21,0 +21,2	+21,0 +22,6 +23,1 +23,1	- 28,1 - 35,3 + 15,6 - 44,2	37,0 37,7
	Vénus, bord I Jupiter, centre ß Lion y Grande Ourse:	11.31.20,11 11.41.19,98 11.45.48,89	+ 0,16 + 0,13 + 0,31 + 1,41	- 4,05 - 4,12	284.19.42,9 295.23.44,5 334.30.22,0	729,5 729,5	+21,3	+23,4 +24,0 +22,5	- 47,6 - 31,6 + 7,8 + 53,8	34.7 40,3 37,2
ľ	α Petite Ourse I α Vierge		- 0,12	- 4,32	269.37.15,7	729,4 729,4	+21,5		-1.20,6	36,2

Le 30', Mire Sud-269,19. Mire Nord B+12192. Mire Nord C-9",02. Mire Nord D-421,00.

58
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERMO Inté- rieur.	Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
3	Soleil, bord 1, inf  \[ \alpha \] Grande Ourse  Mars, centre  Vénus, bord 1, centr.  Jupiter, centre  \[ \beta \] Lion  \[ \gamma \] Grande Ourse  \[ \alpha \] Petite Ourse I  \[ \alpha \] Vierge	h. m. s. 8.51.28,64 10.54.18,30 11.15. 7,17 11.21.19,05 11.33.20,60 11.41.19,34 11.45.48,87 13. 5.50,07 13.17.13,84	5. - 0,25 + 0,56 - 0,41 - 0,42 - 0,28 + 0,34 - 0,65	5,00 - 5,26 - 5,16 - 5,43	297.16.12,2 342.31.26,3 285.41.13,4 285. 9. 4,4 284. 5.50,5 295.23. 8,8 11.26.50,5 269.36.42,0	732,9 732,5 732,3 731,9	+20,4 +21,3 +21,4 +21,3 +21,3	+18,7 +21,4 +22,1 +21,7 +21,8	- 30,2 + 15,8 - 45,8 - 46,6 - 48,4 - 32,0 + 54,2 -1.21,0	5, t 58,6
	3 Petite Ourse S  α Couronne  α Serpent  α Scorpion  Piazzi, XVI, 137  15 Ophiuchus  Taylor 7817  Piazzi, XVI, 222  Anonyme  Groombridge 2411  Groombridge 2418.  Anonyme 8+73°31'	14.51. 4,77 15.28.16,99 15.36.49,39 16.20.10,72 16.31.41,78 16.36. 5,24 16.44.37,89 16.46. 8,63 16.49.12,78 16.59.12,72 17. 3.29,63	+ 1,22 - 0,11 - 0,40 - 0,96 - 0,83 - 0,90 - 1,14 - 1,14 - 1,14 + 1,13 + 1,13	- 5,68 - 5,42 - 5,43 - 5,43 - 5,45	354.44. 3,5 307.11.56,4 286.53. 0,1 253.55.10,3 259.53.28,5 257. 6.22,2 246.49.24,7 246.45.16,8 353.19. 7,4	732,0 732,0 732,0 732,0	+21,1 +20,9 +20,5	+19.7 +18.9 +18.5 +17.8	+ 29,4 - 18,6 - 44,2 -2.47,3 -2. 2,8 -2.20,8 -4.40,5 -4.41,9 + 27,9	8,6 2,8 4,9 3,6
	α Hercule.  Anonyme. α Ophiuchus. Anonyme. Lalande 32630.  Anonyme. γ Dragon. Anonyme. Lalande 34077. Lalande 34107	17. 4.24,74 17. 7.45,24 17.23.47,76 17.27.55,16 17.33.27,50 17.40. 3,41 17.48.35,73 17.53. 4,08 17.57.40,06 18.15.43,38 18.16.14,67	+ 1,14 - 0,29 + 1,16 - 0,31 + 1,16 + 1,16 + 1,16 + 0,27 + 1,19 + 1,19	- 5,45 - 5,35 - 5,35	294.32.43,3 354. 2.48,3 292.39.11,8 353.59.29,5 354. 3.13,3 353.59.44,7 331.28.49,0 354.22.26,3 354.14.53,3	732,1 732,1	+19,4	+17,4 +17,7 +17,6 +15,8	- 33,6 + 28,8 - 36,1 + 28,8 + 28,8 + 28,8 + 5,1 + 29,4 + 29,3 + 29,2	2,4 58,6 5,8
	Ö Petite Ourse S.     α Lyre.     Anonyme.     Anonyme.     L Dragon.     Anonyme.     Anonyme.     Toragon.     Anonyme.     Anonyme.     Anonyme.     Anonyme.     Anonyme.     Anonyme.     Anonyme.     Anonyme.	18.49.27,30 18.59. 0,72 19. 1.34,36 19.10.20,58 19.18.22,64	+ 0,05 - 0,81 - 0,81 - 0,81 + 1,16 - 0,87 - 0,86 + 1,09 + 1,12	- 5,38	6.33.27,0 318.37.18,5 261.29.15,0 261.23.57,0 353.52.30,7 258. 5. 0,3 258. 5.51,7 258.50.45,5 353. 2.25,8 353.13.31,3	732,1	+18,6	+15,8 +15,8 +15,1 +15,1	$\begin{array}{c} + \ 46,6 \\ - \ 7,3 \\ - \ 1.55,3 \\ - \ 1.55,7 \\ - \ 1.55,9 \\ + \ 28,9 \\ - \ 2.15,6 \\ - \ 2.15,5 \\ - \ 2.10,6 \\ + \ 27,9 \\ + \ 28,1 \end{array}$	6,4 5,4

Le 1er Août, en nettoyant l'instrument, la lunette a été heurtée près de l'oculaire, ce qui a occasionné un changement dans l'erreur d'axe optique.

Le 3, Mire Sud-35°,75. Mire Nord C-21°,88. Mire Nord D-53°,06. Niveau-2°,55. d+9°,50.

Nadir 146°10'0",93.

59

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

JOURS	1(0.11	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	_	)MÈTRE	RÉFRACTION	LIEU du
3.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	IRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	Пох.	POLE.
	Anonyme γ Aigle α Aigle β Aigle α Taureau α Cocher β Orion α Taureau α Orion	h. m. s. 19.29.31,80 19.39. 5,00 19.43.25,16 19.47.54.03 4.27.14,52 5. 5.32,65 5. 7.15,04 5.16.43,69 5.46.57,95	s. + 1,07 - 0,35 - 0,38 - 0,41 - 0,26 + 0,16 - 0,62 - 0,11 - 0,39	5,47 - 5,47 - 5,55 - 5,49 - 5,65 - 5,65 - 5,73 - 5,80	353. 0.52,7 290.13.59,7 288.27.30,5 286. 1.12,3 296.10.37,1 325.48.12,8 271.36.33,6 308.26.39,8 287.21.10,8	732,1 732,0 732,0 732,0 732,0 731,9	+18,5 +18,9 +18,8 +19,0 +19,2	+15,1 +17,2 +17,6 +17,8 +17,9	+ 27,8 - 39,8 - 42,5 - 46,3 - 31,5 - 0,4 -1.16,4 - 17,4 - 43,7	0,7 0,4 4,4 57,5 3,8 0,4 0,5 2,9
4	Soleil, bord 1, sup.	8.55.20,00 · 4.26.14,14 5. 5.31,68 5. 7.14,66 5.16.43,34 6.38.26,84	- 0,23 - 0,26 + 0,16 - 0,62 - 0,11 - 0,76	- 5,9° 5,77 - 6,°6 - 6,11 - 5,9°	297.32.14,2 296.10.38,0 325.48.11,6 271.36.33,0 308.26.41,5 263.28.53,3	731,7 730,1 730,1 730,1 730,0	+19,3 +19,3 +19,8	+20,8 +18,1 +20,1 +20,3 +21,0	- 29,4 - 31,3 - 0,3 -1.15,4 - 17,2 -1.43,5	58,5 2,7 0,7 2,3 3,4
5	Soleil, bord 1, inf  Grande Ourse  Vénus, bord 1, centr.  Jupiter, centre	8.59.10,64 10.54.17,43 11.29.45,59 11.34.41,82	- 0,24 + 0,56 - 0,43 - 0,44	- 5,84	296.44.26,0 342.37.23,0 284. 8.27,8 283.56.49,9	729,4 728,9 728,7	+22,2 +24,2 +24,4	+24,2 +28,5 +28,5 +28,5 +28,5	- 29,9 + 15,3 - 47,0 - 47,3	3,3
	3 Lion	11.41.18,60 11.45.47,71 13. 5.52,69 13.17.13,20 14. 8.44,08 14.51. 3,55	-0.28 $+0.34$ $-0.65$ $-0.21$ $+1.22$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	334.29.45,7 11.26.52,0 169.36.39,7 299.56.28,1	728,7 728,4 728,4 727,9	+26,6 +25,7 +26,0 +25,3	+28,3 +28,1 +28,2 +27,7	+ 7,6 + 52,7 -1.18,9 - 25,8	4,7 7,5 1,6 58,7
	α Couronne α Serpent	15.28.15,47 15.36.48,63 15.51.24,91 15.56.39,71 16.20. 9,77	- 0,11 - 0,40 - 0,87 - 0,82 - 0,96	- 6,00 - 6,17 - 6,38	307.11.53,4 286.52.58,7 257.48.44,9 260.36.33,0 253.55. 5,1	727,5 727,5 727,5	+24,4 +24,0 +23,4	+26,5 +26,3 +21,5 +21,8	- 18,0 - 42,9 -2.13,2 -1.56,8 -2.44,6	0,3 4,7
	Groombridge 2404. Groombridge 2411. Groombridge 2418. Anonyme	16.56.31,37 16.59.11,57 17. 3.28,03 17. 4.23,61 17. 7.44,48 17.27.54,54 17.33.26,11	+ 1,11 + 1,13 + 1,14 - 0,29 - 0,31 + 1,16 + 1,16	- 6,18 - 5,95	353. 7. 9,1 353.22.15,5 353.29. 9,2 294.32.39,4 292.39.11,4 353.59.28,7 354. 3.19,3	727,6	+23,2	+21,4		59,0 58,6
	Anonyme y Dragon	17.48.34,21	+ 1,16	- 6,25	353.59.39,7 331.28.51,3				+ 28,4 + 5,0	7,6

Le 5, Mire Sud-37P,96. Mire Nord C-20P,00. Niveau-1P,90.

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERM		RÉFRACTION	LIEU du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	IION.	POLE.
	Anonyme Lalande 34077 Lalande 34107  Petite Ourse S	h. m. s. 17.57.38,52 18.15.41,56 18.16.13,13 18.20.41,43	s + 1,19 + 1,19 + 1,19	\$.	354.22.28,9 354.18.29,5 354.14.49,8 6.33.27,0	727,8 727,8	+22,3 +22,2	+19,9 +20,0	+ 28,8 + 28,7 + 28,6 + 45,7	5,1
	a Lyre	18.31.47,35 18.37. 3,64 18.39.15,06 18.41.12,69 18.49.25,94	+ 0,05 - 0,81 - 0,81 - 0,81 + 1,16	- 6,40	318.37.18,2 261.29.11,8 261.25. 9,1 261.23.55,5 353.52.35,3			+20,0	- 7,1 -1.53,0 -1.53,4 -1.53,6 + 28,3	4,8
	AnonymeAnonymeAnonymeAnonyme	18.58.24,44 19. 1.33,62 19. 7. 6,76 19.10.19,54 19.18.21,26	- 0,87 - 0,86 - 0,86 + 1,09		258. 9.52,6 258. 5.45,1 258.47.33,6 258.50.42,5 353. 2.29,7	727:9	+21,8	+19,1	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	Anonyme Anonyme  y Aigle  a Aigle  ß Aigle	19.21.42,95 19.29.30,52 19.39. 3,98 19.43.24,42 19.47.53,31	+ 1,12 + 1,07 - 0,35 - 0,38 - 0,41	- 6,49 - 6,22 - 6,28	353.13.35,3 353. 0.58,8 290.14. 0,5 288.27.29,0 286. 1. 9,5	727,8	+21,3	+18,5	+ 27,5 + 27,3 - 39,1 - 41,7 - 45,5	1,8 59,4 2,1
6	Soleil, bord 1, sup.	9. 2. 0,94	- 0,26		296.59.42,8	725,3	+22,3	+24,1	- 29,5	
7	α Taureauα Cocher	4.27.13,04 5. 5.30,93	- 0,30 + 0,04	- 7,13 - 6,74	296.10.40,2	732,8	+17,8	+13,5	- 31,9	59,8
	B Orion	5. 7.13,81 5.16.42,56 6.38.25,86 7.24.54,26 7.31.20,15	- 0,61 - 0,17 - 0,72 - 0,12 - 0,42	- 6,97 - 7,04 - 6,92 - 6,88 - 7,07	271.36.39,9 308.26.45,9 263.28.58,2 312.10.53,6 285.35. 0,4	732,8 732,8 732,7 732,6	+17,8 +17,8 +18,1 +18,5	+14,2 +14,9 +18,0 +19,8	-1.17,4 - 17,6 -1.45,0 - 13,5 - 46,3	5,1 6,2 6,3 4,8 2,2
8	Soleil, bord 1, sup. Vénus, bord 1, centr. y Grande Ourse  a Couronne  Serpent Anonyme	11.42.20,87 11.45.46,89 15.28.14,35 15.36.47,57	- 0,31 - 0,47 + 0,20 - 0,18 - 0,41 + 0,75	- 7,21 - 7,14 - 7,20	296.26.14,5 282.37. 3,0 334.29.45,3 307.11.55,0 286.53. 0,5 354. 2.53,0	732,3 731,5 730,5	+19,2 +20,5 +20,9	+21,7 +22,5 +19,7 +16,7	- 30,7 - 50,8 + 7,8 - 18,6 - 44,1 + 28,8	3,0 1,1 5,1
	α Ophiuchus Anonyme Lalande 32630 Anonyme γ Dragon	17.27.53,20 17.33.24,67 17.40. 1,00 17.48.33,31 14.53. 2,05	- 0,34 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,12	- 7,29 - 7,43	292.39.12,7 353.59.31,7 354. 3.18,4 353.59.43,9			+16,7	- 36,1 + 28,8 + 28,9 + 28,8	58,9
	Anonyme	17.57.37,63	+ 0,77	1	354.22.28,2	730,7	1 +19,5	+16,6	+ 29,3	

Le 8, Mire Sud-36p, 11. Mire Nord C-21p, 71.

61
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BARONÈTRE	Inté-	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	Lalande 34077 Lalande 34107 δ Petite Ourse S α Lyre Anonyme Anonyme Anonyme L Dragon	h. m. s. 18.15.40,84 18.16.12,19 18.20.41,59 18.31.46,55 18.37. 2,44 18.39.14,10 68.41.11,59 18.49.24,96	+ 0,77 + 0,77 - 0,05 - 0,76 - 0,76 - 0,76 + 0,73	- 7,27	354.18.29,9 354.14.54,2 6.33.30,2 318.37.16,5 261.29.16,5 261.25.14,7 261.23.58,4 353.52.37,7	730,8	+19,3	+16,4 +16,2 +15,5	+ 29,2 + 29,1 + 46,5 - 7,2 -1.55,0 -1.55,4 -1.55,6 + 28,8	8,5 2,1
	Anonyme. Anonyme & -21°13' Anonyme & -21°13' Anonyme. Toragon. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Aigle. Aigle. Aigle. Taureau. Cocher. Gorion.	18.58.23,12 19. 1.32,48 19. 7. 5,54 19. 7.21,18 19.10.18,46 19.18.20,18 19.21.42,13 19.29.29,68 19.39. 3,16 19.43.23,26 19.47.52,45 4-27.12,75 5. 5.30,61 5. 7.13,44	- 0,82 - 0,81 - 0,81 - 0,81 + 0,70 + 0,70 + 0,69 - 0,36 - 0,41 - 0,41 - 0,61	- 7,32 - 7,38 - 7,14 - 7,45 - 7,10 - 7,37	258. 9.55,5 258. 5.52,1 258.47.49,0 258.50.50,0 353. 2.35,3 353.13.41,1 353. 1. 0,1 290.14. 1,8 288.27.36,0 286. 1.12,5 296.10.38,2 325.48.12,7 271.36.37,5	7 <sup>3</sup> 0,9 7 <sup>3</sup> 0,9 7 <sup>3</sup> 0,9 7 <sup>3</sup> 1,0	+18,6 +18,6 +18,3 +18,5	+15,4 +14,7 +14,4 +17,1 +19,2	-2.14,6 -2.15,1 -2.10,5 -2.10,3 + 27,8 + 28,c + 27,8 - 39,8 - 42,5 - 46,4 - 31,5 - 0,3 -1.15,9	2,0 5,2 3,8 58,1 3,9 4,0
ľ	3 Taureau 3 Petite Ourse I α Grand Chien α Gémeaux β Gémeaux Soleil, bord 1, inf	5.16.42,21 6.20.49,76 6.38.25,58 7.24.54,00 7.31.20,01 7.36. 0,57	- 0,17 - 0,72 - 0,12 - 0,42 - 0,17 - 0,31	- 7,42 - 7,22 - 7,16 - 7,23 - 7,28	308.26.41,9 13.20.58,5 263.28.56,0 312.10.48,7 285.34.58,7 308.21.12,3 295.33.25,7	731,0 731,0 730,9	+19,2 +19,3 +20,4 +20,8	+19,4 +21,5 +22,0 +25,0	- 17,3 + 57,9 -1.43,3 - 13,2 - 45,4 - 17,0 - 31,1	2,5 4,7 5,0 0,3 1,3 1,5
10	Mars, centre Jupiter, centre β Lion γ Grande Ourse νénus, bord i, centr. α Hercule θ Ophiuchus α Ophiuchus Anonyme α Taureau δ Petite Ourse I	11.31.10,47 11.38. 9,24 11.41.16,96 11.45.46,23 11.50.41,43 17. 7.42,44 17.12,43,33 17.27.52,56 17.33.24,12 4.27.12,24 6.20.48,67	- 0,44 - 0,49 - 0,31 + 0,20 - 0,46 - 0,30 - 0,86 - 0,34 + 0,75 - 0,31	- 7,63 - 7,85 - 8,17 - 7,90 - 8,03	283.53.54,6 283.33.46,4 295.23. 9,3 334.29.42,7 281.35.43,9 296.38.45,3 255.10. 0,8 353.59.33,0	731,3 731,4 731,4	+21,4 +22,3 +20,9 +20,7	+23,3 +17,6 +17,3	- 48,8 - 49,3 - 31,9 + 7,8 - 52,5 - 33,4 -2.36,5 + 28,8	59,4 2,9 3,9

Le 9, Niveau-2P,68.

62

## Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

10PRS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO		RÉFRACTION	LIEU du
*	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	110N.	POLE.
	α Grand Chien	6.38.24,98	- 0,72	- 7,85	263.29. 2,2	731,8	+18,9	+16,5	-1.45,4	9,5
II	Soleil, bord 1, sup. Mars, centre Jupiter, centre	9.22. 3,96 11.33.28,33 11.38.51,49	- 0,31 - 0,44 - 0,44		295.34. 1,8 283.38.28,9 283.29.15,7	730,8 729.7	+20,3 +20,6	+20,5 +21,8	- 31,8 - 49,0 - 49,3	
	3 Lion	11.41.16,68 11.45.45,81 11.54.50,51 12.33.56,49	- 0,31 + 0,20 - 0,46 - 0,50 - 0,50	- 7,91 - 8,26	295.23. 9,3 334.29.44,6 281. 4.55,8 279.21.25,0	7 <sup>2</sup> 9,5 7 <sup>2</sup> 9,3	+21,0 +21,2	+22,0 +23,2	- 31,8 + 7,8 - 53,5 - 56,6 - 56,0	59,5 5,0
	A Petite Ourse I  A Vierge  Grande Ourse  Bouvier	12.41.42,79 13. 5.51,41 13.17.10,84 13.41.29,17 14. 8.41,90	- 0,63 + 0,08 - 0,25	- 8,31 - 8,09 - 8,18	279.38.46,0 169.36.43,4 330. 2. 3,3 299.56.29,5	729,2 729,1	+21,4 +21,4 +21,4	+21,9 +21,9 +20,9	-1.20,7 + 3,6 - 26,4	3,1 5,0 59,5
	3 Petite Ourse Lalande 32630 Anonyme	14.51. 1,31 17.40. 0,37 17.48.33,00	+ 0,79 + 0,75 + 0,75 + 0,12	- 8,35 - 8,23	354.44. 2,2 354. 3.21,0 353.59.45,2 331.28.53,0	728,9 728,8	+21,3 +20,8	+20,4 +18,4	+ 29,2 + 28,6 + 28,6 + 5,0	7,5
	Anonyme Lalande 34077 Lalande 34107	17.57.37,18 18.15.40,18 18.16.11,61	+ 0,77 + 0,77 + 0,76	3,20	354.22.27,2 354.18.31,4 354.14.52,9	728,7	+19,9	+17,8	+ 29,1 + 29,0 + 28,9	8,6
	d Petite Ourse S	18.37. 1,70	- 0,05 - 0,76 - 0,76	- 8,29	6.33.31,4 318.37.21,4 261.29.13,2 261.25.14,7	728,7	+19,9	118,8	- 7,2 -1.54,0 -1.54,4	6,7
	Anonyme	18.58.22,56	- 0,76 + 0,73 - 0,82 - 0,82		261.23.58,2 353.52.36,2 258.10. 0,3 258. 5.51,0	728,7	+19,7	+17,3	-1.54,5 + 28,5 -2.13,4 -2.13,8	
	Anonyme δ-21°12' Anonyme  T Dragon	19. 7.20,44 19.10.17,72 19.18.19,58	- 0,81 - 0,81 - 0,81 + 0,70		258.47.42,1 258.50.48,1 353. 2.33,9	0.0			-2. 9,4 $-2. 9,1$ $+ 27,5$	
14	Anonyme  B Lion  G Grande Ourse	11.41.15,84	+ 0,70 - 0,31 + 0,20	- 8,73 - 8,55	353.13.41,1	728,6	†19,7	+17,1	+ 27,7	
	α Petite Ourse I α² Gémeaux α Petit Chien β Gémeaux	7.24.52,54 7.31.18,47	- 0,12 - 0,42 - 0,17	- 8,75 - 8,88 - 881						

Le 11, Mire Sud-351,00. Mire Nord C-201,47. Niveau-21,21. d+81,70. Nadir 1/6010' 1",30. Le 12, le niveau du cercle a été enlevé pour être réparé; il a été replacé le 19.

63

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

IOHRS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE des verniers	BAROMÈTRE	THERMO	WÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
5	. DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ETRE.	laté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
15	Soleil, bord 2   a Petite Ourse I	9.39.19,14 13. 5.50,91	- 0,33	5.	0 1 27	Min.	Ø	a	, ,,	11
16	Soleil, bord 1  bord 2 β Lion γ Grande Ourse α Petite Ourse I α Vierge	9.40.52,62 9.43. 3,70 11.41.15,68 11.45.45,09 13. 5.50,94 13.17.10,20	- 0,33 - 0,33 - 0,31 + 0,20 - 0,63	- 8,88 - 9,39 - 9,26			·			
17	α Hercule	17. 7.41,12 17.27.51,16 18.20.37,56 5.46.54,79 6.20.42,76 6.38.23,66	- 0,31 - 0,34 - 0,41 - 0,72	- 9,38 - 9,21 - 9,33 - 9,34		-				
18	Soleil, bord 1 bord 2  α Orion δ Petite ()urse I α Grand Chien α Petit Chien β Gémeaux	9.48.20,60 9.50.31,18 5.46.54,53 6.20.44,66 6.38.23,48 7.31.17,81 7.35.58,33	- 0,34 - 0,34 - 0,41 - 0,72 - 0,42 - 0,17	- 9,62 - 9,54 - 9,61 - 9,73						
19	ô Petite Ourse S α Lyre α Orion	18.31.43,65	- 0,05 - 0,41	- 10,00 - 9,88	6.31.13,2 318.35. 4,9 287.18.56,8	728,5 728,5 728,0	+20,9 +20,8 +19,8	+19,8 +19,5 +19,1	+ 45,7 - 7,1 - 43,3	48,4 48,8 47,8
20	Soleil, bord 1, inf  a Bouvier  a Scorpion  a Hercule  b Ophiuchus  a Ophiuchus	14. 8.40,04 16.20. 5,85 17. 7.40,46 17.12.41,01	- 0,36 - 0,25 - 0,89 - 0,31 - 0,87 - 0,34	- 9,90 - 10,00 - 10,01 - 9,83	292.10.50,7 299.54.13,9 253.52.54,7 294.30.28,7 255. 7.48,8	727,6 727,2 726,5 726,3	+20,6 +22,0 +21,0 +20,0	+22,1 +22,2 +19,4 +17,8	- 35,9 - 26,2 -2.45,8 - 33,2 -2.35,3	44,3 49,5 46,8
	Anonyme. Anonyme. Lalande 34077. Lalande 34107.  Petite Ourse S.  Lyre. Anonyme.	17.48.29,70 17.57.34,26 18.15.37,54 18.16. 8,73 18.20.35,15 18.31.43,43	+ 0,75 + 0,77 + 0,77 + 0,77 - 0,05	_	353.57.31,2 354.20.14,0 354.16.14,9 354.12.41,4 6.31.13,7 318.35. 6,9 261.27. 1,0	726,3	+19,0	+17,3	+ 28,6 + 29,0 + 29,0 + 28,9 + 46,1 - 7,2 -1.54,1	49,1 50,5

Le 20, Mire Sud-349,94. Mire Nord B+5919. Mire Nord C-219,81. Mire Nord D-579,40.

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

Sunor	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	TUERN	OUÉTRE	RÉFRACTION	LIEU
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	люх.	POLE.
		h. m. s	š.	5.	0 1 11	mu.	0	0	1 11	"
	Anonyme	18.39.11,24	- 0,76 - 0,76		261.22.57,3 261.21.45,3	726,3	+18,3	+16,5	-1.54,4	
	L Dragon	18.49.21,70	+ 0,74		353 50.21,3	/20,0	710,0	+16,5	+ 28,5	
	Anonyme	18.58.20,42	- 0,82		258. 7.40,6			,,	-2.13,5	
1	Anonyme	19. 1.29,64	- 0,82		258. 3.30,3				-2.13,7	
	y Aigle	19.39. 0,24	- 0,36	- 10,19	290.11.48,1				- 39,4	47,1
	α Aigle	19.43.20,62	- 0,38	- 9,98	288.25.20,2				- 42,1	48,4
1	3 Aigle	19.47.49.45	- 0,41	- 10,11	285.58.57,0	726,6	+18,2	+15,4	- 45,9	47,5
	α Capricorne	20. 9.13,06	- 0,67	- 9,94	00 5				2	
	α <sup>2</sup> Capricorne	20. 9.36,86	- 0,67	- 10,09	266.57.10,5				-1.31,1	48,5
	3º Capricorne	20.12.27,96	- 0,71		264.42.38,8	726,6	+18,1	+15,0	-1.39,8	
	15 v Capricorne Lune, bord 1, inf	20.31.23,52	- 0,78		260.55.11,5	726,6	+18,0	+15,4	-1.57,4	
	α Cygne	20.36.12,09	- 0,78 + 0,04	- 9,81	300.55.11,5	/20,0	710,0	710,+	-1.3/14	
	α Orion	5.46.53,99	- 0,41	- 10,21	287.18.56,2	725,0	118,0	+18,5	- 43,2	47,5
	. O	5.40.00,99	7,4.	,	20/110100,2	/,-	120,9		1-1-	177
21	α Petite Ourse I	13. 5.54,33			11.24.29,4	723,8	+20,5	+19.9	+ 53,9	50,1
	α Vierge	13.17. 8,91	- 0,63	- 10,13	. 3/1					
1	α Hercule	17. 7.40422	- 0,30	- 10,23	294.30.27,7	723,4	+20,5	+21,3	- 32,7	46,2
	θ Ophiuchus	17.12.40,75	- 0,87		255. 7.42,0				-2.32,8	
	α Ophiuchus	17.27.50,08	- 0,34	- 10,23	292.36.58,3	723,7	+20,9	+21,2	- 35,2	44,7
	Lalande 32630	17.39.57,37	+ 0,75		354. 1. 5,2			+21,2	+ 28,1	
	Anonyme	17.48.29,30	+ 0,75	,	353.57.33,0			+20,9	+ 28,1	e !
	y Dragon	17.52.58,72	+ 0,12	- 10,/2	331.26.36,6	2		: 8	+ 5,0	50,1
	Anonyme	17.57.33,98	+ 0,77	/ -	354.20.13,9 287.18.53,3	723,9	+20,8	÷20,8 +18,8	+ 28,6	44,2
1	α Orion	5.46.53,76	- 0,41	- 10,47	207.10.55,5	727,3	+21,7	+10,0	- 40,5	44,2
22	Soleil, bord 2	10. 5.19,92	- 0,37							
1 2	α Petite Ourse I	13. 5.54,21	5,07		11.24.29,1	727,5	+21,7	+20,7	+ 54,0	50,2
	α Vierge	13.17. 8,66	- 0,63	- 10,37	-4- 5/	1 11	' "	.,		
	α Bouvier	14. 8.39,48	- 0,25	- 10,45	299.54.12,8	727,2	+21,7	+20,4	- 26,4	43,x
1	α Ophiuchus	17.27.49,81	- 0,34	- 10,48	292.36.58,2	727,0	+20,7	+19,0	- 35,6	45,3
	Lalande 32630	17.39.56,76	+ 0,75		354. 1. 5,3			0.0	+ 28,5	,
	γ Dragon	17.52.58,40	+ 0,12	- 10,71	331.26.36,3	727,3	+20,4	+18,3	+ 5,0	49,7
	o Petite Ourse S	18.20.33,70		/ /	2.026	2		1.80		50,5
	a Lyre	18.31.43,15	- 0,05	- 10,44	318.35. 7,2 261.26.57,8	727,3	+20,2	+18,0	- 7,2 -1.53,7	30,3
	Anonyme	18.36.59,32	- 0,76 - 0,76		261.22.59,0				-1.54,1	
	Anonyme	18.39.10,64	- 0,76		261.21.46,5				-1.54,3	1
	L Dragon	18.49.21,14	+ 0,74		353.50.23,2	727,2	+19,8	+17,3	+ 28,4	
1	Anonyme	18.58.55,84	- 0,82		258. 2.30,0	/-/	, - 3,-	, ,,-	-2.13,6	1
	Anonyme		· -		258. 3.32,3			+17,3	-2.13,5	

Le 21, Niveau-21,32. d+81,89.

Le 22, Mire Sud-34°,39. Mire Nord B+5°,38. Mire Nord C-20°,94. Mire Nord D-55°,62.

65
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-	ECTION de .	MOYENNE  DES VERNIERS  corrigée  pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté-	ONÈTRE Exté-	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
24	Anonyme.  τ Dragon. Anonyme. Anonyme. Anonyme. A Aigle.  α Aigle. Β Aigle. Β A. C. 6850. Anonyme δ-22°31′ Lalande 38250. Anonyme. α² Capricorne. α² Capricorne. Lalande 39318. Piazzi, XX, 166. Piazzi, XX, 166. Piazzi, XX, 167. Anonyme. 15 υ Capricorne. α Cygne. α Orion. α Grand Chien. α Scorpion. α Hercule. θ Ophiuchus. α Ophiuchus. α Ophiuchus. Lalande 32630. Anonyme.	h. m. s 19.10.15,18 19.10.15,18 19.18.16,70 19.21.38,55 19.29:25,98 19.38.59,74 19.43.20,00 19.47.48,85 19.50.33,36 19.52.38,46 19.55.26,81 20. 2.27,07 20. 9.36,34 20.12.27,34 20.12.10,74 20.23.19,21 20.28.45,66 20.31.23,10 20.36.11,49 5.46.53,55 6.38.22,50 16.20. 4,51 17. 7.39,16 17.12.39,16 17.12.39,16 17.12.39,16 17.27.49,12 17.39,56,53	ment.  - 0,81 + 0,70 + 0,69 - 0,36 - 0,38 - 0,84 - 0,84 - 0,67 - 0,67 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,94 -	pendule.  - 10,68 - 10,59 - 10,69  - 10,47 - 10,60  - 10,71 - 10,61 - 11,24 - 11,14	258.48.30,3 353.0.20,6 353.11.23,3 352.58.47,1 290.11.46,9 288.25.21,2 285.58.58,3 257.21.30,0 257.21.59,3 257.21.59,3 257.34.50,5 266.59.28,7 264.42.34,7 257.27.31,8 257.18.28,5 261.18.10,0 32.440.58,5 287.18.54,9 263.26.43,5 253.52.55,5 294.30.28,9 255.7.49,4 292.37, 2,2 354.1.7,5 353.57.33,8	727,2 727,1 727,0 726,9 727,6 728,1 732,2 732,4 732,5	+19,3 +19,0 +19,0 +19,0 +18,8 +19,2 +20,0 +19,3 +18,6 +18,2	rieur.  0 +17,3 +17,2 +17,0 +16,9 +16,9 +16,4 +14,4 +14,4 +14,4	-2. 8,7 + 27,7 + 27,7 + 27,7 + 27,4 - 39,3 - 41,9 - 2.18,5 -2.17,0 +1.30,5 -1.39,2 -2.18,0 -1.43,4 -43,4 -1.43,4 -2.49,1 -33,9 -2.38,5 -36,5 +29,2 +29,1	46,1 49,3 48,8 50,0 51,8 45,6 50,8 46,9 46,0 46,8
	y Dragon Anonyme Lalande 34077 Lalande 34107 δ Petite Ourse S α Lyre Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Δ-18°36' L Dragon Anonyme Anonyme δ-21°55' Anonyme δ-21°55'	17.52.57.97 17.57.32.97 18.15.36,06 18.16. 7,53 18.20.33,62 18.31.42.99 18.36.58,16 18.39. 9,78 18.41. 7,36 18.49.20,84 18.55.13,64 18.55.13,64	+ 0,12 + 0,77 + 0,77 + 0,77 - 0,05 - 0,76 - 0,76 - 0,76 - 0,75 - 0,83 - 0,83	- 11,08 - 11,47	331.26.36,9 354.20.15,4 354.16.14,7 354.12.43,2 6.31.16,0 318.35. 8,8 261.27. 1,8 261.23. 2,1 353.50.19,3 258.13.30,7	732,7	+17,6	+14,4	+ 29,6 + 29,6 + 29,5 + 29,4 + 46,9 - 7,3 -1.56,2 -1.56,7 + 29,1 -2.15,8	51,7 51,7

Le 24, Niveau-29,89.

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-	de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée DOUT le niveau.	BAROMÈTRE.	Inté-	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
Anonyme &-21°13' Anonyme Anonyme	h. m. s. 19. 7. 1,44 19. 7.16,98 19.10.14,30	°. - 0,81 - 0,81 - 0,81	s.	258.45.41,9 258.48.35,9	mm.	o .	+12,4	-2.12,3 -2.10,0 + 28,2	"
Anonyme. Anonyme. Anonyme.  y Aigle.  \( \alpha \) Aigle.	19.21.38,13 19.29.25,32 19.33.51,44 19.38.59,00 19.43.19,10	+ 0,70 + 0,68 - 0,36 - 0,36 - 0,38	- 11,40 - 11,47	353.11.24,2 352.58.49,2 290.17. 1,7 290.11.48,8	732,8	+15,2	+12,0 +11,7	+ 28,4 + 28,2 - 40,2 - 40,3	46,5
B. A. C. 6850 Anonyme Lalande 38250 Anonyme	19.50.32,75 19.52.37,64 19.55.25,97 20. 2.26,25	- 0,41 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84	- 11,58	257.21.35,2 257.27.17,6 257.22. 3,1 257.34.51,9				-2.22,3 -2.21,6 -2.22,4 -2.20,7	46,4
α <sup>1</sup> Capricorne α <sup>4</sup> Capricorne β <sup>2</sup> Capricorne Lalande 39318 Piazzi, XX, 166	20. 9.11,64 20. 9.35,58 20.12.26,68	- 0,67 - 0,67 - 0,71 - 0,84 - 0,84	- 11,35 - 11,36	266.57.14,1 264.42.39,4 257.27.40,3 257.18.54,5	732,8	+15,1	+11,7	-1.33,0 -1.41,9 -2.21,5 -2.22,6	50,0
Anonyme &-21°51' Lalande 39739 15 v Capricorne 2 Cygne 3 Orion	20.36.10,81 4.27. 9,26 5. 7. 9,86	- 0,84 - 0,83 - 0,83 - 0,77 + 0,04 - 0,31 - 0,61	- 11,06 - 11,43 - 11,39	258. 1.37,3 261.18. 8,8 324.41. 1,0 296. 8.25,1 271.34,24,8	7 <sup>3</sup> 2,9 7 <sup>3</sup> 3,7 7 <sup>3</sup> 3,7	+11,9 +16,5 +15,9	+11,8 + 9,4 +11,0	-2.17,5 -1.57,9 - 1,4 - 32,4 -1.18,4	53,7 42,5 46,8
3 Taureau  α Orion  δ Petite Ourse I  α Grand Chien  α Petit Chien  3 Gémeaux  3 Gémeaux	5.46.52,93 6.20.39,76 6.38.21,84 7.24.50,52 7.31.16,09	- 0,18 - 0,41 - 0,72 - 0,12 - 0,42 - 0,18	- 11,35 - 11,38 - 11,32 - 11,02 - 11,44 - 11,28	287.18.56,6 13.18.35,6 263.26.45,6 312. 8.33,1 285.32.49,4	733,8 733,8 733,9 733,9 734,0	+15,9 +16,3 +16,3 +16,4 +16,7	+11,2 +12,4 +13,7 +14,1 +15,0	- 44,7 + 59,7 -1.49,1 - 13,7 - 47,0	44,7 45,9 46,6 47,0 45,3 49,3 45,2
α Petite Ourse I α Vierge	10.14.11,62 12. 5.54,65 12.52.27,71 13. 5.52,83 13.17. 7,42	- 0,36 - 0,49 - 0,59 - 0,63 + 0,08	- 11,58 - 11,35	290.29.34,7 279.56.18,7 273.52.46,7 11.24.25,5 269.34.26,0 329.59.44,0	733,8 733,8 733,9 734,0 734,0	+18,0 +18,6 +19,0 +19,1 +19,3 +19,3	+17,4 +18,9 +19,0 +18,9 +18,8 +19,2	- 39,2 - 56,6 -1.10,1 + 54,8 -1.22,1 + 3,7	48,2 43,5 47,7
	Anonyme &-21°13' Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Aigle B Aigle B Aigle B Aigle B Ac. 6850 Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Aricapricorne Capricorne	Anonyme δ-21°13′ Anonyme 19. 7.16,98 Anonyme 19. 7.16,98 Anonyme 19. 10.14,30 τ Dragon 19.18.16,18 Anonyme 19. 29.25,32 Anonyme 19. 33.51,44 γ Aigle 19. 38.59,00 α Aigle 19. 43.19,10 β Aigle 19. 47.47,95 Β. A. C. 6850 19. 43.19,10 β Aigle 19. 52.37,64 Lalande 38250 19. 52.37,64 Anonyme 20. 2.26,25 Anonyme 20. 2.26,25 Anonyme 20. 2.26,25 Anonyme 20. 3.5,586 β² Capricorne 20. 9.11,64 α² Capricorne 20. 9.11,64 α² Capricorne 20. 9.21,68 Lalande 39318 20.12.26,68 Lalande 39318 20.12.26,68 Lalande 39739 20.23.23,667 Anonyme δ-21°51′ Lalande 39739 20.29.26,66 15 υ Capricorne 20.31.22,18 α Cygne 20.36.10,81 α Taureau 4.27 9.26 β Orion 5.46.52,93 β Petite Ourse I 6.38.21,84 α² Gémeaux 7.24.50,52 α Petit Chien 7.31.16,09 γ 35.56,93  Soleil, bord 1, inf 10.14.11,62 19. 7. 1,44 19. 7. 1,44 19. 7. 1,44 19. 7. 1,44 19. 7. 1,44 19. 38.59,90 19. 42.19,10 19. 20.32,7,5 19. 50.32,7 19. 50.32,7 19. 50.32,7 19. 50.32,7 19. 50.32,7 19. 50.32,7 19. 50.32,7 19. 50.32,7 19. 50	NOM  DES ASTRES.  Fil Méridien.  h. m. s.  Anonyme δ-21°13′ 19. 7. 1,44′ - 0,81 19. 7.16,98′ - 0,81 19.10.14,30 - 0,81 19.10.14,30 - 0,81 19.21.38,13 + 0,70 Anonyme.  Anonyme 19.21.38,13 + 0,70 19.29.25,32 + 0,68 19.38.59,00 - 0,36 α Aigle.  Anonyme 19.38.59,00 - 0,36 α Aigle.  19.47.47.95 - 0,41 19.50.32,75 - 0,84 Anonyme.  20.226,25 - 0,84 19.50.32,75 - 0,84 Anonyme.  21.55.25,97 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 2.26,25 - 0,84 20. 20.23.26,66 - 0,71 20.28,45,04 - 0,83 20.29.26,66 - 0	The base   Fil Meridien   Fil Fil Meridien   Fil	NOM   Fassage condition   Nom   Fassage contrigée   Pour le niveau.	NOM DES ASTRES.    Fil Méridien.   DES VERNIERS   NOM   PASSAGE OWALL   Surprise   Power   Po	NOM   PASSAGE OF COLUMN   NOM   Fill Méridien.   DES YERRIERS   DES YERRIERS   DES YERRIERS   DES YERRIERS   Des Yerrigide   Deur le niveau.		
Le 25, Mire Sud-33P,71. Mire Nord B+5P,32. Mire Nord C-21P,62. Mire Nord D-55P,50.

67
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

Jours	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	-	OMÉTRE	RÉFRACTION	LIEU du
	HES ASIRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	pendule.	pour le niveau.	RE.	Inté- ricur.	Exté- rieur.	ION.	POLE.
	α Couronne α Serpent β t Scorpion α Hercule θ Ophiuchus α Ophiuchus Lalande 32630	h. m. s. 15.28. 9,77 15.36.43,07 15.56.34,10 17. 7.38,80 17.12.39,47 17.27.48,90	5. - 0,18 - 0,41 - 0,76 - 0,30 - 0,87 - 0,34 + 0,75	- 11,41 - 11,44 - 11,59 - 11,35	286.50.44,2 260.34.21,3 294.30.31,2 255. 7.48,1 292.37. 4,4 354. 1. 6,7	734,0 734,0 734,4 734,5	+19,1 +19,0 +18,5 +18,4	+18,7 +18,1 +16,2 +16,4 +16,5 +16,3	- 44,5 -1.59,3 - 33,8 -2.37,8 - 36,3 + 29,1	47,9 48,4 49,1
	Anonyme  y Dragon Anonyme. Lalande 34077 Lalande 34107  d Petite Ourse S  a Lyre.	17.48.28,37 17.52.57,56 17.57.32,82 18.15.35,82 18.16. 7,25 18.20.32,29	+ 0,75 + 0,12 + 0,77 + 0,77 + 0,77	- 11,46 - 11,45	353.57.32,0 354.20.18,0 354.16.17,3 354.12.40,6 318.35. 7,2	734,7	+18,0	+16,2 +16,2 +15,9	+ 29,0 + 29,5 + 29,4 + 29,3 - 7,3	/0.0
	8 Petite Ourse I  Retit Chien  Gémeaux	6.20.38,63 7.31.16,03 7.35.56,69	- 0,63   - 0,43   - 0,17	- 11,55 - 11,54	285.32.50,7 308.18.55,9	735,4	+16,9	+17,1	- 47,0 - 17,6	49,9 50,8 45,5
26	Soleil, bord 1, sup.  A Hercule Petite Ourse S Anonyme Lalande 34849 Anonyme Anonyme &-18°26'	10.17.51,63 17. 7.38,80 18.20.30,41 18.34.14,91 18.39. 3,70 18.42.12,24 18.42.24,06	- 0,36 - 0,32 - 0,76 - 0,76 - 0,76	- 11,57	290.40.31,9 294.30.28,7 6.31.15,7 261.39.42,2 261.34.42,4 261.36.25,9	734,9 734,9 735,3	+18,3 +18,8 +18,4	+20,2 +16,8 +15,6	- 38,6 - 33,8 + 46,8 -1.54,8 -1.55,3 -1.55,2	45,8 51,0
	Anonyme	18.46.43,99 18.50.32,64 18.55.13,28 18.57.55,78 19. 2.56,02 6.20.38,90	- 0,76 - 0,77 - 0,77 - 0,82 - 0,82 - 0,82		261.23.54,8 261.14.17,1 258.13.26,7 258.19. 4,6 258.38.22,5 13.18.36,8	735,5 736,3	+17,9 +18,1	+14,8 +16,8	-1.56,3 -1.57,1 -2.15,1 -2.14,5 -2.12,5 + 59,2	47,6
27	Soleil, bord 1, inf.  12 \( \alpha \) Chiens de chasse Vénus, bord 1, centr. \( \alpha \) Petite Ourse I \( \alpha \) Vierge \( \alpha \) Grande Ourse \( \alpha \) Bouvier \( \alpha \) Couronne \( \alpha \) Serpent \( \alpha \) Serpent	10.21.31,22 12.48.48,23 13. 0.38,85 13. 5.56,39 13.17. 7,14 13.41.25,19 14. 8.38,12 15.28. 9,47 15.36.42,75 15.39. 5,65	- 0,37 - 0,01 - 0,61 - 0,63 + 0,16 - 0,24 - 0,15 - 0,40 - 0,30	- 11,84 - 11,64 - 11,71 - 11,64 - 11,72	289.47.58,9 319. 3.43,4 272.52.31,0 11.24.23,8 269.34.25,5 329.59.45,2 299.54.14,4 307. 9.42,6 286.50.46,7 295.50. 9,9	735,4 735,0 735,0 734,9 734,8 734,7	+19,4 +20,2 +20,3 +20,3 +20,3 +20,3 +20,3	+20,2 +22,0 +22,4 +21,9 +22,5 +22,3 +21,8	- 39,9 - 6,7 -1.12,0 + 54,3 -1.21,4 + 3,6 - 26,5 - 18,5 - 44,0 - 31,5	46,5 43,5 49,1 44,8 48,6 50,9

Le 26, Mire Sud-34P,49. Mire Nord B+5P,69. Mire Nord D-56P,94.

Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

IOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU an Fil Méridien.	CORR l'instru- ment.	ECTION de la pendule.	MOYEXXE  DES VERNIERS  COTTIGES  pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO	Exté-	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	& Scorpion	h. m. s. 15.51.19,03 15.56.34,00	- 0,84 - 0,79	\$.	257.46.34,3 260.34.17,7	734,5	+20,3	+21,1	-2.14,9 -1.58,1	"
	α Scorpion α Hercule 68 u Hercule 49 σ Ophiuchus	16.20. 3,87 17. 7.38,62 17.11.36,87 17.18.54,71	- 0,93 - 0,31 - 0,08 - 0,43	- 11,90 - 11,74	253.52.56,5 294.30.29,1 313.12.10,2 284.13.20,0	734,5 734,6	+20,3	+20,6 +20,2	-2.46,9 - 33,4 - 12,4 - 48,6	50,1 46,6
	λ Scorpion α Ophiuchus 56 ο Serpent γ Télescope	17.23.17,43 17.27.48,62 17.32.50,08 17.39.30,89	- 1,18 - 0,69 - 1,18	- 11,59	243. 3.19,5 292.37. 4,0 267. 9.59,7 243. 3.19,2	734,5	+20,1	+19,7	-6.55,3 - 35,9 -1.29,8 -6.55,7 - 8,5	49,0
	Anonyme θ Hercule γ Dragon Anonyme δ-22°3'. Anonyme	17.47.25,21 17.50.56,21 17.52.56,88 17.57.38,62 18. 1.32,54	- 0,03 - 0,03 + 0,18 - 0,84 - 0,84	- 12,02	317.15.36,5 317.12.39,2 331.26.35,0 257.42.24,2	_2/ K	÷20,0	+19,1	$\begin{bmatrix} -8,5 \\ -8,5 \\ +5,1 \end{bmatrix}$	47,8
	Anonyme $\delta$ -22°2′. $\delta$ Sagittaire	18. 5.38,46 18.11.14,99 18.17. 8,50 18.20.28,43	- 0,84 - 1,01 - 0,22		250. 6.15,1 301.38.44,7	734,5	720,0	+19,0	-3.34,5 - 24,8	
	AnonymeLalande 34849	18.31.41,43 18.34.14,79 18.39. 3,62 18.42.12,08	- 0,01 - 0,78 - 0,78 - 0,78	- 12,03	318.35. 7,3 261.39.36,5 261.34.36,5 261.36.23,8	734,7	+20,0	+18,0	- 7,1 -1.53,5 -1.53,9 -1.53,8	49,9
	Anonyme 8-18°26' Anonyme Lalande 35359 Anonyme	18.46.44,02 18.50.31,42 18.55.13,18	- 0,78 - 0,78 - 0,78 - 0,84		261.23.49,6 261.11.56,1 258.13.26,4				-1.54,9 -1.56,0 -2.13,6	
	Anonyme	19. 2.55,56 19. 7. 0,78 19. 7.16,50	- 0,84 - 0,84 - 0,83 - 0,83		258.19. 2,2 258.38.23,9 258.45.23,3	734,8	+19,3	+17,7	-2.13,0 -2.11,0 -2.10,5	
	Anonyme δ-20°49' Lalande 36878 Anonyme	19.23. 7,48	- 0,83 - 0,83 - 0,82 - 0,82		259.15.17,7 259.16.23,6	734,8	+19,0	+16,7	-2. 9,6 -2. 6,6 -2. 6,5	
	Anonyme  y Aigle  a Aigle  ß Aigle	19.33.50,84 19.38.58,36 19.43.18,60 19.47.47,47	- 0,36 - 0,36 - 0,38 - 0,41	- 12,02 - 11,95 - 12,04	290.17. 0,0 290.11.46,5 288.25.20,4 285.58.59,2				- 39,6 - 39,8 - 42,4 - 46,3	44,4 47,5 48,6
	B. A. C. 6850 Anonyme Lalande 38850	19.52.37,09	- 0,86 - 0,86 - 0,86		257.21.30,4 257.27.14,1 257.22. 0,5			+16,0	-2.20,3 -2.19,7 -2.20,4	

Le 27, Mire Sud-36°,13. Mire Nord B+5°,70. Mire Nord C-20°,35. Mire Nord D-52°,79. Niveau-3°,16. d+7°,43.

69
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

Jouns.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU- an Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERM	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Anonyme	h. m. s. 20. 2.25,77 20. 5.19,53 20. 9.11,06 20. 9.35,04 20.12.26,15 20.18.19,44	s. - 0,86 - 0,86 - 0,69 - 0,69 - 0,72 - 0,86	s. - 11,93 - 11,90	257.34.50,0 257.29. 2,0 266.59.25,7 264.42.35,3 257.30.14,3	nm.	o	+15,9	-2.18,9 -2.19,9 -1.31,8 -1.40,7 -2.19,6	45,7
	Lalande 39318  Piazzi, XX, 167.  Lalande 39739  α Cygne  α Taureau  β Orion  β Taureau  α Orion	20.19. 9,39 20.23.20,03 20.29.29,10 20.36.10,19 4.27. 8,64 5. 5.26,78 5. 7. 9,42 5.16.38,23 5.46.52,40	- 0,86 - 0,85 + 0,08 - 0,28 + 0,09 - 0,61 - 0,15 - 0,39	- 11,61 - 12,11 - 11,63 - 11,91 - 11,98 - 11,88	257.18.29,3 258. 1.35,7 324.41. 0,7 296. 8.26,1 325.45.56,0 271.34.24,2 308.24.29,9	734,7 734,7 734,1 734,0	+18,3 +17,7 +17,3	+15,5 +15,4 +11,9 +13,2 +13,5	-2.21,0 -2.16,0 - 1,4 - 32,2 - 0,3 -1.17,7 - 17,7	52,6 43,4 47,0 46,6 49,3
	3 Petite Ourse J 2 Petit Chien 3 Gémeaux	6.20.38,34 7.31.15,77 7.35.56,33	- 0,41 - 0,15	- 11,83 - 11,93	13.18.37,1 285.32.50,0 308.18.53,9	734,0 733,8	+17,8 +18,5	+16,6	+ 59,1 - 46,4 - 17,4	47,6 50,6 43,8
28	Soleil, bord i, sup.  B Lion  y Grande Ourse  Mercure, bord I, ctre  12   Chiens de chasse		- 0,37 - 0,29 + 0,24 - 0,47 - 0,01	- 11,81 - 12,09	289.58.36,7 295.20.51,9 334.27.23,8 280.37. 1,7 319. 3.46,4	732,7 732,4 732,4 732,0	+19,9 +20,8 +21,0 +22,2	+24,2 +25,0 +24,7 +24,8	$ \begin{array}{r} - 38,9 \\ - 31,6 \\ + 7,8 \\ - 54,1 \\ - 6,6 \end{array} $	43,1 43,2
	Vénus, bord t, centr.  α Petite Ourse I  α Vierge  η Grande Ourse  α Bouvier  γ² Petite Ourse  α Couronne  α Serpent	13. 4.44,45 13. 5.57,65 13.17. 7,12 13.41.24,84 14. 8.37,88 15.20.45,92 15.28. 9,07	- 0,59 - 0,63 + 0,16 - 0,24 + 0,75 - 0,15	- 11,85 - 11,97 - 11,94 - 12,02	272.22.33,4 11.24.24,0 269.34.25,7 329.59.42,9 299.54.11,9 352.17.49,7 307: 9.42,3 286.50.41,6	731.9 731,9 731,8 731,8 731,3	+22,5 +22,7 +22,9 +23,3 +22,4	+25,2 +25,2 +24,6 +25,0 +24,4	-1.12.2 + 53,5 -1.20,1 + 3,6 - 26,1 + 26,1 - 18,3 - 43,5	46,2 45,0 46,9 42,8 48,5 46,2
		15.36.42,53 15.39. 5,26 15.51.18,71 15.56.33,60 16.20. 3,73 17. 7.38,28 17.11.36,44 17.18.54,57	- 0,40 - 0,29 - 0,84 - 0,79 - 0,93 - 0,08 - 0,43	- 11,92 - 12,02 - 12,06	295.50. 9,2 257.46.35,7 260.34.18,9 253.52.49,7 294.30.30,5 313.12.15,0 284.13.21,1	731,1 731,1 731,1 731,1	+22,3 +22,2 +22,0 +21,6	+24,1 +23,0 +22,9 +22,5 +20,4 +20,6	- 43,5 - 31,1 -2.13,5 -1.56,8 -2.45,1 - 33,2 - 12,4 - 48,3	45,0 48,1
	λ Scorpion	17.23.17,15	- 1,18 - 0,33	- 11,93	243, 3.19,5 292.37, 1,6 267.10, 0,2			+20,6	$ \begin{vmatrix} -6.52,5 \\ -35,6 \\ -1.29,2 \end{vmatrix} $	46,8

Le 28, Mire Sud-36",29. Mire Nord B+6",13. Mire Nord C-20",80. Mire Nord D-53",32. Niveau-2",73.

70
Observations faites à la lunette méridienne en Août 1850.

tours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS  corrigge pour le niveau.	BAROMÈTHE	THERMO Inté-	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
	7 Télescope Anonyme. 6 Hercule. 7 Dragon Anonyme Anonyme Anonyme 6 Sagittaire	h. m. s. 17.39.30,61 17.47.24,99 17.50.56,09 17.52.56,75 17.57.38,52 18.132,31 18.538,22 18.11.14,89	ment.  s.  - 1,18  - 0,03  - 0,03  + 0,18  - 0,84  - 0,84  - 0,84  - 1,01	pendule. s 12,13	243. 3.16,1 317.15.39,5 317.12.43,0 331.26.40,1 257.54.46,9 257.42.24,8 257.55.30,4 250. 6.13,7	731,2	+21,3	rieur. +20,6	-6.52,4 -8,4 -8,5 +5,0 -2.14,0 -2.15,5 -2.14,1 -3.33,1	52,7
	rog F Hercule  Petite Ourse S  Lalande 34849  Anonyme  Anonyme δ-18°56'  Anonyme  Lalande 35359  Lalande 35374	18.17. 8,30 18.20.28,68 18.31.41,21 18.39. 3,42 18.42.12,02 18.42.24,00 18.46.43,56 18.50.31,26	- 0,22 - 0,01 - 0,78 - 0,78 - 0,78 - 0,78 - 0,78 - 0,78		301.38.50,4 318.35. 7,8 261.34.37,1 261.36.22,2 261.23.52,5 261.11.53,4	731.5	+19,9	+19,1	- 24,6 - 7,1 -1.53,2 -1.53,1 -1.54,1 -1.55,2	50,3
	Anonyme γ Aigle α Aigle β Petite Ourse I	18.55.12,89 19.38.58,14 19.43.18,32	- 0,84 - 0,36 - 0,38	- 12,23 - 12,22	258.13.29,6 290.11.46,0 288.25.19,3 13.18.39,0	731,4 731,5 730,0	+20,5 +20,3 +19,0	+18,9 +19,2 +16,8	-2.12,5 - 39,2 - 41,8 + 58,7	44,4 46,9 49,7
29	Soleil, bord 1, inf.  A Petite Ourse I  Vénus, bord 1, centr.  A Vierge  B Grande Ourse  B Bedite Ourse  Petite Ourse  Petite Ourse  Couronne	13. 8.49,93 13.17. 6,78 13.41.24,53 14. 8.37,62 14.42.24,92 14.50.56,10	- 0,37 - 0,60 - 0,63 + 0,16 - 0,24 - 0,72 + 0,98 + 0,75 - 0,15	- 12,18 - 12,26 - 12,19 - 12,13 - 11,99	289. 5.30,0 11.24.26,9 271.52.40,2 269.34.28,3 329.59.46,0 299.54.11,2 264.32.31,9 354.41.45,9	729.8 729.7 729.7 729.7 729.7 729.7 729.7 729.6	+20,7 +21,7 +21,8 +22,0 +22,2 +22,1 +22,1	+23,6 +22,3 +22,3 +22,3 +23,0 +23,0 +22,5 +21,6	- 40,1 + 53,9 -1,14,0 -1,20,6 + 3,6 - 26,3 -1,38,3 + 29,1 - 18,4	49,8 47,0 50,2 42,0 48,9 53,2 46,7
31	Soleil, bord 2  12 \( \alpha \) Chiens de chasse \( \alpha \) Petite Ourse I  Vénus, bord 1, centr. \( \eta \) Grande Ourse  \( \alpha \) Bouvier  \( \alpha \) Balance  \( \beta \) Petite Ourse  \( \alpha \) Couronne	10.38.14,74 12.48.47,21 13. 5.55,77 13.17. 1,12 13.41.24,25 14. 8.37,22 14.42.24,44 14.50.55,75	- 0,38 - 0,01 - 0,60 + 0,16 - 0,24 - 0,72 + 0,98 - 0,15	- 12,51 - 12,56 - 12,58 - 12,19	319. 3.49,0 11.24.26,2 270.53.32,9 329.59.48,2 299.54.14,6 264.32.37,5 354.41.45,1 307. 9.42,8	732,7 732,7 732,7 732,7 732,7 732,7	+18,0 +18,1 +18,3 +18,4 +18,5 +18,5	+17,2 +17,2 +17,4 +17,4 +17,6 +17,0	- 6,8 + 55,1 -1.18,5 + 3,7 - 26,9 -1.40,6 + 29,7 - 18,8	51,0 52,9 44,9 52,1 53,4 48,7

Le 29, Mire Sud-350,51. Mire Nord B+50,69. Mire Nord D-540,21.

71
Observations faites à la lunette méridienne en Août et Septembre 1850.

nouns.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO		RÉFRACTION	LIEU
s.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	α Serpent	h. m. s. 15.36.41,75 15.36.32,96 16.20. 2,99 17. 7.37,64 17.11.35,80 17.18.53,87 17.27.47,56 17.32.48,94 17.47.24,53 17.50.55,41	- 0,40 - 0,79 - 0,93 - 0,31 - 0,08 - 0,43 - 0,69 - 0,03 - 0,03	- 12,65 - 12,70 - 12,65 - 12,58	286.50.46,8 260.34.26,1 253.52.57,6 294.30.33,0 313.12.13,4 284.13.23,9 292.37, 3,8 267.10, 3,5 317.15.42,5 317.12.44,7	732,8 732,8 732,8 732,9	+18,2 +17,9 +17,5	+16,5 +16,1 +15,6 +15,5 +15,3 +15,2	- 44,7 -1,59,8 -2,49,2 -33,8 -12,6 -49,3 -36,4 -1,31,1 -8,6 -8,6	 50,3 48,8 49,9 48,1
	Anonyme. Anonyme. Anonyme. Sagittaire. Og F Hercule. Ale Curse S. Lyre. Anonyme. Lalande 34849. Anonyme. Anonyme.	17.57.37,52 18. 1.31,50 18. 5.37,56 18.11.14,10 18.17. 7,67 18.20.27,02 18.31.40,69 18.34.14,00 18.39. 2,68 18.42.23,20 18.46.53,70	- 0,84 - 0,84 - 0,84 - 1,01 - 0,72 - 0,78 - 0,78 - 0,78 - 0,78	- 12,68	257.54.59,2 257.42.28,8 257.55.38,0 250. 6.18,2 301.38.51,4 6.31.21,4 318.15.11,0 261.39.47,5 261.34.42,0 261.31.52,3 261.14.43,0	, , <sub>7</sub> 33, <sub>7</sub>	+16,7	+14.2	-2.16,9 -2.18,4 -2.17,0 -3.37,9 -2.5,1 +47,0 -7,3 -1.55,6 -1.55,8 -1.57,4	50,0 52,9
	Lalande 35359 Lalande 35374 Anonyme Anonyme Anonyme Lalande 36878 Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Aigle Aigle Aigle Aigle Aigle Aigle Aigle	18.55.12,20 19. 2.54,78 19.13.38,14 19.18. 1,94 19.23. 6,76 19.28.11,88 19.33.40,84 19.38.57,52 19.43.17,60	- 0,78 - 0,78 - 0,84 - 0,84 - 0,83 - 0,84 - 0,82 - 0,36 - 0,36 - 0,36 - 0,38 - 0,41	- 12,81 - 12,91 - 12,80	258.13.31,8 258.38.27,3 259, 2.59,5 258. 3. 3,7 259.15.21,7 259.16.25,2 290.17. 1,5 288.25.24,8 285.59. 1,6	733,7		+13,5	-2.15,4 -2.12,8 -2.10,2 -2.16,7 -2. 7,9 -2. 7,8 - 40,0 - 42,8 - 46,8	51,1 50,2
	Soleil, bord 1, sup.	6.38.20,54 7.24.49,10 7.31.14,69 7.35.55,59	- 0,38 - 0,73 - 0,09 - 0,42 - 0,14 - 0,60	- 12,81 - 12,62 - 13,03 - 12,78 - 12,80	288.32.45,2 263.26.51,8 312. 8.35,9 285.32.55,0 308.19. 0,7 271.56.21,5	735,7 738,2 738,3 738,6	+17,2 +15,0 +15,3 +16,3	+15,8 +12,3 +12,7 +12,7 +15,2	- 42,4 -1.47,9 - 13,9 - 47,9 - 18,0 -1.16,7	53,5 48,5 54,0 50,4 48,1

Le 31, Mire Sud-349,55. Mire Nord B+59,05. Mire Nord C-219,18. Mire Nord D-549,60. d+59,94.

Niveau-29,97.

72
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOHAS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYEANE DES VERNIERS  con le niveau.	BARONÊTRE.	Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du 'POLE.
-		h m. s	ment.	pendule.	-		rieur.	rieur.	-	
2	Soleil, bord 1, inf Mercure, bord 1, ctre	10.43.21,27	- 0,39 - 0,53	5.	287.38.59,3 277.13.16,6	738,3 737,7	+17,0	+16,8 +17,3	- 43,8 -1. 2,9	"
	Mars, centre α Petite Ourse I α Vierge	12.24.42,77 13. 5.56,97 13.17. 6,06	- 0,52 - 0,63	- 12,87	277.48.52,9 11.24.24,8 269.34.32,5	737,5 737,5	+17,5	+17,4 +18,4 +18,4	-1.1,7 + $55,2$ -1.22,7	50,4° 48,9°
	Vénus, bord 1, centr. η Grande Ourse α Bouvier	13.41.24,01	- 0,63 + 0,16 - 0,24	- 12,71 - 12,89	269.55. 1,5 329.59.43,5	737,5	+18,0 +18,1	+18,3	-1.21,6 + 3,7	48,6
	α Petite Ourse S γ <sup>2</sup> Petite Ourse α Couronne	14.50.55,25 15.20.45,04 15.28. 8,11	+ 0,98 + 0,75 - 0,15	- 12,55 - 12,89	354.41.46,0 352.17.47,4 307. 9.40,3	737,3 737,2	+18,2 +18,1	+18,8	+ 29,8 + 26,9 - 18,8	54, <sub>7</sub> 46, <sub>5</sub>
	2 Serpent	15.36.41,49 15.39. 4,24 15.51.17,70	- 0.40 - 0,30 - 0,84	- 12,88	286.55.45,6 295.56. 9,2 257.46.38,6	737, <b>1</b>	+18,1	+18,6	- 44,7 - 31,9 -2.16,7	48,3
	S' Scorpion	15.56.32,62 16.20. 2,65 17. 7.37,34	- 0.79 - 0.93 - 0.31	- 13,00 - 12,91	260.24.24,2 253.52.58,1 294.30.32,0	736,9 736,9 737,0	+18,0 +17,9 +17.9	+18,6 +18,1 +17,7	-1.59.6 -2.49.0 - 33,8	49,4 48,9
	49 & Ophinchus  A Sorpion  Ophinchus	17.11.35,58 17.18.53,59 17.23.16,03	- 0,08 - 0,43 - 1,18	- 00	313.12.17.7 284.13.21.9 243. 3.31.5			+17,5	-12,6 $-49,2$ $-7.0,9$	40.C
	56 o Serpent y Télescope  O Hercule	17.27.47,24 17.32.48,86 17.39.29,43 17.50.55,13	- 0.33 - 0,69 - 1,18	- 12,85	292.37. 4,2 267.10. 2,5 243. 3.31,0	737,0	+17.8	+17,3 +16,6 +16,4	- 36,3 -1.31,1 -7. 2,4	48,6
	Anonyme	17.57.37,42	- 0,03 - 0,84 - 0,84		317.12.46,4 257.54.55,7 257.42.31,6			+16,0	- 8,7 -2.17,1 -2.18,7	
	Anonyme  3 Sagittaire  109 F Hercule	18. 5.37,18 18.11.13,85 18.17. 7,26	- 0,84 - 1,01 - 0,22		257.55.39,3 250. 6.23,8 301.38.51,9				-2.17,3 $-3.38,3$ $-25,2$	
	Anonyme 3-18°18'	18.34.13,46	- 0,01 - 0,78	- 13,22	318.35.12,8	737,3	+17,1	+14,6	- 7,4	54,4
	Lalande 34849 Anonyme Anonyme 8–18°26'		- 0,78 - 0,78 - 0,78		261.34.42,3 261.36.27,8				-1.56,1 -1.56,0	
	Anonyme Lalande 35359 Lalande 35374	18.46.42,60 18.50.30,16 18.50.53,40	- 0,78 - 0,78 - 0,78		261.23.56,6 261.19.49,1	737,3	+16,8	+14,1	-1.57,1	
	Anonyme Anonyme	18.55.11,98 18.58.53,08 19. 2.54,26	- 0,84 - 0,84 - 0,83		258.13.31,7 258. 2.53,9 258.38.31,8				-2.16,0 $-2.17,2$ $-2.13,3$	
	Anonyme 6-21°13'	19. 6.59,70								

Le 2, Mire Sud-369,55. Mire Nord B+59,23. Mire Nord C-219,21. Mire Nord D-539,43. d+39,76.

Niveau-39,70.

73
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	_	OMÈTRE	RÉFRACTION	LLEU
	DES ESTUES.	Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	me.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	ION.	POLE.
	Anonyme Lalande 36613 Lalande 36678	h. m. s 19. 7.15,35 19.17.31,32 19.19. 4,34	- 0,83 - 0,83	5.	258.45.40,7 259. 5.22,1	mui.	0	+13,6	-2.12,6 -2.10,9	,,
	Lalande 36878 Anonyme Anonyme y Aigle	19.23, 6,36 19.28.11,16 19.33.49,68 19.38.57,24	- 0,82 - 0,82 - 0,36 - 0,36	- 13,07	259.15.25,3 259.16.28,7 290.17. 4,6 240.11.50,7	737,3	+15.9	+12,1	-2. 9,0 -2. 9,0 - 40,4 - 40,5	48,3
	α Aigle	19.43.17,42 19.47.46,33 19.50.30,88 19.52.35,82	- 0,38 - 0,41 - 0,86 - 0,86	- 13,06 - 13,11	288.25.27,1 285.58. 4,8 257.21.36,7 257.27.18,2				$ \begin{array}{r} -43,2 \\ -47,2 \\ -2.23,0 \\ -2.22,4 \end{array} $	52,9 52,9
	Lalande 38250 Anonyme Anonyme	19.55.24,32 20. 2.24,46 20. 5.18,34	- 0,86 - 0,86 - 0,86	. 2	257.22. 5,5 257.34.52,8 257.29.12,1			+11,8	-2.23,0 -2.21,5 -2.22,4	
	α Capricorne α Capricorne Β Capricorne Lalande 39318	20. 9. 9,94 20 9.33,86 20.12.24,94 20.19. 8,18	- 0,69 - 0,69 - 0,72 - 0,86	- 13,00 - 13,03	266.59.31,5 264.42.41,2 257.27.42,9			+11,5	-1.33,5 -1.42,5 -2.22,5	49,9
	Piazzi, XX, 166 Piazzi, XX, 167 Anonyme &-21°51' Lalande 39739	20.23.18,80 20.28.43,08 20.29.27,92	- 0,86 - 0,86 - 0,85 - 0,85		257.18.59,1				-2.23,6	r/ 2
	Anonyme	20.36. 8,99 20.40.24,60 20.50.38,78 20.53.33,26 20.56.30,67	+ 0,08 - 0,83 - 0,83 - 0,83 - 0,83	- 12,73	324.41. 3;9 258.47.49,8 258.56.59,0 259. 3. 4,6 259.15.52,7	737,1	+14,4	+10,9	- 1,4 -2.13,6 -2.12,7 -2.12,1 -2.10,8	54,3
	Anonyme 8-20°46' 26 Capricorne Taylor 9813 Piazzi, XXI, 41	20.57.58,94 21. 0.32,76 21. 3.20,74 21. 7.59,78	$ \begin{array}{r} -0.82 \\ -0.82 \\ -0.83 \\ -0.82 \end{array} $		259.10.25,9 259. 1.45,5	737,0	+13,7	+10,5	-2.11,4 -2.12,3	
	Lalande 41349 α Grand Chien α <sup>2</sup> Gémeaux α Petit Chien	6.38.20,48 7.24.49.04	- 0,82 - 0,73 - 0,09 - 0,41	- 12,91 - 12,71 - 12,96	259.14.14,5 263.26.51,5 312. 8.37,3 285.32.51,7	737,0 736,6	+14,8 +14,8	+14,9	-2.11,1 -1.47,7 - 13,8 - 47,5	53,3 50,1 51,1
	3 Gémeaux	7.35.55,43	- 0,14	- 12,97	308.18.57,6	700,0	, - +,/	, , 419	- 17,8	47,5
3	Soleil, bord 1, inf Mercure, bord 1, c <sup>tre</sup> Mars, centre	10.46.58,79 12.18.19,33 12.27. 4,91	-0.41 $-0.52$ $-0.52$		287.17. 4,0 276.34.11,4 277.33.10,8	735,4 734,6	+17,1 +18,1	+21,3 +23,4 +23,4	- 43,5 -1. 2,8 -1. 0,7	
	12 a Chiens de chasse a Petite Ourse I	12.48.46,75	- 0,07		319. 3.45,8	734,4	+19,5	+23,6	- 6,6	

74
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

-										
JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYEXNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO	DWÈTRE	RÉFRACTION	LIEU da
is.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	laté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
		h. m. s.	s.	s,	0 1 11	nin.	o	0	1 11	11
	α Vierge	13.17. 6,06	- 0,63	- 12,86						
	Vénus, bord 1, centr.		- 0,63		269.25.53,3	734,0	+20,6	+24,1	-1.21,1	
	n Grande Ourse	13.41.23,75	+ 0,07	- 13,04	F	0.0		. 0.0	6.0	, ,
	α Bouvier	14. 8.36,70	- 0,27	- 13,07	299.54.11,3	733,7	+21,1	+23,6	- 26,3	42,5
	5 A Petite Ourse	14.27.36,87	+ 0,80	-2	356.17.16,0	733,5	+21,1	+23,6	+ 31,1	
	y <sup>2</sup> Petite Ourse	14.50.55,01	+ 0,69	- 13,01					•	
	α Couronne	15.28. 8,11	- 0,19	- 12,91	307. 9.41,6	733,2	+20,5	+19,6	- 18,6	48,0
	α Serpent	15.36.41,27	- 0,41	- 13,09	286.50.46,1	700,2	120,0	1-9,0	- 44,3	50,0
	B Serpent	15.39. 4,18	- 0,20	,~3	295.50. 9,5				- 31,7	
	ε Serpent	15.43. 9,11	- o,43		284.52.45,6	733,0	+20,1	+19,1	- 47,6	
	α Scorpion		- 0,89	- 13,07	253.52.57,0	733,0	+19,5	+18,4	-2.47,9	49,4
	α Hercule		- o,33	- 12,99						
	68 u Hercule	17.11.35,48	- 0,13		313.12.11,9				- 12,5	
	49 o Ophiuchus	17.18.53,43	- 0,44		284.13.22,5				- 48,9 -6.5 <sub>7,7</sub>	
	λ Scorpion	17.23.16,01	- 1,13	- 13,03	243. 3.23,6 292.37. 0,1	-2	1.00	+17,9	-0.37,7 -35,3	45,4
	56 o Serpent	17.32.48,54	- 0,34 - 0,67	- 15,05	267. 9.57.7	732,9	+19,0	+17,9	-1.30,2	40,4
II.	y Télescope	17.39.29,49	- 1,13		243. 3.21,4			+17,8	-6.58,0	
	θ Hercule	17.51.54,93	- 0,00		317.12.43,2			1 - /,0	- 8.5	
	Anonyme	17.57.37,34	- 0,82		257.54.52,2	732,8	+18,7	+17,7	-2.15,4	
	Anonyme	18. 1.31,05	- 0,82		257.42.29,3		. "	' ''	-2.16,9	
1	Anonyme	18. 5.37,12	- 0,82		257.55.39,7				-2.15,5	
	& Sagittaire	18.11.13,59	- 0,99		250. 6.16,7				-3.35,5	
	109 F Hercule	18.17. 7,46	- 0,26		301.38.51,5				- 24,9	
	& Petite Ourse S	18.20.28,75			0.00% 0		. 0 "		,	,
	α Lyre	18.31.40,15	- 0,07	- 13,22	318.35. 8,2	732,9	+18,5	+16,6	- 7,3	49,7
ı	Weisse, XVIII, 885.	18.35.10,64	- 0,60							
	6 l Aigle	18.39. 2,61	- 0,60 - 0,55		271.26.26,2 275. 2.54,0				-1.17,1	
	Anonyme	18.42.22,55	- 0,76		261.31.54,2				-t. 7,7 -t.54,6	
	Anonyme	18.46.53,14	- 0,76		261.14.44,3				-1.56,1	
	Lalande 35374	18.50.53,58	- 0,76		261-19.48,8	732,8	+18,2	+16,8	-1.55,6	
	Anonyme		- 0,81		258. 2.48,3	, ,		, ,	-2.15,1	
	Anonyme	19. 2.54,38	- 0,8r		258.38.26,0				-2.11,4	
	Anonyme	19. 6.59,56	- 0,81		258.45.24,7				-2.10,9	
	Anonyme 8-21°12'		- 0,81		h 0 0 t					
	Anonyme	19.13.37,64	- 0,80		259. 3. 3,4			+15,2	-2. 9,2	
	Lalande 36613		- 0,80		259. 5.20,5				-2. 9,1	
	Lalande 36678 Lalande 36878		- 0,80 - 0,80		259.15.25,2				2 7 2	
	Anonyme				259.16.26,5				-2. 7,0 -2. 6,9	
4)	in in in it is in it	1 19.20.11,30	0,00		209.10.20,5			1	2. 0,9	

75
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

								•		
JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	OMĖTRE	RÉFRAC	LIEU du
is.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	ACTION.	POLE.
	Anonyme γ Aigle α Aigle	h. m. s. 19.33.49,68 19.38.57,24 19.43.17,34	s. - 0,37 - 0,37 - 0,40	- 13,07 - 13,15	290.17. 6,2 290.11.51,9 288.25.23,7	732,7	+17,5	+14,9	- 39,8 - 39,9 - 42,6	49,1
	B. A. C. 6850 Anonyme Lalande 38250	19.47.46,31 19.50.30,79 19.52.36,02 19.55.24,22 20. 9.10,08	- 0,43 - 0,83 - 0,83 - 0,83 - 0,67	- 13,14	285.58. 0,8 257.27.17,7 257.22. 1,4	732,5	+16,8	+14,2	- 46,4 -2.20,2 -2.20,9	49,6
	α Capricorne β Capricorne Anonyme Piazzi, XX, 166	20. 9.33,94 20.12.24,82 20.18.18,19 20.23.16,89	- 0,67 - 0,70 - 0,83 - 0,83	- 12,93	266.57. 9,4 264.42.39,0 257.30 17,3				-1.32,2 -1.41,0 -2.20,0	46,1
	Piazzi, XX, 167 Anonyme 15 o Capricorne Cygne	20.23.19,05 20.28.43,18 20.31.20,53 20.36. 9,02	- 0,83 - 0,81 - 0,76 0,00	- 12,76	257.18.29,7 258. 7. 5,4 261.18. 9,6 324.41. 0,0	732,5	+16,7		-2.21,4 -2.15,9 -1.57,0 - 1,4	50,2
	Anonyme	20.40.24,69 6.38.20,42 7.24.49,00 7.31.14,53	- 0,81 - 0,72 - 0,14 - 0,42	- 12,99 - 12,83 - 13,14	258.47.45,7 263.26.46,3 312. 8.35,3 285.32.47,8	732,4 731,4	+16,4 +14,7 +15,4	+13,4 +13,2 +15,9	-2.11,6 -1.46,6 - 13,7 - 46,9	49,1 48,3 47,8
	ß Gémeaux	7.35.55,41 9.20. 0,52 10.50.35,63	- 0,17 - 0,60	- 13,25 - 13,08	308.18.58,6 271.56.14,7	731,1	+17,2	+18,4	- 17,6 -1.15,1 - 43,1	48,8
4	Mercure, bord 1, ctre 12 α Chiens de chasse α Petite Ourse I	12.22.47,17 12.48.46,61 13. 5.56,74	- 0,54 - 0,07	2.0	275.55.42,5 319. 3.42,5 11.24.24,1	729.9 729.9	+18,5 +19,1 +19,2	+21,3 +22,3 +22,3	-1. 4,3 - 6,6 + 53,9	49,1
	Vénus, bord 1, centr.  n Grande Ourse  Bouvier	13.17. 5,68 13.33.25,44 13.41.23,61 14. 8.36,62	- 0,63 - 0,63 + 0,07 - 0,27	- 13,16 - 13,15	269.34.26,4 268.57.12,4 329.59.41,6 299.54.12,8	729,8 729,7 729,7 729,7	+19,3 +19,3 +19,4 +19,4	+22,2 +20,2 +20,3 +20,8	$ \begin{array}{r} -1.20,7 \\ -1.23,2 \\ + 3,6 \\ - 26,5 \end{array} $	44,7 47,0 43,8
	5 A Petite Ourse  β Petite Ourse  γ Petite Ourse	14.27.36,63 14.42.23,68 14.50.54,89 15.20.44,46	+ 0,80 - 0,70 + 0,69 + 0,51	- 13,26 - 13,05	356.17.20,0 264.32.32,4 354.41.42.7 352.17.46,8	729,7 729,7 729,7 729,5	+19,4 +19,4 +19,4 +19,3	+19,8 +20,3 +20,8 +20,6	+ 31,3 -1.39,0 + 29,2 + 26,4	48,3 51,2
	α Couronne α Serpent β Serpent	15.28. 7,87 15.36.41,11 15.39. 3,94 15.43. 8,71	- 0,19 - 0,41 - 0,31 - 0,43	- 13,13 - 13,24	307. 9.41,2 286.50.45,4 295.50. 9,4 284.52.43,6	729,5	+19,3	+20,7	- 18,5 - 43,9 - 31,4 - 47,1	47,8 49.7
	α Hercule 68 μ Hercule 49 σ Ophiuchús	17. 7.37,06	- 0,33 - 0,13 - 0,44	- 13,17	294.30.27,0 313.12.14,5 284.13.19,1	729,6	+18,8	+19,1	- 33,3   - 12,4	44,3

76
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	DAROMÈTRE	THERMO		RÉFRACTION.	LIEU du
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	λ Scorpion	h. m. s.	- 1,13	5.	243. 3.21,6	nun.	o	0	-6.54,3	"
	α Ophiuchus	17.27.46,98	- o,34	- 13,10	292.37. 2,4	729,7	+18,8	+18,8	- 35,8	47,2
	56 Serpent	17.32.48,48	- 0,67		267. 9.59,4			+18,7	-1.29,6	
	y Télescope	17.39.29,39	- 1,13		243. 3.22,5	729,7	+18,6	+18,4	-6.55,o	
li .	ξ Hercule	17.51.44,67	- 0,17		309.12.24,9				- 16,5	
	96 Q Hercule	17.55.46,98	- 0,26		2 42 0				P	
1	Anonyme	17.56.22,92	- 0,26		300.43.16,0		. 0 C	1-05	- 25,7	
1	103 o Hercule	18. 1.30,07	- 0,17		308.41.10,1	729,8	+18,6	+18,5	- 17,0	
1	B. A. C. 6210	18.11.20,28	- 0,71		264. 4.21,1				-1.41,7	
	21 Sagittaire	18.16.14,78	- 0,80		259.21. 0,9			11-0	-2. 5,6	102
1	8 Petite Ourse S	18.20.28,77	- C-		6.31.15,9			+17,8	+ 46,2	49,3
1	I m Aigle	18.26.52,13	- 0,60	- 13,27	271.36.36 <sub>.7</sub> 318.35.10,4				-1.16,0	51,9
Ŋ.	Δ Lyre	18.35.10,60	- 0,07 - 0,60	- 13,27	310.33.10,4				- 7,2	31,9
	3 n Aigle		- 0,60		271.26.31,4				-1.16,5	
	6 l Aigle	18.39. 2,41	- 0,55		275. 2.55,6					
1	Anonyme		- 0,76		261.31.55,7				-1. 7,2 -1.53,9	
	Anonyme		- 0,76		261.14.45,1		ļ		-1.55,4	
Į.	Lalande 35374		- 0,76		261.19.50,5				-1.55,0	
	o Sagittaire	18.55.31,52	- 0,81		258. 0.47,5	730,3	+18,3	+17,2	-2.14,5	
	Anonyme		- 0,81		257.57. 4,9	/,-	, , .	1-71-	-2.15,9	
1	Anonyme	19. 2.54,12	- 0,81		258.38.25.8				-2.10,5	
	Anonyme 8-21°13'		- 0,81			1		}		
1	Anonyme	19. 7.15,36	- 0,81		258.45.36,7	1	ĺ	Ì	-2. 9,8	
	Anonyme		- 0,80		259. 3. 1,3	1			-2.8,1	
Н	Lalande 36613		- 0,80		J,-					
	Lalande 36678		- 0,80		259. 9.16,5				-2. 7,4	
	Lalande 36878		- 0,80		259.15.24,4	730,4	+18,2	+16,6	-2. 6,9	
	Anonyme	! •	- 0,80		259 16.23,4				-2. 6,8	
	Anonyme	19.31. 3,08	- 0,80		259.36.52,7			+16,4	-2. 4,8	
	y Aigle		- 0,37	- 13,26	290.11 49,5	730,4	+18,0	+16,4	- 39,6	46,9
1	α Aigle		- 0,40	- 13,26	288.25.24,4				- 42,2	51,0
	B Aigle		- 0,43	- 13,27	285.59. 0,0				- 46,r	49,0
	Taylor 9185		- 0,84		256.55.45,8				-2.22,4	
	Piazzi, XIX, 369		- 0,84		256.57.36,7			+16,8	-2.22,1	
	Anonyme	M () ()	- 0,83		257.34.50,8	2 "			-2.17,7	
	Anonyme	20. 5.18,37	- 0,83		257.29. 6,8	730,5	+17,9	+16,9	-2.18,6	
1	α² Gémeaux		- 0,14		312. 8.37,7	731,3	+15,7	+12,8	- 13,8	50,6
	α Petit Chien		- 0,42	- 13,26	285.32.51,0				- 47,4	50,4
	B Gémeaux	7.35.55,25	- 0,17	- 13,23	308.18.59,2				- 17,8	49,3
1	Soleil, bord 1, inf	10.54.12,79	- 0,41		286.32.45,4	731,3	+16,8	+15,8	- 45,3	

Le 4, Mire Sud-36P,71. Mire Nord B+6P,45. Mire Nord C-21P,15. Mire Nord D-52P,75.

77
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

FOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de ·	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERMO	MÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU
		Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le uiveau.	RE.	rieur.	rieur.	0N.	POLE.
	12 α Chiens de chasse α Petite Ourse I	h. m. s. 12.48.46,57 13. 5.57,26	- 0,07	2.7	319. 3.45,9 11.24.23,3	730,9	+17,5	+17,2 +17,2	- 6,8 + 55,0	49.7
	Vénus, bord 1, centr. n Grande Ourse	13.17. 5,66 13.37.31,96 13.41.23,55	- 0,63 - 0,64 + 0,07	- 13,24 - 13,21	269.34.30,4 268.28.44,1 329.59.45,6	730,9	+17,9	+17,3	-1.22,2 $-1.25,7$ $+3,7$	51,3
	α Bouvier  5 A Petite Ourse α Balance	14. 8.36,52 14.27.36,25 14.42.23,58	- 0,27 + 0,80 - 0,70	- 13,23 - 13,35	299.54.16,3 356.17.22,7 264.32.34,9	730,9	+18,0	+17,6	- 26,8 + 31,6 -1.40,2	49,6
	β Petite Ourse γ Petite Ourse α Couronne	14.50.54,65 15.20.44,40 15.28. 7,71	+ 0,69 + 0,51 - 0,19	- 13,22 - 13,28	354.41.44,4 352.17.46,0 307. 9.41,9	731,0 731,0	+18,1	+17,5	+ 29,6 + 26,7 - 18,7	53,5 48,1
	α Serpent β Serpent ε Serpent α Hercule	15.36.40,99 15.39. 3,86 15.43. 8,43 17. 7.36,92	- 0,41 - 0,39 - 0,43 - 0,33	- 13,35	286.50.47,3 295.50.13,2 284.52.43,3 294.30.31,5	731,0 731,4	+18,2 +17.5	+17,4	- 44,5 - 31,8 - 47,7 - 33,7	48,4
	69 e Hercule 49 σ Ophiuchus λ Scorpion	17.12.17,56 17.18.53,05 17.23.15,59	- 0,08 - 0,44 - 1,13	13,30	294.30.31,3 317.23.22,6 284.13.25,0 243. 3.23,7	/ 5 1,4	1.7.0	+16,0	- 8,4 - 49,1 -7, 0,3	
	α Ophiuchus 56 ο Serpent y Télescope	17.27.46,96 17.32.48,20 17.39.29,11	- 0,34 - 0,67 - 1,13	- 13,10	292.37. 4,5 267.19. 5,3 243. 3.25,0	731,6	+17,1	+15,5	- 36,3 -1.30,9 -7. 1,0	48,8
	96 Q Hercule Anonyme	17.51.44,44 17.55.46,83 17.56.22,77	- 0,17 - 0,26 - 0,26		300.43.13,1	731,6	+17,1	+15,1	- 16,7 - 26,1	
	B. A. C. 6210 21 Sagittaire	18. 1.29,79 18.11.19,94 18.16.14,60	- 0,17 - 0,71 - 0,80		308.41.12,8 264. 4.23,0 259.21. 3,7			+14,8	- 17,3 -1.43,2 -2. 7,2	56,0
	δ Petite Ourse S  I m Aigle  Δ Lyre  3 n Aigle	18.20.26,40 18.26.51,96 18.31.39,97	- 0,60 - 0,07	- 13,35	6.31.22,2 271.36.34,8 318.35.11,7			+15,3	+ 46,7 -1.16,9 - 7,3	53,2
	Weisse, XVIII, 885. 6 \( \) Aigle	18.35.13,31	- 0,60 - 0,55 - 0,37	- 13,52	271.26.31,1 275. 2.55,1 290.11.51,8	732,0 732,4	+16,7	+14,7	-1.17,5 -1. 8,0 - 40,1	48,6
	α Aigle	19.43.16,96	- 0,40 - 0,43 - 0,84	- 13,51 - 13,48	288.25.23,4 285.59. 2,6 256.55.47,3	702,4	710,5	710,2	- 42,8 - 46,7 -2.24,6	49,3
	Piazzi, XIX, 369 Anonyme	19.54.40,65 20. 2.24,33 20. 5.18,23	- 0,84 - 0,83 - 0,83		256.57.41,3 257.34.53,1 257.29. 8,7				-2.24,4 -2.20,0 -2.20,9	
	α <sup>1</sup> Capricorne α <sup>2</sup> Capricorne		- 0,67 - 0,67	- 13,24 - 13,35		732,4	+16,2	+12,8	-1.32,5	45,6

Le 5, Mire Sud-36P,42. Mire Nord B+4P,88. Mire Nord (-20P,21. Mire Nord D-53P,34. d+3P,90. Niveau-3P,46.

78
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BIRONÈTRE	THERMO		RÉFRACTION	LIEU du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Lalande 39318 Piazzi, XX, 166 Piazzi, XX, 167 Anonyme 15 v Capricorne a Cygne Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme 26 Capricorne	h. m. s. 20.19. 7,81 20.23.16,46 20.23.18,50 20.28.43,00 20.31.20,36 20.36. 8,90 20.40.24,50 20.50.58,40 20.53.32,98 20.56.30,62 21. 0.32,52	s. - 0,83 - 0,83 - 0,83 - 0,81 - 0,76 0,00 - 0,81 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80	- 12,85	257.27.36,6 257.27.36,6 257.27.36,6 258.7.5,2 261.18.13,5 324.41.2,9 258.47.51,4 258.55.5,2 259.2.53,5 259.15.51,5 259.16.25,5	mm.	+15,6	+12,7	-2.22,0 -2.16,4 -1.57,4 -1,4 -2.12,0 -2.11,3 -2.10,5 -2.9,2 -2.9,7	52,6
	Piazzi, XXI, 41 Lalande 41349 α² Gémeaux α Petit Chien β Gémeaux	21. 7.59,46 21.10.25,92 7.24.48,90 7.31.14,55	- 0,80 - 0,80 - 0,14 - 0,42 - 0,17	- 12,98 - 13,26 - 13,28	259.14.14,9 312. 8.36,1 285.32.52,3 308.19. 0,6	732,5 732,8	+15,6 +14,8	+12,3 +11,6 +11,2	-2. 9,3 - 13,9 - 47,7 - 17,9	49,0 51,4 50,6
6	Soleil, bord 1, sup. Mercure, bord 1, c <sup>tre</sup> 12 α Chiens de chasse α Petite Ourse I α Vierge Vénus, bord 1, centr. α Hercule 69 e Hercule	12.48.46,51 13. 5.56,39 13.17. 5,46	- 0,41 - 0,56 - 0,07 - 0,63 - 0,65 - 0,33 - 0,08	- 13,43 - 13,34	286.42.24,0 274.41.31,2 319. 3.45,8 11.24.26,0 269.34.30,6 268. 0.24,5 294.30.33,7 317.23.24,2	732,6 732,2 732,2 732,1 732,1 732,1 731,9	+16,1 +16,9 +17,0 +17,0 +17,0 +17,4 +17,0	+15,0 +15,6 +15,6 +16,0 +16,4 +16,1 +15,4 +15,2	- 45,2 -1. 8,7 - 7,6 + 55,2 -1.22,5 -1.27,6 - 33,8 - 8,4	52,9 47,0 50,5
7	3 Orion	5.16.37,18 5.46.51,12	- 0,60 - 0,17 - 0,41 - 0,72 - 0,14 - 0,42 - 0,17 - 0,58	- 13,60 - 13,41 - 13,58 - 13,41 - 13,40 - 13,45 - 13,33 - 13,22	271.34.34.7 308.24.35,7 287.18.2,0 13.18.36,4 263.26.50,8 312. 8.36,1 285.32.54,3 308.19.0,3 271.56.19,9	733,6 733,5 733,7 733,7 733,7 733,7	+12,1 +11,4 +12,0 +12,3 +12,3 +12,8 +13,7	+ 4,1 + 4,3 + 5,7 + 9,3 + 9,4 +10,6 +13,2	-1.20,3 - 18,3 - 45,7 +1. 0,7 -1.48,4 - 13,9 - 47,9 - 18,0 -1.16,7	53,6 54,0 49,4 50,2 51,4 49,1 53,2 50,4 47,0
	Soleil, bord 1, inf		- 0,43 - 0,17	- 13,32	285.25.26,6 308.24.32,6	733,1 734,2	+14,7	+15,0	- 47,7 - 18,4	50,8
10	Soleil, bord 1, sup. Mercure, bord 1, c <sup>tre</sup>		- 0,43 - 0,58		285.12. 8,5 272.22.59,3	734,4 733,9	+14,2	+13,6 +14,6	- 48,t -1.15,2	

Le 6, Mire Sud-36P,74. Mire Nord C-19P,97.

79
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BARONÈTRE	THERMO	DMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEG du POLE.
1		rit metidien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	Ę.	rieur.	ricur.	N.	TULE.
	α Petite Ourse I α Vierge	h. m. s. 13. 5.57,19 13.17. 5,44	- 0,63	s. - 13,42	0 , ,, 11.24.22,5 269.34.36,3	733,8 733,8	+14,9	+15,0 +14,8	+ 55,6 -1.23,3	51,0 51,7
	y Grande Ourse Vénus, bord 1, centr. & Bouvier	14. 8.36,40	+ 0,07 - 0,68 - 0,27	- 13,23 - 13,28	266. 9.29,4 299.54.17,0	733,6	+15,2 +15,2	+14,8	-1.35,1 - 27,2	47.9
	5 A Petite Ourse  α Balance  β Petite Ourse  α Couronne	14.27.35,89 14.42.23,62 14.50.54,37 15.28. 7,59	+ 0,80 - 0,70 + 0,69 - 0,19	- 13,24 - 13,16 - 13,31	356.17.19,1 264.32.38,6 354.41.46,1 307. 9.42,4	733,5 733,5	+15,2 +15,2 +15,3	+15,4 +15,3 +15,4	+ 32,0 -1.41,4 + 30,0 - 18,9	51,9 56,6 48,8
	α Serpent ε Serpent α Scorpion	15.36.40,89 15.43. 8,55 16.20. 2,16	- 0,41 - 0,43 - 0,89	- 13,36 - 13,31	286.50.47,6 284.52.44,2 253.52.57,5	733,0	+15,0	+15,3	- 45,0 - 48,2 -2.49,8	50,8
	α Hercule 69 e Hercule λ Scorpion	17. 7.36,84 17.12.17,75 17.23.15,57	- 0,33 - 0,08 - 1,13	- 13,28	294.30.27,8 317.23.25,5 243. 3.32,5	733,1 733,1	+15,0	+14,9	- 33,9 - 8,5 -7. 2,9	44,5
	α Ophiuchus y Télescope ξ Hercule	17.27.46,86 17.39.29,03 17.51.44,55	- 0,34 - 1,13 - 0,17	- 13,11	292.37. 9,0 243. 3.33,4 309.12.30,2			+14,7	- 36,5 -7. 4,0 - 16,8	53,0
	96 Q Hercule 103 o Hercule B. A. C. 6210 21 Sagittaire	17.55.46,86 18. 1.29,81 18.11.19,92 18.16.14,42	- 0,26 - 0,17 - 0,71 - 0,80		300.46.43,2 308.41.13,0 264. 4.27,2 259.21. 7,7	733,1	+14,9	+13,4	- 26,2 - 17,4 -1.44,1 -2. 8,5	
	Petite Ourse S  1 m Aigle  2 Lyre	18.26.51,76 18.31.39,69	- 0,60 - 0,07	- 13,52	6.31.17,7 271.36.41,5 318.35.10,8	733,3	+14,7	+12,6	+ 47,2 -1.17,8 - 7,4	51,5 51,5
	3 n Aigle	18.35.10,33 18.35.13,09 18.39. 2,13 18.42.22,42	- 0,60 - 0,60 - 0,55 - 0,76		271.26.36,3 275. 2.59,3 261.31.57,0				-1.18,3 -1.8,8 -1.56,6	
	Anonyme Sagittaire Anonyme	18.46.52,72 18.55.31,16 18.59. 3,08	- 0,76 - 0,81 - 0,82		261.14.46,8 258. 0.57,9 257.57.13,5	733,5	+14,4	+12,1	-1.58,2 -2.17,7 -2.15,1	
	Anonyme Lalande 36104 Anonyme 3-22°5'. Anonyme	19. 6.48,54	- 0,82 - 0,82 - 0,82 - 0,80		257.47.58,8 257.52.43,1 259. 3. 3,8				-2.19,4 -2.18,9 -2.11,3	
	Lalande 36613 Lalande 36678 Lalande 36878	19.17.31,04 19.19. 4,00 19.23. 5,88	- 0,80 - 0,80 - 0,80		259. 5.22,5 259. 15.25,7	733,5	+.14,0	+11,0	-2.11,1	
	Anonyme  y Aigle  a Aigle	19.31. 2,78	- 0,80 - 0,37 - 0,40	- 13,44 - 13,33	259.36.58,0 290.11.52,2 288.25.27,5			+10,2	$ \begin{array}{r} -2.10,1 \\ -40,6 \\ -43,3 \end{array} $	48,1 52,7

Le 10, Mire Sud-369,71. Mire Nord B+59,73. Mire Nord C-199,98. Mire Nord D-539,97.

80
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYEXXE DES VERNIERS corrigée	BAROMÉTRE	THERMO	Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
-		h. m, s.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.	1 11	"
	B Aigle Taylor 9185 Piazzi, XIX, 369 Anonyme	19.47.45,93 19.51.43,43 19.54.40,51 19.59.46,05	- 0,43 - 0,84 - 0,84 - 0,84	- 13,44	285.59. 5,7 256.55.53,5 256.57.41,5 256.51. 1,0				- 47,2 -2.26,2 -2.26,0 -2.26,8	53,3
	α Capricorne α Capricorne Taylor 9368 Anonyme		- 0,67 - 0,67 - 0,82 - 0,82	- 13,41 - 13,44	266.59.33,1 257.32.40,0 257.30.23,1	733,4	+13,2	+10,6	-1.33,4 -2.21,9 -2.22,4	51,7
	Piazzi, XX, 166 Piazzi, XX, 167 Anonyme Anonyme Lalande 40536	20.23.18,43 20.28.42,96 20.40.24,40	-0.82 $-0.81$ $-0.81$ $-0.81$		257.18.36,9 258. 7.10,1 258.47.54,4			+ 8,6	-2.24,0 -2.18,6 -2.14,2	
	Anonyme.  Anonyme.  Lalande 40877.  Taylor 9813.  Piazzi, XXI, 41.	20.53.32,98 20.56.30,52 20.59. 6,84 21. 3.20,54	- 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80		259. 3. 2,5 259.15.55,6 259.20.11,4 259. 1.49,9 259.10.37,9	733,3	+11,8	+ 8,1	-2.12,7 -2.11,4 -2.11,0 -2.13,0 -2.12,1	
	Lalande 41349  a Céphée  B Céphée  Neptune  a Gémeaux  a Hydre	21.14.50,00 21.26.33,51 22.29.26,86 7.24.49,14 7.31.14,79	- 0,80 + 0,26 + 0,48 - 0,63 - 0,14 - 0,42 - 0,17 - 0,59	- 13,04 - 12,73 - 12,89 - 13,14 - 13,18 - 13,16	349.50, 1,9 269.38, 9,1 312, 8.32,7 285.32.54,3 308.18.57,6	733,2 733,4 733,5 733,4	+10,6 +11,5 +12,1 +12,3 +13,0	+ 7,5 + 7,4 + 6,5 + 9,2 +10,1 +11,8	+ 16,0 + 24,9 -1.25,6 - 14,0 - 48,1 - 18,1 -1.17,1	55,8 57,8 45,9 53,0 47,6 47,9
	Soleil, bord 1, inf α Petite Ourse I α Vierge η Grande Ourse ∀énus, bord 1, centre α Bouvier 5 Δ Petite Ourse α² Balance	13. 5.56,94 13.17. 5,68 13.41.23,63 14. 2.15.98 14. 8.36,54 14.27.35,97 14.42.23,72	- 0,45 - 0,63 + 0,07 - 0,68 - 0,27 + 0,80 - 0,70	- 13,13	265.42.24,4 299.54.13,6 356.17.18,4 264.32.33,4	732,8 732,4 732,2 732,1 732,1 732,1	+14,2 +14,6 +15,1 +15,2 +15,3 +15,3	+14,4 +15,4 +15,7 +15,5 +15,5 +15,6 +15,8	- 49,4 + 55,4 + 3,7 -1.36,4 - 27,0 + 31,9 -1.41,0	47,0
	β Petite Ourse  α³ Gémeaux  α Petit Chien  β Gémeaux  α Hydre  2 Soleil, bord 1, sup.	7.24.49,26 7.31.14,87 7.35.55,63 7.20. 0,71	- 0,14 - 0,42 - 0,17 - 0,59	- 12,81 - 13,09 - 13,04 - 13,00	308.19. 0,6	733,1	+12,9		+ 29,9 - 14,0 - 48,1 - 18,0 -1.16,8 - 49,1	53,9 44,0 51,5 51,0 51,3

Le 11, d op,o. Nadir 14607'46",53. Niveau-4p,14.

81

Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERW	ONÈTRE	RÉPRACTION	LIEU
is.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Mercure, bord 1, ctre α Petite Ourse I α Vierge η Grande Ourse Vénus, bord 1, centr. α Bouvier 5 A Petite Ourse α Balance α Petite Ourse α Couronne α Serpent ε Serpent α Ophiuchus 28 ω Dragon	13. 5.59,21 13.17. 5,70 13.41.23,57 14. 6.24,24 14. 8.36,50 14.27.36,05 14.42.23,92 14.50.54,49 15.28. 7,85 15.36.41,21 15.43. 8,73 17.27.47,06 17.37.36,81	s. - 0,59 - 0,63 + 0,07 - 0,68 - 0,27 + 0,80 - 0,70 + 0,69 - 0,19 - 0,41 - 0,44 - 0,34 + 0,40	- 13,15 - 13,05 - 13,16 - 12,91 - 12,90 - 13,01 - 13,06 - 12,88	271.19.52,1 11.24.19,7 269.34.30,0 329.59.4c,7 265.15.37,1 299.54.13,3 356.17.18,0 264.32.34,2 354.41.45,2 307. 9.39,2 286.50.48,3 284.52.44,0 292.37. 6,2 348.45.32,3	731,4 731,3 731,3 731,3 731,2 731,1 731,0 730,9 730,7 730,6	+14,8 +15,3 +15,5 +16,3 +16,2 +16,3 +16,2 +16,2 +15,8	+15,9 +15,6 +15,6 +16,3 +16,5 +16,5 +16,9 +16,9 +15,6 +15,9	-1.17,6 + 55,4 -1.22,8 + 3,6 -1.37,4 - 26,9 + 31,7 -1.40,4 + 29,7 - 18,7 - 44,6 - 47,8 - 36,3 + 22,8	48,7 45,8 47,9 44,7 48,4 55,9 45,9 52,0 50,3
	ξ Hercule	17.51.44,49 17.55.46,90 18. 1.29,97 18.11.20,08 18.16.14470 18.20.22,79 18.26.52,03 18.31.39,81 18.35.10,52 18.35.13,30 18.39. 2,29 18.46.52,86 18.55.31,54 19. 2.57,08 19. 7.53,50 19. 13.37,42 19.17.31,14	- 0,17 - 0,26 - 0,17 - 0,71 - 0,80 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,76 - 0,76 - 0,76 - 0,81 - 0,82 - 0,80 - 0,80	- 13,34	309.12.29,5 300.46.45,5 308.41.12,0 264. 4.25,2 259.21. 3,6 271.36.35,1 318.35. 8,4 271.26.29,2 275. 2.52,2 261.31.50,0 261.14.39,2 258. 0.53,3 257.47.55,8 257.45.45,9 259. 3. 2,0	7 <sup>30</sup> ,7	+15,6 +15,4	+14,8	- 16.7 - 26.0 - 17.2 -1.43.1 -2. 7.2 -1.17.0 - 7.3 -1.17.5 -1. 8,1 -1.55.4 -1.56.9 -2.15.6 -2.17.8 -2.18.2 -2. 9.8	49,1
	Lalande 36678 Piazzi, XIX, 147 Anonyme  γ Aigle  β Aigle  Taylor 9185 Piazzi, XIX, 369 Anonyme	19.19. 4,02, 19.23.10,60 19.27.59,40 19.31. 3,04 19.38.57,06 19.43.17,22 19.47.46,13 19.51.43,61 19.54.40,70	- 0,80 - 0,81 - 0,81 - 0,81 - 0,81 - 0,40 - 0,43 - 0,84 - 0,84	- 13,13 - 13,16 - 13,21	259, 9.17,6 258, 8.26,3 258, 0.46,6 259,36.50,5 290.11.51,5 288,25.24,9 285.59, 1,9 256.55,48,7 256.57,41,4 256.51, 1,4	731,1	<b>+15,</b> 0	+12,8 +12,7 +13,2	-2. 9,2 -2.15,9 -2.16,8 -2. 6,6 - 40,1 - 42,8 - 46,3 -2.24,3 -2.24,1 -2.25,0	47,8 50,4 50,0

Le 12, Mire Sud-380,56. Mire Nord B+50,04. Mire Nord C-180,41. Mire Nord D-510,52. Niveau-40,50.

Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU ou Fil Méridien.		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	DHÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
		rii meridicu.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.	;-e:	TOLE.
	α¹ Capricorne α² Capricorne α² Capricorne Taylor 9368 Anonyme Piazzi, XX, 166 Piazzi, XX, 167 Anonyme δ-21°51′ Lalande 39739 α Cygne Anonyme Lalande 40536 Anonyme Lalande 40877 Taylor 9813 Piazzi, XXI, 41	h. m. s. 20. 9. 9,60 20. 9.33,68 20.13. 8,43 20.18.18,27 20.23.16,59 20.23.18,75 20.28.43,15 20.29.27,55 20.36. 8,73 20.40.24,66 20.50.38,56 20.56.30,79 20.59. 6,92 21. 3.20,74 21. 7.59,36	5 0,67 - 0,67 - 0,82 - 0,82 - 0,82 - 0,81 - 0,81 - 0,81 - 0,81 - 0,81 - 0,80 - 0,80 - 0,80	pendule.  5 13,22 - 13,09 - 12,90	266.57.10,5 257.32.36,8 257.30.17,4 257.18.26,8 258. 1.32,9 324.41. 3,0 258.47.48,5 258.47.48,5 258.20.2,4 259.15.44,4 259.20.2,4 259. 1.42,8	nin.	o o	+13,2	-1.32,4 -2.19,9 -2.20,2 -2.16,6 -1,4 -2.11,6 -2.11,0 -2.9,0 -2.8,7 -2.10,8	47,1 51,2
	Piazzi, XXI, 41 Piazzi, XXI, 57.  a Céphée 35 Capricorne  B Céphée Anonyme Taylor 10063 Anonyme  a Verseau Neptune  a² Gémeaux  Petit Chien  B Gémeaux  a Hydre	21. 9.45,56 21.14.49,92 21.18.34,27 21.26.32,91 21.30.29,59 21.32.55,12 21.40.45,73 21.57.54,57 22.29 15,04 7.24.49,22 7.31.14,91 7.35.55,63	- 0,00 - 0,80 - 0,26 - 0,81 + 0,48 - 0,82 - 0,82 - 0,82 - 0,50 - 0,63 - 0,14 - 0,42 - 0,59	- 13,07 - 13,26 - 13,16 - 12,87 - 13,07 - 13,07 - 12,99	259. 0.31,6 258. 7.40,7 349.50. 0,3 257.35. 5,6 257.37.53,7 257.17.21,0 278.54.16,7 269.36.57,8 312. 8.32,2 285.32.50,7 308.18.56,4 271.56.18,2	731,4 731,3 731,3 731,4 731,2	+13,0 +12,5 +12,3 +13,4 +13,8	+10,0 + 9,9 + 9,0 +10,8 +11,5	-2.11,1 -2.17,3 + 24,6 -2.21,3 -2.20,9 -2.23,4 -1.0,4 -1.24,6 -13,9 -47,6 -17,9 -1.17,0	55,3 46,4 45,6 49.9 46,9 43,8
13	Soleil, bord 2  A Ophiuchus  B Dragon  G Hercule  G Q Hercule  B A. C. 6210  I Sagittaire  Petite Ourse S.  M Aigle  A Lyre  A Aigle  A Aigle	17.37.36,53 17.51.44,45 17.55.46,84 18. 1.29,89 18.11.20,04 18.16.14,68 18.20.23,24 18.26.51,91 18.31.39,82	- 0,45 - 0,34 + 0,40 - 0,17 - 0,26 - 0,17 - 0,71 - 0,80 - 0,60 - 0,07 - 0,60	,	292.37. 7,5 348.45.28,0 309.12.30,4 300.46.44,1 308.41.11,0 264. 4.25,2 259.20.59,2 6.31.17,9 271.36.34,2 318.35.12,5	729,3	+15,2	+14,3 +14,2 +14,0	- 36,4 + 22,9 - 16,7 - 26,0 - 17,3 -1.43,2 -2. 7,4 + 46,8 -1.17,0 - 7,3	51,5 50,9 53,1

83 Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROHÈTRE	THERMO	NĖTRE	RÉFRACTION	LIEU du
RS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	luté- ricur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
	Weisse, XVIII, 885. 6 / Aigle Anonyme Taylor 10063  a Gémeaux  B Gémeaux	h. m. s. 18.35.13,30 18.39. 2,17 18.42.22,48 21.30.29,70 21.32.54,98 7.24.49,22 7.31.15,01 7.35.55,73	5. - 0,60 - 0,55 - 0,76 - 0,83 - 0,83 - 0,14 - 0,42 - 0,17	- 12,90 - 13,04 - 13,04	271.26.34,5 275, 2.56,2 261.31.55,3 257.35. 5,5 257.37.52,0 312. 8.35,5 285.32.51,2 308.18.58,8	7 <sup>2</sup> 9,7 7 <sup>2</sup> 9,7	+15,0 +14,2 +12,8	+13,6 +12,1 + 9,0	-1.17,6 -1. 8,1 -1.55,4 -2.19,9 -2.19,6 - 14,0 - 47,9 - 18,0	48,9 50,1 49,3
14	Soleil, bord 1, inf.  a Petite Ourse I  a Balance.  B Petite Ourse.  a Couronne.  a Scrpent.  a Scorpion.  a Hercule.  a Ophiuchus.  b Petite Ourse S.  Lune, bord 1, sup.  Sagittaire.  s Sagittaire.	11.26.37,65 13. 5.59,79 14.42.23,82 14.50.54,45 15.28. 7,83 15.36.41,05 16.19. 2,16 17. 7.37,04 17.27.46,98 18.20.23,87 18.30. 6,02 18.55.31,42 19. 0.40,36	- 0,46 - 0,70 + 0,69 - 0,19 - 0,41 - 0,89 - 0,33 - 0,34 - 0,80 - 0,81 - 0,81	- 12,99 - 12,81 - 12,99 - 13,14 - 13,23 - 13,01 - 12,92	283. 8.33,0 11.24.21,1 264.32.37,6 354.41.42,1 307. 9.37,5 286.50.45,5 253.52.55,1 294.30.31,0 292.37. 4,3 6.31.20,2 259.14.56,0 258. 0.51,3 258.42.42,3	729,6 729,2 728,7 728,5 728,5 728,6 728,6 728,7 728,7	+14,2 +14,8 +15,4 +15,3 +15,0 +15,0 +15,0 +14,9 +14,8 +14,8	+13,2 +15,0 +15,4 +15,5 +15,4 +15,6 +14,9 +14,9 +13,8 +13,9	- 51,4 + 55,3 -1.40,6 + 29,8 - 18,8 - 44,7 -2.48,7 - 36,3 + 46,7 -2. 7,9 -2.115,9 -2.11,3	50,7 51,5 53,3 44,3 49,1 46,4 47,9 48,4 53,1
	Anonyme. Lalande 36104 Anonyme. Piazzi, XIX, 147 Anonyme. Anonyme. y Aigle. α Aigle. β Aigle. Piazzi, XIX, 369 Anonyme. α Capricorne. α Capricorne.	19. 2.57,04 19. 6.48,66 19.13.37,46 19.23.10,62 19.27.59,38 19.31. 3,14 19.38.57,04 19.43.17.20 19.47.46,09 19.54.40,78 19.59.46,13	- 0,82 - 0,81 - 0,81 - 0,81 - 0,80 - 0,37 - 0,40 - 0,43 - 0,84 - 0,84 - 0,67 - 0,67	- 13,12 - 13,15 - 13,23 - 13,00 - 13,07	257.47.57,3 257.52.39,5 259. 3. 2,5 258. 8.24,5 258. 0.45,5 259.36.51,3 290.11.50,8 288.25.23,5 285.59. 2,9 256.57.36,8 256.50.56,2 266.59.28,6	729,2	+14,5	+13,1	-2.17,4 -2.17,0 -2. 9,4 -2.15,3 -2.16,3 -2. 6,1 - 40,0 - 42,6 - 46,5 -2.24,0 -1.32,2	47,1 49,1 51,0
	Taylor 9368 Anonyme Piazzi, XX, 166 Piazzi, XX, 167 Anonyme &-21°51' Lalande 39739    Cygne	20.18.18,09 20.23.16,47 20.23.18,57 20.28.43,18 20.29.27,68	- 0,82 - 0,82 - 0,82 - 0,82 - 0,81 - 0,81 0,00	- 12,70	257.32.33,4 257.30.20,2 257.18.30,4 258. t.35,9 324.41. 3,2		,	+12,4	-2.19,9 -2.20,2 -2.21,7 -2.16,7 - 1,4	51,0

Le 14, Mire Sud-37P, 32. Mire Nord B+5P, 05. Mire Nord C-18P, 30. Mire Nord D-5.2P, 53.

84
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO	DMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Anonyme	22.14.59,45 22.23.12,36 22.29. 3,50	- 0,81 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,82 - 0,82 - 0,82 - 0,86 - 0,63 - 0,63 - 0,63 - 0,63	- 12,76 - 13,06	258.47.57,2 258.47.57,2 258.56.54,0 259. 2.56,9 259.15.46,4 259.10.31,5 259.6.45,9 257.37.56,2 257.17.17,2 255.13.0,6 255.25.51,3 255.38.21,4 278.54.16,1 255.35.54,5 255.13.54,5 255.13.54,5 255.13.54,5 255.13.54,5 255.13.54,5 255.13.54,5	729.7 729.7	+14,2 +13,8 +13,3 +16,3	+11,2 +10,9 +10,6 +10,6 +18,7	-2.11,7 -2.11,7 -2.10,8 -2.10,2 -2. 8,9 -2.10,0 -2.20,0 -2.20,0 -2.22,5 -2.39,2 -2.38,7 -2.35,5 -1.0,0 -2.35,5 -1.0,0 -2.35,5 -1.0,0 -2.36,	46,1
I	Soleil, bord 1, inf  A Petite Ourse I  Mercure, bord 1, cre  A Bouvier  5 A Petite Ourse.  Vénus, bord 1, centr.  B Petite Ourse.  A Serpent  A Hercule  5 ge Hercule  28 w Dragon  5 Hercule  96 Q Hercule  103 hercule  21 Sagittaire  Petite Ourse S  1 m Aigle  A Lyre	14: 8.36,74 14:27:35,41 14:35:27,34 14:50:53,91 15:36:41,31 17: 7:37,12 17:12:17,95 17:37:36,39 17:51:44,67 17:55:47,05 18: 1:30,03 18:11:20,34 18:16:14,83 18:20:20,12 18:26:52,21	- 0,46 - 0,64 - 0,25 + 1,00 - 0,77 - 0,41 - 0,32 - 0,06 + 0,54 - 0,15 - 0,25 - 0,16 - 0,72 - 0,81 - 0,61	- 12,82 - 12,85 - 12,80 - 12,82	281.12.29,5 11.24.18,4 268.23.27,2 299.54.11,8 356.17.18,8 262.16.57,2 354.41.39,8 294.30.30,4 317.23.119,3 309.12.23,4 300.46.41,1 308.41.9,6 264.4.19,9 259.20.56,9 6.31.20,2	726,1 725,0 725,0 724,9 724,9 724,9	+17,5 +17,5 +17,5 +17,6 +17,7 +17,5 +17,5	+10,7 +19,0 +19,0 +20,6 +20,0 +19,7 +19,8 +17,6 +17,5 +17,3 +17,2 +17,2 +17,2	+ 54,2 -1.24,9 - 26,3 + 31,1 -1.48,6 + 29,2 - 33,2 - 8,3 + 22,5 - 16,4	48,8 44,6 51,7 47,8

Le 19, Mire Sud-38º,61. Mire Nord C-17º,90. Mire Nord D-51º,59. Niveau-4º,31.

85
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850.

iouns.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le biveau.	BAROMÈTRE.	THERM	OMÉTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	3 n Aigle	h. m. s. 18.35.10,75 18.35.13,47 18.55.31,54	s. - 0,60 - 0,60 - 0,83	5.	271.32. 1,2 258. 0.48,5	nım.	0	+16,7	-1.16,0 -2.13,9	"
	Anonyme.  Lalande 36104  y Aigle.	18.59. 3,24 19. 2.57,16 19. 6.48,72 19.38.57,08	- 0,83 - 0,84 - 0,84 - 0,37	- 13,01	257.57. 1,5 257.47.48,5 257.52.32,2 290.11.50,4	725,3	+17,0	+16,0 +15,0	-2.15,9 $-2.14,4$ $-2.15,6$ $-2.15,1$ $-39,5$	46,9
	α Aigle.  ß Aigle.  Taylor 9185.  Piazzi, XIX, 369.	19.43.17,24 19.47.46,29 19.51.43,53 19.54.40,87	- 0,39 - 0,42 - 0,86 - 0,86	- 13,03 - 12,95	288.25.26,9 285.59. 3,2 256.55.49,5 256.57.37,7	725,6	+16,3	+13,3	$ \begin{array}{r} -42,2 \\ -46,1 \\ -2.23,1 \\ -2.22,0 \end{array} $	52,6 51,5
	Anonyme	19.59.46,27 20. 9. 9,76 20. 9.33,70 20.13. 8,43	- 0,86 - 0,68 - 0,68 - 0,84	- 12,99 - 13,00	256.50.45,0 266.57.14,8 257.32.31,6		•	+13,2	-2.23,8 -1.31,7 -2.18,9	52,3
20	Anonyme Soleil, bord 1, sup. α Petite Ourse I	20.18.18,13 11.48.10,07 13. 6. 5,85	- 0,84 - 0,48		257.30.21,1 281.21.12,9 11.24.19,5	725,5 725,6 724,9	+15,4	+12,8 +18,4 +18,9	-2.19,3 $-53,4$ $+54,2$	50,2
	Mercure, bord 1, ctre η Grande Ourse α Couronne, α Serpent	13.16.52,14 13.41.23,77 15.28. 8,05 15.36.41,29	- 0,65 + 0,13 - 0,16 - 0,41	- 12,70 - 12,64 - 12,81	268. 5.28,3 329.59.36,7 307. 9.39,4 286.50.46,2	724,8	+17,7 +18,0 +18,3	+19,6 +18,4 +18,9	$ \begin{array}{r} -1.25,6 \\ + 3,6 \\ - 18,4 \\ - 43,9 \end{array} $	45,9 47,2 50,8
24	Soleil, bord 1, inf  7 Grande Ourse  A Bouvier  A Scorpion  4 Hercule  5 q e Hercule	12. 2.32,01 13.41.23,45 14. 8.36,56 16.20. 2,33 17. 7.36,90 17.12.17,59	- 0,49 + 0,13 - 0,25 - 0,92 - 0,32 - 0,05	- 12,97 - 12,96 - 12,91 - 12,95	279.15.47,1 329.59.39,3 299.54.12,1 253.52.52,7 294.30.28,4 317.33.21,3	725,2 724,9 724,8 724,2 724,2	+17,0 +17,7 +17,9 +18,0 +18,0	+16,3 +19,3 +19,4 +19,0 +17,4 +17,4	- 57,8 + 3,6 - 26,4 -2.45,6 - 33,2 - 8,3	49,5 45,4 46,6 44,0
	α Ophiuchus δ Petite Ourse S α Lyre 3 n Aigle	17.27.46,92 18.20.18,54 18.31.39,59 18.35.10,33	- 0,33 - 0,60	- 12,78 - 13,22	6.31.20,4 318.35.10,7 271.32. 4,7	724,4 724,4 724,4	+17,8 +17,8 +17,8	+15,6 +15,6 +15,4	+ 46,1 - 7,2 -1.16,3	52,3 50,9
	Weisse, XVIII, 885. Anonyme Anonyme Lalande 36104	18.35.13,25 18.58.52,54 19. 2.56,82 19. 6.48,42 19.13.55,60	- 0,60 - 0,83 - 0,84 - 0,84 - 0,82		258. 2.43,3 257.47.51,1 257.52.35,3 258.54. 1,0	724,6	+17,2	+14,9	-2.14,4 -2.16,0 -2.15,5 -2. 8,8	
	Anonyme Piazzi, XIX, 147 Anonyme	19.18. 0,82	- 0,83 - 0,83 - 0,83		258. 2.58,0 258. 8.21,3 258. 0.40,2			+14,9		

Le 20, Mire Sud-38°,00. Mire Nord B+6°,83. Mire Nord C-17°,68. Mire Nord D-50°,61. Le 24, Mire Sud-38°,92. Mire Nord B+5°,11. Mire Nord D-52°,50. d+3°,81. Niveau-3°,81.

Observations faites à la lunette méridienne en Septembre 1850. CORRECTION MOYENNE BAROMETRE LIEU PASSAGE COXCLU THERMOMÈTRE JOURS. NOM de DES VERNIERS du 211 corrigee DES ASTRES. la luté-Extél'instru-Fil Méridien. POLE. pour le niveau. pendule. ment. ricur. rieur. h. m. s. 972.02E. - 0,80 -2. 4,7 Anonyme. . . . . . . 19.31. 2,84 259.36.48,4 +14,5 47,3 y Aigle..... 19.38.56,78 -13,22290.11.50,9 39,5 -0.37288.25.25,7 19.43.16.94 51,3 α Aigle. . . . . . . . . . . . - 13,25 42,2 ~ 0,39 - 45,4 53,7 19.47.45,85 - 13,31 285.59. 4,8 B Aigle...... - 0,42 -2.23,4 Piazzi, XIX, 351... 19.52.18,69 256.49.40,0 724,8 +16,8 +14,0 -0.86256.50.50,7 -2.23,3Anonyme..... 19.59.45,81 ~ 0,86 50,9 a Capricorne .... 20. 9. 9,58 -13,00-1.31,1 -0.68266.59.29,7 α 2 Capricorne.... 20. 9.33,46 -13,16- 0,68 257.32.30,4 Taylor o368..... +16,3 +13,4 -2.18,6 20.13. 8,25 724,9 -0.84Lalande 39533.... -2.40,4 20.24.45,33 254.48.39,3 - 0,00 -2.44,7 Lalande 39714.... 254.21. 5,3 20.28.46,07 - 0,91 20.31.45,21 254.24. 4,0 Anonyme..... - 0,91 -2.44,351,2 α Cygne..... 20.36. 8,53 -12,81324.41. 5,3 +15,8 +12,8 + 0,05 724,9 1,4 Lalande 40536.... 20.50.38,44 258.56.54,5 +12,6 -2. 9,6 - 0,82 Anonyme. . . . . . . 20.56.30,54 259.15.43,0 -2. 7,8 -0.81Lalande 40877.... -2. 7:4 20.59. 6,67 -0.81259.20. 0,5 Taylor 9813..... 21. 3.20,36 - 0,81 259. 1.38,2 -2.9,321. 7.59,30 259.10.32,5 Piazzi, XXI, 41... - 0,81 -2.8,5Piazzi, XXI, 57... 21. 9.45,56 - 0,81 α Céphée ...... 341.53. 8.3 + 15,5 55,7 21.14.49,50 + 0,36 -13,0621.18.34,22 35 Capricorne .... -2.15,3-0.83258. 7.44,0 55,4 3 Céphée. ..... 349.50. 4,3 257.35. 3,4 +11,8 21.26.32,51 + 0,62 - 13,08 724,9 +15,1 + 24,2 Anonyme..... 21.30.29,36 -0.84-2.19,1 21.32.54,70 +11,6 -2.18,9Taylor 10063..... -0.84257.37.46,9 Anonyme...... 21.40.45,48 -0.85257.17.19,1 -2.21,3 Anonyme..... -2.37,9 21.44.41,07 - 0.88 255.13. 0.1 -2.37,4 Lalande 42720.... 21.48. 4,27 -0.88255.15.35,0 -2.36,4Anonyme..... 21.50.34,56 - 0,88 255.22.20,2 Anonyme..... 255.38.25,3 -2.34,221.53.36,97 - 0,88 - 59,5 49,6 α Verseau..... 21.57.54,59 - 13,09 -0.50278.54.19,4 -2.34,7 Lalande 43 r 63.... 255.35. 2,9 22. 0.55,31 -0.88724,9 +14,2 +11,4 Neptune..... 22.28. 6,74 -0.62269.30.13,7 +13,9 +11,4 -1.23,5724,9 +16,5 +15,0 26 Soleil, bord 1, inf... 12. 9.44,09 - 0,51 278.28.53,2 730,1 -1. O,I 13. 6. 7,62 13.17. 5,74 +15,8 + 55,1 α Petite Ourse I... 11.24.15,3 729,7 +16,6 49,0 α Vierge..... -0.62- 13,04 269.34.30,4 -1.22.546,1 Mercure, bord 1, ctre 13.22.31,62 - 0,68 267.12.25,9 729,6 +16,8 +15,8 -1.304264.32.32,7 354.41.38,3 α² Balance . . . . . . - 13,05 +16,3 -1.40,446,2 14.42.23,64 - 0,72 729,4 +17,0 52,6 B Petite Ourse S ... 14.50.53,21 +0.87- 13,13 + 29,7 -2. 4,7 259.36.27,1 Vénus, bord 1, centr. 15. 4.37,36 +17,3 +16,5 - 0,80 729,3 - 18,7 - 44,5 43,6 α Couronne..... 15.28. 7,67 -0.16307. 9.35,4 729,3 +17,4 +16,8 - 12,92

Le 25, Mire Sud-36P,08.

α Serpent......

Le 26, Mire Sud-371,20. Mire Nord B+6119. Mire Nord C-181,03. Mire Nord D-501,90.

- 13,10 | 286.50.43,7

48,0

15.36.40,91 - 0,41

87
Observations faites à la lunette méridienne en Septembre et Octobre 1850.

Sunor	NOM	PASSAGE CONCLE		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROHÈTRE	_	DWÉTRE	RÉFRAC	LIEU du
s.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	laté- rieur.	Exté-	ACTION.	POLE.
	α Scorpion α Hercule α Ophiuchus 28 ω Dragon δ Petite Ourse S α Lyre 3 n Aigle Weisse, XVIII, 885.	h. m. s. 16.20. 2,15 17. 7.36,76 17.27.46,78 17.37.35,79 18.20.17,89 18.31.39,75 18.35.10,35 18.35.13,23	5. - 0,92 - 0,32 - 0,33 + 0,57 - 0,03 - 0,61 - 0,61	s. - 13,06 - 13,05 - 12,88 - 13,01	253.52.56,1 294.30.28,7 292.37. 1,5 348.45.31,3 6.31.21,8 318.35.10,5 271.32. 4,5	729,1 729,0 729,0 729,0 728,9	+17,3 +17,0 +17,1 +16,7	*17,2 +16,5 +16,4 +16,4 +15,0 +14,1	-2.47.8 - 33,5 - 36,1 + 22,7 + 46,6 - 7,3 -1.17,1	47.77 46.0 46.0 54.1 50.5
	36 Sagittaire 36 ξ' Sagittaire B. A. C. 6485 Anonyme Anonyme γ Aigle α Aigle β Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle γ Aigle	18.41.39,01 18.48.15,10 18.52.24,71 18.59. 2,76 19. 2.56,62 19.38.56,88 19.43.17,04 19.47.46,05 19.52.18,71 20. 9. 9,44	- 0,84 - 0,82 - 0,85 - 0,84 - 0,84 - 0,37 - 0,39 - 0,42 - 0,86 - 0,68	- 13,09 - 13,12 - 13,08	257.38.30,3 259. 7.11,2 257. 4.11,1 257.57. 6,2 257.47.54,6 250.11.50,4 288.25.25,7 285.59. 4,5 256.49.39,2	728,9 729,2	+15,8 +15,1	+13,3 +12,9 +12,3 +12,3	-2.18,5 -2. 8,9 -2.22,8 -2.16,7 -2.17,9 - 40,1 - 42,8 - 40,6 -2.25,2	46,1 50,6 52,1
	α <sup>2</sup> Capricorne α Verseau. Neptune. Weisse, XXIII, 568. Victoria Weisse, XXIII, 777.	20. 9.33,32 21.57.54,57 22.27.55,88	- 0,68 - 0,50 - 0,62 - 0,34 - 0,34 - 0,33	- 13,28 - 13,10	266.57.11,2 278.54.15,7 269.29.15,9 291.46.46,5 291.56.48,8 292.15.53,6	729,2 729,8 729,5	+14,5 +14,7 +13,8 +13,8	+12,1 +10,0 +10,0 + 9,3 + 9,3	-1.32,5 -1. 0,2 -1.24,5 - 38,2 - 38,0 - 37,5	48,1 45,2
27	Soleil, bord 2	12.15.29,21 13. 6.11,28 13.17. 5,86	- 0,51 - 0,62	- 12,92	11.24.15,9 269.34.28,0	730,8 730,8	+17,5	+19,5 +18,8	+ 54,5 -1.21,8	49,4
30	z Couronne	15.28. 7,57 15.36.40,99 17.27.46,80	- 0,16 - 0,41 - 0,33	- 12,96 - 12,97 - 12,79	307. 9.35,1 286.50.42,3 292.37. 1,4	722,8	+16,4	+16,8	- 18,5 - 44,1 - 35,8	44,1 47,3 46,3
7	Soleil, bord 1, sup.	12.49.41,07 13. 6. 8,36	- 0,56		274.45. 3,4 11.24. 9,4	725,2 725,0	+14,3	+16,3 +16,7	-1. 7,8 + 54,6	46,7
8	z Couronne z Serpent Vénus, bord 1,centr. z Scorpion z Herculc	16.20. 5,15	- 0,16 - 0,41 - 0,88 - 0,92 - 0,32	- 9,93 - 9,94 - 9,88 - 9,86	307. 9.34,2 286.50,44,5 255.51.37,0 253.52.48,3 294.30.25,2	728,8 728,7 728,7 728,7	+15,3 +15,7 +16,6 +17,6	+20,4 +20,2 +19,6 +19,0	- 18,5 - 43,9 -2.28,5 -2.46,0 - 33,2	44,5 50,3 41,2 43,8

Le 27, Mire Sud-40",12. Mire Nord  $B+6^{\circ}$ ,60. Mire Nord  $C-17^{\circ}$ ,42. Mire Nord  $D-50^{\circ}$ ,23. Niveau-3°,96.  $d+5^{\circ}$ ,28.

Le 30, Mire Sud-380,03. Mire Nord B+50,37. Mire Nord C-190,90. Mire Nord D-530,13.

88
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE		OMĖTRE	RÉFRACTION	LIEU
s.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	corrigée pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	ô Petite Ourse S	ti. m. s 18-20-17,30 18-31-42,41 18-41-42,05 18-48-18,13	- 0,03 - 0,84 - 0,82	- 10,04	6.31.19,5 318.35, 5,4 257.38 29,8 259, 7.11,4	728,7 728,8	+17,0	+17,2 +16,8 +16,5	+ 46,2 - 7,2 -2.17,1 -2. 7,7	51,7 45,7
	B. A. C. 6485	18.52.27,71 19. 0.43,02 19. 7.56,22 19.19. 6,92 19.23.13,46	- 0,85 - 0,82 - 0,84 - 0,82 - 0,83		257. 4. 9,8 258.42.43,4 257.45.44,5 259. 9.10,2 258. 8.24,7	728,8	+16,6	+15,2	-2.21,5 -2.10,5 -2.16,9 -2. 7,9 -2.14,5	
	Anonyme  y Aigle  a Aigle  ß Aigle  Piazzi, XIX, 351	19.28. 2,12 19.38.59,70 19.43.20,02 19.47.48,93 19.52.21,63	- 0,83 - 0,37 - 0,39 - 0,42 - 0,86	- 10,05 - 9,92 - 9,99	258. 0.41,4 290.11.49,5 288.25.23,9 285.59. 1,2 256.49.37,3	728,9	+16,2	+14,8	$ \begin{array}{r} -2.15,4 \\ -39,7 \\ -42,3 \\ -46,1 \\ -2.23,8 \end{array} $	45,5 49,2 49,3
	α Capricorne α Capricorne Anonyme Lalande 39533 Lalande 39714	20. 9.12,56 20. 9.36,54 20.18. 2,42 20.24.48,29 20.28.49,09	- 0,68 - 0,68 - 0,90 - 0,90 - 0,90	- 9,89 - 9,86	266.59.27,8 254.51.50,0 254.48.37,8 254.21. 3,2	728,9	+16,0	+14,6	-2.40,4 -2.40,9 -2.45,1	49,1
	Anonyme  Anonyme Lalande 40536 Lalande 40877	20.31.48,35 20.36.11,43 20.40.27,74 20.50.41,42 20.59. 9,88	- 0,90 + 0,05 - 0,82 - 0,81	- 9,57	254.24. 7,6 324.41. 7,0 258.47.47,3 258.56.45,5 259.20. 0,6	729,0	+14,9	+13,5	$ \begin{array}{rrrr} -2.44,7 \\ -1,4 \\ -2.10,8 \\ -2.9,9 \\ -2.7,5 \end{array} $	51,0
	Lalande 41112	21.26.35,09	- 0,86 + 0,36 - 0,83 + 0,62 - 0,38	- 9,81 - 9,85	289.28.49,5	728,9	+14,7	+13,8	- 40,9	
	Weisse, XXIII, 647. Weisse, XXIII, 777.  a Lion  B Lion	23.31.10,64 23.37.53,58 10. 0.14,00 11.41.15,16	- 0,35 - 0,33 - 0,33 - 0,30	- 9,63 - 9,59	291.18.36,9 292.15.55,8 292.38. 4,4 295.20.47,4	729,2 729,1	+14,4	+15,4 +16,6	- 38,2 - 36,9 - 36,2 - 32,4	41,8 42,6
9	Soleil, bord 1, inf  a Petite Ourse I  a Hercule  a Ophiuchus  b Petite Ourse S  a Lyre  a Alala	12.57. 1,67 13. 6.13,76 17. 7.39,92 17.27.49,90 18.20.15,75 18.31.42,53 18.35.13,53	- 0,58 - 0,32 - 0,33 - 0,03 - 0,60	- 9,67 - 9,53 - 9,89	273.27. c,2 11.24. 8,0 294.30.30,1 292.37. 1,5 6.31.16,4 318.35.10,2 271.32. 6,0	728,9 728,9 727,8 727,8 727,7	+16,3 +16,3 +17,7 +17,9 +17,7	+16,9 +17,0 +19,7 +19,5 +17,6	-1.11,2 + 54,9 - 33,1 - 35,6 + 46,1 - 7,2 -1.16,2	46,4 48,7 47,1 48,5 50,5
	3 n Aigle 36 ξ · Sagittaire		- 0,00		271.52. 6,9 259. 7. 9,6	727,7	717,3	1 77,1	-1.10,2 -2. 7,1	

Le 8, Mire Sud-39°,35. Mire Nord B+7°,66. Mire Nord C-15°,64. Mire Nord D-45°,49. Niveau-4°,48.

89
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS.	NOM .  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYEXNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	B. A. C. 6485  ** Sagittaire* Lalande 35947 Anonyme. B. A. C. 6602 Anonyme. Piazzi, XIX, 147 Anonyme.  **p Aigle **a Aigle **a Aigle **a Aigle **B Aigle **p Aigle *p	23.26.14,06	- 0,85 - 0,82 - 0,82 - 0,84 - 0,83 - 0,83 - 0,83 - 0,37 - 0,42 - 0,42 - 0,19 - 0,19 - 0,19 - 0,68 - 0,38 - 0,38	- 9,78 - 9,81 - 9,93 - 9,59 - 9,51 - 9,82 - 9,59	257. 4.10,3 258.42.38,9 253.49.30,6 257.45.44,9 302.42. 2,3 258. 8.22,6 258. 0.38,6 290.11.52,7 288.25.23,1 285.59. 3,6 264.9.39,4 304.27.17,2 266.57.11,2 254.24. 9,0 324.41. 7,7 341.53. 9,9 349.50. 6,0 255.13.49,4 251. 1.48,9 254.27.34,9 269.23.14,6 289.28.53,9 291.18.36,5 291.18.36,5 291.18.36,5	727.9 727.9 728,0 727.9 727.7 727.7 727.6	+17,2 +16,6 +16,5 +16,5 +15,8 +15,6 +15,4	+15,8 +15,7 +15,6 +15,0 +14,9 +14,9 +15,0 +12,6 +13,6 +13,6 +14,1 +14,1 +13,8 +12,1 +12,0	-2.20,9 -2.9,9 -2.48,6 -2.16,3 -2.3,6 -2.14,9 -3.9,6 -4.2,2 -46,1 -2.23,6 -21,7 -21,7 -1.31,4 -2.45,0 -2.44,5 -1.4 +15,5 +24,1 -2.36,8 -3.22,7 -2.43,7 -1.23,0 -1.23,4 -41,1 -41,0 -38,4 -37,0	48,8 48,5 51,7 49,7 51,7 54,1 53,4
1	α Petite Ourse I  Soleil, bord 1, sup. α Couronne α Serpent Vénus, bord 1, centr. α Scorpion α Hercule α Ophiuchus	16.20. 6,05	- 0,57 - 0,24 - 0,43 - 0,83 - 0,83 - 0,35 - 0,37	- 8,66 - 8,68 - 8,63 - 8,63 - 8,50	272.28.39,0 307. 9.33,5 286.50.37,6 254.39.17,8 253.53. 2,8 294.30.27,3 292.37. 0,6	734,5 734,4 733,9 733,7 733,5 733,2	+ 9,4 + 9,4 +10,0 +10,2 +10,2	+ 7,4 + 7,1 + 8,1 + 8,2 + 8,3 + 8,3 + 8,3	+ 57,2 -1.17,7 - 19,4 - 45,2 -2.46,8 -2.54,4 - 34,8 - 37,4	49,7 43,8 42,6 47,0 44,5 44,9

Le 9, Mire Sud-40°,64. Mire Nord C-15°,00. d+3°,96.

90
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO	) VĖTRE	RÉFRACTION	LIEU
is.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ètre.	Iaté- rieur.	Exté- rieur.	710N.	POLE.
	δ Petite Ourse S α Lyre 36 ξ' Sagittaire Β. A. C. 6485 π Sagittaire Lalande 35947	18.52.28,99	- 0,15 - 0,76 - 0,79 - 0,77 - 0,84	s. - 8,79	6.31.15,6 318.35. 7,0 259. 7.13,8 257. 4.17,3 258.42.45,9 253.49.38,3	733,1 733,1	+ 9.9 + 9.9	+ 8,1 + 8,0 + 7,6 + 6,8	+ 48,0 - 7,5 -2.12,5 -2.26,9 -2.15,5 -2.56,0	49,8 48,3
	B. A. C. 6602 Piazzi, XIX, 147 h <sup>2</sup> Sagittaire y Aigle a Aigle	19.11.15,71 19.23.14,36 19.27.28,35 19.39. 0,60 19.43.20,92	- 0,29 - 0,77 - 0,83 - 0,39 - 0,41	- 9,08 - 8,95	302.42. 8,4 258. 8.27,5 254.46. 3,7 290.11.51,7	733,1 733,1	+ 9,5	+ 6,7	- 24,6 -2.19,5 -2.46,6 - 41,1	46,4
	B Aigle Lune, bord I, inf Anonyme Anonyme α ' Capricorne α ' Capricorne	19.54.15,94 19.58. 2,35 20. 3.58,65 20. 9.13,50 20. 9.37,36	- 0,44 - 0,75 - 0,26 - 0,67 - 0,67	- 8,9 <sup>2</sup> - 8,86 - 8,95	285.59. 2,3 259.26.16,3 304.27.11,8 304.33. 4,4 266.57.13,5	733,2	+ 9,0	+ 6,9	$ \begin{array}{r} - 47.8 \\ -2.11.1 \\ - 22.6 \\ - 22.6 \end{array} $ $ -1.35.6 $	48,0
	β <sup>2</sup> Capricorne Lalande 39533 Lalande 39714 Anonyme α Cygne α Verseau	20.12.28,48 20.24.49,27 20.28.50,05 20.31.49,25 20.36.12,45 21.57.58,63	- 0,68 - 0,83 - 0,83 - 0,83 - 0,10 - 0,50	- 8,5 <sub>7</sub> - 8,86	264.42.41,3 254.21. 5,4 254.24.10,7 324.41. 7,7	733,0	+ 8,0	+ 4,3	-1.44,7 -2.52,1 -2.51,6 - 1,4	51,3
	Lalande 43 r63 Anonyme Anonyme 49 Verseau Anonyme Neptune	22. 0.59,13 22. 6.17,79 22.10.45,38 22.15. 3,39 22.23.16,50	- 0,81 - 0,81 - 0,90 - 0,83 - 0,62 - 0,62	3,30	255.35. 6,3 255.13.55,4 251. 2. 2,0 254.27.40,8 269.31.31,9 269.21.50,4	732,8	+ 7,5	+ 2,4	-2.41,7 -2.44,9 -2.33,4 -2.52,3 -1.27,3	
	Weisse, XXIII, 477. Victoria Weisse, XXIII, 647. Weisse, XXIII, 777. a Petite Ourse I	23.23.38,68 23.24.41,42 23.31.11,48 23.37,54,54	- 0,41 - 0,41 - 0,39 - 0,37		288.50.50,7 292.15.55,8 11.24. 6,0	732,8 732,8 732,8 732,3	+ 6,6 + 6,8 + 9,3	+ 1,9 + 2,1 + 7,6	- 43,9 - 38,7 + 57,0	48,5
	Soleil, bord 1, inf  a Couronne  begin series of the series of t	17. 7.41,32	- 0,59 - 0,24 - 0,43 - 0,83 - 0,35 - 0,37 - 0,03	- 8,27 - 8,33 - 8,22 - 8,17 - 8,31	271.33.54,8 307. 9.34,9 286.50.40,5 254.26.18,4 294.30.28,5 292.37. 1,3 331.26.37,6	732,3 731,5 731,4 731,3 731,2	+ 9,4 +10,0 +10,3 +10,5 +10,5	+ 7,6 +11,3 +11,4 +10,6 +10,8 +10,7	-1.19,3 - 19,2 - 45,5 -2.47,0 - 34,3 - 36,9 + 5,2	45,6 45,2 46,3 46,0 50,7

Le 13, Mire Sud-379,75. Mire Nord B+69,73. Mire Nord C-189,03. Mire Nord D-509,81. Niveau-59,12.

91
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION le la pendule.	MOVENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE.	THERM Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	3 Petite Ourse S α Lyre	h. m. s. 18.20.17,37 18.31.44,01 18.48.19,78 18.52.29,33	s. - 0,15 - 0,76 - 0,79	- 8,4o	6.31.16,4 318.35. 9,4 259. 7.13,7 257. 4.14,6	731,1 731,1	+10,3 +10,3	+10,0, +9,6 +9,4	+ 47,6 - 7,4 -2.11,3 -2.25,8	50,3 49,8
	π Sagittaire Lalande 35947 B. A. C. 6602 Piazzi, XIX, 147 Anonyme	19. 0.44,73 19. 3.53,57 19.11.16,09 19.23.14,94 19.28. 3,65	- 0,77 - 0,84 - 0,29 - 0,77 - 0,77		258.42.42,8 253.49.37,5 302.42. 5,6 258. 8.27,8 258. 0.42,3	731,1	+10,1	+ 9,1 + 9,0 + 8,5 + 8,5 + 8,4	$ \begin{array}{r} -2.14,1 \\ -2.54,0 \\ -24,4 \\ -2.18,2 \\ -2.19,1 \end{array} $	
	y Aigle	19.39. 1,26 19.43.21,48 19.47.50,35 19.58. 2,75 20. 2.53,81 20. 3.59,12	- 0,39 - 0,41 - 0,44 - 0,26 - 0,26 - 0,26	- 8,40 - 8,38 - 8,48	288.25.24,9 285.59. 0,1 304.27.10,4 304.28.36,6	731,3	+10,0	+ 8,4	- 43,5 - 47,4 - 22,5 - 22,4	49,1 47,0
	α <sup>1</sup> Capricorne α <sup>2</sup> Capricorne β <sup>2</sup> Capricorne Anonyme Lalande 39533	20. 9.13,98 20. 9.37,86 20.12.29,10 20.18. 3,79 20.24.49,63	- 0,67 - 0,67 - 0,68 - 0,83 - 0,83	- 8,36 - 8,43	266.57. 7,7 264.42.39,9 254.51.52,2 254.48.41,4			. ,	-1.34,5 -1.43,5 -2.45,5 -2.46,0	43,3
	Lalande 39714 Anonyme  a Cygne Lune, bord 1, inf Lalande 40536 Anonyme  y Verseau	20.28.50,39 20.31.49,61 20.36.12,85 20.45.22,54 20.50.42,84 20.58. 3,16 21. 1.19,62	- 0,83 - 0,83 - 0,10 - 0,71 - 0,76 - 0,65	- 8,13	254.21. 6,4 254.24. 6,3 324.41.10,0 261.12.23,9 258.56.50,7 259.11.30,7 267.58.59,0	731,2	+ 8,5	+ 5,6	-2.50,6 -2.50,2 - 1,4 -2. 0,8 -2.13,8 -2.12,1 -1.31,2	53,5
	Lalande 41112 Capricorne Anonyme Lalande 42720 Anonyme  Z Verseau Lalande 43163 Anonyme	21. 4.43,53 21.13.47,80 21.44.45,23 21.48. 8,69 21.53.41,17 21.57.59,13 22. 0.59,69 22. 6.18,09	- 0,81 - 0,71 - 0,82 - 0,82 - 0,82 - 0,50 - 0,81 - 0,81	- 8,35	262.29.40,7 255.12.59,9 255.15.42,7 255.38.27,0 278.54.16,3 255.35. 6,7 255.13.52,7	731,1 731,1 731,2	+ 8,2 + 7,9 + 7,6	+ 5,5 + 5,2 + 3,9	-1.54,2 -2.43,4 -2.43,1 -2.40,0 -1. 1,8 -2.40,5	44,2
	Anonyme	22.10,45,60 22.15. 3,93 22.23.16,86 22.26,38,16 22.49.16,22 23.24.22,62	- 0,90 - 0,83 - 0,62 - 0,62 - 0,93 - 0,41 - 0,39	- 8,57	253.15.32,7 251. 2. 0,9 254.27.40,2 269.31.25,8 269.21.26,3 249.34.51,0 288.40.44,4 291.46.46,4	731,0 731,2 731,2	+ 6,4 + 6,5 + 7,0	+ 3,4 + 3,4 + 3,4	-3.31,7 -2.51,1 -1.26,7 -1.27,2 -3.55,0 - 44,1 - 39,3	47,3

Le 14, Mire Sud-381,18. Mire Nord B+71,10. Mire Nord C-171,89 Mire Nord D-491,51. d-41,80.

Niveau-51,20.

92
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE COXCLU au Fil Méridien.		ECTION de	MOYEXXE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO	MÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
		rii meridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.	N.	I Vall.
	Weisse, XXIII, 647. Weisse, XXIII, 777. 3 Lion γ Grande Ourse α Petite Ourse I	b. m. s. 23.31.12,14 23.37.55,00 11.41.16,92 11.45.46,55 13. 6. 7,67	s. - 0,39 - 0,37 - 0,34 - 0,01	- 7,96 - 7,95	334.27. 4,6 11.24. 4,9	732,0 731,7	+ 8,4 + 9,9	+ 8,5 +14,8	+ 8, <sub>2</sub> + 55,5	44,0 46,3
15	Soleil, bord 1, sup.  a Couronne  a Serpent  Scorpion	13.19.14,08 15.28.12,57 15.36.45,89 16.20. 7,09	- 0,60 - 0,24 - 0,43 - 0,83	- 7,86 - 7,94 - 7,77	271.43.35,8 307. 9.33,8 286.50.41,1	731,5 731,5	+10,5	+14,2	-1.16,9 - 18,9 - 44,9	45,0 46,5
	Vénus, bord 1, centr.  α Hercule  α Ophiuchus  γ Dragon	16.22.53,93 17. 7.41,82 17.27.51,76 17.52.59,56	- 0,83 - 0,35 - 0,37 - 0,04	- 7,70 - 7,61 - 7,92	254.14. 1,9 294.30.27,8 292.37. 0,0 331.26.39,2	731,5 731,4 731,3 731,3	+12,4 +12,8 +12,6 +12,3	+14,5 +14,2 +13,8 +13,4	-2.46,6 - 33,9 - 36,5 + 5,1	46,1 45,2 52,3
	A Petite Ourse S Δ Lyre	18.31.44,37 18.48.20,16 18.52.29,66	- 0,15 - 0,76 - 0,79 - 0,77	- 8,02	6.31.16,4 318.35. 9,6 259. 7.12,0 257. 4.13,5 258.42.40,5	731,3 731,3 731,4	+12,1 +12,0 +12,3	+12,9 +12,8 +12,0 +11,7 +11,2	+ 47,1 - 7,3 -2.10,1 -2.24,2 -2.13,0	49,9
	Lalande 35947 Piazzi, XIX, 42 B. A. C. 6602 Weisse, XIX, 387.	19. 3.53,91 19. 8.43,30 19.11.16,49 19.15.58,82	- 0,84 - 0,31 - 0,29 - 0,55		253.49.37,1 300.55. 3,9 302.42. 5,5 274.10. 0,3		,	+10,9	-2.52,7 - 26,1 - 24,2 -1.11,2 -2.17,0	
	Piazzi, XIX, 147. Anonyme. Anonyme.  y Aigle	19.28. 4,08 19.30.44,46 19.39. 1,64	- 0,77 - 0,77 - 0,77 - 0,39 - 0,41	- 8,01 - 7,94	258. 8.28,9 258. 0.47,4 258. 1.35,4 290.11.54,4 288.25.25,7	731,4	+11,5	+10,4	-2.17,0 -2.18,0 -2.18,0 - 40,5 - 43,2	49,7 50,2
	B Aigle Piazzi, XIX, 351 B. A. C. 6883 Anonyme	. 19.47.50,77 19.52.23,45 19.55.17,19 19.58. 3,11	- 0,44 - 0,80 - 0,26 - 0,26		285.59. 2,0 256.49.45,5 304.19.48,7 304.27.15,9	2 (		. 0.0	- 47,1 -2.26,9 - 22,4 - 22,3	49,2
	Anonyme	20. 9.14,22 20. 9.38,18 20.18. 4,09	- 0,67 - 0,67 - 0,83	- 8,10 - 8,10	254.51.51,0	731,4	111,0	+ 8,6	- 22,3 -1.33,8 -2.44,2	48,8
	Lalande 39533 Lalande 39714 Anonyme Cygne	20.28.50,89 20.31.50,15 20.36.13,23	- 0,83 - 0,83 - 0,10	- 7,73	254.48.38,7 254.21, 7,8 254.24, 7,5				-2.44,6 -2.49,0 -2.48,5	
-	Anonyme				261.28.40,1 258.55. 3,0		+10,1	+ 8,7	-1.58,1 -2.12,9	

Le 15, Mire Sud-40P,44. Mire Nord B+6P,00. Mire Nord C-18P,19. Mire Nord D-50P,80.

93
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	NOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté- rieur.	DMÈTRE Exté- rieur.	HÉFRACTION.	LIEU da POLE.
	Anonyme	b. m. s. 20.58. 3,68 21. 1.19,98 21. 4.44,11 21.13.48,40 21.18.39,22 21.26.37,15 21.30.17,07 21.35.18,92 21.44.45,85 21.48. 9,13 21.53.41,75 21.57.59,65 22. 0.59,97 22. 8.50,02 22.15. 4,39 22.23.17,24 22.26.34,90 23.24. 5,76 23.37.35,41 23.45.56,70 23.48.56,60	- 0,76 - 0,65 - 0,81 - 0,71 - 0,77 + 0,20 - 0,83 - 0,82 - 0,83 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,63 - 0,62 - 0,62 - 0,62 - 0,63 - 0,63 - 0,63 - 0,63 - 0,63 - 0,63 - 0,63 - 0,63	- 7,84 - 7,82	259.11.31,0 267.58.59,2 256.48.54,2 262.29.40,5 258. 7.41,9 349.50. 9,0 254.51.20,1 263.46.48,7 255.12.55,2 255.15.42,4 255.38.24,5 278.54.18,1 255.34.59,5 271.25.41,6 254.27.40,3 269.31.26,6 269.21. 4,6 288.30.50,0 291.46.52,8 291.18.37,9 292.15.56,5 292. 5.48,7	731,6 731,6 731,7 731,8	+ 10,0 + 9,2 + 9,3 + 9,0	+ 7,9 + 8,2 + 6,5 + 6,1 + 5,9 + 6,3 + 6,3 + 4,4	-2.10,9 -1.30,9 -2.28,5 -1.53,5 -2.18,6 + 24,8 -2.44,5 -1.47,1 -2.41,7 -2.41,3 -2.38,2 -1. 1,2 -2.39,0 -1.20,0 -2.49,7 -1.25,8 -38,8 -38,8 -38,6 -38,6 -38,6	55,9
	Weisse, XXIII, 1007 Weisse, XXIII, 1117   Andromède  y Pégase  Lion  Grande Ourse  A Petite Ourse I		- 0,39 - 0,39 - 0,24 - 0,36 - 0,37 - 0,35	- 7,66 - 7,87 - 7,60 - 7,38 - 7,67	291.55.45,0 291.45.57,4 308.12. 5,7 294.17.40,5 292.38.10,4 295.20.50,4 334.27. 6,7 11.24. 3,8	731,8 732,7 732,7 732,4	+ 8,7 + 8,5 + 9,3 +10,0	+ 3,9 + 3,8 + 8,9 +10,0	- 38,9 - 39,1 - 18,5 - 35,5 - 37,9 - 33,5 + 8,2 + 56,5	43,1 48,8 47,1 45,6 46,5 46,5
16	Soleil, bord 1, inf  a Couronne  a Serpent  be Scorpion  Vénus, bord 1, centr.  a Hercule  p Ophiuchus  p Dragon  Petite Ourse S  a Lyre	17. 7.42,04 17.27.52,09 17.52.59,90 18.20.17,91	- 0,60 - 0,24 - 0,43 - 0,83 - 0,83 - 0,35 - 0,37 - 0,04 - 0,15	- 7,39 - 7,45 - 7,37 - 7,47 - 7,27 - 7,55 - 7,53	270.49.28,1 307. 9.34,1 286.50.4c,9 253.53. 1,0 254. 2.14,0 294.30.27,0 292.37. 0,6 331.26.37,6 6.31.15,9 318.35. 8,7	732,4 731,8 731,7 731,6 731,5 731,5 731,5	+10,0 +11,2 +11,4 +11,5 +11,5 +11,6 +11,4	+10,0 +11,4 +11,9 +11,9 +12,0 +12,0 +12,1 +11,8 +11,8	-1.20,8 - 19,2 - 45,5 -2.51,7 -2.50,2 - 36,8 + 5,2 + 47,3 - 7,4	45,2 45,8 47,7 45,1 45,6 50,9 49,8 49,2

94
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM	_	RÉFRACTION	LIEU
s.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	Lalande 35947 Piazzi, XIX, 42 B. A. C. 6602 Weisse, XIX, 387. Piazzi, XIX, 147	h. m. s. 19. 3.54,43 19. 8.43,74 19.11.16,99 19.15.59,39 19.23.15,63	s. - 0,84 - 0,31 - 0,29 - 0,55 - 0,77	s.	253.49.36,9 300.55. 0,5 302.42. 5,5 274. 9.55,4 258. 8.25,3	731,5	+11,0	+10,9	-2.52,9 - 26,1 - 24,2 -1.11,4 -2.17,5	21
	Anonyme	19.55.17,69	- 0,77 - 0,77 - 0,39 - 0,41 - 0,44 - 0,26	- 7,65 - 7,59 - 7,47	258. 0.45,4 258. 1.33,4 290.11.52,3 288.25.24,9 285.59. 1,4	731,6	+11,1	+ 9,3	-2.18,5 -2.18,5 - 40,7 - 43,4 - 47,3	47,4 49,2 48,4
	Piazzi, XIX, 378 Anonyme α Capricorne α Capricorne Anonyme	19.58. 3,65 20. 2.54,39 20. 9.14,86 20. 9.38,84	- 0,26 - 0,26 - 0,67 - 0,67 - 0,83	- 7,45 - 7,42	304.27.49,1 304.27.9,9 304.28.38,7 266.59.31,2	731,7	+10,4	+ 9,5 + 8,2 + 7,7	- 22,3 - 22,3 - 22,3 -1.34,0	50,3
	Lalande 39533 Lalande 39707 B. A. C. 7113	20.24.50,35 20.28.42,62 20.29. 7,05	- 0,83 - 0,83 - 0,83 - 0,10 - 0,76	- 7,47	254.48.40,9 255. 5.12,2 258.48. 1,3			* 777	-2.45,4 -2.42,8	
	Anonyme Anonyme Anonyme Verseau Lalande 41112 4 Poisson austral	20.51. 3,56 20.58. 4,00 21. 1.20,34	- 0,72 - 0,76 - 0,76 - 0,65 - 0,81 - 0,97		261.28.44,4 258.55. 3,9 259.11.34,9 267.58.56,5 256.48.57,3 247.12.45,9			+ 7,5	-1.58,7 -2.13,6 -2.11,4 -1.30,6 -2.28,4 -4.40,2	
,	Capricorne  Capricorne  Céphée  Lalande 42116  Anonyme  Lalande 42330	21.13.48,76 21.18.39,54 21.26.37,53 21.30.17,51 21.33.19,47	- 0,71 - 0,77 + 0,20 - 0,83 - 0,83 - 0,83	- 7,41	262.29.37,2 258. 7.40,8 349.50. 7,5 254.51.23,9 254.38.44,2	731,8	+ 9,5	+ 7,5	$ \begin{array}{r} -1.53,5 \\ -2.18,9 \\ + 24,8 \\ -2.45,2 \\ -2.47,3 \end{array} $	54,2
	Lalande 42385 Anonyme Lalande 42720 Anonyme  verseau Lalande 43163	21.37.34,49 21.44.46,35 21.48. 9,49 21.53.42,21 21.57.59,99	- 0,83 - 0,83 - 0,83 - 0,82 - 0,50 - 0,83	- 7,47	254.28.26,9 255.12.56,4 255.15.39,9 255.38.26,9 278.54.19,7 255.35. 2,5	732,0	+ 9,0	+ 6,7	-2.49,1 -2.42,4 -2.41,8 -2.38,5 -1. 1,2 -2.38,9	48,3
	Anonyme	22. 6.19,21	- 0,83 - 0,89	,	255.13.55,9 251. 1.59,2				-2.42,0 -3.29,4	

Le 16, Mire Sud-409,71. Mire Nord B+69,28. Mire Nord C-189,01. Mire Nord D-490,87. Niveau-40,20.

Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigce pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERMO	DMÈTRE  Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
I.	49 Verseau Weisse, XXII, 451. Weisse, XXII, 452. Neptune Victoria Weisse, XXIII, 568. Weisse, XXIII, 568. Weisse, XXIII, 647. Weisse, XXIII, 1943. Weisse, XXIII, 117 α Andromède γ Pégase α Lion γ Grande Ourse Mercure, bord 2, ctre α Petite Ourse I Soleil, bord 1, sup α Couronne α Couronne α Scorpion ν énus, bord 1, centr. α Hercule α Ophiuchus γ Dragon λ Petite Ourse S α Lyre Piazzi, XIX, 42 Weisse, XIII, 387. Lalande 36835 λ Sagittaire Anonyme Victoria Weisse, XXIII, 568. Weisse, XXIII, 568. Weisse, XXIII, 568. Weisse, XXIII, 943. Weisse, XXIII, 117 α Andromède α Andromède	23.31.12,84 23.37.55,84 23.49.2,76 23.54.11,66 0.0.34,43 0.5.26,90 10.0.16,62 11.45.47,27 12.32.35,37 13.6.10,76 13.26.42,46 13.41.29,35 15.28.13,35 15.28.13,35 15.36.46,81 16.20.8,15 16.30.48,97 17.7.42,52 17.27.52,48 17.53.0,30 18.20.16,60 18.31.45,11 19.8.44,08 19.15.59,79 19.22.26,96 19.27.30,13 19.30.45,64 23.23.37,36 23.27.31,60 23.31.13,32 23.38.48,30 23.45.57,58 23.49.3,38 23.54.11,80	5 0,84 - 0,62 - 0,62 - 0,62 - 0,63 - 0,37 - 0,37 - 0,37 - 0,37 - 0,37 - 0,37 - 0,36 - 0,37 - 0,52 - 0,60 - 0,60 + 0,04 - 0,20 - 0,42 - 0,88 - 0,33 - 0,34 + 0,05 - 0,88 - 0,33 - 0,34 + 0,05 - 0,88 - 0,88 - 0,88 - 0,88 - 0,33 - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35	- 7,41 - 7,39 - 7,25 - 7,27 - 6,99 - 6,93 - 6,87 - 7,02 - 7,17	254.27.39.9 269.31.41.9 269.20.41.5 288.20.49.9 291.46.50.7 291.18.35.6 292.15.53.9 292.5.43.4 291.55.44.7 291.46.0,3 308.12.7,4 294.17.38,2 292.38.8,7 334.27.7,2 277.25.26.7 11.24.5,8 270.59.41.4 329.59.29,1 307. 9.33.7 286.50.42,3 253.52.58.7 253.50.54,0 294.30.22.9 292.36.59.8 331.26.36,8 6.31.13,2 318.35.7,3 300.54.57,0 274.9.56,0 258.37.11.9 254.46.5,2 258.1.34.7 291.46.51,4 291.18.35,5 291.48.35,8 292.5.40,5 291.55.40,2 291.45.59,0 308.12.9,4	732,0 732,1 732,2 732,2 732,3 732,5 732,3 732,3 732,3 731,4 731,4 731,4 731,3 731,3 731,1 731,4	+ 9,4 + 9,6 + 9,5 + 9,5 + 8,4 + 10,6 + 11,0 + 11,3 + 11,3 + 11,3 + 12,1 + 12,1 + 12,1 + 12,1 + 12,0 + 12,0 + 11,4 + 11,6 + 11,6 + 10,1	+ 7,1 + 5,1 + 4,4 + 3,6 + 3,6 + 10,3 + 12,9 + 13,5 + 12,2 + 12,3 + 12,3 + 12,2 + 12,0 + 12,0 + 12,0 + 11,7 + 11,0 + 6,3	-1.25,6 -1.26,2 -44,2 -39,0 -39,7 -38,4 -38,6 -38,9 -39,2 -18,6 -35,6 -37,9 +8,2 -1.3,1 +55,8 -1.19,6 +3,8 -19,0 -45,3 -2.50,9 -2.51,3 -2.50,9 -2.51,3 -2.50,9 -2.51,3 -34,1 -36,7 +5,2 +47,2 -7,4 -26,0 -1.11,0 -2.13,5 -2.43,4 -2.17,6 -44,2 -38,7 -38,3 -38,6 -38,8 -18,4	44,5 46,3 45,5 47,3 48,2 46,9 45,2 47,5 46,2 41,2 44,9 50,2 47,1 47,9

Le 17, Mire Sud-42°,00. Mire Nord B+10°,81. Mire Nord C-15°,66 Mire Nord D-44°,40. d-4°,56.

Nadir 146°7'42",40.

96

Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERM	ONETRE	RÉFRACTION	LIEU du
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TION.	POLE.
	γ Pégase	h. m. s. o. 5.27,08 io. o.17,10 ii.41.18,18 ii.45.47,67 i3. 6.11,54	s. - 0,33 - 0,34 - 0,31 + 0,12	5. - 7,18 - 6,76 - 6,71 - 6,76	294.17.37,9 292.38. 4,3 295.20.47,2 334.27. 7,2 11.24. 4,2	731,4 732,5 732,6 732,5	+ 9,8 + 9,7 +11,1 +11,7	+ 5,6 + 7,4 +10,6 +10,7 +11,8	- 35,3 - 37,4 - 33,3 + 8,2 + 56,2	46,3 41,7 43,0 47,6 47,4
1 8	Soleil, bord 1, inf.,  Grande Ourse  Couronne  Serpent  Scorpion  Vénus, bord 1, centra  Hercule.  Ophiuchus  Dragon  Petite Ourse S.  Lyre  Piazzi, XIX, 42	16.20. 8,09 16.34.43,55 17. 7.42,76 17.27.52,54 17.53. 0,54 18.20.16,73 18.31.45,35	- 0,62 + 0,04 - 0,20 - 0,42 - 0,88 - 0,33 - 0,34 + 0,06 - 0,09 - 0,26	- 6,75 - 6,81 - 6,87 - 6,78 - 6,76 - 6,76 - 6,75 - 6,91	270. 5.29,6 329.59.27,9 307. 9.32,5 285.50.38,0 253.52.58,2 253.40. 7,7 294.30.25,9 292.36.59,6 331.26.34,6 6.31.15,9 318.35. 6,6 300.54.55,8	732,4 732,3 732,0 731,8 731,5 731,5 731,5 731,5 731,5	+11,7 +12,0 +12,0 +12,6 +12,7 +12,5 +12,4 +12,6 +12,4 +12,6	+12,5 +12,2 +14,0 +13,8 +14,0 +15,0 +15,1 +15,0 +14,4 +14,4 +13,4	-1.22,3 + 3,4 - 19,0 - 45,1 -2.50,5 -2.52,6 - 33,9 - 36,4 + 5,1 + 46,9 - 7,3 - 25,8	46,0 46,2 43,5 46,0 44,5 45,1 48,1 49,6 47,4
	Weisse, X1X, 387, Lalande 36835  ha Sagittaire  Anonyme  A Aigle  A Aigle  B. A. C. 6883  Piazzi, XIX, 378, Anonyme	19.16. 0,05 19.22.27,42 19.27.30,49 19.30.45,78 19.33. 2,82 19.43.23,00 19.47.51,99 19.55.18,49 19.55.34,51 20. 2.55,30	- 0,56 - 0,80 - 0,87 - 0,80 - 0,38 - 0,40 - 0,43 - 0,23 - 0,23 - 0,23	- 6,76 - 6,78 - 6,76	274. 9.56,7 258.37.14,6 254.46. 4,6 258. 1.35,8	731,7		+13,0	-1.10,7 -2.13,0 -2.42,8 -2.16,9 - 40,2 - 42,9 - 46,9 - 22,1 - 22,1	45,6 48,2 47,4
	Anonyme 6+24°36  \[ \alpha \text{ Capricorne} \]  \[ \alpha^2 \text{ Capricorne} \]  Anonyme.  Lalande 39448  B. A. C. 7113  \[ \alpha \text{ Cygne} \]  Anonyme.	20. 9.15,58 20. 9.39,58 20.18. 5,49 20.23.18,83 20.29. 7,93 20.36.14,31	- 0,23 - 0,67 - 0,67 - 0,87 - 0,87 - 0,86 - 0,02 - 0,80	- 6,69 - 6,64 - 6,49	254.51.49,6 254.36.18,7 255.13.44,4	*		+11,1	-1.33,0 -2.42,8 -2.45,2 -2.39,5 - 1,4 -2.12,7	10
	19 Capricorne Anonyme 26 Capricorne Lalande 41112 4 Poisson austral. Capricorne	20.46.15,04 20.51. 4,26 21. 0.38,48 21. 4.45,27 21. 8.46,40	- 0,76 - 0,80 - 0,79 - 0,84 - 1,03		261.28.37,7 258.54.57,7 259.10.21,8 256.48.54,5 247.12.46,7 262.29.36,0		+11,7	+ 10,8		1

Le 18, Mire Sud-40P,73. Mire Nord B+7P,24. Mire Nord C-16P,76. Mire Nord D-49P,26. Niveau-4P,20.

97
Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLL au Fil Méridien.	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE	Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉPRACTION	LIEU du POLE.
	Taylor 9943  6 Céphée. Lalande 42116 Anonyme. Lalande 42385 Lalande 42498 Anonyme. Anonyme Anonyme 3-24°33' Lalande 43011 Piazzi, XXI, 393. Lalande 43242	h. m. 4 21.18.57,14 21.26.37,97 21.30.18,41 21.33.20,47 21.35.53,55 21.37.35,29 21.40.56,98 21.44.46,93 21.50.40,65 21.50.46,13 21.56.28,01 21.56.28,01	ment.  - 0,79 + 0,43 - 0,87 - 0,87 - 0,87 - 0,86 - 0,86 - 0,86 - 0,86 - 0,83 - 0,83	pendule.  5.  - 6,62	259. 6.46,0 254.51.23,5 254.38.45,8 254.23. 5,0 260.53. 7,1 255.12.59,0 255.22. 9,6 257. 0.10,3 257. 0.10,3 257. 1.43,6	732,0	+11,1 +10,9	+ 8,5 + 8,4	-2.12,2 -2.44,3 -2.46,0 -2.48,9 -2. 1,5 -2.41,3 -2.39,8 -2.26,5 -2.26,6 -2.26,4	"
	Anonyme.  9 Verseau. Anonyme. Weisse, XXII, 354: Weisse, XXII, 451. Weisse, XXII, 452. Neptune.  a Pégase. Victoria Weisse, XXIII, 568. Anonyme. Weisse, XXIII, 756. Weisse, XXIII, 796.	22. 5.29,98 22. 8.51,12 22.13.53,02 22.16.43,41 22.21. 5,50 22.21.19,42 22.26.25,58 22.57.13,78 23.23.25,94 23.27,32,00 23.31.49,63 23.38.48,58	- 0,83 - 0,60 - 0,62 - 0,62 - 0,62 - 0,62 - 0,62 - 0,33 - 0,33 - 0,36 - 0,36 - 0,36 - 0,36 - 0,36	- 6,66	256.58.15,2 271.25.34,7 269.35.35,6 269.35.53,0 269.31.35,5 269.20. 2,5 294.20.36,2 288. 1. 6,5 291.46.49,6 291.43.20,7 291.48.33,9	732,2 732,2 732,2	+10,4 +10,5 +10,4	+ 8,4 + 7,1 + 7,0	-2.26,8 -1.19,4 -1.25,0 -1.25,0 -1.25,6 -35,1 -44,4 -38,7 -38,8 -38,7	42,0
	Tesse, XAIII, 945.  27 Poissons  30 Poissons  Lune, bord 1, inf., y Pégase  Lalande 630  Lalande 785  α Cassiopée  20 Baleine  Weisse, O, 858  Weisse, O, 861  26 Baleine  Weisse, O, 1056  α Petite Ourse S  Saturne, centre	23.50.55,87 23.54.12,59 0. 0.54,49 0. 5.27,42 0.20.47,77 0.25. 7,55 0.31.59,44 0.45.17,47 0.49.15,37 0.49.29,09 0.56. 2,77 0.59.27,37 1. 5.55,56 1. 6.33,98	- 0,54 - 0,57 - 0,54 - 0,33 - 0,84 - 0.88 + 0,12 - 0,50 - 0,49 - 0,49 - 0,49 - 0,49 - 0,44	- 6,84 - 6.41	275.33.55,4 273. 6.23,6 275.11. 7,1 294.17.35,8 256.17.32,3 253.47.39,5 335.38.44,7 275.59.30,0 279.35.19,5 280.30.39,7 280.30. 4,7 284. 1.50,8 270.16. 0,0		+ 9,5	+ 6,4 + 6,4 + 5,4	-1. 8,9 -1.15,3 -1. 9,8 - 35,2 -2.33,2 -2.56,2 + 9,5 -1. 3,3 - 59,9 - 58,0 - 58,1 - 51,4	44,2

98

Observations faites à la lunette méridienne en Octobre 1850.

JOURS	NOM ·	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO	NÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
,	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	T10N.	POLE.
25	γ Aigle	h. m. s. 19.39. 6,80 19.43.27,04 19.47.55,81 21. 8.50,20 21.13.53,40 21.19. 1,12 21.26.42,45 21.30.22,31 21.35.57,42	s 0,42 - 0,43 - 0,44 - 0,89 - 0,66 - 0,71 - 0,17 - 0,77	s. - 2,70 - 2,65 - 2,83	290.11.49,5 288.25.20,8 285.58.55,5 247.12.45,7 262.29.39,7 259. 6.43,4 349.50. 7,4 254.51.23,9	713,0 713,4	+ 7,7	+ 6,t + 6,o + 3,6 + 3,3 + 3,3	- 40,1 - 42,8 - 46,7 -4.37,2 -1.52,3 -2.11,1 + 24,6 -2.43,4	45,6 46,0 43,5 52,5
	Lalande 42498 Anonyme  Verseau Lalande 43242  Verseau Neptune  Andromède  Pégase	21.41. 1,00 21.50.50,07 21.58. 4,65 22. 3. 2,31 22. 8.55,10	- 0,68 - 0,75 - 0,50 - 0,57 - 0,57 - 0,59 - 0,31 - 0,39	- 2,70 - 2,43 - 2,56	255.25.51,2 278.54.17,1 257. 1.43,5 271.25.39,8 269.18. 6,8 308.12. 8,1 294.17.35,4	731,4 713,5 71+,0	+ 5,8 + 5,1 + 6,1	+ 3,4 + 2,7 + 1,3	-2.38,8 -1. 0,4 -2.25,6 -1.19,0 -1.25,6 - 18,2 - 35,0	46,7 44,5 43,6
26	γ Aigle	19.39, 7,58 19.43.27,68 19.47.56,55 0. 0.40,05 0. 5,32,40 0.32, 4,22 1. 6. 6,63	- 0,42 - 0,43 - 0,44 - 0,31 - 0,39 - 0,21	- 1,91 - 2,00 - 2,08 - 1,80 - 1,89 - 1,92	290.11.47,0 288.25.19,7 285.59. 0,7 308.12. 4,7 294.17.35,3 335.38.44,4 8.25.42,0	719.7 721,5 721,7 731,7	+ 7,5 + 7,1 + 6,8 + 6,5	+ 5,3 + 2,4 + 2,5 + 2,7	- 40,6 - 43,3 - 47,3 - 18,4 - 35,2 + 9,5 + 51,6	42,6 44,5 48,2 40,7 43,3 43,9 43,7
30	δ Petite Ourse S α Petite Ourse I	18-20-23,01 13. 6. 8,56			11.23.58,8	728,4	+ 7,5	+ 5,6	+ 57,1	47,7
31	Soleil, bord 1, inf  A Hercule  Ophiuchus  Petite Ourse S  Lyre  Aigle  Aigle  Saigle  Capricorne  A' Capricorne	1 0 11 01 0	- 0,62 - 0,39 - 0,40 - 0,21 - 0,26 - 0,42 - 0,43 - 0,44 - 0,62 - 0,62	+ 1,02 + 1,03 + 0,89 + 0,97 + 0,98 + 1,04 + 1,05 + 1,06	265.35.41,7 294.30.21,9 292.35.57,4 331.26.33,9 6.31.13,2 318.35. 8,3 290.11.49,3 288.25.23,2 285.25.25,5 266.59.24,9	728,4 728,4 728,4 728,4 728,4 728,8	+ 8,0 + 8,5 + 8,7 + 8,8 + 8,7 + 8,1	+ 7,0 + 7,6 + 7,9 + 7,8 + 7,6 + 7,6 + 6,3 + 6,3	-1.39,4 - 34,6 - 37,2 + 5,2 + 47.8 - 7,5 - 40,9 - 43,7 - 47,6 -1.34,4	41,5 43,6 49,8 49,5 49,5 44,9 48,6 46,9 44,3

Le 31, Mire Sud-40P,35. Mire Nord B+62,70. Mire Nord C-18P,54. Mire Nord D-50P,16. Niveau-5P,05.

99

## Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERM	DUÈTRE	RÉFRACTION	LIEU
ns.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	Inté- ricur.	Exté- rieur.	CTION.	POLE.
2	Soleil, bord t, sup.  8 Lion  y Grande Ourse  z Petite Ourse I	14.28. 8,78 11.41.27,30 11.45.56,93 13. 6.17,46	- 0,75 - 0,36 + 0,10	+ 2,05 + 2,03	265.29.23,7 295.20.45,2 334.27. 1,9 11.23.57,9	734,4 736,2 736,2	+10,0 + 9,4 +10,1	+10,2 + 7,9 +10,9	-1.39,5 - 33,8 + 8,3 + 56,6	43,6 47,5 47,3
3	Soleil, bord 1, inf Taylor 9943 3 Céphée Lalande 42116 Anonyme Lalande 42330 Lalande 42385	14.32. 5,20 21.19. 5,97 21.26.45,83 21.30.27,05 21.33.29,13 21.36. 2,28 21.37.43,91	- 0,76 - 0,86 + 0,44 - 0,95 - 0,95 - 0,95 - 0,95	+ 2,19	264.38.10,6 259. 6.43,3 349.50. 8,9 254.51.19,9 254.38.41,2 254.23. 8,7	736,0 735,3	+10,3 +10,3	+10,7 + 9,2	-1.43,0 -2.12,2 + 24,8 -2.44,9 -2.46,9 -2.49,4	53,2
	Lalande 42498 Anonyme δ-24°33' α Verseau Lalande 43242 Anonyme	21.41. 5,76 21.50.49,43 21.50.54,77 21.58. 9,45 22. 3. 7,27 22. 5.38,67 22.14. 1,72	- 0,82 - 0,93 - 0,93 - 0,55 - 0,90 - 0,90 - 0,69	+ 2,18	260.53. 3,7 255.22.14,7 278.54.15,0 257. 1.43,8 256.58.11,4 269.35.30,9			+ 8,8	-2. 1,9 -2.40,5 -1. 1,1 -2.27,2 -2.27,8 -1.25,6	44,3
	Weisse, XXII, 355. Weisse, XXII, 451. Neptune		- 0,68 - 0,69 - 0,69 - 0,37 - 0,39 - 0,39	+ 3,28	269.46.11,0 269.27.15,6 269.16.26,2 294.20.37,9 291.43.24,5 291.48.33,2 291.55.44,5	735,5 735,5 735,6	+ 9,6 + 9,7 + 9,5	+ 7,3 + 7,6 + 6,3 + 6,0	-1.25,1 -1.26,2 -1.26,8 - 35,2 - 39,0 - 39,0 - 38,8	43,1
	Weisse, XXIII, 1117  Andromede  y Pégase  Lalande 630  Lalande 785  C Cassiopée	23.54.21,08 0. 0.43,93 0. 5.36,32 0.20.56,51 0.25.16,13 0.32. 7,88	- 0,39 - 0,21 - 0,37 - 0,91 - 0,97 + 0,12	+ 2,24 + 2,09 + 2,16	291.45.52.4 308.12. 4,8 294.17.34,7 256.17.21,9 253.47.42,2	735,6	+ 9,5	+ 5,4	- 39,1 - 18,5 - 35,5 -2.34,5 -2.57,7	40,0 42,1
	20 Baleine Weisse, O, 858 Weisse, O, 861 Saturne, centre α Petite Ourse S	0.45.26,11 0.49.24,33 0.49.37,97 1. 2.20,01 1. 6. 2,37	- 0,56 - 0,54 - 0,54 - 0,50	2,10	277.59.32,2 279.35.15,8 283.36.16,2 8.25.49,6	735,2 735,2	+ 8,3 + 8,3	+ 5,3 + 5,3	-1. 3,8 -1. 0,3 - 52,4 + 52,0	48,7
	β Lion γ Grande Ourse α Petite Ourse I Solcil, bord 1, sup.	11.41.27,72 11.45.57,41 13. 6.16,06	- 0,36 + 0,10	+ 2,43	295.20.43,5 334.27. 3,2 11.23.55,9	734,0	+ 8,3	+ 4,6	- 34,1 + 8,4 + 56,7	41,8 49,2 45,7

100
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

JOURS.	NOM  DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU an Fil Méridien.		le la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigce pour le niveau.	BAROUÈTRE.	THERMO	MÉTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	δ Petite Onrse S  α Cygne  Anonyme  19 Capricorne  Lalande 40536	h. m. s. 18.20.19,65 20.36.22,87 20.40.21,64 20.46.24,14 20.50.53,54	s - 0,03 - 0,87 - 0,81 - 0,87	5. † 2,51	6.31.11,0 324.41, 6,2 258.47.54,1 261.28.33,4 258.56.45,2	732,0 732,3	+11,6 +12,3	+16,8 +13,8	+ 46,5 - 1,4 -2.11,4 -1.56,1 -2.10,2	 46,6 49,2
	26 Capricorne 4 Poisson austral 2 Céphée Taylor 9943 3 Céphée	21. 0.47,60 21. 8.55,32 21.15. 3,50 21.19. 6,38 21.26.45,97	- 0,86 - 1,11 + 0,23 - 0,86 + 0,44	+ 2,40	259. 6.40,5 349.50.10,7	732,6	+12,7	+13,9 +13,7 +13,7	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	54,4
	Lalande 42116 Lalande 42330 Lalande 42385 Lalande 42498 Anonyme	21.30.27,53 21.36. 2.69 21.37.44,51	- 0,95 - 0,95 - 0,95 - 0,82 - 0,93	T 2,09	254.28.17.7 260.52.59.9 255.22. 9.5	732,9	+12,8	+t3,8	-2.41,5 -2.45,0 -1.59,3 -2.36,9	3+,+
	Anonyme δ-24°33 α Verseau	21.50.55,35 21.58. 9,97 22. 3. 7,63 22. 5.39,07 22. 9. 0,24	- 0,93 - 0,55 - 0,90 - 0,90 - 0,66 - 0,69	+ 2,71	278.54.15,9 257. 1.39,0 256.58 11,0 271.25 38,8 269.35.30,7				- 59.7 -2.23.9 -2.24.3 -1.18.1 -1.23.7	46,6
	Weisse, XXII, 354. Weisse, XXII, 451. Weisse, XXII, 452. Neptune	22.21.14,60 22.21.28,46 22.25.53,24 22.57.22,73	- 0,69 - 0,69 - 0,69 - 0,69 - 0,37 - 0,39	+ 2,43	291.43.24,5	733,1 733,2 733,8	+12,4 +12,1 +11,9	+12,8 +12,5 +12,0	- 34,4 - 38,2	
	Weisse, XXIII, 796 Weisse, XXIII, 943 Weisse, XXIII, 100 Weisse, XXIII, 111	23.38.57,72 23.46. 7,06 23.49. 6,84 7 23.49.12,66 7 23.54.21,38	- 0,39 - 0,39		291.48.39,4 292. 5.39,6 291.55.41,5 291.45.58,2 308.12. 8,6			+10,7	- 38,1 - 37,8 - 38,1 - 38,3 - 18,1	
	α Andromède γ Pégase Lalande 630 20 Baleine Saturne, centre α Petite Ourse S	0. 5.36,70 0.20.56,69 0.45.26,50	- 0,37 - 0,91 - 0,56 - 0,50	+ 2,48	294.17.39,9 256.17.28,9 277.59.32,5 283.34.51,8	734,3 734,2 735,0 735,0	+11,4 +11,6 +11,6	+11,2 +11,5 +11,5	- 34,8 -2.31,0 -1. 2,3 - 51,3	48,0
	β Lion γ Grande Ourse α Petite Ourse I η Grande Ourse	11.45.57,45	+ 0,10	+ 2,48		736,3		+12,6	+ 8,3	51,5 45,3

Le 4, Mire Nord B+6p,99. Mire Nord D-50p,81.

101
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE	Inté-	OMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
			ment.	pendule.	pour ic mircua.		rieur.	rieur.		
		h. m. s.	s		0 1 11	253.111.	0	u	1 11	,
	Mercure, bord 2, ctre	13.51. 1,86	- 0,67		270.22.35,9			+13,4	-1.21,5	
	a Bouvier	14. 8.52,26	- 0,31	+ 2,68	299.54. 4,8	735,9	+12,4	+13,9	- 27,4	45,3
						6.00		t i		
5	Soleil, bord 1, inf	14.40 1,08	- 0,77		264. 0.56,4	735,7	+12,7	+14,7	-1.44,2	~ -
	B Petite Ourse :	14.51. 8,09	+ 0,62	+ 2,85	354.41.21,9	735,6	+12,8	+16,0	+ 30,0	50,5
	a Hercule	17. 7.52,04	- 0,37	+ 2,74	294.30.27,7	935,2	+14,0	+14,2	- 34,2	48,4
1	α Ophiuchus	17.28. 2,02	- 0,38 - 1,00	+ 2,90	292.36.59,7 252. 0.43,4	735,1	+14,0	+14,0	- 36,7 -3.12,0	47,1
	Vénus, bord 1, centr. y Dragon	17.53. 9,44	+ 0,06	+ 2,65	331.26.31,9	735,0	+13,8	+13,4	pus .	48,8
	Pelite Ourse S	18.20.19,08	7 0,00	T 2,03	6.31.11,4	734,7	+13,4	+13,1	+ 5,2	47,0
	a lyre	18.31.54,67	- 0,10	+ 2,81	318.35. 5,2	1041/	110,4	+13,0	- 7.4	48,2
	y Aigle	19.39.12,06	- 0,42	+ 2,73	240.11.48,9			1.0,0	- 40,6	45,1
	α Aigle	19.43.32,16	- 0,45	+ 2,62	288.25.24,0	734,7	+12,1	+10,7	- 43,3	49,3
	ß Aigle.	19.48. 1,05	- 0,47	+ 2,55	285.58.5 3,1	, .,,		' "	- 47.3	47,2
	Piazzi, XIX, 378	19.55.43,55	- 0,25		304.27.49,8			+10,4	- 22,3	1
	Anonyme	20. 4. 9,97	- 0,25		304.33. 6,1				- 22,2	
	α Capricorne	20. 9.24,88	- 0,72	+ 2,84						
	2 Capricorne	20. 9.48,76	- 0,72	+ 2,78	265.57.12,8				-1.33,9	50,0
	Lalande 39448	20.23.28,21	- 0,95		254.36.16,4	734,5	+11,3	+ 9,8	-2.46,6	
	Lalande 39707	20.28.52,65	- 0,95		255. 5. 5,7	D / F		. 0	-2.41,9	_
1	α Cygne	20.36.23,23	- 0,03	+ 2,91	324.41. 9,0	734,5	+11,1	+ 9,8	- 1,4	52,0
	19 Capricorne	20.46.24,44	- 0,81		261.28.36.2			+10,1	-1.58,0	
	Lalande 40536	20.50.53,80	- 0,87		258.56.47,2	-21 -		+10,2	-2.12,3	
	26 Capricorne 4 Poisson austral	21. 0.47,72	- 0,86 - 1,11		259.10.19,6 247.12.44,6	734,7	+11,0	710,2	-2.11,2 $-4.38,5$	
	a Cépliée	21.15. 3,68	+ 0,23	+ 2,62	341.53. 9,5				+ 15,9	50,9
	Taylor 0943	21.19. 6,73	- <b>o</b> ,86	T 2,02	259. 6.39,2			0,01+	-2.11,7	00,9
	B Céphée	21.26.46,03	1 0,44	+ 2,51	349.50.11,2			+ 9,9	+ 24,7	55,2
	Lalande 42116	21.30.27,65	- 0,95		254.51.18,7			3,3	-2.44,3	1
	Anonyme	21.33 29,85	- 0,95		254.38.38,7				-2.42,5	
	Lalande 42330	21.36. 3,05	- 0,95							
	Lalande 42385	21.37.44,59	- 0,95		254.28.21,9				-2.47,9	
	Lalande 42498	21.41. 6,42	- 0,82		260.53. 3,5				-2. 1,4	
	Anonyme 8-24°36'	21.50.50,07	- 0,93			0.1.0			2 2	
	Anonyme	21.50.55,55	- 0,93		255.25.46,5	734,6	+10,5	+ 9,4	-2.39,3	
	Lalande 43011	21.56.37,31	- 0,90		257. 0. 9,0				-2.26,5	
	Piazzi, XXI, 393.	21.58.59,01	- 0,90		257. 0. 5,1				-2.26,6 -2.26,4	
	Lalande 43242	22. 3. 8,01	- 0,90		257. t.36,4 256.58.t5,9				-2.20,4 $-2.26,9$	1
}	Anonyme	22. 5.39,40	- 0,90 - 0,66		271.25.40,4				-2.20,9 -1.19,5	
	O Verseau	22.14. 2,48	- 0,60		269.35,30,3				-1.19,5 -1.25,2	1
1	Weisse, XXII, 354		- 0,69		269.35.50,5				-1.25,2	

Le 5, Mire Sud-41P,11. Mire Nord B+7P,11. Mire Nord C-16P,85. Mire Nord D-49P,81. Niveau-4P,16.

102
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

Jouns.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION /	MOYEANE DES VERNIERS	BARONÈTRE	THERMO	DHÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du POLE.
-		- Increase	ment.	pendule.	pour le niveau.	-	ricur.	rieur.		T ODD.
	Weisse, XXII, 451 Weisse, XXII, 452 Neptune  a Poisson austral a Pégase Victoria Anonyme	h. m. s. 22.21.14,80 22.21.28,82 22.25.52,00 22.49.27,20 22.57.23,00 23.25.17,44 23.31.59,10	- 0,69 - 0,69 - 0,69 - 1,06 - 0,37 - 0,47 - 0,39	+ 2,56 + 2,71	269.31.36.4 269.16.11,5 294.20.38,7 285.40.59,3 291.43.21,9	734,5 734,5 734,4	+10,5 +10,6 +10,6	+ 8,4 + 8,6 + 8,6	-1.25,5 -1.26,3 - 35,0 - 48,1 - 38,7	44,t
	Weisse, XXIII, 796. Weisse, XXIII, 943. Weisse, XXIII, 1003 Weisse, XXIII, 1107 Weisse, XXIII, 1117 Andromède	23.38.57,92 23.46. 7,18 23.49. 7,40 23.49.12,94	- 0,39 - 0,39 - 0,39 - 0,39 - 0,39 - 0,21	+ 2,93	291.48.36,4 292. 5.43,6 291.55.47,4 291.45.58.5 308.12. 8.8				- 38,6 - 38,3 - 38,6 - 38,9 - 18,4	43,8
	γ Pégase. Lalande 630. Lalande 785. α Cassiopée.	0. 5.36,94 0.20.57,25 0.25.17,09 0.32. 8,60 0.45.26,93	- 0,37 - 0,91 - 0,97 + 0,12 - 0,56	† 2,72 † 2,72	294.17.38,5 256.17.28,5 253.47.36,3 335.38.54,0 277.59.27,2	734,4	+10,6 + 9,8	+ 5,9 + 5,4	- 35,4 -2.35,2 -2.57,2 + 9,6 -1. 3,4	46,0 51,2
	Anonyme	0.48.46,61 0.56.12,13 0.58.41,40 1. 1.50,84 1. 6. 0,64 1.34.59,12	- 0,54 - 0,53 - 0,53 - 0,50	4	279.32. 2,4 280.30.39,2 280.35.37,5 283.33.30,2 8.25.53,8 290.16.19,4	734,0	+ 9,9	+ 6,6	-1. 0,2 - 58,1 - 58,1 - 52,2 + 51,7 - 41,3	51,4
	β Lion γ Grande Ourse α Petite Ourse I	1.43.49,00 11.41.28,36 11.45.57,89 13. 6.19,06	- 0,42 - 0,36 + 0,10	+ 3,02 + 2,89	290. 4.30,2 295.20.46,3 334.27. 1,8 11.23.57,7	734,0 734,5 734,2	+ 9,9 + 8,5 + 9,6	+ 4,9 + 2,4 + 2,6 + 7,6	- 41,6 - 34,4 + 8,5 + 57,2	44,7 48,5 48,7
6	Soleil, bord 1, sup.  B Petite Ourse  Hercule  Ophiuchus Vénus, bord 1, centr.		- 0,77 + 0,62 - 0,37 - 0,38 - 1,00	+ 3,12 + 3,11 + 3,11	264.15.23,2 354.41.22,2 294.30.25,8 292.36.59,7 252. 0.10,7	733,5 733,0 733,2	+11,0 +11,1 +11,1	+10,5 +10,5 + 9,8 + 9,8 + 9,9	-1.44,4 + 30,0 - 34,5 - 37,2 -3.14,5	51,2 46,4 46,7
	γ Dragon	17.53. 9,78 18.20.19,94 18.31.54,87 19.39.12,28 19.43.32,58	+ 0,06 - 0,10 - 0,42 - 0,45	+ 3,01 + 3,03 + 2,97 + 3,05	331.26.32,2 6.31.11,9 318.35. 4,0 290.11.51,5 288.25.24,5	733,3 733,4 733,7	+11,2 +11,2 +10,6	+ 9,9 + 9,5 + 9,5 + 9,0	+ 5,2 + 47,8 - 7,5 - 40,8 - 43,5	49,3 49,1 47,1 47,6 49,7
	B. A. C. 6883 Piazzi, XIX, 378	19.48. 1,49 19.55.27,93 19.55.44,11	- 0,47 - 0,25 - 0,25	+ 3,00	285.58.59,3 304.19.48,2	733,8	+10,6	+ 8,9	-, 47,5 - 22,5	47,2

103
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

Jours	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYEXNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERW	DMĖTRE	RÉFRACTION	LIEL du
ŝ.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	ÈTRE.	laté- rieur.	Exté- ricur.	TION.	POLE.
	Lalande 39448 Lalande 39471 Lalande 39707  α Cygne  19 Capricorne  21 Capricorne  21 Capricorne  4 Poisson austral  α Céphée  36 b Capricorne  3 Céphée  Lalande 43011	10.23.28,15 20.24. 1,64 20.28.52,85 20.36.23,49 20.46.24,48 20.52.30,46 20.52.30,46 20.54.59,01 21. 1.30.70 21. 8.55,68 21.15. 3,94 21.20.15,32 21.26.46,47 21.56.37,37	s 0,95 - 0,95 - 0,95 - 0,81 - 0,81 - 0,81 - 0,69 - 1,11 + 0,23 - 0,88 + 0,44 - 0,90	+ 3,18 + 2,92 + 3,01.	254.36.13,3 255. 5.10,3 324.41. 9,8 261.28.38,7 261.51. 6,0 261.54.25,2 267.58.52,0 247.12.44,4 257.30.52,7	733,8	+ 9,8	+ 8,2 + 8,2 + 7,2 + 7,2 + 7,0 + 6,4 + 5,2		52,8
	Piazzi, XXI, 393 Lalande 43242 Anonyme Lalande 43483 Weisse, XXII, 354 Weisse, XXII, 451 Weisse, XXII, 452	21.58.59,05 22. 3. 7,99 22. 5.39,62 22. 9.58,63 22.14. 2,30 22.16.52,98 22.21.14,98 22.21.29,06	- 0,90 - 0,90 - 0,90 - 0,69 - 0,69 - 0,69 - 0,69		257. 0.12,9 257. 1.43,8 256.58.17,5 256.55.38,1 269.35.35,7	734,2	+ 7,9	+ 5,5	-2.28,7 -2.28,5 -2.28,9 -2.29,2 -1.26,4	
	Neptune. Victoria. Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme. Anonyme. Weisse, XXIII, 993. 27 Poissons. 30 Poissons.	23.40. 4,85 23.43.57,43	- 0,69 - 0,47 - 0,59 - 0,59 - 0,59 - 0,59 - 0,59 - 0,63 - 0,63	+ 3,20	269.16. 747 285.35.30,2 276. 9.47,4 275.48.37,0 275.35. 1,4 275.38.10,8 275.37.23,7 275.33.55,0 273. 6.29,0 308.12.12,3	734,3	+ 8,5	+ 5,5 + 3,6	-1.27,2 - 49,1 -1. 8,4 -1. 9,2 -1. 9,8 -1. 9,7 -1. 9,7 -1. 9,9 -1.15,3 - 18,6	/- 0
	y Pégase Lalande 630 Lalande 785	0. 5.37,18 0.20.57,35 0.25.17,11	- 0,37 - 0,91 - 0,97	+ 2,97	294.17.42,0 256.17.25,3 253.47.40,4	734,3	+ 6,7	+ 3,2	- 35,8 -2.36,2 -2.58,9	49,0
	α Cassiopée 20 Baleine Anonyme 26 Baleine Anonyme Saturne, centre	0.23.17,11 0.32. 9,08 0.45.27,11 0.48.46,77 0.56.12,59 0.58.41,75	+ 0,12 - 0,56 - 0,54 - 0,53 - 0,53 - 0,50	+ 3,39	233.47,40,4 335.38.52,8 277.59.29,6 279.32. 1,7 280.30.43,2 280.35.37,0 283.32. 3,0	734,3	+ 6,3	+ 3,2	+ 9.7 -1. 4,2 -1. 0,9 - 58,9 - 53,0	49.9
	α Petite Ourse S Weisse, I, 640	ı. 6. 4,84			8.25.50,2	734,4	+ 7,0	+ 2,6	$\begin{array}{c c} - & 55,5 \\ + & 52,5 \\ - & 41,8 \end{array}$	48,7

Le 6, Mire Sud-419,52. Mire Nord B+69,89. Mire Nord C-179,86. Mire Nord D-500,59. Niveau-30,85.

104
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENVE DES VERNIERS	BAROMÈTRE		OMÈTRE	RÉFRACTION	LIEG
S.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	TON.	POLE.
	Uranus  ß Lion  y Grande Ourse  a Petite Ourse I	h. m. s 1.43.40,52 11.41.28,82 11.45.58,35 13. 6.18,06	- 0,42 - 0,36 + 0,10	+ 3,46 + 3,32	290. 3.40,0 295.20.30,4 334.27. 2,9	734,3 735,0	+ 7,2 + 7,5	+ 2,0 + 1,6	-42,1 $-34,5$ $+8,5$	48,9 49,9
	η Grande Ourse Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup> α Bouvier	13.41.39,91 14. 2.58,18 14. 8.52,94	+ 0,04 - 0,69 - 0,31	+ 3,34	329.59.21,0 269. 5.59,6	734,9 734,7	+ 8,8	+ 7,1 + 7,3	+ 3,8	45,7
7	Soleil, bord 1, inf    A Hercule  Ophiuchus  Vénus, bord 1, centr.	14.48. 0,12 17. 7.52,74 17.28. 2,68 17.42.31,47	- 0,78 - 0,37 - 0,38 - 1,00	+ 3,45 + 3,58	263.25. 1,4 294.30.22,2 292.36.57,9 252. 0.12,9	734,5 733,6 733,6	+ 9,6 +10,1 +10,3	+ 8,0 + 9,6 + 9,9	-1.49,3 - 34,6 - 37,2 -3.14,7	42,8 45,4
	y Dragon	17.53.10,18 18.20.18,87 18.32.55,11 19.39.12,78	+ 0,06	+ 3,43 + 3,29 + 3,48	331.26.31,7 6.31.11,9 318.35. 3,6 290.11.48,7	733,6 733,6	†10,3 †10,3	† 9.9 +10,1 +10,2	+ 5,2 + 47,7 - 7,4 - 40,8	49,1 49 2 47,0 44,9
	α Aigle β Aigle B. A. C. 6883 Piazzi, XIX, 378	19.43.33,00 19.48. 1,93 19.55.28,33 19.55.44,35	- 0,45 - 0,47 - 0,25 - 0,25	+ 3,49 + 3,45	288.25.22,4 285.59. 0,4 304.19.40,7	733,4	+10,1	+ 9,3	- 43,5 - 47,4 - 22,5	47.7 48,5
	Anonyme  \[ \alpha^{\text{T}} \text{ Capricorne} \]  \[ \alpha^{\text{2}} \text{ Capricorne} \]  Lalande 39448	20. 4.10,53	- 0,25 - 0,72 - 0,72 - 0,95	+ 3,43 + 3,50	304.33. 0,5 266.59.24,9 254.36 17,7	733,6	+10,7	† 9,2   † 9,1	- 22,3 -1.33,9 -2.46,8	45,1
	Lalande 39471 Lalande 39707 Weisse, XXI, 752. Anonyme	20.24. 2,23 20.28.53,13 21.31.29,91	- 0,95 - 0,95 - 0,69 - 0,76		255. 5.10,7 268.42.30,2 264.31.34.9	733,7733,8	+10,7	+ 9,0	-2.42,3 -1.28,8 -1.44,9	
	Lalande 42502 Lalande 42554 Lalande 42699 B. A. C. 7652 Lalande 43011 Piazzi, XXI, 393 Piazzi, XXI, 419	21.41.20,45 21.42.58,81 21.47.22,09 21.50.57,33 21.56.37,61 21.58.59,31 22. 2.48,62	- 1,01 - 1,01 - 0,91 - 0,90 - 0,90 - 0,88 - 0,88		251.53.20,3 256.12.51,7 256.23.15,4 257. 0.17,3 257. 0.10,8 258. 0.12,5 258. 0.11,3				-3.19,0 -2.34,0 -2.33,2 -2.28,4 -2.26,5 -2.21,2 -2.20,2	
	Lalande 43483 Weisse, XXII, 355 Weisse, XXII, 449 Neptune	22.16.53,84 22.21.12,92 22.25.50,22 22.57.23,62	- 0,69 - 0,69 - 0,37		256.55.39,1 269.46.13,8 469.15.23,8 269.16. 2,8 294.20.39,0 285.30. 3,6	733,6 733,6 733,6	+ 7,5	1 + 4.4	$\begin{vmatrix} -2.29,2 \\ -1.25,8 \\ -1.27,4 \\ -1.27,4 \\ -35,5 \\ -49,2 \end{vmatrix}$	43.9

Le 7, Mire Sud 419,47. Mire Nord B+6',98. Mire Nord C-179,65. Mire Nord D-509,49. Niveau-39,83.

105
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

DES ASTRES.	Fil Méridien.		le la pendule.	MOVENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	Inté- rieur.	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU   da POLE.
Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme	h. m. 4 23.31.13,05 23.35.59,89 23.40. 4,97 23.43.57,29	- 0,59 - 0,59 - 0,59 - 0,59	5.	276. 9.47,5 275.48.33,5 275.35. 0,6 275.36.35,8	Tuni.	0	o	-1. 8,1 -1. 9,0 -1. 9,6 -1. 9,5	***
Weisse, XXIII, 993. 27 Poissons	23.48.39.87 23.51. 6,31 23.54.22,57 0. 0.45,13 0. 5.37,38 0.10.47,52	- 0,59 - 0,59 - 0,63 - 0,21 - 0,37 - 0,88	+ 3,47 + 3,47	275.37.25,3 275.33.51,3 273. 6.20,2 308.12.10,9 294.17.34,7 257.59.52,6	733,7	+ 6,7	+ 3,9	-1. 9,5 -1. 9,6 -1.16,1 - 18,6 - 35,6 -2.22,1	45,6 42,3
Anonyme.  Lalande 785  Cassiopée  Anonyme.  Baleine  Anonyme.	0.19. 7,41 0.25.17,50 0.32. 9,40 0.48.47,19 0.56.12,87 0.58.42,02	- 1,03 - 0,97 + 0,12 - 0,54 - 0,53 - 0,53	+ 3,73	250.44.54,2 253.47.37,2 335.38.48,9 279.32. 0,0 280.30.40,0 280.35.34,5			+ 2,7	-3.3 <sub>7</sub> ,1 -2.58,9 + 9.7 -1. 0,9 - 58,9 - 58,9	47,5
Relite Ourse S Weisse, I, 640 Uranus, centre Weisse, I, 830 Weisse, I, 897	1. 6. 2,54 1.34.59,68 1.43.31,78 1.46. 8,92 1.50.37,24	- 0,42 - 0,42 - 0,42 - 0,42	+ 3,44	283.30.47,8 8.25.52,5 290.16.17,2 290. 2.51,3 289.49.41,3 290. 0.10,9	733, <sub>7</sub> 733, <sub>7</sub>	+ 6,8 + 7,0	+ 2,6 + 1,0	- 51,8 + 52,4 - 41,9 - 42,2 - 42,6 - 43,3	50,5
	13. 6.19,86			11.23.54,3	736,8	+ 9,3	+ 9,2	+ 57,0	46,2
α Hercule α Ophiuchus	14.56. 2,78 17. 7.53,61 17.28. 3,46	- 0,78 - 0,37 - 0,38	+ 4,33 + 4,37	263.22.26,6 292.36.54,2	736, <sub>2</sub> 735, <sub>5</sub>	+10,2	+ 9,9	-1.48,9 - 37,1 -3.14.8	41,8
y Dragon	17.53.10,76 18.20.18,36 18.31.56,23	+ 0,06	+ 4,05	331.26.30,7 6.31.14,7 318.35. 6,7	735,5	+10,7	+11,2 +11,0	+ 5,2 + 47,7 - 7,4	48,6 52,4 50,5
Piazzi, XIX, 378 Anonyme	19.55.45,25 20. 4.11,31 20. 9.26,36 20. 9.50,08	- 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,72 - 0,72 - 0,95	+ 4,38 + 4,15	304.19.41,5		+10,3	+10,1	- 22,5	
	Weisse, XXIII, 736. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. 30 Poissons. Andromède. Pégase. Lalande 291. Piazzi, 0, 57. Anonyme. Lalande 785. Cassiopée Anonyme. Baleine. Anonyme. Saturne, centre. Petite Ourse S. Weisse, I, 640. Uranus, centre. Weisse, I, 830. Weisse, I, 897. Bélier  Ophiuchus. Venus, bord I, sup. Hercule. Ophiuchus. Venus, bord I, centr. Pragon. Petite Ourse S. Lyre. B. A. C. 6883. Piazzi, XIX, 378. Anonyme. Capricorne. Capricorne. Lalande 39448.	Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. Andromède. Andromède. Andromède. Andromède. Andromède. Anonyme. Weisse, XXIII, 642.       23.31.13,05       - 0,59         Weisse, XXIII, 736.       23.35.59,89       - 0,59         Anonyme.       23.40. 4,97       - 0,59         Anonyme ê-4°19'       23.43.57,29       - 0,59         Anonyme ê-4°19'       23.48.39,87       - 0,59         Yeisse, XXIII, 993.       23.48.39,87       - 0,59         27 Poissons       23.51.6,31       - 0,59         30 Poissons       23.54.22,57       - 0,63         α Andromède       0. 0.45,13       - 0,21         γ Pégase       0. 537,38       - 0,37         Lalande 291       0.10.47,52       - 0,88         Piazzi, O, 57       0.10.47,52       - 0,88         Piazzi, O, 57       0.10.47,52       - 0,88         0.15.48,45       - 1,10         0.19,741       - 1,03         Lalande 785       0.25.17,50       - 0,97         α Cassiopée       0.32.9,40       + 0,12         Anonyme       0.56.12,87       - 0,53         Anonyme       1.1.22,46       - 0,55         A Petite Ourse S       1.1.22,46       - 0,42         Weisse, I, 830       1.46.8,92       - 0,42         Weisse, I, 897       1.50.37,24       - 0,42 </td <td>Weisse, XXIII, 642.       23.31.13,05       - 0,59         Weisse, XXIII, 736.       23.40.4,97       - 0,59         Anonyme.       23.45.59,89       - 0,59         Anonyme δ-4°19'.       23.43.57,29       - 0,59         Weisse, XXIII, 993.       23.48.39,87       - 0,59         27 Poissons       23.51.6,31       - 0,59         30 Poissons       23.54.22,57       - 0,63         α Andromède.       0.045,13       - 0,21         γ Pégase.       0.537,38       - 0,37         Lalande 201.       0.10.47,52       - 0,88         Piazzi, 0,57.       0.19,741       - 1,03         Lalande 785.       0.25.17,50       - 0,97         α Cassiopée       0.32.9,40       - 0,12         Anonyme.       0.48.47,19       - 0,54         Anonyme.       0.56.12,87       - 0,53         Anonyme.       0.56.12,87       - 0,53         Anonyme.       1.122,46       - 0,50         Weisse, I, 640.       1.34.59,68       - 0,42         Uranus, centre.       1.46.8,92       - 0,42         Weisse, I, 897.       1.50.37,24       - 0,42         Weisse, I, 897.       1.728.3,61       - 0,37       + 4,33</td> <td>Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme</td> <td>Weisse, XXIII, 642. 23.31.13,05</td> <td>Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme</td> <td>Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme</td> <td>Weisse, XXIII, 642. 23.31.13.05</td>	Weisse, XXIII, 642.       23.31.13,05       - 0,59         Weisse, XXIII, 736.       23.40.4,97       - 0,59         Anonyme.       23.45.59,89       - 0,59         Anonyme δ-4°19'.       23.43.57,29       - 0,59         Weisse, XXIII, 993.       23.48.39,87       - 0,59         27 Poissons       23.51.6,31       - 0,59         30 Poissons       23.54.22,57       - 0,63         α Andromède.       0.045,13       - 0,21         γ Pégase.       0.537,38       - 0,37         Lalande 201.       0.10.47,52       - 0,88         Piazzi, 0,57.       0.19,741       - 1,03         Lalande 785.       0.25.17,50       - 0,97         α Cassiopée       0.32.9,40       - 0,12         Anonyme.       0.48.47,19       - 0,54         Anonyme.       0.56.12,87       - 0,53         Anonyme.       0.56.12,87       - 0,53         Anonyme.       1.122,46       - 0,50         Weisse, I, 640.       1.34.59,68       - 0,42         Uranus, centre.       1.46.8,92       - 0,42         Weisse, I, 897.       1.50.37,24       - 0,42         Weisse, I, 897.       1.728.3,61       - 0,37       + 4,33	Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme	Weisse, XXIII, 642. 23.31.13,05	Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme	Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736. Anonyme	Weisse, XXIII, 642. 23.31.13.05	

106
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

JOURS	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	DVĖTRE	RÉFRACTION	LIEU
NS.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	corrigée pour le niveau.	ÈTRE.	laté - rieur.	Exté- rieur.	Tion.	POLE.
	B. A. C. 7113 2 Cygne 21 Capricorne Piazzi, XX, 428 Verseau Piazzi, XXI, 27 Lalande 41363	21.11.11,57	5. - 0,94 - 0,03 - 0,81 - 0,69 - 0,89 - 0,99	s. + 4,24	255.13.41,9 324.41. 7,9 261.51. 3,3 261.54.26,7 267.58.55,0 257.32.19,0 253. 0.50,1	IN Da.	0	+ 9,2 + 9,1	-2.41,3 - 1,4 -1.56,5 -1.30,8 -2.23,4 -3. 4,6	50,2
	a Céphée	21.20.16,61 21.31.30,84 21.35.55,90	+ 0,23 - 0,89 - 0,69 - 0,76	+ 4,05	257.30.54,0 268.42.29,7 264.31.39,2	736,0	+ 9,6	+ 7,6	-2.24,0 -1.28,7 -1.44,8	
	Lalande 42502 Lalande 42554 I.alande 42699 B. A. C. 7652 Lalande 43011 Piazzi, XXI, 393 Piazzi, XXI, 419 41 Verseau Lalande 43483 Weisse, XXII, 355. Weisse, XXII, 449 Neptune  2 Pégase Victoria	21.42.59,59 21.47-22,79 21.50.58,27 21.56.38,39 21.59. 0,25 22. 2.49,55 22. 6.7,53 22. 9.59,89 22.16.54,58 22.21.13,76 22.25.49,22 22.57,24,38 23.26.59,56	- 1,01 - 1,01 - 0,91 - 0,90 - 0,90 - 0,88 - 0,88 - 0,69 - 0,69 - 0,69 - 0,69 - 0,47	+ 4,14	251.53.16,5 256.12.52,0 256.23.13,9 257. 0.11,5 258. 0.10,7 258. 9.11,2 256.55.38,5 269.46.18,2 269.15.21,7 269.15.51,1 294.20.40,6 285.19.50,9	736,2 736,1 736,1	+ 8,5 + 8,3 + 8,0	+ 6,2 + 5,1 + 5,1	-3.18,7 -2.34,3 -2.33,0 -2.28,2 -2.28,3 -2.21,0 -2.20,0 -1.25,6 -1.27,3 -1.27,3 -35,5 -49,5	45,5
	Weisse, XXIII, 642. Weisse, XXIII, 736 Anonyme. Anonyme. Anonyme δ-4°19'.	23.36. 0,71 23.40. 5,97 23.43.57,97 23.43.58,53	- 0,59 - 0,59 - 0,59 - 0,59		276. 9.45,3 275.48.29,5 275.35. 0,6 275.36.38,4				-1. 8,2 -1. 8,7 -1. 9,2 -1. 9,2	
	Weisse, XXIII, 993 27 Poissons 30 Poissons	23.51. 6.96 23.54.23,45 0. 0.45,91 0. 5.38,38 0.10.48,59 0.15.49,52	- 0,59 - 0,59 - 0,64 - 0,21 - 0,37 - 0,88 - 1,10 - 1,03	+ 4,27 + 4,19	275.37.24,2 275.33.52,5 273. 6.20,9 308.12. 8,2 294.17.38,5 257.59.55,3 248. 8.10,7 250.44.51,2	736,4	+ 7,5	+ 5,2	-1. 9,1 -1. 9,3 -1.15,7 - 18,5 - 35,6 -2.22,1 -4.23,6 -3.36,8	42,8 45,7
	Lalande 785	0.25.18,29 0.32. 9,96 0.42.59,99	- 0,97 + 0,12 - 0,54	+ 4,31	253.47.41,2 253.47.41,2 279.37.38,2 279.31.54,4			+ 4,1	-2.58,6	

Le 9, Mire Sud-409,70. Mire Nord B+61,88. Mire Nord C-189,49. Mire Nord D-499,87. Niveau-39,61.

107
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO		RÉFRACTION	LIEU du
j.	DES ASTRES.	Fil Méridien.	l'instru- ment.	la pendule.	pour le niveau.	TRE.	Inté- ricur.	Exté- rieur.	Пох.	POLE.
	26 Baleine Anonyme Saturne, centre    Petite Ourse S	h. m. s. 0.56.13,53 0.58.42,70 1. 0.35,38 1. 6. 4,84	s. - 0,53 - 0,53 - 0,50	\$	280.30.43,1 280.35.34,4 283.28.19,7 8.25.55,0	736,6	+ 6,3	+ 3,7	- 58,8 - 58,8 - 53,1 + 52,4	52,3
	Weisse, I, 640 Uranus, centre Weisse, I, 830 Weisse, I, 897 & Bélier	1.35. 0,74 1.43.15,50 1.46. 9,62 1.50.37,96 1.58.51,45	$ \begin{array}{r} -0,42 \\ -0,42 \\ -0,42 \\ -0,42 \\ -0,27 \end{array} $	+ 4,20	290.16.19,7 290. 1.15,5 289.49.45,2 290. 0.13,6 302.41.28,5	736,6	+ 7,3	+ 4,8	$ \begin{array}{r} - 41,5 \\ - 41,9 \\ - 42,2 \\ - 41,9 \\ - 24,9 \end{array} $	47,3
	3 Lion	11.41.30,02	- 0,36 + 0,10	+ 4,58 + 4,39	295.20.44,2	736,5	+ 7,3	+ 2,9	- 34,4	43,4
	α Petite Ourse I α Vierge	13. 6.17,75	- 0,69	+ 4,43	11.23.52,8 269.34.30,4	736,5 736,6	+ 8,2 + 8,6	+ 9,0	+ 57,1 -1.25,6	45,2 44,1
10	Soleil, bord 1, inf  A Hercule  Ophiuchus	15. 0. 5,08 17. 7.53,96 17.28. 3,80	- 0,79 - 0,37 - 0,38	+ 4,69	262.33. 0,4 292.36.56,0	736,4	+ 9,9	+ 8,8	-1.53,4 - 3 <sub>7</sub> ,1	43,7
	Vénus, bord 1, centr.  γ Dragon  γ Petite Ourse S  α Lyre		- 1,00 + 0,06	+ 4,63	252. 3. 0,8 331.26.31,7 6.31.12,4 318.35. 4,3	735,6 735,5	†10,3 †10,3	+11,4 +11,0	-3.13,5 + 5,2 + 47,7	49,8 50,3
	γ Aigle α Aigle β Aigle	19.39.13,88 19.43.34,00 19.48. 3,03	- 0,10 - 0,42 - 0,45 - 0,47	+ 4,74 + 4,63 + 4,54 + 4,60	288.25.22,9 285.58. 1,1	735,3	+10, <b>v</b>	+11,0 +10,0 +10,0	- 7,4 - 43,5 - 47,4	48,3 48,5 49,4
	B. A. C. 6883 Piazzi, XIX, 378 Anonyme \( \alpha^{\text{T}} \) Capricorne	20. 4.11,65	- 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,72	+ 4,62	304.19.44,0 304.33. 3,1			+ 9,8	- 22,5 - 22,3	
	α <sup>2</sup> Capricorne β <sup>2</sup> Capricorne Lune, bord 1, inf B. A. C. 7113	20. 9.50,44 20.12.41,64 20.24.54,35	- 0,72 - 0,76 - 0,84	+ 4,53	266.57. 9,1 264.42.34,1 260. 6.20,7	735,2	+ 9,8	+ 9,9	-1.34,0 -1.42,9 -2. 5,8	46,4
	α Cygne γ Capricorne Piazzi, XX, 428	20.36.25,01	- 0,94 - 0,03 - 0,81 - 0,81	+ 4,80	255.13.45,0 324.41. 6,4 261.51.10,5 261.54.30,1	735,2 735,2	+ 9,8 + 9,8	+10,1 + 8,9	$\begin{vmatrix} -2.40,9 \\ -1.4 \\ -1.56,6 \\ -1.56,5 \end{vmatrix}$	49,7
	Verseau Piazzi, XXI, 27 Lalande 41363	21. 1.32,36 21. 6.34,41	- 0,69 - 0,89 - 0,99		267.58.54,6 257.32.20,3 253. 0.54,6				-1.30,8 -2.23,4 -3. 4,4	
	α Céphée 36 b Capricorne β Céphée	21.15. 5,54	+ 0,23 - 0,89 + 0,44	+ 4,69	341.53.11,3 257.30.54,0 349.50.11,2	735,2	+ 9,5	+ 7,5	+ 16,0 -2.23,9 + 24,9	52,7 55,1
	Weisse, XXI, 752.			1, 1,51	268.42.31,0				-1.28,7	

108
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

Jours.	NOM	PASSAGE CONCLU au Fil Méridien.	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BUROUÈTRE	THERMO	Exté-	néfraction	LIEU du POLE.
1-			ment.	pendule.	*	-	rieur.	rieur.	-	
	Anonyme	11.35.56,50	- 0,76	۶.	264.31.35,6	ъна.	0	O	-1.44.7	"
	Lalande 42502	21.41.21,75	- 1,01		251.53.23,5				-3.18,7	
	Lalande 42699	21.47.23,27	- 0,01		256.12.54,8				-2.34,3	
	B. A. C. 7652	21.50.58,81	- 0,91		256.23.14,0				-2.32,9	
	Lalande 43011	21.56.39,07	- 0,90		257. 0.14,5			+ 66	-2.28,2	
H	Piazzi, XXI, 393	21.59. 0,89	- 0,90		257. 0. 9,5				-2.28,2	
	Piazzi, XXI, 419.	22. 2.50,17	- 0,88 - 0,88		258. 0.13,7 258. <b>c</b> . 8,0				-2.20,9	
1	41 Verseau Lalande 43483	22.10. 0,41	- 0,00		256.55.36,4				-2.19,9 -2.28,9	
1	Weisse, XXII, 355	22.16.55,12	- 0,68		269.46.15,5				-1.25,5	
1	Weisse, XXII, 449.	22.21.14,18	- 0,69		269.15.27.5				-1.27,2	
1	Neptune	22.25.48,86	- 0,69		269.15.50,2	735,4		+ 6,2	-1.27,2	
	Victoria	23.27.29,33	- 0,47		285.15.22,7	735,4	+ 8,0	+ 5,2	- 49,5	
1	Weisse, XXIII, 642		- 0,59		276. 9.48,4				-1. 8,1	
	Weisse, XXIII, 736		- 0,59		275.48.33,4				-1. 9,1	
	Anonyme	23.40. 6,39	- 0,60		275.35. 5,0				-1. 9,6 -1. 9,6	
	Anonyme 8-4°19'.		0,60		275.30.40,7				-1. 9,0	
	Weisse, XXIII, 993.		- 0,60		275.37.30,5				-1. 9,7	1
	27 Poissons	23.51. 7.46	- 0,60		275.33.57,1				-I. 9.9	
	30 Poissons		- 0.64		273. 6.27,4				-1.16,3	
	α Andromède		- 0,21	+ 4,82	308.12.13,1	735,4	+ 6,8	+ 3,4	- 18,6	47,6
	y Pégase		- 0,37	+ 4,58	294.17.41,0				- 35,8	48,0
	Lalande 291		- 0,88		257.59.58,2		}		-2.22,5	
	Piazzi, O, 57 Lacaille Q1		- 1,10		248. 8.15,5 250.55. 0,3				-4.24,2	
1	51 Poissons	0.24.47,58	- 0,46		286. 4.31,5			;	- 48,8	
1	B. A. C. 149		- 0,39		292.19.59,4			1	- 38,5	
	α Cassiopée		+ 0,12	+ 5,07	335.38.51,7	735,3	+ 6,4	+ 3,9	+ 9,6	47,8
	Weisse, O, 745	0.43. 0,59	- 0,54		279.37.40,1				-1. 0,6	
	Anonyme		- 0,54		279.31.57,2				-1. 0,8	
	26 Baleine		- 0,53		280.30.40,3				- 58,7	
	Saturne, centre		- 0,50		283.27. 2,9 8.23.51,5	-35/	1 7 7	1 + 30	- 53,0 + 52,3	100
	α Petite Ourse S Weisse, 1, 640		- 0,42		290.16.19,8	755,4	+ 7,1	+ 3.9	- 41,7	48,3
	Weisse, I, 830		- 0,+2		289.49.49,4		-	1 0,2	- 42,3	
	Weisse, I, 897		- 0,42		200. 0.14.0				- 42,1	
	z Bélier		- 0,27	+ 4,84	302.41.25,4	735,6	+ 7,5	+ 3,0	- 25,0	44,0
	α Petite Ourse I				11.23.54,1	735,1	+ 8,2	+ 6.7	+ 57,5	47,3
11	α Petite Ourse I	13. 6.17,56			11.23.54,5	730,7	+ 7,2	+ 6,0	+ 57,2	47,7

Le 10, Mire Sud-418,23. Mire Nord B+68,73. Mire Nord C-168,61. Mire Nord D-498,62. Niveau-48,36.

d op,o.

109
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

Jours.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERM	OMÈTRE Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
13	α Petite Ourse I	h. m. s. 13. 6.17,36	5.	s.	0 , "	mm.	+ 8,8	+ 7,6	+ 56,6	47,0
14	α Petite Ourse I 3 Petite Ourse	13. 6.15,26 14.51.13,27	+ 0,26	+ 7,65	11.23.51,8 354.41.17,7	733,2 733,0	+ 6.5 + 7.0	+ 3,4 + 4,4	+ 58,0 + 31,2	46,8 51,0
:5	Soleil, bord t, sup.  a Ophiuchus  y Dragon  Vénus, bord 1, centr.  d Petite Ourse S	15.20.30,76 17.28. 6,62 17.53.14,28 18- 0.11,26 18.20.23,04	- 0,78 - 0,41 - 0,07 - 0,95	+ 7,53 + 7,57	261.44.59,7 292.36.57,0 331.26.28,0 252.17.13,6	732,8 732,4 732,4	+ 7,2 + 7,8 + 7,6	+ 4,5 + 5,2 + 5,2 + 5,2	-1.58,7 - 37,6 + 5,3 -3.13,6	45,0 47,5
	α Lyre γ Aigle α Aigle β Aigle 21 Capricorne Piazzi, XX, 428	18.31.59,11 19.39.16,54 19.43.36,72 19.48 5,63 20.36.27,74 20.52.34,44 20.55. 3,00	- 0,18 - 0,43 - 0,45 - 0,47 - 0,13 - 0,78 - 0,78	+ 7,34 + 7,35 + 7,33 + 7,27 + 7,56	318.35. 5,2 290.11.49,7 288.25.24,1 285.58.57,6 324.41. 6,2 261.51.13,6 261.54.32,8	732,2 732,2 732,5	+ 7,1 + 7,0 + 6,6	+ 4,9 + 4,5 + 3,4 + 3,4	- 7,5 - 41,3 - 44,0 - 48,0 - 1,4 -1.58,6 -1.58,4	50,0 46,1 49,6 45,7 49,8
	Piazzi, XXI, 27 Lalande 41363  a Céphée 36 b Capricorne 3 Céphée Weisse, XXI, 752. Anonyme	21. 6.36,69 21.11.14,61 21.15. 8,14 21.20.19,65 21.26.50,35 21.31.33,74 21.35.59,02	- 0,85 - 0,94 + 0,05 - 0,85 + 0,18 - 0,68 - 0,74	+ 7,33 + 7,18	257.32.23,3 253. 0.59,4 257.30.56,0 268.42.31,7 264.31.42.9			+ 3,2	-2.25,5 -3. 7,1 -2.25,8 -1.29,8 -1.46,0	
	Lalande 42502 Lalande 42554 Lalande 42699 B. A. C. 7652 α Verseau 41 Verseau Lalande 43483	21.41.24,27 21.43. 2,62 21.47.25,77 21.51. 1,15 21.58.14,37 22. 2.52,50 22. 6.10,50 22.10. 2,63	- 0,95 - 0,95 - 0,87 - 0,87 - 0,55 - 0,84 - 0,84 - 0,86	+ 7,27	251.53.18,0 256.12.57,8 256.23.19,0 278.54.17,7 258: 0.17,0 258. 9.11,9 256.55.41,5	732,7	+ 5,7	+ 2,2	-3.21,0 -2.36,2 -2.34,9 -1. 2,3 -2.22,7 -2.21,7 -2.30,7	46,4
	Weisse, XXII, 355 Weisse, XXII, 449 Neptune Anonyme Weisse, XXIII, 736 Anonyme Anonyme	22.16.57.70 22.21.16,72 22.25.49,68 23.23.29,00 23.36. 3,65 23.40. 8,97	- 0,66 - 0,67 - 0,67 - 0,45 - 0,59 - 0,59 - 0,59		269.46.14,8 269.15.27,3 269.15.44,0 288.36.13,0 275.48.31,8 275.35. 3,2 275.38.12,8	733,0 733,0	+ 5,5 + 5,6	+ 2,2 + 1,0 + 0,9	-1.26,5 -1.28,2 -1.28,2 -44,5 -1.9,8 -1.10,4	
	Weisse, XXIII, 993. 27 Poissons Anonyme	23.48.43, 19	- 0,59 - 0,59	1	275.37.30,5 275.33.55,8 273.16.58,3			+.0,8	-1.10,3 -1.10,4 -1.16,4	

Le 15, Mire Sud-399,24.

110
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

JOURS.	NOM	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS corrigée	BAROMÈTRE	THERMO	DMÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du
	,	Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	F	ricur.	rieur.	JN.	POLE.
	33 Poissons α Andromède	h. m. s. 23.57.49,75 o. o.49,17	- 0,62 - 0,27	+ 7,5 <sub>2</sub>	273.24.34,8 308.12.14,4	mm.	0	0	-1.16,1 - 18,8	48,3
	y Pégase	0. 5.41,40 0.10.51,63 0.15.52,58 0.19.11,61	- 0,40 - 0,84 - 1,04 - 0,98	+ 7,23	294.17.41,7 258. o. 1,0 248. 8,14,7 250.44.59,5	-		+ 0,4.	- 36,1 -2.23,8 -4.26,9 -3.39,4	48,4
	51 Poissons Lune, bord 1, inf α Cassiopée 20 Baleine	0.24.50,27 0.28.31,13 0.32.13,45 0.45.31,35	- 0,47 - 0,57 - 0,02 - 0,55	+ 7,76	286. 4.30,9 277.34. 0,2 277.59.34.8	733,o	+ 3,2	- 0,2	- 48,9 -1. 5,9	
	Weisse, O, 858 Saturne, centre & Petite Ourse S Weisse, I, 587	0.49.29,31 0.59.41,34 1. 6. 7,13 1.33, 8,92	- 0,54 - 0,50 - 0,43		279.35.22,0 283.21.28,5 8.25.56,4 290.28.26,8	7 <sup>33,2</sup>	+ 3,8	0,0	-1, 1,4 - 53,8 + 52,9 - 41,8	52,2
	Weisse, I, 830 Weisse, I, 897	1.42.28,24 1.46.12,84 1.50.41,18	- 0,44 - 0,44 - 0,44		289.56.41,3 289.49.46,6 290. 0.12,1	733,3	+ 4,4	- 0,1 + 0,4 + 0,5	- 41,0 - 42,5 - 42,7 - 42,4	
	α Bélier α Petite Ourse I β Petite Ourse Mercure, bord 2, c <sup>tre</sup>	14.51.13,90	- 0,31 + 0,26 - 0,74	+ 7,35	11.23.52,3 354.41.17,6 263.37.46,5	734,2 73,,2 734,2	+ 4,5 + 5,5 + 5,5	- 0,3 + 2,6 + 2,7	+ 58,9 + 31,4 -1.50,4	48,5 51,4
16	Soleil, bord 1, inf Vénus, bord 1, centr. & Petite Ourse S	18.20.23,42	- 0,79 - 0,94		260.57.12,0 252.21.26,4 6.31.13,0	734,0 733,6 733,6	+ 6,1 + 6,6 + 6,6	+ 3,2 + 5,0 + 5,0	-2. 3,8 -3.13,8 + 48,6	53,2
	α Lyre γ Aigle α Aigle β Aigle	18.31.59,70 19.39.17,10 19.43.37,18 19.48. 6,23	- 0,18 - 0,43 - 0,45 - 0,47	+ 7,95 + 7,92 + 7,80 + 7,88	318.35. 4,7 290.11.48,8 288.25.22,7 285.59. 1,3	733,6	+ 6,3	+ 5,0	$ \begin{array}{rrrr}     & - & 7.6 \\     & - & 41.5 \\     & - & 44.2 \\     & - & 48.3 \end{array} $	49,6 45,1 48,1 49,2
	A Cygne Lalande 42502 Lalande 42699 B. A. C. 7652	20.36.28,26 21.41.24,57 21.47.26,23 21.51. 1,79	- 0,13 - 0,95 - 0,87 - 0,87	+ 8,11	324.41. 5,1 251.53.21,6 256.12.59,6 256.23.17,6	733,7 733,7	+ 5,4 + 3,6	+ 3,0	- 1,4 -3.23,2 -2.37,6 -2.36,4	48,7
	Piazzi, XXI, 419 41 Verseau Weisse, XXII, 231.	21.58.14,99 22. 2.53,12 22. 6.11,00	- 0,55 - 0,84 - 0,83 - 0,67	+ 7,90	278.54.17,9 258. 0.18,9 258. 9.18,9 269.24.26,3		,	+ 0,3	-1. 2,8 -2.24,0 -2.23,0 -1.28,5	46,2
	Weisse, XXII, 336. Weisse, XXII, 449. Neptune	22.16.21,78 22.21.17,26 22.25.50,30	- 0,67 - 0,67 - 0,67		269. 0.12,4 269.15.23,6 269.15.47,2	733,7	+ 3,1	0,0	-1.29,9 -1.29,0 -1.29,0	
	Weisse, XXIII, 891.	23.23.29,56	- 0,45 - 0,59	;	288.36.16,9	734,1	+:3,4	- 0,8	- 44,9	

Le 16, Mire Sud-40P,20. Mire Nord B+6P,39. Mire Nord C-18P, 10. Mire Nord D-50P,11. Niveau-5P,27.

111
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre 1850.

Jouns.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BARONÈTRE.	THERVO laté- rieur.	Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Anonyme	h. m. s. 23.44. 2,35 23.53.32,55 23.57.50,35 0. 0.49,61 0. 5.41,98 0.10.52,07 0.15.53,04 0.19.11,79 0.24.50,69 0.28.19,96	s. - 0,59 - 0,62 - 0,62 - 0,27 - 0,40 - 0,84 - 1,04 - 0,98 - 0,47 - 0,41	+ 7,97 + 7,82	275.38.14,7 273.17. 2,9 308.12.10,2 294.17.41,9 257.59.59,6 248. 8.16,4 250.44.59,8 286. 4.30,2 292.19.57,7	734,1	+ 2,2	- 1,0 - 1,9	- 18,9 - 18,9 - 36,3 - 2.24,9 -4.28,9 -3.44,1 - 49,3 - 39,3	44,0 48,4
	α Cassiopée 20 Baleine Weisse, O, 861 Saturne, centre α Petite Ourse S Lune, bord 1, inf Weisse, I, 587 Uranus α Poissons α Bélier ξ Baleine	0.32.13,98 0.45.31,99 0.49.43,55 0.59.30,11 1. 6. 7,55 1.17.39,99 1.33. 9,52 1.42.20,90 1.46.13,52 1.54.28,99 1.58.55,39 2. 5.14,84	- 0,02 - 0,55 - 0,54 - 0,50 - 0,43 - 0,44 - 0,44 - 0,45 - 0,46	+ 8,30	277.59.31,8 279.28.44,4 283.20.21,7 8.25.54,2 282.13. 6,0 290.28.21,3 289.55.53,1 289.49.46,4 281.59. 6,9 302.41.26,4	734,3 734,5 734,5	+ 2,3 + 2,9 + 2,9	- 1,9 - 1,9 - 1,9 - 1,9 - 1,9	-1. 5,4 -1. 1,9 - 54,3 + 53,4 - 56,5 - 42,1 - 43,0 - 43,1 - 56,9 - 25,5	50,2
22	Soleil, bord 1, inf  a Céphée  36 b Capricorne  3 Céphée  a Verseau  Anonyme  Anonyme  Piazzi, XXIII, 249	15.49.42;74 21.15.12,62 21.20.24,31 21.26.54,61 21.58 18,91 23.24.19,88 23.44.5,73 23.52.13,81	- 0,80 + 0,05 - 0,85 + 0,18 - 0,55 - 0,45 - 0,59 - 0,62	+ 12,10 + 11,87 + 11,90	259.33.29,1 341.53. 9,8 257.30.51,5 349.50. 6,0 278.54.13,8 288.26.25,2 275.36.38,4	726,5 726,5 726,5 726,8 727,0 727,0	+ 8,1 + 8,2 + 8,0 + 7,0 + 7,2 + 7,2	+11,3 +6,8 +6,6 +4,7 +4,2 +4,5	-2. 7,0 + 15,9 -2.22,6 + 24,7 -1. 1,2 - 43,9 -1. 8,8	51,4 49,6 44,1
	Anonyme.  33 Poissons.  α Andromède  γ Pégase  Lacaille gι  51 Poissons  α Cassiopée  α Petite Ourse S	0. 5.44,88 0.20. 7,89 0.24.54,90 0.32.17,70 1. 6. 9,95	- 0,62 - 0,62 - 0,27 - 0,40 - 0,97 - 0,47 - 0,02	+ 12,16 + 11,78 + 12,13	273.17. 3,0 273.24.33,5 308.12. 9,6 294.17.40,1 250.54.58,6 286. 4.29,3 335.38.54,5 8.25.57,2	727,1 727,2 727,3	+ 6,8 + 6,6 + 6,6	+ 4,4 + 4,3 + 4,3 + 3,2	-1.14,8 -1.14,4 - 18,4 - 35,2 -3.31,8 - 47,7 + 9,5 + 51,9	43,5 47,7 48,2 49,8
24	Soleil, bord 1, sup.	15.58.10,58 18.32. 4,85		+ 13,20	259.40.48,8 318.35. 1,0	729,8 728,7	+ 9,2	+10,6	-2. 7,1 - 7,4	48,0

Le 24, Mire Sud-42P,68. Mire Nord B+7P,12. Mire Nord D-49P,60.

112
Observations faites à la lunette méridienne en Novembre et Décembre 1850.

JOURS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU	l'instru-	ECTION de	MOYENNE DES VERNIERS corrigée pour le niveau.	BAROMÈTRE	Inté-	ONÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU da POLB.
1			ment.	pendule.	pour le niveau.		rieur.	rieur.		
	γ Aigle	h. m. s 19.39 22,74 19.43.42,28 19.48.11,13 20. 9.58,92 21.58.20,05 1. 6. 7,22	- 0,43 - 0,45 - 0,47 - 0,70 - 0,55	6. + 13,04 + 12,98 + 12,86 + 13,20 + 13,06	290.11.47,7 288.25.19,0 285.58.58,4 266.57. 6,7 278.54.14,7 8.25.57,8	728,3 728,1 727,4 726,4	+10,1 +10,1 + 9,1 + 8,7	+ 9,7 + 8,9 + 7,9 + 7,6	- 40,4 - 43,1 - 47,0 -1.33,4 -1.0,5 + 51,0	46,1 46,3 48,4 45,2 45,8 48,8
5	a Aigle	19.43.49,12	- 0,45 + 0,18	+ 19,90 + 20,05	288.25.20,0 349.50. 6,4	736,1 736,1	+ 5,3 + 4,8	† 2,1 + 0,8	- 44,8 + 25,6	47,0 51,6
7	γ Aigle	19.43.50,22 19.48.19,23 21.15.21,04	- 0,43 - 0,45 - 0,47 + 0,05	+ 20,96 + 21,01 + 21,06 + 21,12	290.11.42,2 288.25.17,2 285.58.55,2 341.53. 5,7	7 <sup>3</sup> 7,7	+ 5,5	+ 3,2	- 41,9 - 44,7 - 48,8 + 16,3	44,8 44,6 45,0 49,0
	α Verseau	21.58.27,95	+ 0,18 - 0,55 - 0,66 - 0,67	+ 21,08	278.54.11,9 269.24.23,5 269. 0.11,3	737,5	+ 4,8	+ 2,3	-1. 2,7 -1.28,3 -1.29,6	41,7
	Neptune		- 0,66 - 0,27 - 0,40 - 0,97 - 0,47	+ 21,13 + 20,88	269.18.59,9 308.12. 7,1 294.17.35,2 250.54.55,7 286. 4.23,3	737,5	+ 4,2	+ 2,0	-1.28,6 - 18,9 - 36,3 -3.38,5 - 49,2	40,4 42,1
	B. A. C. 149 α Cassiopée Weisse, O, 745 Weisse, O, 858 Weisse, O, 861	0.28.32.80	- 0,41 - 0,02 - 0,54 - 0,54 - 0,54	+ 21,25	292.19.50,3 335.38.53,0 279.37.34,8 279.35.19,8	737,5	+ 3,2	- 0,3	- 39,0 + 9,8 -1. 1,7 -1. 1,9	45,0
	Saturne, centre  A Petite Ourse S  Weisse, I, 587  Uranus	0.56.51,79 1. 6. 9,94 1.33.22,70	- 0,51 - 0,43		283. 7.47,5	737,6	+ 3,2	- 0,8	- 54,7 - 42,t	
	α Poissons· α Bélier ξ Baleine Piazzi, II. 75	1.54.42,05 1.59. 8,39 2. 5.27,80	- 0,45 - 0,52 - 0,31 - 0,46 - 0,45	+ 21,14	289.43. 3,7 281.59. 2,8 302.41.29,0 288. 5.10,0 288.58.38,5			- 1,3 - 1,4	- 43,3 - 57,0 - 25,5 - 46,0 - 44,6	45,9
	B. A. C. 764 Weisse, II, 498 Piazzi, II, 167 & Petite Ourse I	2.21.59,62 2.29.49,02 2.37.15,00	- 0,45 - 0,45	+ 20,96	288.50.13,6 288.51. 3,2 289.25.19,3			- 1,6	- 44,8 - 44,8 - 43,9 +1.37,8	41,9
	α Baleine		- 0,50	+ 21,15		737,6	+ 3,2	- 1,6		

Le 5, Mire Sud-39P,63.

Le 7, Mire Sud-42P, 28. Mire Nord B+7P,47. Mire Nord C-14P,87. Mire Nord D-46P,74.

113
Observations faites à la lunette méridienne en Décembre 1850.

JOHRS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION de la pendule.	MOYENNE DES VERNIERS corrigee pour le niveau.	BAROMÈTRE	Inté-	OMĖTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du ,
25	α Verseau α Poisson austral	1 in. s 21.58.37,79 22.49.54,64	- 0,55 - 1,01	+ 31,12 + 30,77	278.54.11,5 249.34.49,8	729,0 728,7	rieur. 0 + 2,3 + 2,0	o - 0,4 - 0,6	-1. 2,6 -3.57,9	42,9 49,5
	α Pégase α Andromède y Pégaseα α Cassiopéeα Saturne, centre	22.57.50,74 0. 1.12,31 0. 6. 4,76 0.32.36,13 0.56.49.89	- 0,40 - 0,27 - 0,40 - 0,02 - 0,51	+ 31,04 + 31,19 + 31,03 + 31,35	294.20.36,4 308.12. 9,7 294.17.39,4 335.38.55,9 283.11.50,4	729,0	+ 1,6	- 0,3 0,0 - 0,9 - 0,7	- 35,9 - 18,7 - 35,9 + 9,7 - 54,0	43,5 43,9 47,7 46,8
	α Petite Ourse S Uranus α Poissons α Bélier ξ Balcine	1. 6. 8,64 1.39 17,16 1.54.51,73 1.59.18,19 2. 5.37,76	- 0,44 - 0,52 - 0,31 - 0,46	+ 31,08	289.37.28,9 281.59, 3,8 302.41.24,4 288, 5, 3,9	728,9	+ 1,3	- 1,8 - 2,1	- 43,1 - 56,5 - 25,3 - 45,6	41,5
26	Piazzi, 11, 75 B. A. C. 764 Soleil, bord 1, sup.	2 17. 4,56 2.22. 9,80 18.18.35,65	- 0,45 - 0,45 - 0,87		288.58.35,9 288.50.13,6 256.51.25,8	729,1 729,1	+ 1,0	- 2,I + 1,0	- 44,2 - 44,4 -2.31,2	
	α Céphée β Céphée α Verseau α Poisson austral α Pégase	21.15.31,22 21.27.12,99 21.58.38,43 22.49 55,17 22.57.51,24	+ 0,05 + 0,18 - 0,55 - 1,01 - 0,40	+ 31,93 + 32,10 + 31,77 + 31,31 + 31,55	341.53. 0,5 349.50. 3,3 278.54.12,4 249.34.51,3 294.20.38,9	728,0 728,3	† 2,2 † 2,3	+ 2,0 + 2,0 + 1,9 + 1,1 + 1,1	+ 16,2 + 25,2 -1. 2,0 -3.56,3 - 35,7	47,2 51,4 44,5 52,6 46,3
	Anonyme & +8°39'. Anonyme & +8°39'. Anonyme Weisse, XXIII, 891.	23.11.43,51 23.23.52,78 23.24.38,90 23.44.21,29	- 0,67 - 0,45 - 0,45 - 0,59	• ,	269.31.32,1 288.26.21,5 275.42.43,7	728,4	+ 2,C	+ 1,1 + 1,1 + 1,1	-1.27,2 - 44,5 -1. 9,6	
	Piazzi, XXIII, 249. Anonyme δ-6°40'. Anonyme δ-6°43'. α Andromède y Pégase	23.52.33,19 23.53.55,71 23.54. 0,43 0. 1.12,75 0. 6. 5,14	- 0,62 - 0,62 - 0,62 - 0,27 - 0,40	+ 31,64 + 31,42	308.12. 9,2 294.17.40,7				-1.16,1 - 18,7 - 35,8	43,5 49,2
	Anonyme  a Cassiopée  Weisse, O, 858.  Weisse, O, 861	0.19.35,01 0.32.36,74 0.49.53,23 0.50. 6,83	- 0,97 - 0,02 - 0,54 - 0,54	+ 31,99	250.44.54,9 335.38.59,8 279.28.37,4	728,6	+ 1,9	+ 0,8	-3.37,6 + 9.7 -1. 0,7	50,7
	Saturne, centre  A Petite Ourse S  Weisse, I, 587  Uranus  A Poissons	0.56.53,50 1. 6. 9,54 1.33.33,08 1.39.15,72 1.54.52,47	- 0,51 - 0,43 - 0,45 - 0,52		283.12.24,3 8.26. 2,4 290.28.26,2 289.37.19,4 281.59. 3,8	728,6	+ 1,6		- 53,5 + 52,3 - 41,3 - 42,6 - 55,9	47,8
	α Bélier ξ¹ Baleinc Weisse, II, 130	1.59.18,75 2. 5.38,26	- 0,31 - 0,46	+ 31,65	288. 5. 7.7 289. 1.56,3				- 25,0 - 25,1 - 43,5	43,9

Le 26, Mire Sud-417,16. Mire Nord B+67,45. Mire Nord D-487,95. d-87,43. Niveau-67,91.

Nadir 14607'42",90.

. 114
Observations faites à la lunette méridienne en Décembre 1850.

JOURS	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU		ECTION le	MOYENNE DES VERNIERS	BAROMÈTRE	THERMO	WÈTRE Exté-	RÉFRACTION	LIEU du
	DES ASTRES.	Fil Méridien.	ment.	pendule.	pour le niveau.	E.	rieur.	rieur.	ON.	POLE.
	Anonyme	3.55. 0,84 3.57.18,92	s. - 0,45 - 0,45 - 0,45 - 0,44 - 0,44 - 0,26 - 0,50 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84	\$. † 31,20 † 31,52	288.59.30,6 288.58.37,6 288.50.15,1 288.51.3,1 289.25.18,1 25. 8.28,6 283.26.37,1 257.54.30,9 257.55.35,4 257.57.11,9 258. 2.56,5 258. 7.49,2	728,8 729,1 729,2	+ 1,7 + 1,7 + 1,6	+ 0,6 + 0,5	- 43,6 - 43,6 - 43,9 - 43,9 - 43,9 - 43,0 - 42,8 +1.35,5 - 53,2 -2.23,7 -2.23,6 -2.23,4 -2.22,8 -2.22,2	47,1 46,4
	Anonyme Anonyme Anonyme Taureau	4. 2.51,14	- 0,84 - 0,90 - 0,37	+ 31,63	258. 2.23,7 254.53.10,0 296. 8.30,0	729,3	+ 1,5	+ 0,2	-2.22,9 -2.48,8 - 33,4	43,8
27	α Céphée	21.27.13,45 21.58.38,67 22.49.55,88 22.57.51,70 23.11.43,90	+ 0,05 + 0,18 - 0,55 - 1,01 - 0,40 - 0,67 - 0,45	+ 32,45 + 32,60 + 32,05 + 32,03 + 32,02	341.53. 1,0 349.50. 3,5 278.54.11,0 249.34.50,3 294.20.35,0 269.31.34,0	7 <sup>2</sup> 9, <sup>2</sup> 7 <sup>2</sup> 9, <sup>3</sup> 7 <sup>2</sup> 9, <sup>4</sup> 7 <sup>2</sup> 9, <sup>4</sup>	+ 2,0 + 2,0 + 2,0 + 1,9	+ 1,8 + 1,6 + 1,4 + 1,4 + 1,4	+ 16,2 + 25,3 -1, 2,2 -3.56,2 - 35,7 -1,27,1	48,0 52,0 43,0 51.7 42,5
	Anonyme & +8°39'. Anonyme	23 24.39,46 23.44.21,67 23.52.33,49 23.53.56,23	- 0,45 - 0,59 - 0,62 - 0,62		288.26.19,8 275.42.48,4		-	+ 1,4	-1. 9,6	
	Anonyme  Andromède  Pégase  Lacaille 91  Weisse, O, 438	o. 1.13,21 o. 6. 5,68 o.20.27,71	- 0,62 - 0,27 - 0,40 - 0,97 - 0,41	+ 32,11 + 31,97	273.14.33,2 308.12.15,4 294.17.38,0 250.55. 0,3 292.20. 6,3	729,6	+ 1,9	+ 1,0	-1.16,1 - 18,7 - 35,8 -3.35,2 - 38,6	49,8 46,6
	α Cassiopée	0.32.37,05 0.43.27,49 0.49.53,67	- 0,02 - 0,54 - 0,54 - 0,54	+ 32,34	335.39. 0,0 279.37.30,6 279.35.16,0	7-3,0	19		+ 9.7 -1. 0,8 -1. 0,9	50,9
	Saturne, centre  A Petite Ourse S  Lalande 2368	0.56.57,54	- 0,51		283.13.10,8 8.26. 2,9 255.41.14,1	729,9	+ 1,7	+ 0,6	- 53,7 + 52,6 -2.41,8	48,5

Le 27, Mire Nord B+7°,38. Mire Nord D-48°,01.

115
Observations faites à la lunette méridienne en Décembre 1850.

JOHRS.	NOM DES ASTRES.	PASSAGE CONCLU on Fil Méridien.		ECTION le la pendule.	MOYENNE  DES VERNIERS  COPPIGES  pour le niveau.	BAROMÈTRE.	Inté- rieur.	Exté- rieur.	RÉFRACTION.	LIEU du POLE.
	Uranus Lalande 3447 56 Baleine α Poissons α Bélier ξ¹ Baleine. Weisse, II, 130 Λησηγμα Piazzi, II, 75 B. A. C. 764	1.59.19,31 2. 5.38,94 2. 9.28,32 2.13.56,68 2.17. 5,58	5. - 0,44 - 0,87 - 0,87 - 0,52 - 0,31 - 0,46 - 0,45 - 0,45 - 0,45	+ 32,22	289.37. 8,4 256. 4.53,9 256.42.39,0 281.59. 5,9 302.41.25,8 288. 5.11,4 289. 1.55,933,4 288.59.33,9,6 288.50.15,9	730,2 730,3	+ 1,3	+ 0,2	- 43,0 -2.38,7 -2.33,6 - 56,3 - 25,2 - 45,4 - 43,9 - 44,0 - 44,0	43,0
	Weisse, II, 498. Piazzi, II, 167. Anonyme. Lalande 5315. 3 Petite Ourse I.  a Baleine Anonyme. Anonyme. Lalande 7298. Lalande 7311. Anonyme.	2.29.59,96 2.37.26,06 2.40. 8,82 2.44.42,01 2.51.39,53 2.55. 2,43 3.38.57,78 3.42.10,16 3.49.24,70 3.49.24,70	- 0,45 - 0,44 - 0,44 - 0,87 - 0,26 - 0,50 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,84	+ 31,65 + 32,29	288.51. 3,7 289.25.18,3 289.32.24,8 256.19.19,9 25. 8.27,0 283.26.40,8 257.55.40,4 257.55.42,0 258. 2.54,4	730,4	+ 1,4		- 44,2 - 43,3 - 43,1 -2.36,8 +1.36,5 - 53,6 -2.25,4 -2.25,4	46,3 49,8
	Lalande 7576 Lalande 7645 Anonyme Anonyme  Taurean Soleil, bord 1, inf	3.57.19,54 3.59.14,34 4. 2.51,84 4.11.22,59 4.15. 4,01 4.27.55,46 18.27.29,39	- 0,84 - 0,84 - 0,84 - 0,90 - 0,90 - 0,37 - 0,87 - 0,87	+ 32,28	258. 6.13,8 258. 2.26,0 254.47.10,0 254.53.14,2 296. 8.31,8 256.23.48,5 256.58.36,0	7 <sup>3</sup> 0,7 7 <sup>3</sup> 2,0 7 <sup>3</sup> 5,5	+ 1,2 + 1,8 + 2,4	- 0,5 + 0,2 + 4,0		45,2
29	Weisse, O, 858 Weisse, O, 861 Saturne centre α Petite Ourse S Lalande 2368 Uranus Lalande 3447 56 Baleine α Poissons α Belier	0.49.54,71 0.50. 8,25 0.57. 6,86 1. 6. 8,94 1.11.42,01 1.39.12,52 1.45.29,93 1.50.15,11 4.54.53,89	- 0,54 - 0,54 - 0,51 - 0,89 - 0,44 - 0,87 - 0,87 - 0,52 - 0,31	+ 33,12	279.28.33,7 283.14.35,4 8.26. 2,1 255.41.19,0 289.37. 2,9 256. 4.54,3 256.42.41,2 281.59. 5,2 302.41.28,1	734,8	+ 2,1	+ 1,6 + 1,0 + 0,3	-1. 1,1 - 54,0 + 53,0 -2.42,7 - 43,2 -2.39,5 -2.34,3 - 56,7	47,9

Le 30, Mire Sud-419,80.

I.e 31, Mire Sud-427, 56. Mire Nord B+5P, 17. Mire Nord D-48P, 18. Niveau-5P, 88.



		2 03161071	o moge.	1	ucs t		oser cee.	s pen	auni	i unnee	1000,	Tame	nees	au 1"	Janvie	r ae c	ette e	annee.	
п																			
	αA	NDROMÈD	E.	2	Péc	ase (su	ite).		Anon	YME (SU	ite).		В. А	. C. 149	9.	α	Cass	10pée P	. I.
		ohom to	280151			о <sup>ь 5 т</sup>	11/0201			0 1 1 1 1 1	-29°14'		,	olio Qm	1 = 20 = 3/			h2 . m . (	2701.1
lévr.	. 14					318,04				08,31		Nov.			14",5	Juin			
	17	38,64	44,1		24	31,05	58,0					2101.	16		12,0	Juill.		1,43	49,2
	18	38,63	45,4 40,2		29	31,05		Mo	venn.	0,42	3-3	Déc.	7	8,70	8,9	Mov	enne	1,48	48,0
г	19	38,6q		Oct.	15 16	30,95		1110	yemme	0142	3/13	Moy	renne	8,77	11.8			, .	
ı.	23	38,64	41,7		17	30,75	57,6		LACA	ille 9	1.	ľ		'''	,	11	EISS	E, O, 7	45.
Ю.	25 26	38,5 <sub>0</sub> 38,48			18	30,87						α	Cass	OPÉE P	. S.			0142m	-00191
m	28	38,69			25 26	31,00				oh19m						Nov.	9	52°,33	25",5
vril		38,69	41,9	Nov.		30,94	53,5	Nov.	22	52°,57 52,52				0132m +		D./-	10	52,52	23,5
	18	38,55 $38,52$			4 5	30,98	57,6 55,6	Déc.		52,56	<sup>27,7</sup> 33,0	Févr.		1,56	50",8	Déc.	7 27	52,45 $52,47$	24,6 28,9
Iai	<sup>24</sup>		41,9		6	30,99 30,94			27	52,67	24,7		17	1,62	52,1	Mov		52,44	25,6
	12	38,50	43,1		7	30,72	51,6	Mo	venne	52,58	29,1		19	1,77	52,4			,	,-
	19	38,64 38,63			9	30,90			J	- ,	- 31-		20	1,56	51,6		20]	BALEINE	
	20 21	38,61	40,4 39,5		15	30,88 30,84	5 <sub>7</sub> ,6 5 <sub>7</sub> ,9		LALA	NDE 63	0.		26	1,64	53,0			01145m	-1057
	22	38,53	41,2		16	30,88	57,9			-h - m	2./ /		27	1,62	48,6	Oct.	18	20,82	/
1	24	38,66	42,5	_	22	30,87	57,3	0			-23°41'		28	1,56	49,9	Nov.	3	20,55	32,8
Oct.	29	38,64 38,61	43,1 39,0	Déc.	7 25	30,86	55,2 60,7	Nov.	3	50,78	o",3 9,6	Mars	5	1,59	49,7 53,6		4 5	20,59	32,8 39,1
1	16	38,42	40,5		26	30,86	59,7		4	50,61	0,7	1	6	1,72	50,9		6	20,50	37,5
1	17	38,56	44,8		27	30,91			5	50,93	5,2		2	1,60	50,0		15	20,60	32,5
и	25 26	38,65 38,5 <sub>7</sub>	42,6 38,8	Moy	enne	e 30,94	56,3		6		0.		0	1,60	51,2 50,6		16	20,68	36,0
lov.		38,54	38,0			,,,		Mo	yenne	50,80	5,0	Avril	24	1,61	50,3	Moy	enne	20,67	35,1
	4	38,50	40,4		LAL	ANDE 29	I.		F .	Poisson	_		29	1,81	52,3		An	ONYME.	
	5	38,65 38,62	40,2			obiom.	-21058		or.	Poisson	S.	Mai	3	1,95	51,0				
	7			Nov.		405,56				0 <sup>h</sup> 24 <sup>m</sup>	+607'		11	1,77 1,74	49,1 50,7	Nov.	E	40°,46	0025/
	9	38,42	39,2	1107.	9	40,83	25,3	Nov.	. 10	39 <sup>s</sup> ,72	37",6		12	1,59	50,0	INOV.	6	40,34	0",9
	10	38,56	43,8		10	40,88			15	39,63			19	1,57	50,6		7	40,32	3,9
1	15 16	38,58 38,48	44,6 40,3		15 16	40,86 40,76			16	39,50 39,80			20	1,73	53,3 51,8		9	40,48	9,3
	22	38,7 r	39,9	31				Déc.		39,59	33,7		24	1,74	50,3	7.5	10	40,48	6,5
)éc.	7	38,56	40,3	MO	yenn	e 40,78	23,9	Mo	venne	39,65		Jain	29 8	τ,85	50,5	Moy	enne	40,42	4,6
	25 26	38,61 38,53	43, <sub>7</sub> 40,8	ļ	PIAZ	zz, O, 5	7.	1720	yemic	09,00	70,+	Jain	9	1,53	50,5 51,3	V	Veiss	E, O, 8	58.
	27	38,51	47,0						LAL	ANDE 78	35.	Oct.	18	1,82	49,7			ob/om	-0021
Mo	yenn	e 38,58	41,8				-31052					Non	26 3	1,52	47,2	Oct.	18	185,71	
		T. /		Nov.	_	418,26					-26°11'	MOA"	5	1,53	52,7	Nov.	3	18,77	45,9
	γ	PÉGASE.			9	41,53		Oct. Nov.		10°,63	15",8		6	1,88	51,4	D.	15	18,56	41,9
			140201		15	41,60		INOV.	5	10,70			7	1,77 1,53	47,4	Déc.	7 26	18,78	39,6
èvr.	14	315,03	53",9		16	41,51			6	10,45	16,2		9	1,55	49,3		27	18,61	43,3
	17	30,93 30,89	52,7	Mo	yenn	e 41,50	7,1		7	10,41			15	1,88	49,0			18,70	
	19 23	31,09	52,0 54,6					Ma	9	10,38			16	1,86	1 0	Moy	enne	18,68	42,6
	25	30,95	54,5		Aı	NONYME		INTO	yenne	10,48	10,1	Déc.	22	1,72	49,8	77	Truce.	ε, Ο, ε	26+
l write	28	30,82	56,1			Op to m	-29°14'	1	WEISS	E, O,	438.	Dec.	7 25	1,75	50,1 51,8	· '	£133		_
Sai Sai	13	30,90 30,93	58,8 59,8	Nov.		05,27							26	1,95	53,2	Oct	. 0		-0°28′
	19	30,95	55,5			0,40	42,2			0 <sup>h</sup> 25 <sup>m</sup>	+12°23'		27	1,79	53,4	Nov.	3	32°,43	
	20		56,4	1	9 15	0,68		Déc.	. 27	473,94	24",0	Mo	yenne	1,69	50,9	1	16	32,24	19",9
																			-

Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Weisse, 1, 680.   Say, 360.   360.	- 00 ( )	W T Clalmin	α Bélier.	ANONYME.	a Baleine.
Déc. 7 32-1,28					
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Déc. 7 32 <sup>s</sup> ,28 26 32,27 21",7	Nov. 7 525,65 32",7 9 52,89 35,6	Févr. 14 43°,62 59",9 17 43,70 58,9	Déc. 26 20 <sup>5</sup> ,95 49",7 27 21,05 52,2	Févr. 14 26 <sup>s</sup> ,62 49",2 19 26,52 50,9
26 Biline.  ob 56 <sup>th</sup> + o° 33' Oct. 18 64.09 39'', 38.1	29 32,24 25,6 Moyenne 32,29 22,4	Moyenne 52,84 34,9	20 43,63 59,2 21 43,58 59,3	Prazzi, II, 75.	22 26,55 50,8 23 26,57 52,9
Nov.   5   5,96   38,7   29   53,58   33,4   28   43,72   58,1   37   29,93   58,2   41,6   7   5,96   38,3   9   5.82   41,6   10   5.97   38,9   38,9   11,46   49,52   13,43,63   55,6   58,3   34,6   25   35,13   34,6   35,30   35,2   35,13   32,8   9   34,99   32,9   10,45   32,5   56,3   34,6   35,30   35,2   35,13   32,8   9   34,99   32,9   10,45   32,5   56,3   34,6   35,30   35,2   35,13   32,8   9   34,99   32,9   10,45   32,5   32,5   33,60   34,6   32,5   33,60   34,6   34,6   34,6   34,6   35,30   35,2   36,6   36,5   36,	o <sup>h</sup> 56 <sup>m</sup> +o∘33	1 <sup>h</sup> 44 <sup>m</sup> -23°53′ Déc. 27 53°,63 33″,3	23 43,63 60,1 24 43,64 56,9 26 43,55 60,6	Déc. 7 29 <sup>8</sup> ,87 58",1 25 29,94 56,8	26 26,62 52,8 Mars 1 26,52 52,0 2 26,61 54,5
Nov.   1	Nov. 5 5,96 38,1 6 6,14 41,4 7 5,98 38,3	29 53,58 33,4	28 43,72 58,1 Mars 2 43,59 62,2 5 43,67 57,5	27 29,95 58,4 Moyenne 29,93 57,5	6 26,50 52,6 7 26,52 51,3 8 26,53 52,6
ANONYME.    Nov. 7   1*,86   56"/8   9   1.74   61.1   10   1.81   65.2   10   1.81   65.2   15   1.83   62.1   16   1.96   61.5   1.5   43.52   59.5   24   43.53   59.9   25   43.61   60.8   27   34.95   35.2   24   26.68   55.2   27   34.95   35.2   24   26.68   55.2   24   26.68   55.2   27   24.95   35.2   25   26.55   52.2   25   26.55   5	10 5,97 38,9	1 <sup>b</sup> 46 <sup>m</sup> +9°52 <sup>f</sup>	8 43,55 58,3 9 43,63 5 <sub>7,2</sub>	2 <sup>h</sup> 21 <sup>m</sup> +8°53	13 26,68 51,7 14 26,62 53,2
Nov. 5 35;23 36",4 6 35,30 35,2 7 35,13 32,8 9 34,99 32,9 Moyenne 35,16 34,4 Weisse, O, 1056.  Weisse, O, 1056.  Obi59 +0033' Oct. 12 300,69 4",8 Lalande 2368.  Lalande 2368.  Weisse, I, 587.  Weisse, I, 587.  Nov. 15 57,96 42",4 16 58,00 36,7 Déc. 7 58,17 39,9 26 58,12 44,8 Moyenne 30,14 28,9 Moyenne 30,14 28,9 Moyenne 58,09 41,0 Weisse, I, 640.  Weisse, I, 640.  Place 17,51 11,7 27 17,51 13,5 29 17,51 1		9 1,74 61,1	Juin 8 43,50 57,8 9 43,43 60,8	25 35,13 34,0 26 35,08 34,6 27 34,05 35,2	9 26,52 51,3 23 26,43 50,4 24 26,68 55,2
Moyenne   35,16   34,44   Weisse, O, 1056.   Obc. 27   38',73   43'',0 29   38,80   41,3   Oct. 12   30°,69   4",8   Lalande 2368.   Ib   13   29   5,81   13,2   Occ. 27   38',15   27'',0   Occ. 27   5,86   17'',3   29   5,81   13,2   Occ. 27   38',15   27'',0   Occ. 27   5,86   17'',3   Occ. 27   5,86	6 35,30 35,2 7 35,13 32,8	16 1,96 61,5	24 43,59 59,9 25 43,61 62,2	Moyenne 35,00 34,4	Juill. 2 26,54 54,8 3 26,50 52,3
Déc. 27 38,73 43",0 29 38,80 41,3  Moyenne 38,76 42,1  Déc. 27 5,86 17",3 29 5,81 13,2  Moyenne 5,83 15,2  Weisse, I, 587.  Iban 1, 24",4  Nov. 15 5,7,96 42",4 16 58,00 36,7  Déc. 7 58,17 39,9 26 58,22 44,8  Moyenne 30,14 28,9  Déc. 7 17,47 10,6  Weisse, I, 640.  Iban 2, 27 38,73 43",0 29 38,80 41,3  Déc. 27 38,73 43",0 29 38,80 41,3  Moyenne 38,76 42,1  Déc. 27 38,365 58,5  Moyenne 24,31 23,3  Moyenne 24,31 23,3  Moyenne 24,31 23,3  Plazzi, II, 167.  A Persée.  2 15 26,58 51, 27 26,64 54,  Moyenne 26,55 52,  Moyenne 43,59 59,4  E 18 Aleine.  2 15 30,20 30,3  15 30,15 28,1  Nov. 16 3,22  Déc. 7 3,14 27",8 25 3,21 23,1 26 3,21 25,1 27 3,39 28,5  Déc. 7 58,17 39,9 26 58,22 44,8  Moyenne 58,09 41,0  Weisse, I, 640.  Iban 2 15 43,46 58,5  Iban 2 27 24,29 23,0  2 27 24,30 23,0  Moyenne 24,31 23,3  Plazzi, II, 167.  A Persée.  2 15 26,58 51, 27 26,64 54,  Moyenne 26,55 52,  Moyenne 43,59 59,4  E 18 Aleine.  2 15 20,58 51, 27 26,64 54,  Moyenne 26,55 52,  Moyenne 50,22 38,8  27 50,25 38,8  Moyenne 50,26 39,3  A Nonyme.  2 38,40 18, 2 38,20 20, 2 38,40 18, 2 38,20 20, 2 38,40 19, 3 38,40 19, 3 38,54 22, 3 38,20 20, 3 38,40 19, 3 38,54 22, 3 38,40 19, 3 38,54 22, 3 38,30 18, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 29, 3 38,24 2	Moyenne 35,16 34,4	56 BALEINE.	Juill. 2 43,46 59,5 Nov. 7 43,47 9 43,42 61,5	2 <sup>h</sup> 29 <sup>m</sup> +8°54'	' 10 26,59 55,6' 11 26,60 56,5 12 26,55 54,0
Lalande 2368.  Weisse, I, 897.  Déc. 27 5 \$ \$ \$ \$ 13,2 \\ Moyenne 5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	o <sup>6</sup> 59 <sup>m</sup> +0°33	Déc. 27 38 <sup>3</sup> ,73 43",0 29 38,80 41,3	15 43,46 16 43,65 58,5 Déc. 7 43,62 63,8	27 24,29 23,0 Moyenne 24,31 23,3	25 26,58 51,0 27 26,64 54,3
Déc. 27 5*,86 17",3 29 5,81 13,2 Nov. 7 30*,15 27",0 9 30,07 30,1 10 30,20 30,3 15 30,15 28,1 Nov. 15 57*,96 42",4 16 58,00 36,7 Déc. 7 58,17 39,9 26 58,22 44,8 Moyenne 58,09 41,0 Weisse, I, 640.  Weisse, I, 640.  Weisse, I, 640.  1b50 <sup>m</sup> +10°3'  Moyenne 43,59 59,4 Moyenne 43,59 59,4 Déc. 7 50,19 41,1 26 50,22 38,8 27 50,25 38,8 Nov. 16 3*,22 Nov. 16	LALANDE 2368.	Weisse, I, 897.	26 43,61 59,2 27 43,67 58,3	Piazzi, II, 107.	~ Persée
Weisse, I, 587.  Ib32m +10°31' Nov. 15 57°,96 42",4 16 58,00 36,7 Déc. 7 58,17 39.9 26 58,22 44,8 Moyenne 58,09 41,0 Weisse, I, 640.  Weisse, I, 640. $\frac{1}{1}$ 1534m +10°19' $\frac{1}{2}$ 27 17,51 13,5 $\frac{1}{2}$ 29 17,48 12,5 $\frac{1}{1}$ 10° 50,26 36,3 $\frac{1}{1}$ 30,15 28,1 Nov. 16 3°,22 Déc. 7 3,14 27",8 25 3,21 23,1 26 3,21 25,1 27 3,39 28,5 29 3,14  Weisse, I, 640. $\frac{1}{1}$ 1640. $\frac{1}{1}$ 16	Déc. 27 5,86 17,3 29 5,81 13,2	Nov. 7 30°,15 27″,0 9 30,07 30,1	Moyenne 43,59 59,4	Juill. 3 50°,38 38″,7 Déc. 7 50,19 41,1 26 50,22 38,8	3h13m +49°19 Févr. 9 38°,29 20″,6 17 38,39 21,8
Nov. 15 57°,96 42",4 16 58,00 36,7 Déc. 7 58,17 39,9 26 58,22 44,8 Moyenne 58,09 41,0 Weisse, 1, 640.  1640.  1650.  1650.  1654m +2°2' Déc. 7 17,47 10,6 25 17,27 13,4 26 17,51 11,7 27 17,51 13,5 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,44 10,51 20 17,51 11,7 21 13,4 22 138,27 20, 24 38,27 20, 25 38,39 20, 27 33,01 45,5 Moyenne 33,00 44.7  LALANDE 5315. Mai 24 38,30 18, 24 38,30 18, 25 17,27 3,39 28,5 Déc. 26 52°,62 15",2 27 52,73 14,5 Déc. 26 52°,62 15",2 28,44 10,01 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 20 17,48 12,5 Déc. 26 52°,62 15",2 21 18,50 12,50	WEIGHT 1 587.	15 30,15 28,1	Nov. 16 3°,22 Déc. 7 3,14 27",8	Moyenne 50,26 39,3	2 19 38,41 19,8 20 38,44 20,3 22 38,40 18,9
Moyenne 58,09 41,0 Déc. 7 17,47 10,6. 25 17,27 13,4 26 17,51 11,7 26 17,51 13,5 Déc. 26 52,62 15",2 29 17,48 12,5 Déc. 26 52,73 14,5 Déc. 26 17,51 13,5 29 17,48 12,5 Déc. 26 52,73 14,5 Déc. 26 17,51 14,5 26 17,51 14,5 Déc. 26 52,73 14,5 Déc. 26 52,73 14,5 Déc. 26 52,73 14,5 Déc. 26 38,40 19, Moyenne 33,00 44.7 Moyen	Nov. 15 57 <sup>3</sup> ,96 42",4	α Poissons.	26 3,21 25,1 27 3,39 28,5	2h39m +9°35	24 38,27 20,4 5' Mars 1 38,46 19,9 2 38,39 20,6
26 17,51 11,7 2 2 8 49 5	Moyenne 58,09 41,0	-[Nov. 100 17-,43 9",9	Moyenne 3,22 26,1 WEISSE, II, 130.	27 33,01 45,5 Moyenne 33,00 44-7	6 38,40 19,9 8 38,28 20,2
Nov. 5 52,99 35,4 Moyenne 17,44 11,9 Moyenne 52,67 14,8 Déc. 27 6,31 3",5 9 38,39 19		26 17,51 11,7 27 17,51 13,5	Déc. 26 528,62 15",3	2h44m -23°39	14 38,41 20,1 Mai 24 38,30 18,2 9 Juin 8 38,42 19,6

Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1er Janvier de cette année.

-			_									
a Persée (suite).	LALANDE 7576.		- A	NONYME.		α	TAU	REAU (SE	uite).	6o E	RIDAN (St	nite)
								·			aidan (st	nic).
3h13m +490191					-22°7'			4h27m	+160121		4143ш	-160281
	Déc. 26 43°,42 16",8	Févr.		18°,64		Août	10	195,04		Févr. 23	263,16	
23 38,49 19,2	27 43,55		17	18,63	46,3			18,97		2.5	25,97	57",7
uill. 10 38,53 22,4	Moyenne 43,48 16,8		19	18,61	47,2 42,6	Déc.	27 26		6,7 $8,2$	26	_'JJ	56,2
11 38,49 20,1			23	18,70	40,0		27	19,12		27		55,9
12 38,64 19,1	Lalande 7645.	Moy	enn	e 18,61	44,7	Moy		e 19,02		Moyen	ne 26,06	56,3
Moyenne 38,41 20,2	3458m -21051'				•			3.	**	1		
A	Déc. 26 38 <sup>s</sup> ,50		ε .	LAUREAU	•		A:	NONYME.		Lat	ANDE 93	94.
Анончие.	27 38,35 54,0			4h19m	418°50′			4h36m	-2/035/		4 <sup>h</sup> 51 <sup>m</sup>	-220151
3h38m -22031	Movenne 38,42 54,0	Févr.		51°,61				428,92		Févr.	41°,89	18",7
léc. 26 215,91 37",2	220,01110 00,42 04,0		20	51,74	32,2		9	43,24	23,6	1		
27 21,84 33,1	ANONYME.		22	51,67	31,4		17	1 110		2.		
Moyenne 21,87 35,1			23	51,65	32,6		19		2.7	2.		
T	4hom -22°4′		24		32,2 32,0		23	42,97 43,01	23,2	2(	41,41	14,7
	Févr. 9 115,69 31",2			51,81	31,7			42,99	26,4	2 7	41,82	15,4
3h40m +10°40'	17 11,93 30,8	Mov		e 51,72			26	43,10	24,8	Moyen	ne 41,73	15,4
évr. 19 2°,82 36",0	20 11,88 30,1			′/	,-	Moy	renn	e 43,01	24,6			
20 3,01 37,0 21 3,02 35,5	Moyenne 11,79 30,8	}	α	TAUREAU	r.			***		J'IAZ	zı, IV , :	289.
23 3,00 37,7	moyenne 11,79 30,0			/ h m			59	ERIDAN	•		4556m	-26°29′
26 3,00 36,8	Anonyme.			4h27m				4641m	-16°35′	Févr. 27		34",3
Moyenne 2,97 36,6				188,90	7",7 5,8	Févr.		47°,70		28		31,4
	4h2m -21055'		9	19,01	9,1		28	47.89	54",6	Mars		32,9
ANONYME.	Déc. 26 158,51 42",7		19	18,90	7,4	Mars	1	47,73			3,92 $3,91$	32,4 26,5
3141m -22°21			20	19,01	6,3		5	47,61 47,64	5 <sub>7,2</sub> 5 <sub>7,8</sub>		3,88	29,3
béc. 26 34°,05 32",5	Moyenne 15,71 42,3		23	18,94	$\frac{9.9}{6.7}$	Mov		e 47,71		Moyen	-	31,1
27 34,22 29,3	LALANDE 8033.		24	18,98	6,3	lizoy	CIIII	- 4/1/1	33,0	inoyen	ne 5,91	31,1
Moyenne 34,13 31,0	Danambe 0000.		26	19,02	5,0	]	Lala	NDE 90	79-	Pias	zı, IV, 3	07.
LALANDE 7298.	4hgm -22°31'		<sup>2</sup> 7	19,07	6,4			/ L / m	C= C1		/ I. F	c .
	Févr. 9 248,42 40",2	Mars		19,14	8,1 8,3	127			-16°26′	C/ -	4659m -	
3h48m -22°0'		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2	19,02	8,3	Fevr.		53*,50 53,51	9",6	revr. 2	10°,93	
éc. 26 485,78 55",6	19 24,16 41,1		5	19,00	8,0		9	53,37	9,0	Mars		34,2
27 48,73	23 24,41 37,3	Avril	30	19,10		į	19	53,39	7,4	:	11,04	32,0
Moyenne 48,75 55,6	24 24,33 41,0	TATI	11	18,96			20	/ *	C		10,87	31,6
LALANDE 7311.	Moyenne 24,35 40,4		14	19,12	10,0		23	53,56 53,52	6,2	Moyen	ne 10,92	33,0
			23	18,96	7,3		26	53,31			C	
$3^{h} + 9^{m} - 22^{n}2'$	ANONYME.	Juin	25	19,03	6,5			53,60			COCHER	
éc. 26 63,02 27 5,93 27",4	4h10m -25°11'			19,01	6,7 5,7	Moy	enn	e 53,46	8,5		5h5m	+45°50′
Moyenne 5,97 27,4	Déc. 27 465,50 24",0	Juill.	2	18,98	6,7					Févr. 2		
3,9/ 2/,4	12,000,41,0		5	19,01			00	ERIDAN	•	1.3		24",6
ANONYME.	Anonyme.		10	19,14	E 3			4143m .	-160281		36,94	23,5
31.54m -21.055'	4h14m -2505'		12	18,79	7,2 7,3	Févr.		26°,06		17	·) ~	24,0
		Août		19,14	5,0			26,17		20	0 4	
27 25,33 13,8	Déc. 26 27*,64 21",4 27 27,92 18,9		4	19,15	6,0		17	15		2:	37,08	
Moyenne 25,34 12,0			78	18,94 18,96	7,3 5,6		19		55",3	23		22,1
3,54,53,51				10,90	3,0		20	20,04	33 ,3	2.	37,01	23,9

				1												1			
α	Coc	HER (SU	ite).		3 OB	ion (sui	ite).	B	TAU	REAU (SU	ite).	A	LNON	YME (sui	ite).	A	NON	ME (sui	ite.)
		Chem	. / /			PL m	0- 1			ri. cm	0° 01			PL m	C- FO!			·	
			+45°50′				-8022'			5h16m +		ł.		5h21m -					-21010
Févr.	27 28	36,86	22",6	Mars			45",9	Mars	13	48°,54 48,74	28,0	Févr.		45,13		Févr.	6	33°,51	
Mars	20 I	36,95 36,93	23,0 23,7		7 8	19,71	406		14	48,83	20,0		24	45,29 44,93	43,8 39,8		78	33,55 33,62	14,8
	2	36,96	23,8			19,89		Avril		48,62	29,1			45,11	43,8			33,70	12,2
	5	37,00	21,6		9 13	19,75	50,0		14	48,68	30,3	TAT	•			7.5	_		
	6	37,00	21,9		14	19,81			19	48,72		moy	renne	e 45,14	42,7	Moy	enne	33,60	14,0
	8	36,99	23,0	A!1	15	19,78	48,7	35.	25	48,64	29,5 28,0		03	Lièvre		1	A V A 70	DE 106	01
	9	37,13 36,80	22,2	Avril	19	19,82	43,8 46,5	Mai	4	48,90	28,7					1			
	13	37,03	19,9		25	19,88	46,1		12	48,79	28.8			5 <sup>h</sup> 21 <sup>m</sup> -	-200521			5հ3լա.	-200421
	14	36,89	19,0	Juin	29	19,85			18	48,80	28,4	Févr.	28	498,00		Mars	1	495,73	57",3
	15	37,01		Juill.			47,2	Juill.	3	48,73	20,8	Mars	I	49,04			2	49,95	51,8
Avril	11	36,88 36,98	21,5		4	19,87	48,2 48,3		4 5	48,68 48,70	30,5		5	49,10			5 6	49,80	58,8 51,0
	25	36,99	23,4		10	19,78	48,1		10	48,86	28,0		6	49,19	6o",3			49,75	52,7
Juill.	2	37,04	21,2		11	19,78	45,5		11	48,73	27,7		7 8	49,17		1	78	49,98	50,9
	3	37,01	21,7		12	19,80	47.7		12	48,71	27,2			49,25			9	49,96	52,8
	5	37,04	22,8		13	19,77	100		13	48,78 48,69	26,8		9	49,17	58,9	Moy	enne	49,84	53,6
	10	36,96 $37,26$	22,1		14	19,66	48,8 47,3		14	48,65	27,1		14	48,97	60,9 63,5				
	11	37,07	22,4		21	19,78	48,5		20	48,76	27,3	71.5				L	ALAD	TDE 108	53.
	12	37,23	21,2		22	19,73	48,4		21	48,91	27,2	Moy	enn	e 49,10	60,5			ELOCB.	-20°13'
	13	37,19	19,8	Août		19,76	49,1		22	48,90	28,9		* 0	Lièvre		n.			_
	14	3 <sub>7</sub> ,0 <sub>2</sub> 36,85	19,8		4	19.78	48,9	Août	24	48,81 48,68	06/		10	LIEVEE.	•	Fevr.	18	73,30	47",4 50,6
	17	36,98	21,8		8	19,88	44,4 45,5	Aout	4	48,71	28,3			5h24m -	-20°58′		19	7,30	45,2
i	20	37,11	21,6		24	19,84	47,I		7	48,80		Févr.	28	428,30	44",2		20		7072
	21	37,10	21,8		27	19,85	47,1		8	48,76	28,5	Mars	I	42,42	47,2		22	7,42	
	22	37,13		Sept.	7.	19,66	42,7		24	48,87	26,5		2	42,48	43,6		23	7,45	
Août	3	37,19	21,2 20,1	Moy	enne	19,79	47,5	Sept.	27	48,77 48,84	26,8 33,3		5 6	42,57 42,50	43,3		24 26	7,42	48,7
		37,23	20,1					Schr	9	48,89	30,0		7	42,53	43,2		27	7,35	40,7
	7 8	37,21	21,3		BI	'AUREAU	ī.	Mar		e 48,74	28,6		8	42,54	42,5	Mov		7,38	/80
	27	37,25	20,2						enn	e 40,74	20,0		9	42,52	41,7	Moy	enne	7,30	40,0
Moy	enne	37,04	21,9				1280281		A	NONYME.		Moy	enn	e 42,48	43,5	L	ALAN	DE 108	79.
			,5	Févr.			26",7												
	B	ORION.			9	48,76	28,9	E4		5h19m -			44	t ORION		F3.			-20° 15′
					17	48,61	29,9	Févr. Mars		585,06	64",7			56281	n -600!	Févr.		53°,42 53,40	
		5h7m	-81221		19	48,68	29,9	Mars	2	58,28	00,9	Févr.				Mars	27	53,38	40,6 42,9
Févr.	4	19,78			20	48,71	31,3		5	58,31			19	5,57	51,1		7	53,33	46,7
1	9	19,78	46,5		22	48,68	30,7		6	58,38	J'		20	5,82	49,5		8	53,53	44,2
	14	19,73	47,7		23 24	48,70	28,9 27,6		78	58,31	58,4		26	5,86			٠.	53,60	41,2
	10	19,82	48.4		26	48,66	28,8		8	58,33 58,41			27	5,85	47,3	Moy	enne	53,44	43,9
1	20		48,3		27	48,77	29,4			0-		Moy	enn	e 5,78	48,5				
		19,79	45,1		28	48,60	28,1	Moy	enn	e 58,27	60,9		Α.	CONFIE	•	L	ALAN	DE 109	22.
	23			Mars		48,70			Λ.	NONYME.				NONYME.				5638m	-20°11
1	24	19,77	48,1 49:4			48,64	30,7							5h28m -	-21010	Férr	/-	0,91	-20011
	28	19,78	49:+			48,75				5h21m .	-16°58′	Févr.	28	33*,40	τ6".3	LEAL.	19	0,96	
Mars			48,8		7	48,70	30,3	Févr.		45,08		Mars	I	33,63	18,8		20	1,02	45",0
	2	19,78	48,7		8	48,74	28,7			45,09				33,76			22	0,83	47,6
1	5	19,94	45,5		9	48,74	27,5	ŧ	23	45,37	4494	1	5	33,59	15,6	1	23	1,03	49,3

121
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1er Janvier de cette année.

				_									_						
LALA	NDE	10922 (	suite).	α	ORI	on (suit	te).	L	AT.ANI	DE 1123	31.		An	ONYME.		A	ION	кме (sui	te).
	Ę	5h38m -	-20011			5h47m	+70221		5	5h48m -	190441			5458m -	32010			6h11m +	22029
évr.		18,10		Févr.		35,12	-	Mars	2		10",4	Mars	6	45,60	20",7			225,24	-
_	26	0,87			24	3,02	26,1		5	.0,19	8,9		7	45,70	20,5		7	22,19	40,5
_	27	0,97	1 - C	Mana	27	3,25	25,7	3.5	6	0,01	13,5		8	45,96 45,70	18,4	Moye	nne	22,22	39,6
Moy	enne	0,95	47,0	Mars	13	3,23				0,09	10,9		13	45,92	20,6		C	ÉMEAUX.	
	AN	ONYME.			14	3,09	26,2		An	ONYME.		Mov							
		FL/ m			15	3,11	25,7			5 <sup>h</sup> 51 <sup>m</sup> -		1		401/0				6h13m 1	
f	c		+26°0′	Avril	28	3,05	a= 6	Mana		13°,91			ALAN	те 116	77.		22 23	53°,18 52,98	3",9 3,5
lars	7	28,91	15,4	AVIII	II	3,13	27,6	Mars	2	14,13	19,5			Cl. om	0551		24	53,03	3,9
	ś	29,06	15,5		19	3,02	24,1		5	14,21	0	3	,	6tom .	-19,22,	d.	26	52,86	4,1
	9	28,94	17,1		25	3,13	24,9		6	13,92	21,2	revr.	18	24 <sup>8</sup> ,33 24,43	36".0		27.		6,8
	13			Mai	3	3,08	24,9		7	14,22	23,9		23	24,64	35,4	Moye	nne	53,03	4,4
Moy	enne	29,01	16,4		14	3,07	26,8 24,9	Mov	-		21,0		24	24,6c	37,1				
L	ALAN	DE 110	5a.		18	3,15	25,6	Intoy	CHILL		21,0	1	26 27	24,27	37,1			NONYME.	
					19	3,01	28,0	L	ALAN	TDE 113	76.		28	24.53	` '			6416m	
l.			-2004		2I 25	2,91 3,10	27,9			5 <sup>h</sup> 52 <sup>m</sup> -	-20010	Mars	1	24,46		Mars		29°,70	
evr.	18	42°,06 42,08	50",0	Juill.		2,98	27,1	Févr.			58",2			24,48	37,0		6	29,95 29,97	33,3
	19		52,0	3 4411.	10	3,03	25,3		18	0,87	56,3						7	30,05	33,7
	20	42,30	,0		12	3,03	26,8		19	0,65	59,3			NONYME.			9	29,92	32,4
	22	42,45			14	3,00	25,8		20	0,96	55,4 57,4	-		6h 1m	-10°45′	Moy	enne	e 29,92	32,9
	23	42,32			17	2,84	26,9		23	0,84	60,9	Févr.	19	378,17	23",6	1		NONYME.	
	27	42,05			20	3,12	27,1		24	0,91	57,3		20	37,14	21,3				
	28	42,16	50,7		22	3,05	27,5		27	0,92	57,4		22	37,27					+220321
lars		42,29	53,2		24 30	3,07	26,0 23,8	Moy	enne	0,87	57,8	1	23	37,24 37,20		Févr.	<sup>27</sup> <sub>28</sub>	30°,42 30,43	0",8
	-	42,38	48,6	Août		2,93	26,2		Ar	NONYME.		i	26	37,05		Mars		30,47	0,9
Moy	enne	42,24	50,9	.200	17	3,16	20,2						27	37,17			8	30.40	1,9
	An	ONYME.			18	3,13				5h55m			28 I	36,97 36,99	25,3 25,0			30,47	
					19	3,11	26,9 26,3	Mars	. 2	7,60	31",9	Mais	2	37,25	20,1	Moy	enn	e 30,44	1,3
1.			-2008/		21	3,00	23,3		5	7,67	28,5	1	5	37,35	21,9		A	NONYME.	
evr.	18	40°,21 40,35	5",6		22	3,05	24,7		6	7,46	30,9	Mo	venn	e 37,16	23,1				
Į.	22	40,57	7,4 8, <sub>7</sub>		24	3,16	24,9		78	7,7° 7,58	28,3					Mone		57°,51	+22°10′ 3″,8
1	23	40,44	7,2	Sept.	27	2,98	25,9	Mon		7,58	30,0		A	NONYME		Mais	8	57.54	2,1
l	24	40,39	10,0	Septi	· ,	2,90	25,9	Moy	enne	7,50	30,0			6h10m	122021	F	9	57,60	8,1
1	-	40,35	12,1	Mo	yenne	3,07	26,₁		A:	NONYME		Marc		43°,66					
Moy	enne	2 40,38	8,5							5655m	-20°1		9	43,68		Į	14		
	α	ORION.			LALAT	VDE 112	212.	Févr.	4	475,36			13	43,74	36,0	Moy	enn	e 57,51	5,3
1									18	47,13	34,6	Mo	yenn	e 43,69	33,1		A	NONYME	
			+7022				-19040	7	19	47,22						-			+22016
èvr.		35,15	27",2		. 28	28,12	24",9		20	47,25	28,9 30,8		A	NONYME	•	Férr		278,22	
	9	3,18	28,2	Mars	SI	28,31	24,9		23	47,40				űh 1 I m	+22020				
	18	3,00			5	28,34 28,31			24	47,44	32,3	Févr		225,21			2	27,52	3,7
5	19	2,99	24,6		6	28,15			26		32,2	Mars	1	22,10	40,6		5		2,5
	20	3,06	. 4.14	Ma	*****			Ma	27	47,46			2 5			Ma		37	
	-2	3,00	20,0	1 TATO	yenn	e 28,31	24,9	INTO	yenn	e 47,31	31,9	1	5	22,30	40,5	DIO:	enn	ne 27,36	3,4

		Sittons	J		_				_										
	. 6			~ GB	AND	CHIEN (	suite).	Lala	NDE '	13316 (	suite).	An	ONY	ME (suite	e.)	An	ONYM	re (suite	:).
										6h45m -			6	5h49 <sup>m</sup> -:	21050		(	5657m -	-22°5′
	6	6h29m +	16°31′		(	5h38m -	-16°30′	2.5		0.45	-2207	Mare	2	10,70	56".1	Févr. 2	4 3	78,72 4	011,0
Févr.	22	2°,67 1	6",7	Juill.	10	32,13	50,8	Mars	I 2	34,41	38.4	Mars	5	10,70	55,5	5	6	37,29	40,6
		2,70				32,13 $32,35$	51,2			34,27	37,3	Move	nne	10,62	56.3			37,68	
	24	2,49	16,3		29	32,04	50,5			34,25		nizog		30,02	,	Moye	nne :	37,54	40,5
	27	2.67	14.8		30	32,12	51,5					L	ALAN	DE 1351	10.				
Moy	enne	2,62	16,5	Aout	+	32,27 $32,29$	53,2 50,3		Az	NONYME.				6h50m	_2200/	L	LANE	E 1377	3.
					7 8	32,33	51,0			6b46m	-22°1'	F2 (	,	52°,85	20" 0		6	5h58m	
		ONYME.			10		47,2	Févr.	4	1°,37	23",0	revr.	18	53,00	25,1	Mars			
		6°30°	+22001		17	32,20			19	1,37	24,0	ļ.	19	52,92	29,9	Mars		23,67	
Mars		120 0	, J		18	32,16 $32,20$	40.0		22		,		23				8	23,84	
Mais	2	4,00			24	32,26	53,8		23 24	1,49			24	52,83 52,84	30,3 28,8		9	23,73	
	5	3,79	C ()	Sept.	1	32,22	50,1			1,27	24,3			53,05			-	23,67	_
	6_		26",8			32,21 $32,30$	50,3 51,3	Mov		e 1,42		Mor		52,93	_	Moye	enne	23,68	
Moy	enne	3,80	26,8			32,19		1											
	Ax	ONYME.		Moy		e 32,22			_ A:	NONYME.		L	ALAN	TDE 136:	20.		AN	ONYME.	
			,							6h47m	-2208	1	(	5h53m -	21054			7 <sup>b</sup> 0 <sup>m</sup> -	21047
		6h30m			A	NONYME	•	Févr.	4	34°,84		Févr.	4	56°,79	47"19	Févr.	27	11°,35	10",7
Mars	7	29 <sup>s</sup> ,18 29,28	42"14			6h41m	-2200		18	35,10	46",1		18	56,97	45,9		28	11,20	13,0
	0	29,27	47,6	Févr.	26	25,79	29",9		19	35,15 35,15	/53			57,10	46,8	Mars	1 2	11,05	
	13		47,4	26		25,96	29,0		23	35,07	43,3		23					11,24	9,9
1	14	29,19	47,5	Mars		25,84 26,03				34,91		1	26			Man		11,25	_
Moy	enne	29,25	45,8			25,98			26				27	57,00		Moh	anne	11,23	111/
				Mov			32,8			34,96			8				AN	ONYME.	_
0	z GR	AND CHI	EN.	1				Mo	yenn	e 35,00	47,2								
	(	5h38 <sup>m</sup> -	-160301	]	LALA	NDE 13	168.		A	NONYME.			13	56,83					-21054
Févr.						$6^{h}41^{m}$	-21044			Ch/Om	/	, Mo	yenn	e 56,96	47,1	Mars		13°,88	6",3
	18	0 1	0 13	Mars	6	545,13	38",9	3.5		6548m -	-21041						13	13,91	7,9 7,0
	19	32,29 $32,15$	48,8		7	54,20	39,4	Mars	7 8	225,46	6,6		Α	NONYME	•	Men	op n	13.88	7,1
	20	32,28				per p	$\frac{4^{2},9}{4^{3}}$		9	22,41	7,3			6h54m	-21045	Mol	enne	13,00	/7"
	23	32,17	49,3		13	54,1	38,9			ne 22,47			. 27	418,40	30",0		AN	ONYME.	
	24	32,16		310		ne 54,18		- 1		·			28	41,35	32,0				
	26 27	32,01							A	NONYME	•	Mars	I	41,43	31,3				-21°43′
	28	- '					ε.			6h48m	-21041	7		41,71		- Muss		158,23	
Mars		32,27	48,0			6h45m	-21046	6' Mar	s 6	48°,81	6",6	Mo	yeni	ne 41,47	30,9			15,46	
	2 5	32,28 32,24			s 8	95,0	6 17",1		7	48,88	3			NONTME		Mog	enne	15,34	51,6
	6	32,24	113	1	0	8,9	2 16,1			3 48,93	5						Line	ILLE 26	55
	7	32,20			13	8,9	1 18,3		, T	48,9	3,5	;		6 <sup>h</sup> 57 <sup>m</sup>	-22°21	1	L:ACA	ILLE 20	33.
	8	2	49,2	M	oyen	ne 8,9	6 17,2	AT.		ne 48,9		-16/	r. 18	35,37	7 17,0			7 <sup>6</sup> 6m	-2705
	13				Lav	ANDE 13	3316	141.0	Jy en	110 40,9	, ,,,					Mars	7	2°,87	
	14				LAL				1	ANONYMI	Ξ.		1	ANONYMI	E.		8	3,01	11",7
Avr	il II	32,20	49,0				m -220			6h49m	-21°50	0'		6h57	m -22°5	5/	13	2,95	
Mai		_			21	34.3	6 37",3	Fév	r. 28	B 105,48	3 58",0	Fév	r. 3	1 3-55	/ 38" 6			3,21	
Inil	1. 5				28	34,0	8 38,	Mar	s I	10,5	55,8	3	2.	37,4	6 39,1	Mo	yenn	e 3,01	11,6
*1 (TII	I. J	32911	4915	, '		- 41	,												

														_		_		
														-				
	ANONYME			A	NONYME.		a <sup>2</sup>	GÉN	IEAUX (S	uite).	αP	ETIT	CHIEN (	suite).	BG	èéme	EAUX (SI	nite).
		2/	1		h / m	. (0.12)			h Em	12-01			-h2 -m	150201			1.20	. 00 1
	,	+22013			7114m -		1			+320121	}			+5°36′			,	+28022'
Févr.	23 35°,3° 24 35,26		Mars	7	38,96	21",2	Août	78		44",5	Aout	7	26°,83		Juill.	24 30	7,73	57",4 58,2
		3 17,3		A	NONYME.			14	1,12	40,0		14	27,01	14,3	Août		7,86	58,9
Mars								24	1,47	40,8		18	26,88			14	7,78	00,9
Mov	renne 35,22				7h 15m -	23°55′	Sept.	1	1,31			24	26,93	18,0		18	7,66	
	,	,	Févr		53°,99	00		3	1,29	42,9		25	26,97	19,6		24	7,89	58,4
	Апонти	٤.		24	53,90 53,96	8",8		4	1,35	44,2	Sept.	<sup>2</sup> 7	27,06	19,4		25 27	7,78	58,8 57,1
	716m	+22024	Mars	27	53,73	7,4		5	1,38	41,9	ocpt.	2	26,85			I	7,85	59,8
Févr.		47",4			e 53,90	9,1		7	1,10	42,0		3	26,85	17,1	•	2	7.74	58,0
	28 38,40		1110	Jerrit	00,90	31.		10	1,38	38,7		4	26,86	18,4		3	7,83	62,5
Mars				LAGA	ILLE 279	)2.		11	1,38	38,0 39,6		5	26,90 26,83	17,6		4	7,79	61,6
	5 38,30				l.	1.000		13	1,22	42,9		10	26,90	19,1		7	7,85	61,0
Moy	renne 38,30	44,6	3.6		7"19m -		Mov	enn	1,28	41,8		11	26,87	18,9		10	7,78	58,5
	LACAILLE 26	666.	Mars	5	128,19				, "	• ′		12	26,82	17,2		II	7,82	62,8
				6	12,26	26,3		z Pe	тіт Сні	EN.		13	26,90	17,3	4	13	7,73 7,80	58,8
		n -27°61		7	12,27	25,2			ab2 v m	+5°36′	Moy	enne	26,86	17,9		-		
Mars		11",2		8	12,32	28,8	Fávn	1	268,94						Moye	enne	7,78	60,2
	8 33,91			9	12,24	32,0	L CVI.	9	26,96	17,0		B G	ÉMEAUX			A .		
	9 33,77	0.7	Mo	yenn	e 12,24	28,2		18	26,98	16,9			LDC			Al	NONYME	
Mos	renne 33,90				GÉMEAUX			19	26,94		F1.		7636m -				7h39m	-21010/
1,10	ciiic 55,90	10,4		X- 1	GEMESUA			20	26,54	17,1	Févr.			58,1	Févr.		56°,55	
	ANONYME				7125m -	+32012'		22	26,89			9	7,83	59,3		20	56,54	56,4
	7 <sup>h</sup> IO <sup>m</sup>	-230491	Févr.	. 18	1°,43	41",5		24	26,81	17,7		20	7,82	09,0	6	22	56,68	58,5
Févr.	4 32°,41	40".3		19	1,35	42,3		26	26,71	17,9		22	7,78	61,3		23 26	56,71 $56,52$	55,6 55,2
	19 32,53			22	1,35	38,6 43,3		<sup>27</sup> <sub>28</sub>	26,87 26,66	20,9		23	7,71	61,4	1	27	56,52	
	24 32,5			24	1,19	40,4	Mars	20	26,84	17,4	ĺ	24	7,73	59,3 58,9		- 1		
	26 32,35	, ,		20	1,32	43,9	, in the same of	2	26,91	19,0		27	7,75	63,1	hioye	me	56,59	56,6
	27 32,5 28 32,4;			27	1,31	42,3		5	26,86	15,4	25	28	7.77	62,9		A	NONYME	
Mor	enne 32,48		Mon-	28	1,27	38,0		6	26,97	17,6	Mars	I	7,79	59,8		73.	TONTHE	
Lizoy	- Carro - O 2946	9291	Mars	1 2	1,24	43,3		7 8	26,89 26,90	14,7		5	7,92 7,83	61,9 58,8			7h41m	-30010'
	LACAILLE 2	698.		5	1,36	40,0		9	26,79	17,4		6	7,78	58,0	Mars	5	40°,04	56",2
	7h10m	-24°53′		6	1,28	41,6		13	27,05			7	7,87	59,6		6	39,78	52,4
Mars	,	43",0		78	1,31	40,8		22	26,82			8	7,80	60,9		7	39,93	
T.Zar S	5 38,36			9	1,46	40,0		28 30	26,83 26,87			9	7,74	60,6 60,5		8	39,94	53, <sub>7</sub> 51, <sub>9</sub>
	6 37,9	42,6		13	1,35	41,2	Avril		26,82	18,0		22	7,73	00,3		13	39,97 39,85	54,3
1	7 38,17			22	1,33	• /		8	26,95	20,6		28	7:77		Mary		39,92	53,8
	8 38,00	43,8		28	1,23			11	26,80	18,2	A	30	7,77 7,63	C	Blogi	HILL	. 59,92	33,0
Mar	g 30,0.	/3 -	Avri	30	1,13	41,2	Mai	19	26,79 26,81	19,8	Avril		7.77	60,1		A	NONYME	
1			ZEVET	8	1,44	41,2	Mai	18	26,85	19,3		11	7,84 7,66	60,8 60,4				
	d Gémeau	x.		11	1,04	43,9		19	26,83	18,2	Mai	15	7,77	62,6				-30011
	7h I I m	+22015		19	1,36	43,4		21	26,92	20,4		18	7,78	61,8	Févr.		275,98	8",1
Févr.	22 9°,60	11".8	Mai		1,25	43,6	Turing	25	26,74			19	7,75	59,8		26	27,64	2,4
	23 9,4	7 11,9		18 25	1,25	44,7 44,9	Juin	9	26,88 26,73	18,1		21 25	7.77	61,5	Mare	27	27,92	3,7
Mars	13 9,5		Juin	Q	1,20	40,8	Juill.		26,65		Juin	9	7,81	61,9	Mars	2	27,86	3,1
Moy	enne 9,5	3 11,7		10	1,27	40,4		30		3'		10	7,76	57,7		5	28,01	272

Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1er Janvier de cette année.

					, ,			A				۸				Ano		
A:	NONYME (sui												NONYME.	-			NYME.	0. 1
D7	7h43m -				1154m -					60" 3			8h <sub>1</sub> 5m -			2	8h <sub>2</sub> 5m 8s,29	-25°2′
Mars	6 28°,04 7 27,87		Mars	9	2,10	43,8	revi.	26	41,67	62,8	Mars	13	38 <sup>5</sup> ,8 <sub>7</sub> 38,8 <sub>1</sub>	17,9	Mais	5	8,09	6",7
Moy	enne 27,92	3,9		9 3 -	2,07		Mars		41,53	57,6 56,9	Moy	enn	e 38,84	18,1		6	7,9 <sup>2</sup> 8.04	6,3
	φ GÉMEAUX.		Moye	nne	2,15	41,1	Mov		41,60			Aı	NONYME.			8	8,12	
	*		В	. A.	C. 267	5.	2.203	~~~~	42,00	0314			8h <sub>1</sub> 8m -	22040		9	7,9° 8,15	1,5 3,3
Avril	7 <sup>h</sup> 44 <sup>m</sup> - 19 18 <sup>s</sup> ,37	55".5			7 <sup>b</sup> 54 <sup>m</sup>			Ar	ONYME.			13	23°,50	16",6		nne	8,07	4,4
		,,,	Févr. 2	23 . 26	55°,46 55,23	9",7			8h7m	-21°53′			23,56			AN	ONYME.	
	Anonyme.		3.7	27	55,38	9,3	Févr.	27	115.05		Moy		e 23,53					20.01
	7h45m -		Mars	2.	55,5 <sub>7</sub> 55,5 <sub>5</sub>	7,9 9,9	Mars	5	11,33	25",2		A	NONYME.		Fávr		<sup>36</sup> 27 <sup>m</sup> - 53 <sup>8</sup> ,93	_
Mars	8 26°,46 9 26,45			5	55,40	11,1		6	10,88	. ,		,	$8^{\mu}$ 1 $0^{m}$	-2307		27	54,19	50,7
	13 26,27	16,5	Moye	nne	55,43	10,0	Moy	enne	11,12	27,0	Mars	2 5	41°,32 41,33	14",7	Mars	28	54,17	50,1 47,6
Moy	renne 26,39				LLE 315			A :	NONYME.				41,10	12,5		2	54,20	49,1
	Anonyme.		3.5	. 7	7h58m -	250161						7 8	41,28	14,1	Moye	enne	54,16	49,6
	746m -	-31015/	Mars	7	14,27	42,1				-22046	1	9	41,36	9.9		An	ONYME.	
Mars	8 5°,50 9 5,45	17",3		8	14,34	3493	Mars	5	40°,34 40,32	5",9	Mog	enn	e 41,29	13,1		5	Sh3om .	18029
	9 5,45					40,0			40,18		1	ALA	NDE 166	49.	Mars	5	215,57	26",8
Moy	yenne 5,49	16,2	Moye	nne	14,32	39,1		8	40,19	6,2			$8^{\ln_20^{n_i}}$			6	21,60	28,5 27,9
	Anony we.			AN	ONYME.				40,30		Févr.		28 <sup>5</sup> ,09			8	21,63	27,6
	7149m -	-24053			8 <sup>h</sup> 1 <sup>m</sup> -	-25°22′	Mo	yenn	e 40,26	4,6		27	27,68	43,2	Max	9	21,64	
Mars		22",2	Mars	6	495,64	55",2	1	ALA	NDE 16	381.	Mars	28						
	2 23,04 5 23,20	17,8		8	49,84	56,2			Sha Sm	_0.2050	Mo	venn	e 27,82	42,9		AN	ONYME.	_
	6 23,07	21,9		9	49,90	54,0 55.7	Févr.			31",0	1		NONT ME.					-340341
	8 23,14	0.0			49,78			23	35,09 34,75	31,4		23		-2302'	4	13	59°,55	10",8
7.	9 23,04	4.1	1		NONYME.			27	35,12	34,5	Mars	2	215,27		L	ALAN	DE 170	48.
Moż	yenne 23,09	19,0					Mars	28 5	35,11 35,06	38,1		5 6	21,39					-23021
	II Poure.				36°,83		1			33,5	-	7.	21,26		Fevr.	27	8,21	
	71.50m		Mars	4	36,96 36.08	P 11						8	21,31	2'2	Mana	28	8,0t	
Févr.	. 19 24 <sup>s</sup> ,52		112000	2	37,04	16,5				384.		13	21,38	27,0	Mars	2	8,28	39,5 37,8
	22 24,55	2,5	Mov		36,89 36,94	0.	-		8h13m	-22°53	/ Mo	yeni	ne 21,26	25,9	Moy	enn	8,20	40,1
	23 24,36 26 24,38	1,8	MOA				Févr	. 27	40°,58	3		A	NONYME			8	CANCER.	
1	27 24,60	1,1	-		NONYME.		Mar	SI	40,73	3 24",3			81124111					+180421
Mo	yenne 24,48	3,5	Mars		8h5m			5	40,68	3 23,4 7 24, <b>1</b>	Févi	. 23	40°,02 39,62	9",5	Févr. Mars	23	9,02	4",5 4,4
	ANONYME		Mars	8	9 <sup>s</sup> ,77 9,63	28,7		6	40,5	4 25,2		27	39,97	6,8		7	9,18	3,4
		-24°58	1	9	9,78	28,5		78	40,41			28 S 1	39,76	12,2		8	9,09	
Mars	$\frac{6}{7}$ $\frac{2^{5},18}{2,12}$	40,2	Moy				-	yenı	ne 40,5		- 1		ne 39,80		Moy	_		

125
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1er Janvier de cette année.

					_										• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- 40 000	e unnec	<u> </u>
1																		
	Ax	ONYME.		A:	NON	yme (sui	ite).	1	ACAI	11.LE 36	93.		A	NONYME.		αIJ	YDRE (S	nite).
		8436m .	-34012'			8447m .	-23°/3′			Oham	-26°9′			oh 15m	-2004		oha	om _800′
Mars			0",2	3				1		11°.83						Sept.		
					9	31,75	5,2	Mars		11,89		Mars	1	4,40	36,7	1	0 12,8	9 43,3
L	ALAN	DE 172	77.	Moye	enne	31,72	9,0		<b>2</b> 5	11,79			5	4,36 4,27	37,8	I I	1.0	7 38,8 3 46,3
	8	3h38 <sup>m</sup> -	-23014						6	11,95			6	4,27	37,7			1 43,5
řévr.			44",8		α (	CANCER.			7	11,85	50",5		7	4,56	39,1	Moyen	me 12,9	1 43,5
	<sup>27</sup> <sub>28</sub>		45,0 46,8			8h5om .	+12°26′		9	11,09	49,4	Moy	enn	e 4,32	38,1	LAI	ANDE 18	885.
Mars		6,49	42,3	Févr.	23	16°,63	7",6			12,04	51,9		Α.				_ 1, _ O	
	2		45,8			16,54 16,66	5,1	Moy	enne	11,90	50,5			NONYME,		Mons	· ·	$6 \frac{4'',8}{}$
Moy	enne	6,44	44,9	Avril			7,7 9,0		An	ONYME.				9h16m -	-22021	Mars 1	3  34,0	5 4,5
L	ACAI	LLE 35:	21.	Move	nne	16,59			231		-26°8′	Mars	9	27,23	43",2		6 34,1	7 6,8
						.0,09		Févr	28	9"4" 7*,05	-2000	Avril		27,18		1	8 33,8 1 34,0	
120-	6	518,94	-34041	L	ACAI	LLE 36		Mars	1	7,26	29",1			27,22			9 34,0	
lars	7	52,00	28",5		:	ora m	-24°15′		2	7,32	25,7	Moy	enn	e 27,18	41,6	Moyen	ne 34,0	6 6,2
	8	5.00		ļ					5 6	11.	31,5							
	9	51,95	31,7	Mars	o q	5,10	53,2		7	7,14	-/1-		OK.	HYDRE,			ANONYM	E.
Lvril		51,92	33,4		9 13	5,23	53,3	Moy	enne	7,22	28,5			9 <sup>h</sup> 20 <sup>1</sup>	n -8°0′		9 <sub>µ</sub> 32m	-22017
Moy	enne	51,94	31,2	Avril			53,0	T.	AT.AN	DE 182	50.			128,80	45",5	Mars 1	3 3°,5	7 32",3
				Moye	nne	5,10	54,4	~				Mars	1	12,93	40,7	Avril	6 - 3,5	4 28,2
L	ACAI	LLE 35:	25.		An	ONYME.		Mane		9"7" - 2°,55	-22°15′		5	12,87				6 32,2
		8h41m	-34°3′						0		17",4		6	12,83	41,1	Moven	ne 3,4	6 30,9
lars	6	26°,22	8",0				-240231		13	2,71	16,6		7	12,83	43,9 43,8	1.20 ) 01.	0,4	0 00,9
	78	26,38	9,8			22,71	13.1		11	2,50 2,84	20,9 16,7		9	12,90	, 0		ANONYM	E.
	9	26,41	31-			22,78			٠.	2,67			13		45,2	ţ	oh32m	-22025
	13	26,25	12,9	litoye	.11110	22,70	_	, i			,	Avril	28	12,85	45,7			9 14",9
		26,22			An	ONYME.			An	ОХУМЕ.			8	12,88				
Moy	enne	26,28	10,2			Sheem	'aFast			9 <sub>p8m</sub> -	-22°10'		14				o Lion	
£	ALAI	DE 174	61.	Mars	2	25°.65	-25°1'	Mars	1	13,08	41",6		17				O#33n	+10034
			~23°23′		6	25,58	58,7		5	13,06	42,2		19	12,91	40,6	Mai 1		4 15",5
lévr.		23°,87			78	25,82 25,53	59,8 56,3		6	12,85			23 30	12,86				4 17,1
	26	23,74	56,1				59,9		7		44,4	Mai	3	12,88	43,5	Juin 1		4 17,1
	<sup>27</sup> <sub>28</sub>		50,8		_	25,67	58,3	Moy	enne	13,02			18	12,78			ne 8,4	, ,,,
Mars		23,91	50,4 48,2	}		, ,	,						21	12,86	44,2	l'aby c.		10,0
Mov	enne	23,86	50,0	E	3. A	. C. 30g	96.			ONYME.		Juin	5	12,95	47,0		Anonym	K.
				}		8h56m	-24054'				-22019		9	12,96	42,0		0h35m	-22017
	Ar	NONYME.		Févr.	27	34,73	54".4	Mars	8	12,63	38",4 37,6	Juill.	4	12,95	45,6	Mars 1		
		8h47m .	-230431		28	34,63	54,3		13	12,78	40,0	,	6	13,08	45, <sub>7</sub> 45, <sub>2</sub>	Avril	6 59,0	3 4,8
	27.	318,81	13",5	Mars	8	34, <sub>7</sub> 8 34,85	49,2	Avril		12,51	41,2		14	13,20	40,3		8 59,0 1 59,0	
Mars	-	31,87 $31,72$	13,0		9	34,67			14	12,65	37,9	Sent	17	12,97	43,5	1	9 59,2	
	7	31,66	7,8 7,7	Mov		e 34,73	52,6	Mov	-	e 12,66	39,6	Sept.	3	12,95	43, <sub>2</sub> 45, <sub>3</sub>		ne 59,1	
			,,,	-		. , , _	,			, -	9,			.5	, ,		- 312	-,0

Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1er Janvier de cette année.

1	I an arms	60			ow (ouite	,	Con		0	(auita)		A				A ~		
L	Lalande 19			ot LI	on (suite	3).				` '		AN	ONYME.				ONYME.	
		-21°59'			10pOm -					+62°33′			11b4m +					+59°15′
Mai	rs 13 395,56 il 3 39,78	9",4	Mai	18,	225,68	54",7	Juill.		25°,60	38",2	Avril	3 5		5",9	Avril	19	29°,33	
AVI	6 39,58			25	22,72			4	25,55	36,4		6		5,9 6,7	Mai	3	29,04	25,1 24,1
	8 39,39	9,2		29	22,74	55,6		13	25,87	33,9		8	13,39	9,3			29,45	24,1
	11 39,54 19 39,62		Juin	. 4	22,70 22,65	54, <sub>7</sub> 52, <sub>7</sub>		16.	25,78 25,47	33,3 35,5	Moy	enne	e 13,53	6,9	Moy	enne	29,28	25,3
M	oyenne 39,58			9	22,65			19	25,47	36,5						A	ONYME.	
1	0,000	710	}	10 23	22,66	50,4		23	25,68	35,9		Ar	ONYME.			ALD ,	ONYME.	
	Anonyme			24	22,68	52,0 51,3		24 30	25,88 25,90	$\frac{3_{2},4}{33,8}$			11h7m -	48017				+59°1'
	9 <sup>h</sup> 46 <sup>m</sup>	-21°40'		27	22,64	53, <b>1</b>	}	31	25,84	34,9			08,44		Avril	5	125,74	58",5
Mar	s 13 525,42	0.2	Juill.	30	22,76 22,63	55,9 53,0	Août	3 5	25,88	35,4	Mai	3	<b>o</b> ,83	43,5		8	12,73	57,5 58,0
			Juni.	4	22,65	55,0		_	25,79	32,1	Moy	enn	e 0,63	43,3		14	12,80	58,2
	Anonyme	•	}	5	22,73	55,3	Moy	enne	25,71	35,6						19	12,78	
	9h47m	-21046		13	22,71	50,1 52,5		An	ONYME.			Ar	NONYME.		7.5	30	12,36	57,6
Avr	il 6 34*,56			17	22,85						1		Ilb7m	+51°27'	Moy	enne	12,07	58,0
	8 34,37	50,8		18	22,66	51,6		10	<sup>h</sup> 58 <sup>m</sup> +	190561	Avril	ь	25,98	21",4		Ar	ONYME.	
7.7	34,59			19 24	22,70	51,9 52,5	Avril	30	$49^{s},98$	27",2			25,90				-luom	15-02-1
IVA	oyenne 34,51	52,6		3 r	22,67	53,9						υ,	26,07		Awril		28 <sup>3</sup> ,74	+59°37′
	ANONYME		Oct.	8 15	22,78	48,6		AN	ONYME.		Moy	enne	e 25,98	19,8	Mai		28,54	43,1
	1 M m	200		16	22,64	52,4 50,8			10h58m	+20°6′		A	NONYME.			8	28,70	42,8
	9	-210361		17	22,69	49,2				12",6					Moy	enne	28,66	43,0
Avr	il 8 41°,50 11 41,58		Moy	enne	22,67	52,8							1h13m -			A		
M	oyenne 41,54			,	Lion.		W	EISS	E, X, 1	069.	Avril	14	318,31	31",0			ONYME.	
		, ,							roll 50m	+7°30′								+620271
	Anonyme				10 <sup>h</sup> 24 <sup>m</sup>		Avril		5,15		MIOY	enn	e 30,98	30,3	Avril	8	53,97	47,",7
	0h52m	-21°28'	Mai	18	54°,41	34",6		19	5,26	34,7		A:	NONYME.			14	53,95 54,25	47,0
Mar	9	24",3	Juin			31.9				31,7	1			. =	,			
Avı	il 6 4,99	24,1		9	54,68	32,3							11h17m		Muy	cunc	: 54,00	47,9
	8 4,66		Moy	yenn	e 54,58	33,4		An	ONYME.		AVFIL	14	45°,74	30",0		3	Lion.	
	19 4,89			Gr	ande Oi	TREE			ohsom	12205-1		A:	NONYME.			-	. l. / . m	1.500//
M	oyenne 4,81	24,2	α				Avril		29 <sup>5</sup> ,81				1619m		Awnil			+15°24'
					oh54m		14 1141	5	29,66	43,3	A				ZX VIII	6	24,32	32 ,0
	a Lion.		Avril	3	25,91	34",6		6	29,97	42,7	Mai	30	7°,85 7,54	°",7		8	24,21	2/6
	IO Om	+12041		5 6	25,42 25,73			8	29,70	42,5			e 7,70	1,6		14	24,27	34,6 35,4
Mai	rs 13 228,72			8	25,67	39,4	Moy	enne	29,78	42,6	11207	CHIL	7,70	- , ,		30	24,13	
	28 22,63	3		14	25,76 25,84	37,1			BRIDGE			A	NONYME.		Mai	3	23,99	32,5
Avi	6 22,65	53",6	1	30	25,54	38,6	0.0		DIVERSE	740.			1 <sup>h</sup> 22 <sup>m</sup>	16003.1		8	24,18	34,t 32,7
	8 22,40	51,8	Mai	8	25,81	36,2		1	11 <sup>h</sup> 3 <sup>m</sup> -	430391	Avril		47°,33			18	24,23	32,1
	11 22,64	W 00 0		18	25,83 25,72	34,0	1	14	26s,92	23",0		6	47,58	39,9		19	24,22	35,8
	30 22,68		Juin	<sup>2</sup> 9	25,72	36,7		30	26,88	14,3		8	47,39	45,4	Juin	29 4	24,29	34, <sub>7</sub> 35, <sub>1</sub>
Mai	3 22,66	56,4		9	25,62	34,8	Mai	-	26,96	20,8		14	47,72	38,7		Зо	24,27	35,0
1	8 22,65	53,r	1	10	25,53	36,7	May	enne	26,92	19,4	Moy	enne	e 47,50	41,2	Juill.	3	24,38	

127
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1er Janvier de cette année.

								1				1							
	ß Li	on (suit	te.)	v GR	ANDE	OURSE	(suite).	l A	NON	YME (SU	ite).		4:	Dragon.			Vir	RGE (su	ite).
			,	1			` ′					1						(54.	ic).
	1	1h41m -	+150241	}	ī	1 <sup>h</sup> 45 <sup>m</sup>	+54031			11h48m	+66°4	'		12h23m	+7002		S	3h17m .	-10°22'
Juill	11	248,27	33";3	Juin	9	558,09	46",4	Avril	19	418,01	46",2	Avril		30°,38	2",8			178,80	
	16	24,35	33,7		10	55,01	45,1		30	40,81	43,8		6	30,68	3,0	Mai	12	17,73	35,7
	17	24,31	33,6		18	55,21	44,6	Mai	3		45,2		8	30,26	3,0		30	17,77	39,0
	18	24,28	32,2		22	55,25	43,5		8		42,6		14	30,81	2,5	Juin	4	17,76	38,8
	19	24,23		r -11	30	55,09 54,98	44,6			40,99			30	30,62	1,9		5	17,68	38,7
	23	24,26		Juni.	5	55,05	44,8	Mo	yenn	e 41,05	44,2	Mai	3	30,50 30,28	4,5		9	17,63	39,7
1	24 25	24,21	31,9		13	55,17	42,7					17444	8	30,77	4,7 1,3		18	17,73	39,1 36,3
	30	24,27	32,9		16	55,33	45,5		Λ	NONYME.		Mos	_	30,54			23	17,70	37,2
1	31	24,35	35,6		17	55,06	44,7			h m	Can Zai	,			3,0		30	17,76	34,4
Aoû	3	24,31	32,7		18	54,97	46,3	25.		TC8	+69°37	1	5 x	DRAGON	₹.	Juill.	3	17,89	35,0
	5	24,33			19	55,04	46,2	Mai	. 0	56 <sup>5</sup> ,19 56,22	47",5				+70°36′		4	17,91	35,6
	10	24,43			23	55,11	44,8					Mai	3		58",8		5	17,97	
	11	24,43	33,6		24	55,23 55,03	45,4	Mog	yenn	e 56,20	48,3	212 01 0	8	3,31	55,8		6	17,83	
	14	24,21			25 30	55,21	44,4 45,7						18	3,27	58,7		10	17,70	
1	28	24,39	33,0		31		45,9			NONYME			29	3,18	57,6		12	17,85	37,5 36,1
Oct.		24,38		Août		55,44	4-19			ahrim	+69°23°	Juin	5	2,94	56,4		14	17,71	39,2
	14	24,26			5	55,07	43,3	Avril	5	398,14	18116			3,03	59,0		17	17,71	38,7
,	15	24,37	35,2		8	55,20	43,8	Aven	6	39,31	43,9		10		57,0		18	17,74	37,3
	17	24,30	/		10	55,26	41,6		8	39,35	45,0	Moy	enne	3,10	57,6		19	17,69	36,5
Nov.		24,23	35,2		11	55,13	43,7			39,31			C	Dragon			23	17,86	35,8
	3	24,24	33,4		14	55,44		3707		e 39,28							24	17,68	38,2
	5	24,22	36,5 34,5		28	55,41 55,16	42,7	arcy	CHI	e 39,20					70051'		25	17,85	38,5
	6	24,34	38,7	Oct.		55,32	38,1			VIERGE		Avril	5	218,31	2",1		30 31	17,66	38,4 38,0
•	9	24,29	33,2		15	55,19	40,6		-11	* IEROE		ĺ	6	21,32	2,3	Août		17,75	38,3
Mo	-	e 24,28	34,2		16	55,12	41,4			12b12m	+0°9'		8	21,42	2,4	12000	5	17,89	39,5
, 1,20	,	24,20			17	55,30	43,9	Mai		148,00			14	21,62	0,1		11	17,64	38,0
_	B	VIERGE.	,	Nov.		55,26	43,8		29	13,84	63,4		19 30	21,09	o,9 3,8		16	17,99	
		% / ID	200		3	55,37	45,5	Juin	5	13,97	58,1	2.4					21	17,88	
			+2036'		4	55,07 55,23	46,0 43,0		IO	14,05	60,0	Bloy	enne	21,29	1,9		22	17,89	
Juin		528,96 52,87	33,8			55,28	43,4	Mov	enne	i3,95	60,8		γ '	Vierge.			25	17,68	
	9	52,90	34,4			55,37	4014			-,3-	, , ,				-0037'		<sup>2</sup> 7	17,76	41,8
Juill.			33,2	37			11		Ar	NONYME,		Ande		38,70	23//		29	17,94	40,3 38,3
		52,91		moy	enne	55,18	44,1					1				Sept.	2.	17,86	39,1
III.O	y cirili	52,91	34,5		Αn	ONYME.					+69°211	120	с Сиг	ENS DE C	CHASSE.	•	3	17,95	3/-
	A:	NONYME.			7.5	. On a mag.		Avril	5	518,93	28",9			12540m	+3907		4	17,75	41,5
						11h46m	+66031			51,82	29.7	Août			42",9		5	17,87	40,7
			+65°53′	Avril		16,81			8	52,18			28	0,10	46,2		6	17,70	40,8
Avril		225,98	17 49		6	16,59	26,0			52,34	28,0		31	0,17	48,6		10	17,75	36,2
Mai	30	22,55	18,9		8	16,42	25,3	Moy	enn	e 52,07	28,8	Sept.	3	0,07	47,4		11	17,83	40,9
traat	8	23,27	11,4		14	16.70	27,6						4	0,20	42,9			17,83	38,2
		22,79	18,8	Moy	enne	16,63			A:	NONYME.			5	0,22	44,5		27	17,80	40,0
Mo		e 22,90								- l Cm	100-511		-6 x	0,19	43,8	Nov.	9	17,80	41,3
		193	-/,-		AN	ONYME.					+ <b>6</b> 8°54′	Moy	renne	0,18	45,2	Moy	enne	17,78	
2	GRA	NDE OU	RSE.			vh/Qm	1660//	Avril	39	298,74			œ	VIERGE.				,	
		h/gm ,	5/03.1		Į.	1148m	700"4"	Mai	30	29,29	6,7				1.		An	ONYME.	
Mai	. 20	(40 t	54031	Avril	5	41°,17	/ E // E	LIEGE	8	29,82		N.F.		3617m -				21 Qm	o. C!
luin	29	55,19	4+ 9		8	41,08	40.7			29,57	9,4 9,9	Avril	27	170,00	33",5	A	1.	3h x 8m 4	72 20
Luiii	5	55,05 54,98	45 9			41,34		Mov		29,55	9,8	AVIII	6	17.76	34,0	Ayrıl	19	37,76	55",6
		7773	1-3		**	7-7-4	4 777	nao y		29,00	913		0	./1/0	2470		30	37,02	53,2

		satons	In ogen.		-		1								1				
		me (suite	,	o Gra	NDE	Ourse	(snite).		αB	OUVIER.		WEISS	E, X1	V, 283 (	(suite).	LAI	LANDE	26736	
A			_				1			1418m +1				15 <sup>m</sup> -			1/b3	3 <sup>m</sup> -2	2046/
		18m +				3h41 <sup>m</sup> 378,59		Mars						36°, 18 4		Mai 2			
Mai		58*,00 5 57,86	52,1		13	37,56		Mai		495,29	6,"26	J 4.1.	9	36,10	44,5	3	io 48	80,	50,4
	8	58,37	54,9		18	37,49	50,7		8	49,25	52,5 53,2	Moye	nne	36,16	47,5		J :		48, <sub>7</sub> 52, <sub>2</sub>
	18	5 <sub>7</sub> ,68 5 <sub>7</sub> ,53	54,3		19 23	3 <sub>7</sub> ,58 3 <sub>7</sub> ,33	51,2 50,3		29	49,06	51,2	7	l'AYLO	on 7622	.	τ			50,6
Mov			53.7	4 1.	24	37,62	50,8	Juin	30	49,24 49,19	54,6 52,3					Moyer	nne 48	3,08	50,0
		•		Août	25	37,62 $37,67$	50,4 48,9	711111	4 5	49,19	53,3	Y		43°,08		LAI	LANDE	26855	Ď.
		ONYME.			27 28	37,73	50,4		9	49,11	52,4 52,5			43,08			× 41/2	7 <sup>m</sup> -2	20301
	13	3h27m +	72°34′		20	37,59 37,49	48, <sub>2</sub> 51,5		18	49,26 49,23	33,9		~	43,08	1 C	Mai 2		*,68 5	_
Avril	30	525,61 : 52,24	10",9		3i	37,69	51,5		19	49,19	53,4	377		SUTST 1		3	30 30	5,84	55,2
Mai	3	52,76	7,5 5,7	Sept.	3	37,79 37,54	47,2		23 26	49,23 49,14	54,0 56,1	I IVE	isse,	XIV, 3	33.				52,3 54,1
	6 8	52,62	6,2 8,7		4	37,58	47,4	× '11	30	49,19	53,1			.hr8m -					51,0
	18	52,80	5,3		5	37,65 37,70	50,0	Juill.	4	49,19	52,5 55,0	Mai	30	47°,01	25",5   28,2	Moye	nne 30	5,78	53,6
	<sup>29</sup> 4	52,17	4,1		II	37,74			5	49,23	53,6	Juin		46,84	28,2		x BAL	ANCE.	
Juin	4 5	52,64 52,19	8,8 5,0		12	37,61 37,60	47.7 45.7		6	49,17	54,5 51,4		5	47,16	30,6 28,4				
	9	53,04	8,9		24	37,62	49.3		13	49,17		31	-	47,46		Juill.			15022
1		52,84	7,7	Oct.	17	$3_{7},59$ $3_{7},59$	49,9		18	49,15	51,8 52,4		enne	47,15	20,2	Juni.	4. 2	3,97	12,1
310	yenne	52,63	7,2	Nov.			49,0		30	49,23	53,7	L	ALAN	DE 264	93.	Moye	_	3,96	12,3
		ONYME.			6	37,55	46,9	Août	5	49,32	51,5 52,3		1	4h23m.	-22°46′		_2 R	LANCE.	
	1	3h37 <sup>m</sup> -	+72030	Mo	yenr	ie 37,59	49,3		20	49,31	52,9	Mai	30	355,27	45",8				
Avri	1 19	17 <sup>8</sup> ,18	34",8		A	NONYME	*		22 25		51,7	Juin	4 5	35,09	46,6 43,1	7			15024"
Mai	3o 3	16,53	$\frac{31,6}{31,9}$				-2002		2.7	49,32	53,4		9	34,90	43,9	Juill.		5,23	
	6	17,22	31,1	Mai	6 8	31,37	4",9 9,5		28	,	51,4 50,6		10	35,20	43,3 43,6		6 3	5,44	5 <sub>7</sub> ",9 5 <sub>7</sub> ,3
	8	16,98	34,2		18		4,5		29 31		50,8		J			Août		5,35 5,41	53,5
Juir	4	16,44	33,4	Juin			7,5	Sept		49,27		1	yenn	e 35,10	44,4		3i 3	5,40	53,0
	5	16,33	34,8	-	1 c	30,96	3,4		3	3 6	51,5		A Pi	етіте О	URSE.	Sept.		35,28 35,30	54,9 55,4
M	yenn	e 16,83	32,0	Mo		ne 31,18		-	5	49,31				4h27m		'	10 3	35,46	53,1
	n GB	ANDE OU	RSE.		,	NONTH	6.		10	, 5				54,85	46",6	,		35,40 35,53	56,8 55,4
1		13h41m	+50°3	1		13h53m			10	49,16	51,9		5	54,85 54,67			14	35,43	52,3
Mai	s 27	375,64		Mai		43°,9			24		52,6		10	54,72	49,1			35,35	57,5
Avr Mai	il 30 3		47",2		18	3 43,8	8 3,1	Nov		49,20	53,9		11	54,70 54,76	49,8		enne 3	55,50	55,2
Ma	6	37,65	47,0	D.T		5 43,7 ne 43,8			,	49,20		-	19	54,48	51,5	6	Рети	E OUR	SE.
	8 18	~ ~ w w	50,2 48,0					M	oyen	ne 49,22	52,7	Mo	yenn	e 54,72	49,6		1/4	h45m .	+72°35′
	29	37,44	47,5		:	VIERGI		v	VEIS	SE, XIV,	283.		E.AT.A	NDE 26	662.	Mai		58,90	31",5
Jui	30 n 4						m -9°3	4'						14130m		,	29 30	5,43 5,67	33, <sub>2</sub> 32, <sub>9</sub>
Jul	n 4	37,37	, 50,0	Jui	n I	9 53°,9 3 54,0	3 23",5 6 23,9			14h15m				225,20				5,76	32,4
	9	37,72	2 50,0	)		4 54,1	5 24,0	) III		8 36°,05 9 36,10	48",0	- 1	10	22,21	. 31,5		10	5,81	33,2
	16	37,64	4 51,0	3		6 54,1		l	3	0 36,23	48,7	7	19			Mo	19 _	5,76	33,1
Ju	iii. €	37,51		I M	loyer	me 54,0	8 24,	Jui	n	4 36,28	47,0	o   Mc	yeni	ne 22,10	9 33,0	INEO	Jenne	3,70	00,1

129
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1er Janvier de cette année.

				,				1	_							1	-		
	18	BALANCE	E.	3 Ptte	OUR	SE P. I.	(suite).		An	ONYME.		α	Cour	ONNE (S	nite).	α	SER	PENT (su	ite).
		4h5om .	- x on 3 of			/h5.m	+74°46′			15b6m	∔65°6′			5ha Qm	+27013′			- El-20	1605/1
Toil		47°414		1			•				59",0	Sank					_ ~		+6°54′
Jan	4	47,23	16,6	mars	8	12,20	9,5	Juin	24	14,11	62,6	Sept.	26	20,39	16,0	Oct.	16	52 <sup>8</sup> ,98 53,04	0,5
	$\vec{6}$	47,18	19,3		9	12,59	9,9		25	13,93	,		30	20,19			17	53,04	4,5
Mo	venn	e 47,18	17,7		13	11,79	7,3	¥	30	14,07		Oct.	8	20,25	19,0		18	52,88	0,5
	J	- 17,1	- 1 11		14 30	12,11	9,5	Juill.	3 4	14,33			13	20,42	16,9	Moy	enn	e 52,98	2,8
B	PETIT	E OURSE	P. S.	Mai	11	11,86	8,4		6	14,22	64,8		14		17,7		0.6		
	,	4 <sup>h</sup> 51 <sup>m</sup>	1-10/6/		12	12,06	9,5	Mov	anna	14,19			16	20,35	18,3			SERPENT	
Mai		128,13			24	11,97	9,2	Moy	CHIE	14,19	05,1		17	20,28	20,7				+150531
	29	11,61	٠,٠		30 31	12,14	8,9 6,6	γ°	Рет	TTE OU	RSE.		18	20,19	19.7	Août		168,20	39",0
Juir	ı ğ	11,89	10,0	Juin		11,60	7,2			m l. m	. ,		enne	20,27	19,3	C	28	16,03	38,7
	10	11,87	9,7		10	11,87	7,9				+72°22′		œ s	SERPENT		Sept.	3	16,02	35,3 39,0
	19 23	12,15	9,9		23	11,53	-7-	Août		os,43	9",6						4	16,02	37,8
	24	11,70			24 25	11,81	8, <b>1</b> 6,0	Sept.	29 2	0,20	5,9				+6054		5	16,07	39,5
Juil		11,96		Juill.		11,85	3,3	1	3	0,52				538,01	0",7	Moye	enne	16,07	38,2
	30	11,95	9,2		3	11,89	6,8		4	0,39	6,8	Juin	19	52,89 52,95	6,o 3,1	т	. v	NDE 287	96
Aoû		12,27	10,6		5	11,45	7,7		5 -	0,51			23	52,98	1,6	L		Ť	
	5	11,97			10	11,40	8,6 6,5	Moy	enne	0,49	6,7		25	52,78	4,0				-170401
	II	11,78	9,6	Déc.	7	11,65	10,7		αCo	DURONNI	E.		26 30	52,99	4,8	Juill.		28,26	
	29 31	12,17	8,6		26	11,50	5,5					Inill.		52,94 52,87	2,6		4	28,31 28,32	46,2
Sept		12,34	10,0		27	11,43	5,4		1	5h28m	+27°13′		4	52,96	2,4		10	28,50	47,6
1	3	11,96		Moy	enne	11,97	-	Mai	30	20°,23	17",6		5	52,78	2,2		I 2	28,41	47,6
	4	12,10	8,3		An	ONYME.		Juin	19 23	20,37	22,7		6	53,05 52,94	3,4		16	28,43	49,6
	5	12,17	8,9						24	20,15	21,8		10	53,04	0,5 59,9	Moy	enn	e 28,37	47,4
	11	12,08	10,3				-9°47′		25	20,15	21,5		13	52,98	2,3			Z	
3	12	12,15	12,3	Juin		45,02			26	20,15	21,4		14	52,89	2,1		ε 3	SERPENT	•
	14	12,21	9,8		9	45,11	56,7 54,1	Juill.	3o 3	20,16	19,3 20,8		16	52,88 53,01	4,2				+4055
	19 26	12,01	8,1 9,1		18	45,11	49,8	Juin.	4	20,21	16,8		30	53,06	59,4	Sept.		20°,70	62",2
Nov		12,11	8,4		19	45,09	53,1		6	20,23		Août	3	52,95	4,3		45	20,49	59,3 56, <sub>7</sub>
	6	12,12	9,1		24	44,96	49,5		12	20,25	16,4		5	52,98	4,1		10	20,52	57,1
	14	12,37	8,8	7.4	26	45,09	52,1		13	20,22	16,7 16,4		25	52,97 53,02	1,5 3,1		12	20,51	58,5
1 75			9,3	Mo	yenn	45,07	53,0		22	20,24	22,2		27	53,09	6,0	Moy	enn	e 20,52	58,8
MIC	yenn	e 12,08	9,7	GR	OOM	RIDGE 2	2182.		30	20,26	17,9		28	53,08	1,4		A		
1 3	PETIT	E OURSE	P. I.					Août		20,22	20,8	6	3 <sub>1</sub>	52,98	2,7			NONYME.	
			1	[min			160047		5 8	20,39	18,3	Sept.	3	53,05 52,91	5,7		I		-17°30′
		4151m +	14 40	Juin	30	55°,83 55,94	46,6		25	20,30	•3,0		4	52,94	4,0	Juill.	3	428,44	58",2
Fév		128,24	9",0	Julii,	4	55,88	47,6		27	20,42	22,4		5	52,94	3,6		6	42,41	54,9
	19	11,93	7,8 8,4		6	55,89	46,3		28	20,23	22,3		10	52,99	3,5		01	42,68 42,77	5 <sub>7</sub> ,5 55,3
	20	11,97	7,3	Moy		55,88			<sup>29</sup> 31	20,23	20,5		14	53,08 52,92	5,8 2,0			42,74	56,4
	22	12,20						Sept.		20,29	0.4		19	53,09				42,61	56,5
	2.3	12,63	5,7		A	NONYME.			3	20,35	22,4		20	52,89	4,6				
	24 26	11,91	3,4 4,8				-25061		4 5	20,30	20,8		26 30	52,95	3,3		A	NONYME.	
Mar		12,21	6,2	Juin	10	318,59	10",7		10	20,27	19,4	Oct.	8	52,98 52,98	6,3		1	5147m.	-17°35′
	2	12,32	8,4			31,36	12,5		12	20,32	18,3		13	53,15	59,3	Juill.		14°,33	
	6	11,82	7,2	Mog	yenne	31,47	11,6		14	20,31	16,6		14	53,07	0,0			14,22	

	10	isitions	moyen	nes w	.5 (10	11103 000		period							1				
																_			
An	ONY	ME (sui	te).		» Sc	ORPION.		A:	NONY	me (sui	te).	GROOM	IBRID	GE 2356	(suite)	Т	AYLO	OR 7817	7-
	15	147m -	-17°35′			16h3m	-19°3′	1	11	5h15m -	710181		x6	h26m +	710431		16	144 <sup>m</sup> -	330131
Juill.					21	175,02						Juill.		58°,56					19",8
	10		12,2	Leill		16,84				55,66 55,80	38,9 $41,2$		-	58,88	i			39,85 39,79	18,2
		14,46				16,87	:		12	55,53	40,4	Moy	enne	59,00	10,8		-	39,85	
Moye	inc	14940	12,0	_						55,66		P	AZZI,	XVI, I	37.				
	-	ORPION.				DE 2948				55,76								XVI, 2	
	15	5151m -	-22°I1'		1	(61:3m -	-190111		αS	CORPION				16431m				h46m -	.33°15′
Juill. Août	10 .	28°,28 28,36		Juill.	6	38°,71	9",0			6h20m		Juill.		44°,36 44,13		Juill. 1		10,43	43",5
	27	28,51	28,0			38,64 38,73	11.4	Tuin		138,22		Août	3	44,32	39,8	Août			
		28,41 28,41			13	38,70		Julii	21	13,05	39,2	Moy	enne	44,27	40,3	Moye	nne	10,48	43,5
		28,39		D.T.		38,60	12,0	Juill.	25	13,16	38,8 40,3		4.7.	DE 3030	2.		AN	ONYME.	
1				1				Julii	5	12,87	43,5	1	JLAN	BE 2026	<b>J</b> 1.		1	6h47m	+73°5′
	AN	ONYME.		L	ALAN	DE 2948	88.		10 12	13,07	41,5 39,1		1	6635m -	-22014		0	55,05	3",9
			-17026			16h4m	-19061		14	13,03	38,3	Juin	10	198,42			21	55,55 54,27	3,3
Juill.	3	58 <sup>8</sup> ,97 58,62	25",2	Juill.		19,05			16	13,13	39,6		25	19,36	10,7	Juill.	14	54,70	0,6
	6	58,95	23,7		10		39",0	Août	3	12,94	51,9	Juill.	5	19,24	14,4	Moye	nne	54,89	4,0
			20,4	-	12	1,13	45,0		5	12,91	41,5			19,14	5.9		AN	ONYME.	
Moye	enne	58,83	22,0		16	0,96			20	13,12	38,3 40,8		14	19,42					2201
	B1 S	CORPIO	N.	Mo	yenne	1,05	42,0		27	13,03	37,7	Mo	yenne	19,33	10,5			1.4°,64	-33°17′
	15	5h56m	-19°23	/ F	IAZZI	, XVI,	28.		28 31	13,12			. t. c			Août	3	14,65	27,7
	18	43°,35	27",5		,	6 <sup>h</sup> 8 <sup>m</sup> -	100/3/	Sept.	2	13,05	41,1		15 (	Эрнгисц	us.	Moy	enne	14,65	27.7
Août	5 25			Juill.	12	13°,49	30".0		10	13,08 13,15				6h36m .		Gre	)O VI	BRIDGE :	2404.
	27	43,53	29,1		13	13,47	36,7		14	12,94	42,8	Juill.	16	7°,92					+7309'
	28 31	43,35		7.5		13,51			24	13,25		Aoû	: 3	7,68	63,5	Jain		36°,79	
Sept.		43,38		PTO	yenn	e 13,49	37,0	Oct.	8	13,15	45,6	Mo	yenn:	e 7,77	60,1		21	36,93	10,8
Moy	enne	e 43,3 i	27,2	-	A	NONYME.			13 15	13,11						Juill.	25 5	36,61	
I	ALAT	NDE 20	244.		1	6415m	+71012	,	16	13,21	40,7		A:	NONYME.		1	14	36,59	8,6
	¥	545am	-1805-	Juin	10	46s,80 46,95	·		17 18		39,8 40,0		1	6h37m	-22020	Août	24	35,85 37.03	11,3
Juill.	3	313,58	53",4		21	46,95 46,70				13,10		- Linin	10	293,42	55",7			36,71	
	4	31,36	53,1	Juill	. 4	46,98	23",1	1,10	Jeni		40,0		. 5					.,	
	6	31,45 31,75			6.	46.83 46,83		Gi	ROOM	BRIDGE	2356.	Juli	12	29,56	54,0	-		BRIDGE	
Mo	venn	e 31,53	52,5	-	12	46,30	23,3			16h26m	+71043	31	14	29,52	55,4		1	6459m	+73021'
		LOR 83			16	46,77	21,3	Juin	10	59s,07	, 11",5	Mo	yenn	e 29,52	55,7	Juin	10	17,34	8,9
	IAY			-	yenn	e 46,77	22,6		25	59,24 58,60	, 9,6 , 10,7		A	NONYME			25	16,65	12,4
Le 22	,		n - 1903		A	NONYME		Jaill	. 4	59,00	13,0	1				Juill.	5	16 94	
Juil.			13",3 14,5		1	6h 15m -	+71018	,	5 6	58,52 59,3:				Cp <sup>†</sup> Om			24	17,38	13,6
	12	38,5	14,3	Juin	10	55,95	39",8		10	59,30	12,5	50111		12,44		Aoùt	3	17,45	11,2
Mo		38,80 e 38,61		~	21	56,11 55,43	39,8		1/2	59,21 59,12	11,2			e 12,52		Mov			
1 310	yenn	6 20,01	14,4	1	20	33,43	4217		1+	39,12	. 9,0	1120	Jenn	32902	00,1	, May	21111	/1-4	. 0,2

									-					-					
				1				1				-							
П-			0		11	/	ia	0.0						(-					
GR	OOM	BRIDGE	2418.	α	TIER	cure (su	mej.	00	PHIU	icinos (s	unej.	α	PHI	uchus (s	uite).	ļ	AN	NONYME.	
		rah3m	+730241			17h7m.	11/033/		1.7	hram :	-240501			zhon <sup>m</sup> '.	+120401		١.	1:33m	+7401'
Yi.				l .		48°,72											2	315,49	7/4-1
Juin	21	34,53	13",1	Oct.	15	48,67	52,1	Aout		48,04	40.1	Juni.	24	58,38	25",9	Aout	5 5	30,80	33,1
	24	33,76	10,5		16	48,57	51,0					Août		58,35	18,9	ł	8	30,37	-36,0
	25	33,91	17,4		17	48,62	49,3	Moy	renne	48,08	39,6	1.000	5	58,51	19,0		10	30,68	
Juill.		33,91	14,8		18	48,60	52,6	,	0 - 1	Орніцсі	7***		8	58,17	19,3			30,83	- / /
Août		34,25			31	48,58	49,6	4	g c	OPHICCI	105.		10	58,28		Moy	CILIIC	30,03	33,2
	5	33,54	18,4	Nov.		48,57	54,7			rahrom	+40161		17	58,22			28 ω	DRAGO.	x.
Mov	enn	e 33,97	16,0		6	48,66	52,6	Août			31",1		20	58,46					
ľ		,51	,		7	48,63	49,0	Mout	28	4,54	32,5		21	58,28 58,27	,		3	7h37m .	+68-49
	A	NONYHE.			9	48,63			31	4,51	31,7		22	58,40	21,1	Sept.	12	508,21	41",5
		1 /m	. 000 6	3_				Sept.	2	4,56	29,6	1	25	58,38	25,4		13	49,97	,37,3
			+73°31′	Mo	yenn	e 48,59	52,1		3	4,48			27	58,51	25,3		19	50,19	39,9
Juin		29°,78	4",4		69	HERCUI	97		4	4,49	29,2		28	58,37	23,1		26	50,29	40,6
	21	29,99	7,9		υο α	HERCUI	E.+		5	4,41	32,8		31	58,34	21,7	Moy	enne	50,16	39,8
	24 25	29,63 29,48	8,0		I	7 <sup>h</sup> 11 <sup>m</sup>	+33°15′	Moy	enne	4,49	31,5	Sept.		58,31	22,1				0.
Juill.		29,73	7,5	Annt		478,30							3	58,21 58,34	22,2		γTέ	ÉLESCOPE	3.
Aoùt		29,37	710		28	47,00	55,2		λS	CORPION	T+		5	58,44	22,4			_h2_m	2005-1
	5	29,13	12,5		3r	47,14	50,6			-h-2m	-36°59′		10	58,50	26,6			7 <sup>6</sup> 39 <sup>m</sup> -	~
Mov	enn	e 29,59	8,1	Sept.		47,27	54,9			•	U		12	58,49	25,2	Août	27 28	395,16	24",3
1		~ ~ 310 9	0,.		3	47.21	52,4	Août	27 28	25°,79 25,72			13	58,40	26,4	Sept.		39,10 38,94	24,1
	α	HERCULE			4	47,23	53,6	Sept.		25,72 $25,63$	19,8		14	58,42	23,2	ocpt.	3	39,14	
				Mo	yenn	e 47,21	52,8	Oct.	3	25,75	20,3		26	58,55 58,45	20,8		4	39,24	21,0
		1747m -							4	25,77	20,3		30	58,43	23,6		5	39,08	
Fevr.		48°,61			A:	NONYME.			5	25,65	25,9	Oct.	9	58,42	23,0		10	39,15	
Mars Inill.		48,36	49,8			7h12m	1-30 rot		10	25,78	19,7		13	58,56	20,8	Moy	enne	39,12	23,1
341111.	20	48,49	54,3 52,6	Tuin		8s,74		Mov	enne	25,73	21,1		14	58,45	21,9				
Août		48,55	52,9	Sum	21	9,59	61,8			- / /	,		15	58,53	21,0	L.	ALAN	DE 326	30.
	5	48,58	49,5		24	8.99	65,4		An	NONYME.			16	58,45	21,4			. h/ m	. 1.51
	10	48,31	54,3		25	8,54	62,2			h 2	. 1.11		17	58,39 58,23	23,0 23,2			17h40m	
	17	48,45	• 2	Jaill.	24	8,95	57,9				+74041		31	58,28	21,6	Juin			21",5
	20	48,57 48,58	53,0	Mo	venn	e 8,96	60,9	Juin		51°,62	50",4	Nov.		58,43	23,3	Juill.	24 3	7,40	22,8 25,0
	21 24	48,61	52,4 52,3		,	,,,	, ,		21	51,64	54,0 55,4		6	58,36	22,9	9 14411.	4	7,13	24,1
	25	48,45	54,7		69 e	HERCUL	E.		25	51,21	53,2		7	58,44	21,5	Août		7,22	18,8
	26	48,63	52,1		_			Juill.	3	51,23	54,0		9	58,42	22,7		5	6,77	24,1
	27	48,67	53,4			7 <sup>h 12m</sup>		Août		51.98	54,0		15	58,36 58,52	19,9		8	6,47	22,9
	28	48,54		Sept.	5	29,73	2",9		8	51,20	57,2						II	7,94	24,7
Sept.	31	48,57 48,60			6	29,95	4,5	Moy	enne	51,57	54,0	3103	enne	58,40	22,1	1	21	6,8 <sub>2</sub> 6,54	22,7
Jejn.	3	48,59			10	30,08	5,8			. / /			56 -	SERPEN	Tr.		24	7,26	25,7
	4	48,50	49.7		19	30.09 3 <b>0,</b> 01	1,5 3,4		αΟ	ригисиц	s.						25	7,45	24,7
	5	48,57	52,1							1			1	7h32m -	-12047	Mov	enne	7,06	
	6	48,55	54,2	Mo	yenn	e 29.97	3,6		I	7"27m	+12040	Lour		59°,34		y		7,00	2090
	10	48,63			A ()	PHIUCHU	s.			58s,28			28	59,29	24,5		An	ONYME.	
		48,63 48,64			0	- mount				58,22	20,1		3 r	59,07	25,8				
	19 24	48,67			1	7 <sup>h</sup> 12 <sup>m</sup>	-240501	Juin	21	58,4 <sub>7</sub> 58,4 <sub>9</sub>	19,2	Sept.		59,32	26,8			7 <sup>h</sup> 47 <sup>m</sup> -	
	26	48,59	50,0	Jaill.		485,17			24	58,46	24,0		3	59,10	27,5	Août	27	35°,48	19",0
Det.	8	48,61	50,9	Août	10	48,14	42,1		25	58,36			4 5	59,23 59,06	26,6 23,7		28	35,48	22,0
	9	48,60	54,4		20	48,05	37,0	Juill.			19,0	7.						35.71	21,9
3	13	48.74	<b>5</b> 0,5	1	21	48,04	41,2		20	58,44	19,1	Moy	enne	59,20	25,8	Moye	enne	35,56	21,0

1												T				i			
-					-	, .													
1770	A -	LOWE		γ	DRA	GON (su	ite).	A	NON	yme (su	ite).		B. A	. C. 621	10.	I	09 I	HERCT	JLE.
	Al	NONYME			1	7 <sup>11</sup> 53 <sup>m</sup> .	+51°30′		1	-h5-7m	+740241	,	,	8h11m	-15053/		1	8h17m.	+21°22'
-		17148m	+74°1'	Août			29",3			43°,60				30 <sup>s</sup> , <sub>7</sub> 5		1		18°,30	
Juin		39°,85		13041	28	7,54	34,2	Litout	5	42,94		Sept.	5	30,53	20,0	Loui	28	18,32	19,1
	24	39,65		Oct.		7,65	31,7		8	42,83	33,3		10	30,63	15,7		31	18,36	16,9
Juill.	3	39,17	51,7		15	7,57	33,4		11	43,57			12	30,56	15,4	Sept.		18,23	17,0
Août	43	39,58 39,54	50,6 50,2		16	7,58	33,o 33,5		20	43,12	$3_{2,7}$ $3_{2,1}$		13	30,52 30,75	15,5		3 -	18,53	20,0
Loui	5	38,71	44,4		18	7,59	31,4		24	43,41	34,1	7.0	19		19,1	Moy	enne	18,35	17,3
	8	38,79	48,3		31	7,48	32,8		25	43,51	36,5	Moy	yenne	e 30,62	17,2		¥ 22	2 Aigle	
1	11	39,64	48,9	Nov.	5 6	7,43	30,3	Mov	enne	43,37	33,0	,	ATT	DE 340	7.6		• "	TEAGL	
	20	38,85 38, <sub>7</sub> 5	49,3 50,5		7	7,61 7,63	30,8 30,5			, . ,	,	L	JALAN	ம் 340	17.		1	8h27m	-80201
	24	38,68	51,9		9	7,44	30,0		An	NONYME.			X	8h15m	+74°20'	Sept.	4		39",5
	25	39,35	49,9		10	7,61	31,2			Qi, m	000-51	Juill		465,13			3	2,67	44,0
Mov	enne	39,21	49,3		15	.7,88	29,0	Acris				5 (2111.	4	45,80	34,8		10	2,61	38,2 42,6
				Moy	enne	7,59	31,4	Aout	27 28	41°,34 41,33			10	46,38	36,1		13	2,52	43,5
1	θH	ERCULE.							3 <b>1</b>	41,19	46,2	Août	16	46,49	30,1		19	2,74	
	T	7h5,1m	+37°16′	:	96 Q	Hercui	LE.	Sept.		41,26	1 1	Aout	5 5	46,49 45,55	36,3 35,4	Moy	enne	2,65	41,7
Août		6s,48			χ.	7 <sup>h</sup> 55 <sup>m</sup> +	120050		3.	41,18	40,9		8	45,67	35,6			ĺ	
1 July	28	6,58		Sent		58°,36	, 55 00	Moy	enne	41,26	44,3		i i	46,16	36,3		α	LYRE.	
	31	6,59	24,1	- alser	5	58,33			-0	77			20	45,99	33,8		1	8131m	+38°38′
Sept.	3	6,66	25,6		10	58,40	8",0	,	03 (	HERCU	LE.		24 25	46,07	35,8	Févr.		51°,69	
		6,49	25,8		12	58,32	11,4			18h 1 m	+28044	M		46,07			10	51,46	49,1
Moy	renne	6,56	24,5		13	58,26 58,43	7,3	Sent.		41°,58		310)	enn(	40,07	34,7		16	51,51	50,4
1	EI	IERCULE		Man	٠,	2 58,35		1	5	41,42	46,1	I	ALAN	NDE 341	07.		19	51,61	51,9
	,			ľ	eiii(	. J0 <sub>1</sub> J3	9,2			41,59				-7.	1		20	51,54 51,57	51,6 47,9
	17	151 h	290151		An	ONYME.			12	41,53	7 - 7 -		1	8h16m -	+740161		24	51,75	49,6
Sept.		563,25				h.c.c.				41,45		Juill.		17°,38	53",r		25	51,60	49,5
	5	56,11	62,0			7 <sup>h</sup> 56 <sup>m</sup> +			_	e 41,52	44,0		4	17,09	58,6		26 28	51,66 51,57	47,5
	10	56,40 56,12	62,3 $62,8$	Sept.	4 1	34°,30 34,27	42",9	aloy	· mil	41,532	44,0		16	17,87	57,8 53,5	Mars		51,48	5 <sub>2</sub> ,3 49,1
	13	56,09	63,7	77.00					A	NONYME.		Août	-	17,72	00,00	Août		51,66	50,0
	19	56,29	56,9	Moy	enne	e 34,28	40,4						5	17,22	55,6		5	51,41	49,5
Moy	enne	56,21	61,2		An	NONYME.					-22021		8	17,03	59,8		8	51,52 51,40	46,8 51,7
		•								478,26	2. 11.0		20	17,50	57,7 60,2		11	51,46	49,2
	γ 1	DRAGON.				17 <sup>b</sup> 57 <sup>m</sup>	-22031		28 31	47,24 47,25	37",6 35,6		24	17,19	61,9		20	51,42	51,0
	1.	7 <sup>h</sup> 53 <sup>m</sup> 4	-5x0301	Août	27	478,45		Sept.		47,23	34,5		25	17,51	59,0		22	51,68	51,0
Févr.		·	29",I		28 31	47,57		1	3	47,25		Mov	enne	17,46	57,9		24 25	51,43	52,2 50,4
-	16	7,46	28,8	Sept.		47,23 47,46	14,0	Mov		47,24			100	7170	719		27	51,40	50,4
	23	7,59	28,8		. 3	47,48	16,3			177-4	77"	3	21 S	AGITTALE	RE.		28	51,41	50.7
Mars		7,80	29,9			e 47,44			8 SA	GITTAIR	E.					C		51,57	50,7
Juill. Août		7,67	33,2 $31,5$	2,401		7/377	-/95			Oh			18	3h16m -	200361	Sept.	3	51,32 51,40	52,1 50,7
12001	5	7,67	33,3		An	NONYME.			I	O'IIM	-29°53′	Sept.	4	25s,08	60",5		4	51,52	51,7
	8	7.3a				mh5-m	L=/0-//		27	23°,45 23,57	11",4		5	25,01	bī,o		5	51,54	50,9
	11	7,58	33,9	Y		7 <sup>h</sup> 57 <sup>m</sup> ·	2011 0		31	23,45	14,2		10	24,96 25,01	58,2 59,8		01	51,41	49,4
	2 I 2 2	7,45	31,6 31,2	Juin	21	44 <sup>8</sup> ,02 43,60	28",8 34,3	Sept.	2	23,52	8,9		13	24,99	64,3		13	51,32 51,34	48,2 1 52,2
	24	7,83	31,5	Juill.	3	43,32	$3_{2,3}$		3	23,38	10,0		19_	25,07	64,3	1	19	51,34	52,2 49,1
1	25	7,62		1	4	43,37	33,8	Moy	enne	23,47	11,2	Moy	enne	25,02	61,3		24	51,42	49,9

133

Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1er Janvier de cette année.

-			io moge					Porte			1000,	reme	10000	teto 1	Junete	uc ce		unnec.	
	T e	pr (cuit	(0)	WETCO	V	VIII,88	5 (cuita)		Δ.	MONTHE			Α.,	CONTRACTO		Lien	27.00.00	352-11	(asisa)
	a Li	RE (Sull	.е).	14 E122	SEq Z	. V 111,00	5 (suite)		A	NON IME	,		PA D	MONYME.		LALA	NDE	33374 (	suite).
	à	8h31m .	+38°381			$18^{h}35^{m}$	-8°30'		1	8h41m	-180361		1	8h47m .	-18°43'		1	8h51m -	-18°38'
Sept	. 26	51°.64	49",6					1							14",1				
Oct.	8	51,44	47,1		24	23,96			5	15,62	11,0	Sept.		3,17	8,3	John .	4	4,69	2,5
	9	51,36	50,5		26	23,97				15,58		•	4	3,23	8,2	Mov		4,55	4,7
		51,58	100	Moy	enne	e-23,93	47.I			15,88	3/		10	3,17	10,9			-17	777
	14			į ,		,,,	.,,		20	15,64 15,56			13	3,08	15,9	F	3. A.	C. 648	35.
	15	51,43	50,2 49,3		Az	NONYME.			22	15,57	4,8	Mo	renne	3,19	11,5				
	17	51,39	50,2					May			8,9				,				-22054
	18	51,39	49,7		I	8h37 <sup>m</sup> -	-180301	Moy	enne	16,02	0,9	3	6 51 5	Sagitta	IRE.			35,00	8",3
	31	51,45	52,7	Août	3	65,69	53",2			AGITTAI				OL/OT	-14 /		8	35,o5 35,15	5,7
Nov.			48,7		5	6,57	54,1								-20°50′		9	35,38	5,9 4,8
	6	51,58 51,44	47,5		8	6,45	51,4 53,6				-220191	Sept.	26	25°,46	54",9	1	14	35,29	6,4
	7 9	51,80	47,3 50,7	1	1 I 20	6,70 6,46	50,0	Sept.	26	49s,37	44",6	Oct.		25,55 25,54	50,9 53,4			35,16	5,9
	10	pa /a	48,5	1	22	6,74	52,8	Oct.	8	49,47	41,1		9 13			Mov	enne	35,17	
	15	51,61	50,4		24	6,38	52,2	Moy	yenn	e 49,42	42,9		14			-		, ,	,
	16	51,67	50,0	Mov	enne	e 6,57							15	25,81	53,9		$\mathbf{A}_{\mathbb{N}}$	ONYME.	
	24		48,4	Into	CHILI	0,5/	02,0		<b>A</b> .1	NONYME.		Mox	ronna	25.65	53,5			n. TT	- / / /
Mo	yenne	51,52	4949	I.	AT.AN	DE 348	40.			8h/2m.	-18021		CIMILE	20,00				3h35m .	
						040	. 0	Août		205,82			L	Dragon.				21°,78	
	ALI	NONYME.				8h3qm -	-180231	ILOUE	27		27,0					•	26 27	21,71	45,1 43,9
	18	3h34m -	180187	Août		125,32				21,00	27,9		1	8հ49ա	+73054		28	21,79	39,6
Août	26	238,52	9",3			12,42	14,2	Sept.		20,75		Août		298,94			31	21,67	42,9
	2.7	23,58	13,7	ļ	28	12,44	12,9	Moy	enn	e 20,85	27,2		5		42,1	Sept.	2	21,78	43,5
	31	23,67	6,9			12,34	13,0	_			* '		8	29,16	1 0	Moy	enne	21,74	42,8
Sept	. 2	23,45		Sept.	2	12,23	13,2		Aı	NONYME.			II	29,79					
Mo	yenne	23,55	10,0	Moye	enne	12,35	12,6			Qh/-m	-18°25′		20	29,42 29,47	, .		o SA	GITTAIR	E.
	2							A . A .					24		38,1		-	SPEEm .	-21057
	3 7	Aigle.			6	AIGLE.		Aout		32°,64 32,99		Mov		29,62		C			- 6
	,	8h35m	_8025/						27 28	32,98		mo	emne	29,02	41,0			41°,63	18,6
Sept		218,00			1	ι8 <sup>6</sup> 39 <sup>m</sup> -	-40541				63", <b>r</b>		Ar	ONYME.			12	41,65	19,8
Depte	4	21,14		Sept.		135,06	13",9	Sept.	2	32,81	·							41,53	22,0
	5	21,12					13,3			32,61			1	8h5om .	-180431		19	41,55	22,7
	10	21,10			5	12,84	16,3		4	32,94	56,0	Août	26	185,84	37",4	Mov	enne	41,57	21,5
	12	,		Į.	10 12	12,99	13,0		10	32,90 32,63	59,0 63,5				_				
	13	20,93	15/1/8				14,2				58,2	1	ALAD	TDE 353	59.		An	ONYME.	
	24	21,04	12,6	Mov		e 12,94		Mos		e 32,81			-5	N.Som	-180451		7 6	Oh M Om	02 1
	26	21,09	13,6	III y	CHIII	12,94	14,0	1.23	VARGAT	J 33,70 X	_	A coAs					III		-210391
Oct.	9	21,13	9,0		A	NONYME.			Az	NONYME.		Aout	27	41,15	57",3 59,1			48,21	6",8
Mo	yenn	21,08	12,7			21.41.65				Ob/Cm	0.224		3r	41.30	o.		<sup>2</sup> 7 .	4,35	7,6
			007		1	8639m .	-18.34			0"40"	-180331	Sept.	.2	41,18		Moy	enne	4,28	7,2
W	EISSE	, XVIII	, 885.	Août	3	188,14	55// 3	Août	26	29,19	58",6				58,2				
		18h35m	-8030/		-	17,98	30 90			NONYME		BIO	, chine		00,2		AN	ONYME.	
Sent		238,92			8	18,09	53,6					,	LAYAT	NDE 353	374.		18	3h58m -	-21°50′
P	4	24,10			11	18,13	52,6		1	8h46m	-18033				•	Août	5 -	27°,22	33",1
1	5	23,96			20	18,14	53,3	Août	27	52°,74	62",4		1	8h51m	-18°38′		8	26,97	32,3
	10	23,86	44,2		24	18,14	52,1		28	52,51	58,7	Août	28	4°,61			11	27,41	26,2
	12		49,3	3.		17,99	51,6			52,62			31	4,50	00			27,16	
•	13	23,83	44,1	Moy	enn	e 18,09	53,7	1 Mo	yenn	e 52,62	60,4	Sept	2	4,32	8",3	Moy	enne	27,19	30,4

					-			_		_									
	A ==	ONYME.			A ro	ONYME.			A w	ONVHE.		WE	ISSE.	XIX.	387.	A	NON	me (sui	ie).
																			- 1
		_	210551			19h3m -				19 <sup>h8m</sup> 3 <sup>s</sup> ,73		Oct.		9h16m			,	9 <sup>h</sup> 21 <sup>m</sup> + 45 <sup>s</sup> .92	
Août	22	,	25",8	Sept.	12	7 <sup>5</sup> ,16 7,13	19,8	Sept.	12		30",4	Oct.	16	4,76			ΙI	46,90	47,1
C .	24	2,84	* _		14	7,10	17,9	Oct.		<b>3,50 3,8</b> 0	27,2 27,6		17	4,71	14,7		22	46,30 46,78	42,1
Sept.	3	3,07	21,3		24	7,12	24,7 22,3	Mos	9_	3,64	28,4		enne		14,7	Moy		46,48	43,9
	24.	2,78	28,5		26	7,03 6,8 <sub>7</sub>	20,6	,		, -		ľ							
Moy	enne	2,91	25,4	Mog	enne	7,07	20,8	P	IAZZI	, XIX,	42.	1	JALAN	IDE 366	13.	L		DE 368	
	An	ONYME.		1	ALAD	тък 359	47.			τցհ8ա ⋅		1		9 <sup>h</sup> 17 <sup>m</sup> -				9h22m	
						19h3m	-26°0'	Oct.	15	49,77	28",0	Sept.	2	41°,07 41,33	49",2	Oct.	17	318,45 31,46	53,1
C		_	-22°1′ 6″,3	Oct.		-	-	1	17	49,68			4	41,38		Moy		31,45	
Sept.		13°,47 13,35	0,0			59 <sup>8</sup> ,10 59,34		3.5					10	41,30 41,18	48,7	Т	47.47	NDE 368	-8
	U	13,23	400		14	59,37 $59,26$	11,0	Mo	yenne	49,56	24,0			41,25	47,9	L			
Mox		13,04			16	59,37	10,4		An	ONYME.								9 <sup>h</sup> 23 <sup>m</sup> -	
1,100		,-	+ <sub>1</sub> -	Mog	enne	59,29				19h10m			AT	ONYME.		Aout	27 31	16,18	47",3
	πSA	GITTAIR	E.	1	ALAR	DE 361	04.	Août	3 5	22°,60 22,34				9118m		Sept.			44,5
		19hom	-21°15′							22,31	34,3			118,34			3	16,16 16,23	39,4 40,4
	14	50°,45	26",9	Seni	10	19 <sup>h</sup> 6 <sup>m</sup> 58 <sup>s</sup> ,79		1	11 22	٠,	34,8 36,1	Oct.	9	10,95	13,0			16,11	43,7
Oct.	8 9	50,35 50,41	20,0			58,70	35,5		24	22,33		Mo	yenne	11,09	13,6	Mog	enn	e 16,13	43,8
	13	50,33	25,7		19 24	58,66 58,60	40,7 37,9	Mo	yenn	e 22,42	36,3		τ	Dragon.		P	IAZZI	, XIX,	147.
	14	50,66 50,52		Mo		e 58,69			B. A.	. C. 660	2.			19h18m	1=30//		,	oha?m	-21049
Mo	venne	50,45										Août		2/5,87		1		203,59	_
	J	, ,	,		Α	NONYME	•	Oct.		225,74	28",2		5	24,32	37,0	1-1	14	20,62	49,5
		NONYME.				19 <sup>h</sup> 7 <sup>m</sup>			τ3	22,94	33,4		8	23,97	42,2 39,7	Oct.	24	20,65	50,9 45,2
				/ Aoû	5	9,55	48",7		<b>1</b> 5	22,83	30,9		22	24,45	39,2		9	20,50	48,2
Août			37",3		8	9,40 9,53	41,0			22,93		7.6	24	24,83 e 24.49	38,7		13	20,60	
	5 8	36,40 36,33			24	9,48		Mo	yenno	22,87	30,8			•			15	20,82	44,7
	11	36, <b>6</b> 8 36,36		Sept	. <sup>2</sup> 7	9,37 9,47	44,8		A	NONYME			LALA	NDE 366	i <sub>7</sub> 8.	Mo	16	20,59 e 20,64	
	20 22	3 <b>6</b> ,3 <sub>7</sub>			3 4	9,44 9, <b>6</b> 6	42,9			19h 13m			I	91,19m	-20048	1,20	,	20,04	40,0
	, 24	36. <b>3</b> g		- Ma				Aoû	t 31	478,57	11",2	Aoûi		145,06			h² S	AGITT <b>A</b> U	RE.
Mo	yenn	e 36,41	38,3	1470	yem	ie 9,49	44,3	Sept	. 3	47.51 47.76		Sept	3	14,09			3	9 <sup>h</sup> 27 <sup>m</sup>	-25°12'
	A	NONYME			A	NONYME.				47,71	7,6		4		49",7	Oct.	13	348,49	38",5
						19h7m	-21012	1	12	47,46 47,50			12	14,05	50,6		17	34,51 34,63	31,5 31,5
Ana	t 26	19"3"	-21°19	\ Aoû	t 8	25°,04	35",3	Mo		ie 47,58				14,17		Mo		e 34,54	
Aou	27	3,96	5 44,3		24	25,29 25,02	28,0		A	NONYME		Mo	yenn	e 14,13	51,2				
San	3't	4,04 3,84	45,3		27	25,09						,	A	NONYME	•		A	NONYME.	
Sebi	3	4,0			. 2		_	Λοû	t 27	6s,06	2",9		,	10 <sup>h</sup> 21 <sup>m</sup>	+73°15	1		19 <sup>h</sup> 28 <sup>m</sup>	-21057
	4	3,99		-	4	25,42			. 24		0,1	Aoû	t 3	46°,97	40",0	Sept	12	98,36	29",3
Mo	yenn	e 4,00	43,9	1 Mc	yenr	e 25,16	31,6	Mo	yenn	e 5,87	4,5	1	5	46,04	42,8	1	14	9,35	29,8

				1													_		
	Anon	vne (su	ite).	1	LNON	YME (su	ite).	γ	Aid	LE (sui	te).	α	Aic	LE (sui	te).		3 Arc	cLE (suit	e).
	I	9128m	-21°57′		I	9 <sup>h</sup> 34 <sup>m</sup> .	+10°20′		1	ე <sup>և</sup> 39 <sup>տ</sup> .	+10°15′			19 <sup>h</sup> 43m	+8°28'			19 <sup>b</sup> 47 <sup>m</sup>	
Sept Oct.	. 24	9,31	33",1	Août Sept.	2	59°,95	15,4	Oct. Nov.	5	7°,66	3",5	Oct.	8	275,81	35",1 33,0	Oct.	13	568,61 56,61	8",1 6,3
	9	9,27 9,44	33,3	Moy	3 yenne	0,19	16,0		6 7	7,67 7,78	4,4 1,7		14	27,66 27,79	33,6		15	56,5 <sub>7</sub> 56,7 <sub>2</sub>	8,5 7,7
	16	9,42 $9,39$			γ	AIGLE.			15	7,72 7,76	2,9		15 16 18	27,75 27,68	34, <sub>7</sub> 33,8 35, <sub>0</sub>		18 25 26	56,70 56,63 56,69	8,9 5,0
Mo	yenn	e 9,38	30,7		I		+10°15′	Dáo	24	7,77	2,4		25	<sup>27,77</sup> <sup>27,89</sup>	32,8	37	31	56,75	9,7 8,4
		NONYME.		Févr.	13	7°,64	5",5 4,8	Déc. Moye	7 enne	7,72	3,2	Mar	26 31 5	27,85 27,78	31,2	Nov.	5 6	56,56 56,73	6,8 6,8
Aoû		9 <sup>h</sup> 28 <sup>m</sup> 20 <sup>s</sup> ,99	-20°41′ 41″.5		16 18	7,73	2,5 · 2,8				-,-	Nov.	6	27,72 27,87	34,3		7	56,78 56,71	8,1 9,0
Sept	3í	21,27	43,8 41,4		19	7,67	6,0			Aigle.	0- 04		7	27,74	32,7 33,5		15	56,70 56,76	5,4 8,9
Î	3 4	21,12	38,3	Mai	27	7,87	2,3 3,7	Févr.	8	19h43m 27s,81			15	27,85	34,6 33,1	Déc.	24 7	56,58 56,85	8,1 8,1
Мо	yenn	e 21,09			4 6	7,56	4,6 3,1		13	27,81	31,3 33,2	Déc.	24	27,78	31,2	Moy	enn	56,68	8,4
	A	NONYME.			78	7,64	4,7 5,2		18	27,88 27,84	31,5 32,6	Mos	7 renn	27,88 e 27,79	33,1		В. А	. C. 685	šo.
	. 2		+73°3′		9	7,83 7,74	6,4		22 25	27,79 27,93	32,7 32,7			Aigle.	0~,9		ı	ი <sup>հ</sup> 5ი <sup>m</sup> -	_22°36′
Aoû	5	33,45	6,6		12 13	7,57 7,74	5,6 2,0		<sup>2</sup> 7 28	27,80 27,81	30,8 33,1		Ų		m . Co. 1	Aoùt	22	40°,44	48",0
17	22	33,3 <sub>2</sub> 33,44	7,5 5,9		14	7,73 7,74	2,4 3,1	Mars	4	27,84	31,1 30,0	Févr.	27	19°47	m +6°2′ 9″,4	l	24 27	40,63	46,5 49,2
Mo	24 yenn	33, <sub>77</sub> e 33,58	$-\frac{8,3}{6,\bar{0}}$	Août	5	7,74	1,6 2,8		6 7	27,76 27,80	29,0 31,9	Mars	7 8	56,66 56,80	7,5	Sept.	3	40,46 40,49	48,0
	Αr	ONYME.			20	7,67 7,60	<sup>2,9</sup> 3,9		8 9	27,75 27,81	31,1 31,2		9	56,72 56,77	9,8 7,2	Moy	enne	40,48	47,9
	x	9 <sup>h</sup> 30 <sup>m</sup>	-21056		22 24	7,60	2,9 3,3		10	27,82 27,79	32,9 34,0		13	56,57 56,81	8,9 8,4		TAY	LOR 918	5.
Oct.	15	49°,79			<sup>2</sup> 7 <sub>2</sub> 8	7,59 7,58	I,2 I,I		13 14	27,80 27,83	31,9 30,6		14	56,62 56,80	6,3			19 <sup>6</sup> 51 <sup>m</sup>	-23°2′
	17	50,09	37,4	Sept.		7,60 7,64	1,4	Août	15 3	27,83 27,85	30,3 29,6	Août	3 5	56,69 56,74	8, <sub>2</sub> 5, <sub>9</sub>	Sept.	45	53°,60 53,48	
Mo	yenn	e 49,96	38,5		3 4	7,72 7,71	6,3 2,7		5 8	27,89 27,73	28,6 34,4		8	56,89 56,71	7,6 7,1		10	53,49 53,45	33,8 35,4
	A	NONYME			5 10	7,54 7,64	2,7 2,3		20	27,92 27,79	33,3 34,3		22 24	56,60 56,51	8,4 6,0		14	53,54 53,25	40,4 33,0
Sept		9 <sup>h</sup> 31 <sup>m</sup> - 13 <sup>s</sup> ,10			12	7,70	3,2 2,5		24	27,71	32,4		<sup>2</sup> 7 31	56,59 56,66	7,3 7,2	Mov		53,47	36,3
Ocpt	10	13,02	11,0		19	7,63 7,57	2,3 2,6		28 31	<sup>27,70</sup> <sup>27,63</sup>	31,8	Sept.	3	56,6 <sub>2</sub> 56,6 <sub>7</sub>	9,9 9,8	D.		XIX,	
	14	13,15	14,3	Oct.	26 8	7,72 7,57	3,2	Sept.	3	27,75 27,74	35,1 35,4		5	56,72 56,60	7,9 8,1			Ť	
Mo		e 13,05			13	7,64 7,43	5,1 2,7		5	27,82 27,66	35,1		10	56,65	7,9	Sept.		19 <sup>h</sup> 52 <sup>m</sup> 28 <sup>s</sup> ,65	42",5
	A	NONYME.			15	7,66 7,58	6,0		10	27,86 27,78			14	56,6 <sub>2</sub> 56,7 <sub>2</sub>	9,2	Oct.	26	28,71 28,65	45,0 42,5
Ann			+10°20′		16 18 25	7,5 <sub>2</sub> 7,6 <sub>9</sub>	3,8 4,2		14	27,77 27,72	32,7 36,2	001	24 26	56,52 56,76	10,3		915	28,58 28,61	41,6 38,5
Aou		05,12	14,8		25 26	7,73 7,83	4,1 1,1		24 26	27,80	34,8 34,1	Oct.	9	56,66 56,51	9,9	Moy	enne	28,64	42,0

1	**				1				1				1	_						
-		Α -				A								,	,				, ,	
1		Ar	ONYME.			An	ONYME.			A	NONYME.		α - (	JAPRI	CORNE (S	uite).	A	NON	ME (SU	ite).
2000		1	9 <sup>h</sup> 52 <sup>m</sup> -	-220311			9 <sup>h</sup> 58 <sup>m</sup> ·	+240301			20h5m .	-22°29′			20h9m	-13001		20	o <sup>ր</sup> 18ա -	-22028
Ao	ût		45°,54	311.1	Oct.	9	9°,39	43",4	Aoùt		27°,94		Oct.		438,76	0	Sept.		28°,11	1",7
			45,53 45,50	3",4 4,9		14	9,29 9,26	3 <sub>7</sub> ,0 35, <sub>7</sub>	Sept.	27	27,81	17,9		13	43,8 <sub>2</sub> 43,56			12	27,92 27,85	3,9
Se		2	45,40	5,9		15	9,16	41,4	Jeja	4 5	28,24	12,2		14	43,63			19		
-		3	45,72	0,9		16	9,30	35,4		5	28,20	14,2		15	43,48			٠.	27,87	2,1
i M	loy	enne	45,54	3,8	Moy	yenne	9,28	38,6	Moy	enn (	e 28,04	14,4		16	43, <sub>7</sub> 3 43, <sub>7</sub> 9					
-	Pi	ZZI,	XIX,	369.						. C	APRICOR:	P4.4.		31	43,74		L	ALAN	DE 393	18.
PELL			Í			AN	ONYME.		(				Nov.	5	43, <sub>7</sub> 6 43,80	21,2		2	ohigm .	-220301
The same			J .	-2300'			19h59m	-2307'			20h9m -	-12°58′		7	43,65		Août		17 <sup>3</sup> ,79	
Sel	ı.	5	50,51		Sept.	10	56°,08	27",2	Août	20	19 <sup>8</sup> ,92	211 0		10	43,60				17,81	42,0
The same of		10	50,54			12	55,71 55,93	23,7 28,7		22 24	19,87	3",8		24		25,7	Sept.	<sup>2</sup> 7	17,75	42,6
774		12	50,52			19	55,96	28,5		27	19,73	8,1	Mo	yenne	43,70	23,4		5	17,72	
1			50,61	47,0 44,7			55,74		Sept.	3	19,77	6,6		3° C	APRICORI	NE.	Moy	enne	17,75	44,7
M	[ov	•	50,60	- /	Moy	enne	55,88	28,0		5	19,89	10,7		2	0 1 2 m -	-150151	ī	ATAN	ns 304	4.8
2000	·			-						10	19,72	4,7	Août	20	34,75	2",7				
2000	I	3. A.	C. 688	33.		An	ONYME.		}	12	19,65	6,7		22	34,62	6,2				25022
E .		10	րե55տ .	+240231			20h2m -	-220231		19	19,71	0,7		24	34, <sub>7</sub> 6 34, <sub>7</sub> 6		Oct.		22,68	31″ <sub>3</sub> 4 26,1
Oc	t.	15	23°,24	14",1	Août	22	345,13	26",7		24	19,76	4,3	Sept.	<sup>27</sup>	34,70	7,1 5,6	LYOV.	6	22,50	30,0
1000		16	23,35			24	34,11	28,8	Oct.	26 8	19,79	3,7		3	34,69	3,1		7	22,47	24,9
No	v.		23,51 23,55		Sept.	<sup>2</sup> 7	34,16	28,8 31,0	001.	9	19,85		Oct.	13	34,63 34,83	3,9 4,1		9	22,80	0
		7	23,56	7,4	•	4	34,37	27,3		13	19,71		Nov.		34,73	7,7	Moye	nne	22,66	28,1
		9	23,44	8,4			34,31	28,9		15	19,76	5,4			e 34,72		Pr.	AZZI,	XX,	166.
	ī	10			Mo	yenne	34,18	28,6		16	19,76	3,9		TAT	LOR 936				h <sub>2</sub> 3 <sup>m</sup> -	
TA.	roŷ	enne	23,47	11,1		Α.,				18 31	19,80	7,1	-		_					22059
THE REAL PROPERTY.	L	ALAN	ти 3 <b>82</b>	50.		AI	NONYME.		Nov.		19,79	7,7			о <sup>в</sup> 13 <sup>m</sup> .		Aout	24	26,41	28",9
No.		,	obssm	-22°36′			20h3m	+24°32′		7	19,79	8,7	Sept.	10	18 <sup>s</sup> ,12		Sept.	2	26,23	27,5
Í	A+		33°,88		Oct.	J	05,31			9	19,94			14	18,20	47,3		3 5	26,53 26,37	
Ac	uı	24	33,84	18,9		14	0,26	1",8 6,2	7.7		19,76		-	19	18,10	47,8		10	26,41	
		27	33,85	19,3		16	0,02	4,0	Moy	venn	е 19,79	6,3	ì	24	18,15	48,4		12	26,33	
Se	pt.	3	33,89 33,91	19,4		18	0,26	6,2		α² C	APRICOR	NE.	Mol	renne	18,16	46,3	3.7	14	26,23	
IN	lov		33,87		Mo	yenn	e 0,17	4,5			aobom	-1300	,	A	NONYME.		Moy	enne	26,35	20,2
						Α.			A one	20	43°,7 °				20h 18m	-25061	Pı	AZZI	, XX,	167.
	Pr.	AZZI,	XIX,	3 <sub>7</sub> 8.		A.	NONYME.		Aout	22	43,68		Oct.		95,26	46",6		2/	h-2m	-220391
		I	9 <sup>h</sup> 55 <sup>m</sup>	+24°31	,		20h4m			24	43,72	20,9		14	9,24	50,6	Août			51",5
100	t.	9			Oct.	913	5°,70	,, ,	Sept.	<sup>2</sup> 7	43,71 43,68		,	15	9,08	50,5	Litout	24	28,51	
and a		16	39,59	15",4		13	5,53 5,56	29",4	Sept.	3	43,87	24,2		18	9,36	50,2		27	28,40	52,3
V	v.	18	39,53 39,43	13,9		18	5,60			5	43,72		Mo	yenn	e 9,21	49,7	Sept.	3	28,31 28,69	54,6
210	, v .	6	39,73		Nov.	5	5,79	32,6		10	43,63	25,0		A	NONYME.			5	28,41	55,8
		7	39,58			7	5,70 5,71	27,1		14	43,73	20,0						10	28,41	49,5
		9	39,70 39,69			9	5,66	29,2 30,0		19	43,64	19,9			0h18m			12	28,50 28,33	55,9 52,3
1 1	Io.		e 39,60		Mo	venn	e 5,66	29,7		24	43,63 43,53	24,1	Sent	27	27°,80 27,82	5",9	Mos		28,43	53,1
1	20)	CESTI	09,00	- 0, -	1	J		-31/	1	20	+5,00	-496	Coly		-/,02	274	1		,40	

	1	1	1	at cette annec.
LALANDE 39471.	B. A. C. 7113.	α CYGNE (suite).	LALANDE 40536.	Anonyme (suite).
20h23m -250251	201129m -24044	20h36m +44044	20h50m -2101'	20h56m -20042'
Nov. 6 56s,00	Oct. 16 118,60	Août 24 198,42	Sept. 2 48,30 18",2	Sept. 10 405,47 20",1
7 56,19 9 56,16 48",8	Nov. 9 11,78 50",3	27 19,39 51",5 Sept. 2 19,37 50,5	10 48,46	12 40,50 27,6 14 40,39 25,4
Moyenne 56,12 48,8	10 11,77 51,9	3 19,42 49,6	14 48,40 19,4	24 40,34 27,1
40,0	Moyenne 11,73 52,5	5 19,58 48,3 12 19,31 48,7	Oct. 8 48,25 16,9	Moyenne 40,40 24,2
Lalande 39533.	LALANDE 39739.	14 19,49 48,5	14 48,26 22,7	Anonyme.
20h24m -25010	,	Oct. 8 19,43 50,9	Nov. 4 48,38 23,0 5 48,40 23,0	
Sept. 24 55°,22 1",2	20 <sup>h</sup> 29 <sup>m</sup> -21°56′	9 19,29 50,1	Moyenne 48,33 21,0	20158m -20°46'
Oct. 8 55,19 59,6	Août 24 37°,51 41",5 27 37,48 41,4	13 19,31 49,8	ANONYME.	Sept. 2 8,46 Oct. 14 8,54 41",3
14 55,08 2,0	Sept. 2 37,44	15 19,21	ANONIME.	15 8,60 39,7 16 8,50 36,2
15 54,93 3,2 16 54,92 1,7	12 3 <sub>7</sub> ,30 45,3 14 3 <sub>7</sub> ,44 42,3	16 19,06 - 18 19,33 49,6	201151m -2103'	Moyenne 8,52 39,1
Moyenne 55,08 1,5	Moyenne 37,43 42,6	Nov. 4 19,13 48,1	Sept. 5 8,31 10",4 12 8,33 5,3	3,02 09,1
1,3		5 19,27 50,9 6 19,26 51,7	Oct. 15 8,11 9,4	LALANDE 40877.
LALANDE 39707.	v Capricorne.	9 19,10 49,1	16 8,10 9,1	20159m -20038
20h28m -24°53'	20'31m -18039'	10 19,26 48,5 15 19,33 48,6	Moyenne 8,19 9,2	Sept. 10 165,79 3",9
Oct. 16 478,17 28",1	Août 20 305,18	16 19,33 47,6	21 CAPRICORNE.	12 16,63 9,3 24 16,47 9,2
Nov. 5 47,26 32,4 6 47,18 28,7	24 30,13 50,9	Moyenne 19,32 48,5	20h52m -18°6′	Oct. 8 16,68 5,8
7 46,97 27,7	Sept. 3 30,27 51,6 5 30,37 47,9	Anonyme.	Nov. 6 243,85 50",1	Moyenne 16,64 7,0
Moyenne 47,14 29,2	Moyenne 30,24 49,3	20 <sup>h</sup> 40 <sup>m</sup> -21°10′	9 24,74 52,4	26 CAPRICORNE.
		Sept. 14 16 <sup>3</sup> ,58 16",7 Oct. 16 16,37 12,6	10 24,93 44,8	t. m
ANONYME.	A NONYME.	18 16,46 15,5	Moyenne 24,80 47,7	21 <sup>h</sup> 0 <sup>m</sup> -20°47' Sept. 2 42 <sup>s</sup> ,27 50",5
20h28m -21°51'	20131m -25034'	Nov. 4 16,53 15,1 Moyenne 16,48 15,0	Anonyme.	5 42,31 48,9
Août 22 525,73 10",4	Sept. 24 548,96 40",1 Oct. 8 55,13 33,5	Moyenne 10,40 13,0	20h53m -20°55'	Oct. 18 42,26 48,7 Nov. 4 42,38 52,0
24 52,89 Sept. 2 52,60	9 55,11 33,2	Anonyme.	Sept. 2 428,78 15",1	5 42,27 49,7
3 52,89 13,9	13 55,05 38,4 14 54,99 41,3	20 <sup>h</sup> 40 <sup>m</sup> -21°10'	5 42,89 21,4	Moyenne 42,30 50,0
5 52,93 14,4	15 55,07 38,4	Sept. 2 34 <sup>5</sup> ,13 27",9 3 34,33 26,7	10 42,93 14,3	v Verseau.
12 52,91	Moyenne 55,05 37,5	5 34,41 24,4	Moyenne 42,90 16,7	
14 52,92	α Cygne.	10 34,36 23,4 12 34,39 25,4	PIAZZI, XX, 428.	21h1m -11°58'
Moyenne 52,83 12,5		Oct. 8 34,60 21,5	20 <sup>6</sup> 54 <sup>m</sup> -18°3′	Oct. 14 25°,15 35",0 15 25,05 34,4
LALANDE 39714.	20°36m +44°44′ Févr. 13 19°,32 47″,2	Moyenne 34,37 24,9	ST C E28 / 2 2011 C	16 25,00 36,8
	18 19,49 46,3	19 CAPRICORNE.	9 53,24 28,6	Nov. 6 25,18 40,2 9 24,95 36,8
20 <sup>h</sup> 28 <sup>m</sup> -25 <sup>o</sup> 37'	19 19,12 43,6	20h46m -18°29'	10 53,51 25,1 15 53,23 24,0	10 25,27 37,1
Sept. 24 55°,82 39",2 Oct. 8 55,87 38,3	26 19,37 43,8	Oct. 15 185,93 18",2	Moyenne 53,34 27,1	Moyenne 25,10 36,7
9 55,91 42,2	27 19,33 46,1 28 19,33 47,4	16 19,03 14,5 18 18,95 17,5	Anonyme.	TAYLOR 9813.
13 55,85 44, <sub>2</sub> 14 55, <sub>77</sub> 41,6	Mars 1 19,17 46,3	Nov. 4 19,06 21,4		
15 55,82 38,6	4 19,44 44,9 Août 20 19,38	5 19,11 20,5 6 18,89 19,0	20h56 <sup>m</sup> -20°42' Sept. 2 40 <sup>s</sup> ,19 23",0	21h3m -20°56' Sept. 2 30°,24 31",8
Moyenne 55,84 40,6		Moyenne 19,00 18,5	5 40,52 22,3	10 30,48 27,5

TAYLOR 9813 (suite).	LALANDE 41349.	α Céphée (suite).	В Се́рне́е (suite).	TAYLOR 10063 (suite).
21h3m -20056'	21 <sup>h</sup> 10 <sup>m</sup> -20°43'	21h14m +61°57'	21h26m +69°54'	21h33m -22020'
		Déc. 26 60°,14 3",2		Sept. 14 45,62 27",5
14 30,57 31,0	5 35,81 59,3	27 60,17 4,0	9 42,34 13",8	24 4,38 34,9
24 30,14 33,5	10 35,77	Moyenne 59,89 5,4	15 42,37 16,0	Moyenne 4,58 31,2
Moyenne 30,37 31,0	Moyenne 35,71 60,5		16 42,27 14,6 18 42,36	1,2
LALANDE 41112.		35 CAPRICORNE.	25 42,60 15,1	ANONYME.
	LALANDE 41363.	21h18m -21°50'	Nov. 3 42,30 15,8	21h33m -25°20'
21h4m -2309'	21h11m -26°580	Sept. 12 43°,92 40″,1	4 42,16 15,2 5 42,03 16,0	Oct. 16 235,71 2",2
Oct. 0 40°9//	Nov. 9 4,48 10",4	24 43,95 34,0	6 42,24	18 24,00 6,9
14 40,01	10 4.52 5.7	Oct. 8 44,11	10 42,42 15,9	Nov. 3 23,98 1,0
15 48,93 33",5 16 48,79 30,2	15 4,56 3,3	15 44,03 36,7	15 42,08	5 24,14 0,8
18 48,98 30,2	Moyenne 4,52 6,5	16 43,95 38,0	Déc. 5 42,31 12,4	Moyenne 23,96 2,7
Moyenne 48,86 31,3	C	Moyenne 43,97 37,2	7 42,36	ANONYME.
70	¿ CAPRICORNE.	TAYLOR 9943.	26 42,81 13,2	ALMONTHE.
PIAZZI, XXI, 27.	21h13m -17028'		27 42,83 13,8	21h35m -15°26'
2116m -22°25'	Oct. 14 53°,18 14",8	21h19m -20°51'	Moyenne 42,46 13,9	Nov. 7 48,99 10",4
Nov. 9 265,85 61",8	15 53,32 14,3	Sept. 14 15,09 27",6	LALANDE 42116.	9 48,95 5,9 10 49,14 9,3
10 27,06 60,5	16 53,27 17,5 18 53,33 16,4	Oct. 18 0,86 24,0 25 1,01 24,9	21h3om -2507	- 5 / 0 2 - 1
15 26,77 59,3	25 53,36 11,1	Nov. 3 1,01 25,6	Oct. 15 21°,75 23",6	
Moyenne 26,89 60,5	Moyenne 53,29 14,8	4 1,08 27,6	16 21,77 20,4	
PIAZZI, XXI, 41.	14,0	5 1,20 30,9	18 21,95 17,5	
11221, AA1, 41.	а Сернее.	Moyenne 1,04 26,8	25 22,02 15,6	21 h35m -25°35/
21b8m -20047'	h-/m (C-05-	36 b CAPRICORNE.	Nov. 3 21,91 19,4 4 22,07 22,3	Oct. 16 575,28
Sept. 2 9,29			5 21,96 22,7	18 57,08 40",6
3 9,+3	Févr. 13 59 <sup>s</sup> ,99 4",1 16 59,86 5,0	21h20m -22027	Moyenne 21,92 20,2	25 57,12
10 9,23 38",9	17 59,65 5,1	Nov. 6 98,48 29",4		Nov. 3 57,13 36,0
14 0.37 41.4	19 59,88 5,0	9 9,61 27,6	Anonyme.	4 57,22 5 57,33
24 9,07 38,7	Mars i 59,95 5,5 4 60,22 5,3	10 9,74 27,2 15 9,66 27,1	21 <sup>b</sup> 30 <sup>m</sup> -22°23	
Moyenne 9,24 39,7	6 59,98 3,2	22 9,90 28,0	Sept. 12 395,20 19",5	Moyenne 57,19 38,3
/ Doverno	7 59,89 5,9	Moyenne 9,68 27,9	13 39,30 17,1	
4 Poisson austral.	8 59,91 3,1 9 60,14 4,8	3,00 -7,13	24 39,04 18,6	
2118m -32047'	9 60,14 4,8	В Сернев.	Moyenne 39,24 18,6	21°37° -25°30′
Oct. 16 49°,64 50",3	13 60,15 3,7	21h26m +69°54'		Oct. 16 383,73 21",4
18 49,81 45,3	15 60,05 2,9	1	11 210009 222249 /000	Nov. 3 38,76
25 49,85 44,6 Nov. 4 49,76 52,0	Sept. 10 60,07 8,2	17 42.20 13.6	21"31" -J1"14"	4 39,04 24,4
5 49,79 48,0	24 59,79 9,2	Mars t 42,68 13,6	Nov. 7 23°,87 60",4	5 38,97 23,0
6 49,62 51,2	Oct. 8 59,83	7 42,71 12,4	9 24,00 60,7	Moyenne 38,87 22,9
Moyenne 49,74 48,6	9 59,6t 8,6 Nov. 4 59,66	8 42,70 12,4 9 42,69 15,5	10 23,97 59,3 15 23,90 59,4	Anonyme.
Driggs VVI 5-	5 59,63 5,9	12 42,68 16,1	Moyenne 23,94 59,9	
Piazzi, XXI, 57.	6 59,64	13 42,67 13,4		21h40m -220411
21hgm -20°57'	9 59,55	15 42,88 12,2	TAYLOR 10063.	Sept. 12 553,32 6",5
Sept. 12 555,25 44",4	10 59,77 7,7	Sept. 10 42,89 16,0	21h33m -22°20'	14 55,31 9,3
Och . 2 00 ,20 44 ,4	15 50.75	12 42.11 14.7		
24 55,33 Moyenne 55,29 44,4	15 59,73 22 59,98 6,3 Déc. 7 59,89 7,5	14 42,60	Sept. 12 48,73 31",0	24 55,12 5,3

Name and	_				1		_						1			o anoter	1			
	L	LANI	DE 424	.98.	LAL	ANDE	42720	(suite).	LAI	ANDE	43011	(suite).	Pı	AZZI	, XXI,	419.	0	VERS	SEAU (SU	ite).
		2	1641m	-19°4′		2	1h48m	-24043		2	1 h 56m	-22°58′			22h2m	-210581			221/8m	-8031/
Oct				53",3	Oct.	14	135,77	0",2	Nov.	6	315,34	10",9	Nov.	7	42 <sup>8</sup> ,19	7",1	Oct.	25	548.02	41113
No		25 2	0,80	55,8		15	13,75	58,6		7	31,19	10,2		9	42,32	8,6	Nov.	4	54,94	42,6
TAO	V a	4	0,74				e 13,81	1,5		9		14,7		15	42,52 $42,29$	$\frac{4,4}{3,5}$		5		42,3
		5	0,83	57,2	l mo	уепп	. 13,01	1,2	Mo		31,37			16			Moy	enne	e 54,88	43,3
M	oye	nne	0,74	56,3		A	NONYME						Mo	yenn-	e 42,34	5,3	Ł	ALA	NDE 434	83.
	L	LANI	ов 425	02.		2	1150m	-24°36'		α \	VERSEAU	J.	1	AT.AT	NDE 432	1.42.			ankom	-23021
					0		44°,14					3m -102					Nov.	6	52 <sup>8</sup> ,56	
77				-28051	Oct.	18	44,14	27,6	Mai		4°,68	47",9			22h3m			7	52,56	48,2
NO	7.	7 :	13 <sup>8</sup> ,98 13,92		Nov.	3	44,23	21,8	Sept.	14	4,58 4,68	51,1	Oct.	25	2°,00 1,92	40",9 39,5		9	52,62	48,4
		0	14,08			5	44,30	20,1		24	4,64	47,9	Nov.		2,05	40,0		15	52,73 52,39	50,3 46,6
				58",5	Mo	yenn	e 44,24	23,4	0	26	4,63	52,3		4	2,08	43,2	Moy	enne	52,57	
M		_	13,84	_ / '			ONYME.		Oct.	13	4,53 4,59	52,3		5 6	2,22 1,93	47,2 $42,8$			,	. ,
	oye	muc	10,9/	3/1/						xŚ	4,64	49.8	Mov	_	e 2,03			A	NONYME.	
	LA	LAND	E 425	54.			1 h 50 m		1	16 25	4,56 4,60	48, <sub>2</sub> 47,5	] `							-280571
		2	[h/2m	-28°5′	Sept. Oct.	14	49°,62	49",9	Nov.		4,66	50,0		Ατ	ONYME.				50°,65	29",7
Nov		7 5	52°,34	54",8	Oct.	25		44,4		4	4,84				22h5m	~23°0′	Oct.	9	50,77 50,71	32,6 30,7
		9	52,32	58,0	Nov.		49.57			15	4,53 4,60		Oct.			9",7		14	50,48	30,0
			52,48 52,40			4 5	49,8 <sub>2</sub> 49,78	50.4		22	4,64	52,0	Nov.	3 4	33,46 33,5 <sub>2</sub>	13,0		16	50,59	29,2
M				54,6	Mo	_	e 49,69		Déc.	24 7	4,63 4,76	50,3 51,0		5	33,61	9,2	Moy	enne	50,64	30,4
									12500	25	4,73	49,7		6	33,56	9,5	$W_{\mathbf{E}}$	ISSE,	, XXII,	231.
		ANC	NYME.			B. A	. C. 76	52.		26	4,84 4,64	50,5 52,0	Moy	enn	33,52	10,6			_h _ m	-100331
		21	<sup>h</sup> 44 <sup>m</sup> ·	-240451		2	ıh5om.	-23035/	3.5	27				41	VERSEAU	J.	Nov.	16	39°,69	4",0
Sep	t. 1	4 5	0°,75	42",3	Nov.		50s,94	15",5	Moy	enne	4,65	50,1			22h6m	-21°49′	Déc.	7	39,80	1,7
Oct	. ]	14	50,31	40,6 43,3		9	51,08 51,21	16,6	Pı	AZZI,	XXI,	393.	Nov.	7	05,30	~	Moy	enne	39,74	2,8
		15	50,47	46,2		15	50,99	13,0	1	2	, h58m	-220581	į.	9	0,30	7.1		Α.	NONTME.	
			50,54 50,43	45,6 39,5		16	51,11	15,8	Oct.		53°,28			15	0,43	7,6				
M		_	50,53	42,9	Moy	yenne	e 51,07	15,4	Nov.	5	53,25	19,7		16	0,27	1,8	Oct.			-10021
	•		·	. ,5		Α:	NONYME.		}	6	53,02 52,89		Moy	renne	0,32	7,2	Nov.	3	56,70	55,2
	L	LAND	E 426	99.	Ì					9	53,03	14,8		A	NONYME.			4	56,93	55,6
		21	647m .	-230451			1h53m .			10					22b6m -	-24044		5 6	56,88 56,43	57,4 52,9
Nov	7.	7 1	5°,70	40",6	Sept.		46°,50	18",0	Mog	yenne	: 53,12	15,9	Sept.	14	23°,43	48",9		enne	56,73	54,5
	,	9	15,61	39,8 3 <b>6</b> ,9	Oct	14	46,24	13,0	I	ALAN	DE 431	63.	Oct.	9	23,39	48,2			.,	
	1	5	15,6t	35,5				13,6						13	23,25	49,9 51,3			VERSEAU	
1		-		35,1	3.5		46,39	11,4	8			-240231		16	23,33	47.1	0			-25031/
Mo	yei	nne	15,63	37,6	Moy	enne	2 46,41	13,6	Sept.	24	4,8 <sub>7</sub>	35,1	Moy	enne	23,30	49,1		14	8,94 8,81	9,6
1	L	LAND	E 427	20.	L	ALAN	DE 430	11.	Oct.	13	4,62	35,7		0.1	ERSEAU.			t3	18,8	11,8
			•	240431		2.5	ւհ56 <sup>m</sup> -	22058/		14	4,74 4,54	33, <sub>7</sub> 3 <sub>9</sub> ,6		,		-8 <sup>3</sup> 1'		14 15	8,90	11,1
Sep	t. 1				Oct.		31 <sup>3</sup> ,51			16	4,67		Oct.	15	54 <sup>s</sup> ,82			16	8,90 8,76	9,5 9,5
			13,86	5,2	Nov.	5	31,55	15,9	Moy	cnne	4,69	35,7		18	54,74	47,2	Moye	nne		

Weisse, XXII, 336.	Anonyme.	Anonyme.	Anonyme.	Anonyme.
22h16m -10057'			23h31m +11º46'	
Nov. 16 11 <sup>s</sup> ,17 19",1 Déc. 7 11,30 18,6	Sept. 14 223,12 62",4 Oct. 0 22,35 58,2	Nov. 15 18 <sup>5</sup> ,71 21",0 16 18,73 24,6	Oct. 18 53,22 35,8 Nov. 3 53,26 39,0	Nov. 7 50,68 37,4 9 50,56 34,4
Moyenne 11,23 18,8	13 22,16 59,8 14 22,08 65,3	Déc. 26 18,78 27 18,88	4 53,38 38,8	10 50,70 32,5 22 50,81 33,2
Weisse, XXII, 354.	15 21.00 63.5		5 53,34 34,9 Moyenne 53,30 37,1	Moyenne 50,68 34,4
22h16m -10021	Moyenne 22,14 61,8	Moyenne 18,77 22,8	WEISSE, XXIII, 736.	Anonyme.
Oct. 18 47°,09 34",0	α Poisson Austral.	WEISSE, MILLIA 4//	23h35m -4°8′	
Nov. 4 47,10 42,4 5 47,11 37,3	22h49m -30°24	23h23m +8°56′	Nov. 6 535,35 36",1	Nov. 6 51°,24 62",7
6 47,08	Mai 19 218,01	Uct. 13 44°,20	9 53,33 42,0	7 51,22 9 51,12
Moyenne 47,09 37,9	Oct. 14 20,94 63",5 Nov. 5 21,02	ANONYME.	10 53,31 39,4	10 51,24
Weisse, XXII, 355.	Déc. 25 20,95 57,5	23h24m +8029'	Wavenne 53 30 30 7	15 51,27 60,6 16 51,35 59,5
Nov. 3 47°,73 15",1	26 20,95 56,7 27 21,19 57,5	Nov. 23 55,15 34",1 Déc. 26 4,90 33,1	Weisse, XXIII, 777.	Moyenne 51,24 60,9
7 47,55 14,4	Moyenne 21,01 58,8	27 4,98 31,5	23h38m +12º19'	Wriger VVIII 0/3
9 47,49 9,4	α Pégase.	Moyenne 5,01 32,9	Oct. 8 0,29 12,9	23h46m +12081
15 47,6t 13.6	22h57m +14°20	Weisse, XXIII, 568.	9 0,04 14,1	Oct. 15 15,29 52",6
Moyenne 47,60 12,9	Févr. 3 178,52 57",5		16 011	16 1,34 57,2 17 1,33 56,8
WEISSE, XXII, 449.	14 17,50	Sept. 26 358,67 0",5	16 0,05 7,5	Nov. 4 1,44 55,9
22h21m -10042' Nov. 7 63,59 5",9	24 17,63 54,2	15 35,42 5.9	Moyenne 0,13 10,4	5 1,32 57,5
9 6,64 7,8	Mai 19 17,43 54,2 Oct. 18 17,52 53,7	16 35,59 3,5 17 35,43 6,6	WEISSE, XXIII, 796.	Moyenne 1,36 56,0
10 6,64 2,2	Nov. 3 17,62 54,7 4 17,40 54,8	18 35,59 4,8		Weisse, XXIII, 993.
16 6,60 7,1	5 17,44 53,9		Oct. 17 525,09 51",3 18 52,14 49,4	23h48m -4019'
Moyenne 6,61 5,1	7 17,37 53,8 9 17,34 55,4	WEISSE, XXIII, 642.	Nov. 3 52,11 48,0 4 52,15 55,1	7 33,32 47,4
Weisse, XXII, 451.	Déc. 25 17,49 56,8	23531m -3047	5 52,11 49,8	9 33,28 48,0
22 <sup>h</sup> 21 <sup>m</sup> -10°30'	27 17,45 55,3			15 33,19 42,5
18 9,17	Moyenne 17,49 54,9	9 6,69 26,9	121.01.21.21	Moyenne 33,23 45,9
Nov. 3 9,09 11",5 4 9,19	95 Us VERSEAU.	10 6,75 23.6 Moyenne 6,61 25,1	Nov. 6 58,66 12",2	WEISSE, XXIII, 1003.
5 9,15 6 9,06	23h11m -10°2	3/	7 58,46 12,7	23 <sup>n</sup> 49 <sup>m</sup> +11°58′
Moyenne 9,11 11,5	Déc. 26 98,44 52",8		10 58,56 8,2	Nov. 3 1,38 59",8
Weisse, XXII, 452.	27 9,35 51,5 Moyenne 9,40 52,1	20 01 ,11 21	Moyenne 58,55 11,1	5 1,54 60,9
22 <sup>h</sup> 21 <sup>m</sup> -10 <sup>o</sup> 25		9 17,26 50,4		Moyenne 1,33 60,3
Oct. 16 225,93 48",0		13 17,05	23543 <sup>m</sup> -4°14	WEISSE, XXIII, 1007.
Nov. 4 23,07	25°25m +9°5	2 15 17,31 50,2	Nov. 16 475,15	23h49m +11°58
5 23,19 51,7 6 23,16 47,8		16 17,07 47,8 17 17,13 50,1		16 6,93 58,2
		Moyenne 17,21 50,2		

		1		
WEISSE, XXIII, 1007(suite).	30 Poissons.	α Ptte Ourse P. S. (suite).	" Pite Ourse P I (spite)	A Person D. S.
23 <sup>h</sup> 49 <sup>m</sup> +11°58′	23h54m -6o5o		+88°30'	+86°35′
	Oct. 18 15°,98 54",2		Juill. 12 33",7	Févr. 8 52",9
7,1	Nov. 6 15,85 50,2 7 15,84 58,7	30 35,6 31 37,1	13 33,2 14 33,2	10 50,6 16 53,4
Moyenne 7,00 56,4	9 15,92 57,5	Juin 4 35,7	16 30,0	Juill. 3 52,5
27 Poissons.	10 15,90 51,5 Moyenne 15,90 54,4	5 34,7 8 35,1	19 33,9 23 34,5	4 52,4 5 52,8
23h50 <sup>m</sup> -4°23′		9 34,5	24 30,8 25 33,2	6 51,6 10 53,0
Oct. 18 598,31 15",9 Nov. 6 59,63 18,2	33 Poissons.	25 35,9	30 32,6	12 54,6
7 59,66 21,5	23h57 <sup>m</sup> -6°32	Nov. 3 37,9	Août .3 31,2	14 53,7 16 50,8
10 59,60 15,8	Nov. 15 39°,20 43″,6 16 39,25	5 38,8 6 36,1	5 30.7	18 51,7 Août 3 52,1
15 59,57 17,3	22 39,57 42,6	7 37,9 9 39,7	22 32,2	5 50,7 8 54,1
Moyenne 59,55 18,1	Moyenne 39,34 43,1	10 35,7	25 34,2 27 35,9	11 54,2
PIAZZI, XXIII, 249.	α PETITE OURSE P. S.	15 39,6 . 16 37,5	28 36,2 29 32,6	19 49,8 20 50,6
23\51m -6043'	+88°30′	22 37,2	31 34,1	24 53,1 26 52,4
Nov. 22 583,82 Déc. 26 58,85 34",3 F	·	Déc. 26 36,3	Sept. 2 34,7 4 34,2	31 54,7
27 58,67	17 34,6 18 33,8	27 37,0 29 36,4	5 35,3 6 32,1	Sept. 4 49,9 5 54,9
Moyenne 58,78 34,3	19 34,3	Moyenne 36,4	10 34,0	10 50,3 13 50,9
ANONYME.	20 36,0 22 37,1		11 33,9 12 35,1	14 53,1
23h53m -6040'	23 36,6 24 37,3	α Petite Ourse P. I.	14 33,1 19 35,0	19 52,2 24 52,3
Nov. 15 21°,36 20″,4 16 21,47 16,3	26 36,8	+88°3°′	20 33,6	26 54,1 Oct. 8 54,1
22 21,54 13,5	27 36,7 28 38,7	Avril 5 34",2 6 30,2	26 34,8 27 32,0	9 49,5
Déc. 26 21,37 27 21,41	Mars 1 35,7 2 39,0	8 31,7 14 31,1	Oct. 7 34,7 9 36,4	14 51,4
Moyenne 21,43 16,7	5 38,0	19 31,6	12 33,1	15 51,0 16 50,9
Anonyme.	6 38, <sub>2</sub> 7 3 <sub>7,2</sub>	30 32,3 Mai 3 30,9	13 34,3 14 36,5	17 50,3 18 52,8
23h53m -6042'	8 38,6 9 38,4	6 33,6 8 33,5	15 36,2 16 34,6	31 52,7
Déc. 26 26,09	9 38,4 13 36,5 14 34,7	12 33,7	17 33,9	Nov. 4 48,0 5 49,3
27 26,05 41",1	15 36,5	29 31,4	29 34,1 30 33,3	6 50,5 7 50,5
Moyenne 26,07 41,1	16 38,8 Avril 11 35,3	Juin 4 55,0	Nov. 2 33,3 3 34,9	9 53,8
WEISSE, XXIII, 1117.	22 36,7 24 38,3	5 34,4	4 37.1	10 51,7 16 54,7
23h54m +11°49'	29 33,1	9 34,5	5 33, <sub>7</sub> 8 36,3	Moyenne 52,0
Oct. 15 15,67 11",0 16 15,81 13,7	7 37,3	10 33,0 18 33,6	9 37,2 10 35,1	8 PETITE OURSE P. I.
17 15,53 15,0	10 33,1 11 36,7	22 35,3 23 33,3	11 34,7	+86°35′
Nov. 3 15,78 7,6 4 15,73 12,4	12 36,3	30 31,7	13 35,4 14 35,6	Févr. 4 47",2 18 48,3
5 15,71 12,1	19 3 <sub>7</sub> ,5 22 33,8	4 33,7	15 33,9	19 44,9
Moyenne 15,70 12,0	24 34,0	5 32,5	Moyenne 33,7	20 48,4

142
Positions moyennes des étoiles observées pendant l'année 1850, ramenées au 1<sup>er</sup> Janvier de cette année.

8 Ptte Ourse P. I. (suite).	δ Ptte Ourse P. I. (suite).	of Ptte Ourse P. I. (suite).	of Ptte Ourse P. I. (suite).	& Ptte Ourse P. I. (suite).
22 46,7	+86°35' Févr. 27 46",6 28 47,0 Mai 1 47,4 2 47,2 5 46,6 6 46,0	86°35′ Mai 7 45″,4 8 47,1 9 46,2 13 46,7 14 47,2 Avril 3 46,1	12 48,3 29 49,8	+86°35' Août 26 48",7 27 48,4 28 46,7 Sept. 7 48,2  Moyenne 47,2

Comparaison des positions observées des étoiles fondamentales avec les positions tirées des Éphémérides de Berlin.

NOM DES ÉTOILES.	DÉCLINAISON OBS.	NOMBRE des OBSERVATIONS	овз.—е́рн.	ASC. DROITE OBS.	NOMBRE des ODSERVAT.	овѕ. — е́рн.
a Petite Ourse. { P. S. P. I. B. Petite Ourse. { P. I. B. P. S. P. I. B. Petite Ourse. { P. I. B. P. S. P. I. B. Céphée. P. S. a. Grande Ourse P. S. a. Cassiopée. P. S. a. Cassiopée. P. S. p. I. J. Grande Ourse P. S. p. I. J. Grande Ourse P. S. p. J. J. Grande Ourse P. S. p. J. J. Grande Ourse P. S. a. Cocher. Cocher. Cygne. A. Lyre. A. Gemeaux. B. Taureau. B. Gémeaux. B. Gémeaux. B. Gémeaux. B. Gémeaux. Andromède. Couronne Bélier. Bouvier. Taureau. B. Lion. A. Hercule. Pégase. Pégase. Pégase. Defiase. Pégase. A. Lion. A. Ophiuchus. J. Aigle. A. Aigle. A. Aigle. Detit Chien. Baleine. B. Vierge. Verseau. Hydre. B. Orion. Casepent. B. Aigle. Capricorne. Carlorone. Capricorne. Carlorone. Capricorne. Carlorone. ** 88.30.36,4 33,7 \$6.35.52,0 47,2  + 74.46. 9,7 7,5 + 69.54.13,9 + 62.33.35,6 + 61.57. 5,4 + 55.42.50,9  ** 48,0 + 54.31.44,1 + 51.30.31,4 + 50. 3.49,3 + 49.19.20,2 + 45.50.21,9 + 44.44.48,5 + 38.38.49,9 + 32.12.41,8 + 28.28.28,6 + 28.23. 0,2 + 28.15.41,8 + 27.13.19,3 + 22.44.59,4 + 19.57.52,7 + 16.12. 7,2 + 15.24.34,2 + 14.33.52,1 + 14.20.56,3 + 12.40.22,1 + 10.15. 3,2 + 8.28.32,9 + 7.22.26,1 + 6.54. 2,8 + 6. 2. 8,4 + 5.36.17,9 + 3.29.52,5 + 2.36.34,5 - 1. 2.50,1 - 8. 0.43,5 - 8.22.47,5 - 10.22.38,2 - 12.58. 6,3 - 13. 0.23,4 - 15.22.12,3 - 15.22.12,3 - 15.24.55,2 - 16.30.49,6 - 26. 5.40,8 - 30.24.58,8	57 78 45 24 25 24 25 22 38 25 26 27 38 48 43 39 39 30 31 41 52 43 43 43 43 43 43 44 45 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	+ 1,5 - 1,2 + 3,1 - 1,7 + 4,3 + 2,2 + 5,6 + 2,0 + 1,9 - 1,0 + 2,1 + 2,4 + 0,6 - 0,1 + 1,2 - 2,3 - 3,4 - 0,7 - 2,3 - 3,6 - 3,2 - 1,7 - 0,5 + 0,4 - 0,5 + 1,6 + 1,5 + 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,6 - 0,1 + 1,5 - 1,5 - 1,6 - 0,1 + 1,5 - 1,5 - 1,6 - 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,7 - 0,6 - 0,6 - 0,7 - 0,6 - 0,6 - 0,7 - 0,6 - 0,6 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 0,6 - 1,0 - 0,6 - 1,0 - 0,6 - 1,0 - 0,6 - 1,0 - 0,6 - 1,0 - 0,6 - 0,6 - 1,0 - 0,6 - 0,6 - 1,0 - 0,0 - 0,5 - 1,0 - 0,5 - 1,0 - 0,5 - 1,0 - 0,5 - 1,0 - 0,5 - 1,0 - 0,5 - 1,0 - 0,5 -	h. m. s.  14.51.12,08  11,97  21.26.42,46  10.54.25,71  21.14.59,89  0.32. 1,69  1.48  11.45.55,18  17.53. 7,59  13.41.37,59  3.13.38,41  5. 5.37,04  20.36.19,32  18.31.51,52  7.25. 1,28  5.16.48,74  7.36. 7,78  0. 0.38,58  15.28.20,27  1.58.43,59  14. 8.49,22  4.27.19,02  11.41.24,28  17. 7.48,59  22.57.17,49  0. 5.30,94  10. 0.22,67  17.27,58,40  19.39. 7,67  19.43.27,79  5.47. 3,07  15.36.52,98  19.47.56,68  7.31.26,86  7.31.26,86  7.31.26,86  7.31.26,86  7.31.26,86  7.31.26,86  7.31.26,86  7.31.26,86  7.31.26,86  7.31.27,17,78  20. 9.19,79  13.17,17,78  20. 9.19,79  14.22.23,96  14.42.35,38  6.38.32,22  16.20.13,10  22.49.21,01	29 35 30 26 28 32 38 27 39 23 43 35 49 40 40 43 40 43 43 43 40 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	+ 0,12 + 0,01 + 0,17 + 0,18 + 0,11 - 0,10 - 0,09 - 0,02 + 0,03 - 0,05 + 0,11 + 0,19 - 0,06 + 0,03 - 0,01 - 0,06 - 0,01 - 0,06 - 0,01 - 0,06 - 0,01 - 0,06 - 0,01 - 0,06 - 0,04 - 0,01 - 0,06 - 0,04 -	

## Réduction des observations du Soleil faites à la lunette méridienne pendant l'année 1850. Midi vrai de Genève.

							te Genev						
Date.		AR centre.	Erreur éph.	Déclin, centre.	Erreur éph.	Bord obs.	Date.		AR centre.	Erreur éph.	Déclin. centre.	Erreur éph. I	Bord obs.
		h. m. s.	8.	0 , 11	4				h. m s.	S.	0 , ,,	#	
Févr.	3	21. 7.20,07	-0,3 r	-16.31.49,2	-12,3	S	Mai 1	18	3.39.18,97	-0,11			2.
	4	21.11.22,32	-0,13			L	1	19	3.43.17,42	+0,19	+19.44.47,7	+ 2,9	S
	5	21.15.23,92	-0,11	-15.56.11,2	+ 2,5	S	2	20	3.47.16,99	-0,10	+19.57.27,0	+ 7,7	1
	9	21.31.22,49	-0,14	-14.41.16,6	+ 7,1	S	:	21	3.51.16,68	+0,03	+20.10. 2,3	- 3,8	S
	9 14	21.51. 3,22	-0,21	-13. 2. 0,7	+ 3,7	I		22	3.55.16,79	+0,26	+20.21.54,3	+ 7,2	I
	16	21.58.50,10		-12.20.45,5	+ 0,7	S	2	23	3.59.18,07	-0,15	•		2.
	17	22. 2.42,49		-11.59.55,6	+ 4,7	I		- 6	4.23.34,01	-0,39			1.
	18	22. 6.34,07		-11.38.43,1	- 2,6	S		29 {	33,58	+0,04			2.
	19	22.10.25,20		-11.17.30,1	+ 0,6	I	3	3o `	4.27.38,04	-0,13	+21.45.32,1	+ 1,9	I
	20	22.14.15,13	, ,	-10.56. 5,4	+ 2,6	S		31	4.31.43,19	-0,53	+21.54.21,5	- 0,5	S
	21	22.18. 4,61	+0,12	-10.34.25,8	- 0,3	S		5	4.52.12,61	+0,10	+22.32.20,9	+10,0	I
	22	22.21.53,72	-0,09	-10.12.45,3	+ 5,5	S		6	4.56.20,05	-0,20	+22.39. 4,1	- 5,4	S
	23	22.25.41,89	-b,ot	- 9.50.42,4	- 1,8	Ĭ		9	5. 8.43,20	-0,04	+22.55.52,3	+ 6,8	Ĭ
	24	22.29.29,80		- 9.28.39,6		s		10	5.12.51,31	+0,18	+23. 0.54,6	- 3,5	ŝ
	25	22.33.10,72	-0,19	9.20.09,0	0,1	2.		11	5.17. 0,14	-0,09	+23. 5.14,1	+ 4,7	ı
	26	22.37. 3,19				2.		,	5.46. 4,62	-0,24	720. 0.14,1	1 17/	1.
				- 8.21.47,0	4100	I	:	18 {	4,53	-0,15			2.
	<sup>2</sup> 7 <sub>2</sub> 8	22.40.48,99		- 7.58.58,8	+10,0			. (	5.50.13,87		10306 /0	+11,8	I.
37		22.44.34,08			- 2,1	S		19		+0,03	+23.26. 4,9	111,0	
Mars	I	22.48.19,16		- 7.36.19,5	+ 1,6	I		20	5.54.23,48	~0,05			1.
	2	22.52. 3,33	-0,05	- 7.13.29,7	+ 1,5	S			23,40		1.2.61.	1 -6	2.
	3	22.55.47,26	-0,16	- 6.50.35,6	+ 3,1	S		23	6. 6.52,17	-0,27	+23.26.49,7	+ 1,6	I
	5	23. 3.13,64		- 6. 4.34,5	+10,5	I		24	6.11. 1,13	+0,14	+23.26. 2,6		S
	7	23.10.37,98	0,00	- 5.17.58,1	+ 2,7	S		25	6.15.10,66	-0,10	+23.24.35,8	+ 4,0	I
	8	23.14.19,71	-0,02	<b>-</b> 4.54.36,0		I		26	6.19.19,52	+0,22	+23.22.55,7		S
	9	23.18. 0,86		- 4.3 <sub>1</sub> . 7,0		S		27	6.23.28,54		+23.20.40,2		I
	10	23.21.42,19		-4.7.45,5		I		30	6.35.55,15		+23.12. 2,4		I
	12	23.29. 3,18		- 3.20.33,6		S	Juill.	2	6.44.11,51	-0,08	+23. 4. 9,0		S
	13	23.32.42,98	+0,21	- 2.57. 4,4		I		3	6.48.19,19		+22.59.25,7	+ 4,7	I
	14	23.36.22,89		- 2.33.17,9	- 3,1	S		4 5	6.52.26,85	+0,04	+22.54.34,3	- 1,9	S
	15	23.40. 2,85		- 2. 9.45,1		I		5	6.56.34,33	'-0,15	+22.49. 5,1	+ 5,3	I
	16	23.43.41,77	+0,03	– 1.45.58 <u>,</u> 9	- 1,0	S		6	7. 0.41,05	+0,12	+22.43.26,8	- 2,1	S
		o. 5.33,50	-0,17			I.		Ιī	7.21.10,37	+0,21	+22. 8.36,7	+ 7,0	I
	22	$33,_{7}$	-0,31			2.		12	7.25.15,25	-0,05	+22. 0.33,4	+ 4,9	S
		0.23.43,31	-0,04			I.		13	7.29.19,30	+0,05	+21.52. 5,1	+ 5,1	I
	27	43,37	-0,10			2.		14	7.33.22,91	+0,11	+21.43.15,2	+ 4,4	S
		0.30.59,02	+0,07			1.		16	7.41.28,79				1.
	29	59,08				2.		17	7.45.30,84		+21.14.28,9	+ 6,3	1
	_	0.34.36,80				Ι.		18	7.49.32,45		+21. 4. 6,9		S
	30	36,86				2,	i	21	8. 1.33,84		+20.31. 2,7		·I
Avril	10	1.14.44,21	, ,	+ 7.54.47,5	+ 3,0	I		22	8. 5.33,25		+20.19.29,7	+ 2,4	Ŝ
14 1441	11	1.18.24,90		+ 8.16.57,5		S		23	8. 9.31,91		+20. 7.16,8		ĩ
	13	1.22. 4,74		+ 8.38.50,2		I	i .	24	8.13.30,18		+19.54.59,4		s
	14	1.29.27,26		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 5,0	2.	1	25	8.17.27,42		+19.42.13,2		ĭ
		1.47.57,20		+11. 8.17,3	+ 8,3	.I		29	8.33.12,45		+18.48.10,8		s
	19 23	2. 2.53,33		, 111 0.1 / ,0	7 0,0			30	8.37. 6,83		+18.33.50,6		I
		2. 6.38,10		+12.49.45,3	420	1 - I		31	8.41. 0,92		+18.19.18,1		S
	24	2,10,23,65		+13. 9:29,6		S	Août	3	8.52.40,10		+17.33.30,1		. I
	25		. ,	+14.25.49,5			Aout				+17.17.58,2	3,8	S
	30	2.25.30,28				S		4 5	8.56.31,76		+17. 1.44,5	+ 6,4	I
77-1		2.29.18,04		+14.44.24,6		I			9. 0.22,70				S
Mai	3	2.40.44,92		+15.38.23,0		I		6	9. 4.13,30		+16.55.26,5		
	4	2.44.35,25		+15.56. 2,3				8	9.11.52,50		+16.11.56,8	+ 2,3	S.
	10	3. 7.49,00		+17.35.36,				9	9.15.41,50		+15.50.43,7		I e
	11	3.11.43,07		+17.51. 1,5		I		II	9.23.17,47		+15.19.42,6	+ 3,9	S
	12	3.15.38,0		+18. 6.27,				15	9.34.22,27				2.
	13	3.19.33,16		+18.21.26,		I		16}	9.42. 6,68				I.
	15	3.27.26,08	3 -0,20	+18.50.39,7	7 - 4,7	S		t	7,06	-0,15			2.

145
Réduction des observations du Soleil faites à la lunette méridienne pendant l'année 1850.
Midi vrai de Genève.

Date		AR centre.	Erreur éph.	Déclin, centre,	Erreur éph.	Borlobs.	Date	3	AR centre.	Erreur éph.	Déclin, centre.	Feraur onh	Rard sha
		h. ni. s.	S.	0 , ,	4				h. m. s	S.	0 , ,,	Lifeat cpu.	DOLE OD.
A 0.	-01	9.49.34,88	+0,03			Ι.	Sept.	27	12.14.37,47		· , ,,	.,,	2,
Août	10 }	34,96				2.	Oct.	7	12.50.55.31	+0,14	- 5.27.46,3	+ 2,4	S
	20	9.57. 1,22		+12.30.22,1	+ 6,4	I		q.	12.58.15,55		-6.13.49,4		1
	22	10. 4.25,06				2.		9 13	13.13. 1,04		- 7.44.23,5		S
	25	10.15.27,43	+0,06	+10.49. 4,1	+11,2	I		14	13.16.43,44		- 8. 7. 1,3		ĭ
	26	10.19. 7,56	0,00	+10.28.19,5		S		15	13.20.26,63		/	1,0	ī.
	27	10.22.47,21	+0,03	+10. 7.28,6	+ 3,0	1		16	13.24.10,19	-0,21	- 8.51.28,9	+ 9,2	ī
	28	10.26.26,53	+0,02	+ 9.46.23,6		S		17	13.27.54,28		- q.13.21 <sub>17</sub>		Š
	29	10.30. 5,54	-0,03	+ 9.24.59,5	+ 9,5	1		18	13.31.39,06		- 9.35.26,1		ĭ
	31	10.37.22,57	-0,11	_		2.		19	13.35.24,41	-0,11	- 9.57. 5,6		Š
Sept.	X	10.41. 0,39	+0,09	+ 8.20.25,1		S		31	14.21.22,71	-0,13	-14. 5.27,3		I
		10.44.38,11	+0,10	+ 7.58.23,5		I	Nov.	2	14.29.13,31	-0,32	-14.44.3,1		s
		10.48.15,65	+0,04	+ 7.26.32,0		I		3	14.33. 9,46	-0,04	-15.3.1,2	+ 4,0	I
		10.51.52,62	+0,28	+ 7.14.42,4		S		4	14.37. 6,76	-0,09	-15.21.37,2	- 0,9	S
		10.55.29,88	-0,01	+ 6.32. 9,0	+10,7	I		5	14.41. 4,93	-0,18	-15.40.17,8	+13,9	1
		10.59. 6,61	+0,01	+ 6.30. 0,2	- 0,2	S		6	14.45. 3,72	-0,08	-15.58.EE,0	- 3,0	S
		11. 6.19,65	-0,15	+ 5.44.48,6		I		7	14.49. 3,54	-0,17	-16.16.17,4	+ 9,1	1
	10	11.13.31,86	-0,21	+ 4.59.40,9		S		9	14.57. 5,64	-0,29	-16.51.12,8	+ 5,9	S
	I K	11.17. 7,53	-0,03	+ 4.36.45,7	+ 5,4	I		10	15. 1. 7,65	-0,07	-17. 8.21,7		I
		11.20.43,27	-0,06	+ 4.14. 0,5	- 2,6	S		15	15.21.31,27	-0,03	-18.28.50,7		S
		11.24.18,84	-0,04			2.		16	15.25.38,64		-18.44.19,1		I
		11.27.54,26	+0,04	+ 3.27.54,4		I		22	15.50.39,49		-20. 8. 4,0		1
		11.45.51,22	-0,13	+ t.31.50,1	+10,4	I		24	15.59. 6,34	-0,38	-20.33.11,6	4 /	S
		11.49.26,35	+0,12	+ 1. 8.39,1	+ 2,3	S	Déc.	26	18.19.14,48	-0,13	-23.23. 0,8		S
	-	12. 3.48,63	+0,17	- 0.24.54,8	+ 5,1	I		28	18.28. 7,20	-0,23	-23.18. 8,6		I
	26	12.11. 0,77	+0,04	- 1.11.50,4	+11,1	I		29	18.32.33,27	-0,22	-23.14.49,8	+ 4,3	S

Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1850.

	Mercure.									
Date. Févr. 18 19 22 23 27 . Mars 1 4 6 7 9 12 13	Temps moy, de Genève.  b. m. s.  22.53:13,1  22.45.27,7  22.36.46,3  22.34.38,4  22.29.16,3  22.28. 9,8  22.28. 1,9  22.28.47,2  22.29.22,5  22.30.56,2  22.34. 4,3  22.35.18,5	AR. Centre h. m. s. 20.45.15,99 20.45.26,59 20.48.33,14 20.50.21,67 21. 0.44,97 21. 7.31,38 21.19.13,06 21.27.51,63 21.32.23,57 21.41.50,66 21.56.48,92 22. 1.59,83	- 0,81 - 0,78 - 0,89 - 0,50 - 0,44 - 0,28 - 0,33	Déclinaison Centre.  - 15.39.14,"2 - 15.51.54,4 - 16.19.53,2 - 16.25.54,9 - 16.33.45,4 - 16.28. 7,1 - 16. 8.16,4 - 15.47.25,9 - 15.34.50,1 - 15. 5.25,8 - 14.10.41,7 - 13.49.51,6	Erreur éph.  - 4',9 - 3,1 - 6,1 - 6,5 - 6,7 - 7,5 - 0,9 - 5,1 - 6,5 - 4,9 - 10,1 - 3,0					
14 15 Juill. 2 3	22.36.37,4 22.38. 1,1 22.32.26,4 22.32.22,8	22. 7.15,56 22.12.36,02 5.16.44,90 5.20.37,75	- 0,23 - 0,26 + 0,01 + 0,03	- 13.27.33,1 - 13. 3.57,2 + 19.56.11,3 + 20.11.33,3	- 3,3 - 1,6 + 1,2 + 2,3					

146
Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1850.

		Mercure	(suite).		
Date.	Temps moy, de Genève.	AR. Centre.	Erreur éphém.	Déclinaison Centre.	Erreur éph.
Juill. 5	b. m. s. 22.33.14,6	h. m. s. 5.29.22,83	- o,o3	+ 20.43.10,6	+ 4,3
12	22.46.24,2	6.10.10,53	+ 0,02	+ 22.24.58,6	+ 8,1
16	23. 0.29,8	6.40. 4,61	+ 0,36	+ 22.58.34,5	+ 6,7
24	23.38. 8, <sub>7</sub>	7.49.22,18	+ 0,73	+ 22.17.28,2	+ 7,1
Août 28	1.24.12,4	11.49.46,16	- 0,17	+ 0.41.25,3	+ 2,9
Sept. 2	1.28.40,7	12.13.57,95	- 0,03	- 2.43.30,7	+ 0,1
3	1.29.18,1	12.18.32,02	- 0,19	- 3.22.32,5	- 0,8
4 6	1.29.49,4 1.30.35,1	12.23. 0,01	+ 0,06 - 0,04	- 4. 1. 4,1 - 5.15.21,3	+ 9,0 - 5,4
10	1.30.49,0	12.47.39,00	- 0,04 - 0,25	- 5.15.21,5 - 7.33.59,1	+ 0,1
12	1.30.11,3	12.54.54,31	- 0,13	- 8.37. 7,2	+ 1,8
19	1.22.45,6	13.15. 3,43	- 0,50	- 11.33.38,3	+ 5,0
20	1.20.50,6	13.17. 4,49	- 0,41	- 11.51.37,7	+ 4,3
26	1. 1.54,0	13.22.44,31	- 1,05	- 12.44.43,6	+ 0,1
Oct. 16	22.50.25,5	12.32.41,66	- 0,50	- 2.31.14,1	+ 10,1
Nov. 4	22.53.47,1	13.50.58,30	0,00	- 9.34.27,4	+ 5,4
6	22.57.49,0	14. 2.53,90	+ 0,06	- 10.51. 9,4	+ 4,2
15	23.17.41,5	14.58.18,74	- 0,10	- 16.19.46,0	+ 2,9
		Vém	us.		
		- CAR			
Févr. 14	0. 0.18,7	21.36.51,58	- 0,28	- 15.33.59,5	- I,I
19	0. 5. 6,4	22. 1.22,23	0,00	- 13.32.49,6	+ 0,1
20	0: 6: 0,6	22. 6.12,70	+ 0,16	- 13. 7.23,6	- 2,6
23	o. 8.36,o	22.20.38,21	+ 0,02	- 11.49.10,9	- 1,4
25	0.10.14,5	22.30.10,04	- 0,06	- 10.55.29,8	+ 2,2
26	0.11. 2,0	22.34.54,25	+ 0,14	- 10.28.10,9	+ 2,4
Mars 7	0.17.34,0	23.16.56,28	+ 0,17	- 6.11.19,6	+ 2,1
	0.18.53,5	23.26. 9,14	+ 0,03 + 0,15	- 5.41.51,2 - 5.12. 9,4	+ 5, <sub>7</sub> + 4, <sub>5</sub>
Juill. 3	2.16.34,6	9. 1.29,92	+ 0,06	+ 18.46. 0,6	+ 1,7
4	2.17.28,0	9. 6.20,02	- 0,08	+ 18.25. 9,5	+ 1,4
5	2,18.19,9	9.11. 8,60	- 0,11 /		+ 2,6
6	2.19.10,5	9.15.55,84	- 0,16	+ 17.41.58,9	+ 4, <sub>7</sub> + 5,5
13	2.24.25,5	9.48.47,62	- 0,17	+ 14.57.13,8	
14	2.25. 5,0	9.53.23,83	- 0,13	+ 14.32. 9,8	+ 2,6
16	2.26.20,5	10. 2.32,62	- 0,31	+ 13.40.53,7	+ 0,9
17 18	2.26.56,2 2.27.30,6	10. 7. 4,92	_ 0,23	+ 13.14.46,4	- 1,1 + 1,1
19	2.28. 3,7	10.16. 5,78	- 0,27 - 0,11	+ 12.48.15,4 + 12.21.32,0	+ 1,1 - 2,9
24	2.30.32,1	10.38.17,40	- 0,13	+ 10. 3.17,5	- 0,2
30	2.32.55,6	11. 4.20,57	- 0,46	+ 7. 9.40,2	- 1,5
31	2.33.15,8	11. 8.37,56	- 0,24		
Août 3	2.34.13,0	11.21.24,47	- 0,43	+ 5.10.19,4	- 2,2
5		11.29.51,76	- 0,33	+ 4. 9.42,5	+ 5,0
8	2.35.33,6	11.42.28,04	- 0,48	+ 2.38.14,2	+ 2,6
11	2.36. 1,7 2.36.14,4	11.50.49,32	- o,58	+ 1.36.53,5	- 0,1
25	2.38.42,8	12.52.39,15	- 0,15 - 0,52	+ 1. 6. 4.5 - 6. 4. 4.1	+ 2,2 + 3,7
	2.39. 1,1	13. 0.50,62	- 0,56	- 7. 4.21,5	- 0,7
27 28	2.39.10,4	13. 4.56,43	- 0,65	- 7.34.19,2	- 0,7 - 2,3

147
Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1850.

		Vénus	(suite).		
Date.	Temps moy, de Genère.	AR. Centre.	Erreur éphém.		Erreur éph.
Août 29	2.39.19,4	13. 9. 2,10	- 0,59	- 8. 4.14,1	+ 1,6
Sept. 2	2.39.37,9 2.39.56,9	13.17.13,75	- 0,58 - 0,57	- 9. 3.28,4	+ 1,5
3	2.40. 6,7	13.29.32,21	- 0,68	- 10. 2. 2,7 - 10.31. 7,0	+ 2,4 + 6,8
4	2.40.16,5	13.33.38,62	- 0,66	- 10.59.51,3	+ 3,2
5	2.40.26,6	13.37.45,26	- 0,69	- 11.28.23,7	+ 0,6
6	2.40.36,7	13.41.51,99	- 0,64	- 11.56.45,1	+ 0,4
10	2.41.19,9 2.41.31,0	13.58.21,54	- 0,89 - 0,64	- 13.47.47,3	+ 1,8
12	2.41.42,5	14. 6.37,34	- 0,70	- 14.14.52,3 - 14.41.40,5	+ 1,3 + 1,2
19	2.43. 9,3	14.35.40,41	- 0,66	- 17.40.30,7	+ 4,7
26	2.44.43,4	15. 4.50,43	- 0,77	- 20.21.16,0	+ 4.4
Oct. 8	2.47.14,4	15.54.40,41	- 0,95	- 24. 6.25,7	+ 3,9
14	2.47.52,8 2.47.57,2	16.15. 1,65 16.19. 2,64	- 0,95	-25.19.3,7 -25.32.3,1	+ 7,5
15	2.48. 0,0	16,23. 2,04	- 1,09 - 1,06	- 25.44.19,1	+ 12,1 + 6,0
16	2.48. 1,2	16.26.59,82	- 0,94	- 25.56.10,4	+ 7,6
17	2.48. I,o	16.30.56,17	- 1,06	- 26. 7.29,1	+ 9,6
Nov. 5	2.47.58,8	16.34.50,50	- 0,95	- 26.18.16,5	+ 13,6
6	2.39.10,6 2.38. 2,0	17.36.58,83	- 1,21 - 1,3/	- 27.57.57,7	+ 19,3
7	2.36.47,6	17.42.28,53	- 1,34 - 1,43	- 27.58.32,6 - 27.58.30,3	+ 22,6 + 18,9
9	2.34. 0,6	17.47.34,20	- 1,51	- 27.57. 8,0	+ 21,7
10	2.32.27,4	17.49.57,30	- 1,49	- 27.55.40,2	+ 19,9
15 16	2.22.53,6	18. 0. 4,69	- 1,92	- 27.41.25,8	+ 21,1
10	2.20.54,7	18. 1.42,31	- 1,94	- 27.37.12,9	+ 22,8
		Mar	s.		
Févr. 4	8.11.20,1	5. 9.47,05	- 1,04	+ 26. 1.56,4	+ 13,8
9	7.55.16,0	5.13.23,12	- 0,90	+ 26. 1.14,0	+ 12,4
14	7.40.14,8	5.18. 2,23	- 0,86	+ 26. 1. 5,1	+ 13,9
17	7.31.41,6 7.28.55,0	5.21.17,30 5.22.26,74	- 0,87	+ 26. 1.14,3	+ 9,8
19	7.26.10,0	5.23.37,87	- 1,01 - 0,79	+ 26. 1.15,1 + 26. 1.19,2	+ 11,2 + 9,2
2.0	7.23.27,3	5.24.51,31	- 0,89	+ 26. 1.18,8	+ 11,5
22	7.18. 7,7	5.27.23,92	- 1,01	+ 26. 1.24,2	+ 8,4
23	7.15.30,5	5.28.42,78	- 0,82	+ 26. 1.25,1	+ 6,9
24 26	7.12.55,2 7. 7.49,9	5.30. 3,64 5.32.50,65	- 0,83 - 0,88	+ 26. 1.21,4	+ 10,2
27	7. 5.18,8	5.34.16,68	- 0,92	+ 26. 1.12,8	+ 10,6 + 8,0
28	7. 2.51,2	5.35.44,21	- 0,79	+ 26. 1. 3,8	+ 10,1
Mars 1	7. 0.24,3 6.58.58,9	5.37.13,41	- 0,81	+ 26. 0.54,6	+ 10,6
2 5	6.58.58,9 6.50.51,6	5.38.44,23	- 0,80	+ 26. 0.44,0	+ 9,9
6	6.48.32,0	5.43.25,44 5.45. 1,93	- 0,80 - 0,64	+ 25.59.55,0 + 25.59.40,1	+ 10,2
	6.46.14,2	5.46.40,38	- 1,05	+ 25.59.11,5	+ 4,7
7 8	6.43.57,3	5.48.19,62	- 0,90	+ 25.58.46,5	+ 6,5
9 13	6.41.41,7	5.50. 0,21	- 0,77	+ 25.58.14,9	+ 7.4
13	6.33.51,4	5.56.55,64	- 0,57	+ 25.55.34,9	+ 8,3
14	6.30.43,1	5.58.42,61	- 0,70	+ 25.54.42,7	+ 10,9

148
Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1850.

Date.					
Date.	Temps moy, de Genève.	AR. Centre.	Erreur éphém.		Erreur éph.
Avril 3	h. m. s. 5.50.59 <sub>1</sub> 1	b. m. s. 6.37.43,08	- o,63	+ 25.20.44,8	+ 9,4
11	5.36.26,6	6.54.40,62	0,37	+ 24.55.53,5	
Juin 9	3.58.26,3	9. 9. 0,98	- 0,57	+ 17.50.59,9	+ 7,9 + 5,5
10	3.56.48,8	9.11.19,73	- o,68	+ 16.40. 8,9	+ 8,0
Juill. 19	2.52.46,1	10.40.52,22	- 0,44	+ 9.23.54,2	+ 4,8
30	2.34.35,6	11. 6. 1,89	- 0,43	+ 6.42.39,8	+ 5,8
31	2.32.57,9	11. 8.19,42	- 0,53	0.	
Août 3	2.28. 1,7	11.15.12,11	- 0,57	+ 5.42.26,7	+ 1,4
10	2.28. 1,7 2.16.33,5	11.31.17,87	- 0,72	+ 3.55. 4,9	+ 5,1
II	2.14.55,3	11.33.36,01	- 0,54	+ 3.39.39,1	+ 1,3
25	1.52.16,9	12. 6. 5,62	- o,55	- 0. 0.22,8	+ 3,8
Sept. 2	1.39.36,1	12.24.55,18	- 0,70	0.04.0	
3	1.38. 2,0	12.27.17,41	- 0,72	- 2.23.34,3	- 0,4
		Victo	ria.		
Sept. 26	11.12.49,4	23.34.19,87		+ 12. 0.26,7	
	10.13.48,3	23.26.24,21		+ 9.37.20,9	
Oct. 9	9.56.30,4	23.24.49,71		+ 8.54.23,6	
14	9.52.15,3	23.24.30.46		+ 8.44.17,0	
15	9.48. 2,2	23.24.13,12		+ 8.34.23,1	
16	9.43.50,5	23.23.57,45		+ 8.24.22,5	
17	9.39.41,1	23.23.43,86		+ 8.14.22,5	
18	9.35.33,5	23.23.32,21		+ 8. 4.41,1	
Nov. 5	8.26.28,9	23.25.14,17		+ 5.44.28,0	
G	8.22.55,8	23.25.36,90		+ 5.38.57,8	
7	8.19.23,6	23.26. 0,80		+ 5.33.31,1	
9	8.12.25,6	23.26.54,76		+ 5.23.18,0	
10	8. 8.59,0	23.27.24,12		+ 5.18.49,8	
		Jupi	ter.		
Mai 18	7.15.51,1	11. 0.13,93	- 0,79	+ 7.51. 6,0	+ 7,1
29	6.34.15,0	11. 1.53,06	- 0,89	+ 7.38.26,7	+ 2,6
Juin 5	6. 8.25,3	11. 3.35,06	- 0,93	+ 7.26.18,1	+ 4,€
9	5.53.52,4	11. 4.46,04	- 0,79	+ 7.18. 4,1	+ 3,9
10	5.50.15,8	τι. 5. 5,39	- 0,95	+ 7.15.50,3 + 6.30. 6,6	+ 5,2
Juill. 27	4.50. 9,9	11.11.51,06	- 0,77	+ 6.30. 6,6	+ 2,0
	4.22.39,7	11.15.48,79	- 0,90	+ 6. 3.37,2	+ 6,9
13	3.55.35,2	11.20.12,30	- 0,87	. = - 16 -	1
16	3.45.32,2	11.21.57,29	- 0,96	+ 5.22.46,9	+ 12,0
17	3.42.11,8	11.22.32,93	- 0,95	+ 5.19. 1,3	+ 2,5
18	3.38.51,6	11.23. 8,75	- 0,79	+ 5.15.10,1 + 4.50.27,6	
24	3.18.58,1	11.26.51,35	- 0,81	+ 4.50.27,6 + 4.24.46,7	+ 5,1
30	2.59.15,3	11.30.44,62	- 0,8 <sub>2</sub>	+ 4.20.20,8	+ 9,0
Anna 3	2.55.59,1	11.31.24,41	- 0,85 - 0,85	+ 4. 6.59,7	+ 10,0
Août 3	2.46.12,1	11.33.23,33	- 0,84	+ 3.58. 0,2	+ 9,5
10	2.23.31,1	11.34.47,49	- 0,96	+ 3.34.54,7	+ 16,4
		11.38.59,17	- 1,02	+ 3.30.24,0	+ 7,0
11	2.20.17,7	11.30.39,17	- 1,02	T 0,00,24,0	1 /20

Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1850.

		Satur	ne.		
Date.	Temps moy, de Genève.	AR. Centre.	Erreur éphém.	Déclinaison Centre.	Erreur éph.
Oat	h. m. s.	h. m. s.	5.	+ 4. 5.14,4	+ 5,6
Oct. Nov.	18 11.18.24,6 3 10.11. 7,9	1, 6.40,18	- 1,41		
NOV.	2 4 10	1. 2.17,28	- 1,38		+ 6,0
	4 10. 6.57,1 5 10. 2.46,4	1. 2. 2,27	- 1,38	+ 3.38.13,7	+ 6,7
		1. 1.47,53	- 1,44	+ 3.36.51,2	+ 6,4
	6 9.58.36,0	1. 1.32,96	- 1,44	+ 3.35.23,2	+ 13,4
	7 9.54.25,6	1. 1.18,41	- I,21	+ 3.34. 9,2	+ 8,2
	9 9.46. 5,9	1. 0.50,51	- 1,23	+ 3.31.39,8	+ 4,6
	10 9.41.56,7	1. 0.37,13	- 1,41	+ 3.30.23,1	+ 7,6
	15 9.21.13,6	0.59.33,37	- 1,36	+ 3.24.47,9	+ 4,4
D./	16 9.17. 5,5	0.59.21,58	- 1,44	+ 3.23.40,6	+ 9,7 + 6,3
Déc.	7 7.51.40,8 25 6.40.42,6	0.56.30,18	- 1,34	+ 3.11. 9,6	+ 6,3
	25 6.40.42,6	0.56.18,27	- r,3 <sub>7</sub>	+ 3.15.13.1	+ 3,9
	26 6.36.49,7	0.56.21,37	- 1,30	+ 3.15.45,0	+ 9,8 + 3,8
	27 6.32.57,3	0.56.24,90	- 1,26	+ 3.16.31,3	
	29 6.25.13,8	0.56.33,25	- 1,25	+ 3.17.55,6	+ 7,7
		Uran	us.		
Nov.	5 10.44.37,8	1.43.45,76	+10,64	+ 10. 8. 1,4	+ 60,4
11011	6 10.40.33,1	1.43.37,00	+10,54		+ 62,0
	50.0			+ 10. 7.10,7 + 10. 6.21,9	+ 62,1
		1.43.27,80	+10,95		
	9 10.28.19,2 15 10. 3.53,5	1.43.10,70	+10,66	+ 10. 4.46,4	+ 61,1
	10. 3.33,3	1.42.20,32	+10,81	+ 10. 0.11,6	+ 58,2
Déc.	16 9.59.49,7	1.42.12,42	+10,66	+ 9.59.22,9	+ 62,4
Dec.	7 8.34.54,9 25 7.23, 2.0	1.39.51,30	+10,57	+ 9.46.36,8	+ 57,8
	1	1.38.45,60	+10,24	+ 9.41. 2,2	+ 51,1
	26 7.19. 5,1	1.38.43,64	+10,26	+ 9.40.50,7	+ 53,7
	27 7.15. 7,4	1.38.41,83	+10,33	+ 9.40.39,3	+ 57,2
	29 7. 7.12,7	1.38.38,97	+10,29	+ 9.40.33,6	+ 50,7
		Neptu	me.		
Sept.		22.29.39,55	+ 3,35	- 10.19. 6,4	+ 21,2
	12 11. 3.10,3	22.29.27,49	+ 3,33	- 10.20.15,5	+ 19,4
	14 10.55. 7,0	22.29.15,94	+ 2,95	- 10.21.28,0	+ 22,0
	24 10.14.51,3	22.28.19,19	+ 3,15	- 10.26.58,5	+ 23,0
	26 10. 6.48,7	22.28. 8,33	+ 3,41	- 10.27.57,3	+ 20,8
Oct.	9 9.14.39,9	22.27. 6,16	+ 3,32	- 10.33.56,5	+ 23,7
	9 9.14.39,9 13 8.58.40,0	22.26.49,78	+ 3,24	- 10.35.25,2	+ 19,4
	14 8.54.40,1	22.26.45,81	+ 3,39	- 10.35.48,6	+ 21,3
	15 8.50.40,5	22.26.42,07	+ 3,41	~ 10.36. q,5	+ 21,3
	16 8.46.41,0	22.26.38,50	+ 3,36	- 10.36.32,4	+ 23,9
	18 8.38.42,3	22.26.31,63	+ 3,29	- 10.37. 8,8	+ 21,5
	25 8.10.49,7	22.26.10,30	+ 3,47	- 10.39. 4,3	+ 20,3
Nov.	3 7.35. 7,6	22.25.51,36		- 10.40.46,1	+ 21,1
	4 7.31.10,4	22.25.50,01	+ 3,36	- 10.40.57,1	+ 24,4
	5 7.27.13,0	22.25.48,52		- 10.41. 2,1	+ 22,5
	6 7.23.15,8	22.25.47,20		- 10.41. 6,8	+ 21,1
	1.20.10,0	22.23.47,20	+ 3,30	- 10,41, 0,0	T -191
	7 7.19.18,7	22.25.46,04	+ 3,60	- 10.41.11,9	+ 20,

150


## Réduction des observations des Planètes, faites à la lunette méridienne pendant l'année 1850.

Neptune (suite).					
Date.  Nov. 10 15 16 Déc. 7	Temps moy, de Genève.  7. 7.28,4 6.47.47.0 6.43.51,2 5.21.47,4	AR. Centre. h nt. s. 22.25.43,43 22.25.41,60 22.25.41,67 22.26.12,04	Erreur éphém. + 3,58 + 3,57 + 3,52 + 3,42	Déclinaison Centre.  - 10.41.24,3  - 10.41.31,5  - 10.41.29,1  - 10.38.12,4	Erreur éph.  + 21,1 + 23,0 + 21,8 + 23,1


## OCCULTATIONS D'ÉTOILES PAR LA LUNE OBSERVÉES PENDANT L'ANNÉE 1850.

Les instants sont donnés en temps sidéral de Genève. Les initiales B et P désignent les observations faites par M. Bruderer et par moi.

			h m s	
Le 26 Février	63 χ Lion	Immersion au bord éclairé	4.57.37,34	P
» ·	3)	Emersion au bord obscur	5.49.27,88	P
Le 27 Mars	γ Vierge	Immersion au bord éclairé	13.30. 5,78	В
Le 19 Mai	IIIe Satellite de Jupiter	Immersion au bord obscur	11. 0.29,85	P
n ,	n n	)) )) )) ))	29,55	В
<b>)</b>	IIe Satellite	)) )) )) )) ))	11. 0.54,25	P
3)	1er Bord de Jupiter	n n n n	11. 1. 5,25	P
n	)) ·	» » »	4,55	В
n	2me Bord de Jupiter	n n n	11. 3. 5,45	P
n	)) ))	n n n	4,15	В
))	Ier Satellite	n n n	11. 5. 9,05	P
n	IIe Satellite	Emersion au bord éclairé	12. 0.32,78	P
n	1er Bord de Jupiter	n n n	12. 0.52,78	P
>>	n n	n n n	53,78	В
n	2me Bord de Jupiter.	n n n	12. 2.46,28	P
>>	Ier Satellite	n n n n	12. 5.16,78	P
Le 20 Août	15 v Capricorne	Immersion au bord obscur	19. 4.25,77	В
Le 19 Septemb.	70 Verseau	Immersion au bord obscur	19.31.45,89	В
Le 14 Octobre	19 Capricorne	Immersion au bord obscur	19.54.19,88	В
>>	n	Emersion au bord éclairé	21.22.41,96	В
2)	21 Capricorne	Immersion au bord obscur	0. 8.44,60	P
>>	n	. " " " "	45,10	B







DU TREIZIÈME VOLUME.

	rages.
De l'étiologie du goître et du crétinisme, par M. le docteur Gosse	211
Nouvelles expériences sur la perméabilité des vases poreux et des membranes desséchées par les substances nutritives, par M. A. Morin	251
Description des mollusques fossiles qui se trouvent dans les grès verts des environs de Genève (Quatrième partie : Acéphales Pleuroconques), par M. F. J. Pictet, prof., et M. le Dr W. Roux	279
Note sur la mesure des hauteurs par le baromètre, par M. le Dr E. Ritter.	343
Mémoire sur la cause des aurores boréales, par M. A. De la Rive, prof	373
Bulletin bibliographique. Liste des ouvrages reçus par la Société pendant l'année 1855	411

Observations astronomiques faites à l'observatoire de Genève dans l'année 1850, par M. le prof. É. Plantamour.





